


HISTOIRE
DES
MALADIES DU PHARYNX



D^r C. CHAUVEAU

HISTOIRE

DES

MALADIES DU PHARYNX

III

MOYEN AGE OCCIDENTAL ET TEMPS MODERNES

PRÉFACE DE M. LE D^r DU CASTEL
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE



74113



PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19, RUE HAUTEFEUILLE, 19

1902

MOYEN AGE OCCIDENTAL
ET
TEMPS MODERNES



I

MOYEN AGE OCCIDENTAL

Les textes ci-joints étant écrits en une langue beaucoup plus familière à la majorité des médecins que le grec, et leur latin très facile ne présentant aucune difficulté sérieuse, il nous a paru inutile d'en faire une traduction française.

Conformément à l'usage actuel, nous avons — ce qui n'a pas été fait dans le premier volume — supprimé les accents.

I. PREARABISTES

MACER FLORIDUS

LXXVII

Aloès.

Sunt aloe species geminæ, quæ subrubet estque
Intus sicut hepar cum frangitur, hæc hepate
Dicitur, et magnas habet in medicamine vires,
Utilior piceo quæ fracta colore videtur.
Phlegmate mundificat stomachum, caput articulosque.
Leniter humorem nocuum purgando per alvum;
Ictericos purgat, jecoris juvat interiora.
Vulnus quodque recens putredine purgat ab omni.
Illius injectus pulvis siccandoque sanat;
Præcipue yeretri dicunt et testiculorum
Ulcera curari vel vulnera pulvere tali.
Si solvatur aqua, juvat apostema labrorum
Et naris superappositum, nec non oculorum;
Livoremque fugat, sic circa lumina factum;
Acri cum vino miscens oleoque rosato
Unge dolens caput et frontem, mireque juvabit.
Ungvine pruritus sedabitur hoc oculorum.
Cum vino bene contritum cataplasmaque factum
Confortat, retinetque pilos quoscumque cadentes;
Linguæ, gingivis, vitiis quoque subvenit oris,
Si fricentur eo cum vino melleque trito.
Hoc sumptum per se ventrem non solvit acute,

Esse tamen stomacho putat Oribasius aptum,
Cum lædant illum solventia cetera ventrem ;
Illius geminas cum mulsa sumere dragmas
Idem præcepit, choleram sic flegmaque purgat.
Unaquaque die, post cenam sumere dixit
Utile tres ejus pilulas binasve virentis
Cum suco caulis formatas, ut faba grossas
Aut cicer, humores nocuos cum stercore purget,
Non corrumpendo stomachum neque vim faciendo.
Purgatus pilulis fuerit qui sæpius istis,
Vix unquam capitis vexabitur ille dolore,
Et nihil est oculis, mihi crede, salubrius istis ;
Si vero duram vis solvere largius alvum,
Partibus est geminis pars admiscenda terendo
Una diagridii, sic apta solutio fiet.

XXVIII

Cepa.

De cepis medici non consentire videntur:
Namque Dioscorides inflare caputque gravare
Atque sitim cepas dicit succendere mansas ;
Fellitis non esse bonas, ait ipse Galenus,
Phlegmaticis vero multum putat esse salubres ;
Non modicum sanas Asclepius asserit illas
Et dicit, quisquis jejunia solverit illis
Unaquaque die, quod vivet hic absque dolore.
Affirmant omnes mansas inferre soporem,
Et dicunt illas mollire salubriter alvum ;
Appositas perhibent morsus curare caninos,
Si tritæ cum melle prius fuerint vel aceto ;
Apponunt alii cum vinò melleque coctas,
Transactisque tribus solvunt cataplasma diebus,
Sal, rutam cepasque Dioscorides jubet anguis
Morsibus apponi, sic asserit ille juvari.
Femineo lacti commixtus sucus earum
Pellit sæpe graves infusus ab aure dolores ;

Hic succus commixtus aquæ bibitusque juvabit
Illos quos subitus facit obtumescere morbus.
Naribus attractus harum tantummodo succus
Humores nocuos capitis deponere cogit;
Mansæ vel potæ tardantia menstrua purgant.
Triturasque pedum, soleæ quas vel caligarum
Duritiae faciunt, succo sanabis eodem,
Cum gallinarum pingui si sæpe perungas.
Mane sibi dentes qui succo perfricat isto,
Dicunt hunc dentis nunquam sentire dolorem;
Ulcerâ compescunt oris cum pane comestæ.
Intingens oleo coctas qui sumpserit illas,
Sedat quos intus dat dysenteria morsus.
Contritis cepis loca denudata capillis
Sæpe fricans, capitis poteris reparare decorem.
Oris feteri prosunt, fastidia tollunt,
Hasque jubent hæmorrhoidis superaddere tritas.
Illarum succus caligine lumina purgat
Admixtus melli; maculas quoque junctus aceto
Emundare solet, si sint hoc sæpe fricatæ.

XLV

Hyssopum.

Hyssopum est siccum, calidum quoque, tertius illi
Est in utroque gradus. Ejus decoctio facta
Sic ut cocta simul sint mel, ficus quoque sicca,
Prodest non modicum patientibus hausta catarrhum.
Subvenit et voci raucæ versata palato,
Et prodest cunctis pulmonum sumpta querelis;
Lumbricos ventris eadem potata repellit.
In pectus capitis si destillatio fiat,
Quod persæpe solet tussim phthisimque creare,
Prodest hæc eadem decoctio sumpta frequenter.
Omnibus his prodest pulvis cum melle jugatus.
Contrito viridi si jungitur oxymel illi,
Sicque datur bibitum, stipatum molliet alvum,

Cum vento nocuo viscosum flegma repellens;
Cardama si jungas his, solves fortius alvum.
Potio si viridis vel sicci sæpe bibatur,
Vultibus eximium fertur præstare colorem;
Cum nitro et ficu sicca si conteris ipsum,
Et superapponis spleni cataplasma tumenti
Hydropicisve, solet siccando repellere morbum.
Cum vino bibitum præcordia tensa relaxat,
Et quicumque nocet tumor interiora recedet.
In quo decoquitur si dens foveatur aceto,
Fertur ab immodico cito sæpe dolore levare.
Accensi fumo sonitus compescitur auris.
Elixum appositum livores limpidat omnes,
Sic juvat ictericos injectum naribus idem.
Auriculæ dicunt gravem curare dolorem,
Hoc mixtum roseo si fundis intus olivo.

XLIII

Iris.

Iri dat florum nomen color ipse suorum :
Caelestis similes sunt nempe coloribus iris.
Illyricam dicunt illam, quia plurima nasci
Fertur in Illyria. Vis ejus sicca calensque
Dicitur atque gradum dant huic in utroque secundum.
Major vis hujus est in radicibus herbæ :
Has desiccandas, per frusta rotunda secatas,
Sic ut se partes non turgent insere filo,
Inque loco sicco fac suspendantur in umbra :
Vix aliter totum poteris servare per annum.
Cum vino sedant tussim, præbentque soporem.
Si latitans intus sanies præcordia lædit,
Pellitur illarum cum vino pulvere sumpto ;
Cum mulsa bibitus choleram depellit iniquam,
Tormina commixto bibitus sedabit aceto,
Hocque modo sumptis dicunt prodesse venenis.
Splenetis, et contractis, et frigore læsis

Cum vino bibitus pulvis medicabitur ejus,
Hocque modo sumptus tardantia menstrua purgat.
Duritias stericas radicum coctio mollit,
Si subtus tepida foveantur sæpius illa;
Hæ cum clysterio si sit subjecta per anum,
Non modicum sciasis dicunt prodesse dolori;
De radicibus his mixto collyria melle
Fiunt, quæ vulvæ pellunt subjecta secundas,
Inque locis hæc fixa cavis syringia curant.
Commixtus melli desiccat vulnera pulvis
Carneque nuda replet, si sit superadditus, ossa.
Pulveris ellebori pars tertia jungitur albi
Iris radicum tenui cum pulvere duplo,
Pulvis uterque simul commixto melle ligatur:
Hoc superappositum purgat lentigine vultum,
Et papulas ejus istud cataplasma repellit.

XXXVIII

Origanum.

Origani vires calidæ siccæque leguntur,
Tertius huic in utroque gradus conceditur esse.
Illius in vino curat decoctio sumpta
Quosvis pestiferos morsus, si sæpe bibatur;
Cum mulsa sumptum prodest aconita bibenti,
Sic multis aliis dicunt obstare venenis.
Conquassata juvat mansum vel sæpius haustum,
Hydropicos reprimat bibitum siccaturque tumores.
Cum mulsa bibitum choleram deponere nigram
Dicunt, oxifali fuerit si pondere sumptum.
Menstrua reducet bibitum vel si superaddas
Tritum, vel cocta mulier si se foveat herba.
Illius pulvis tussim cum melle repellit;
Pruritus, achoras maculasque cutis fugat omnes,
In quo decoquitur si sæpius amne laventur;
In lavacro juvat ictericos hæc coctio sumpta;
Succus prædictæ viridis si sumitur herbæ,

Uvas et fauces curat siccando tumentes;
Oris vulneribus medicabitur ore retentus;
Naribus infusus irino mixtus olivo
Invisum capiti coget manare cruorem;
Auribus infusus sedat cum lacte dolorem;
Hic succus mixtus cepis et rho Syriaco
Ponitur ad solem tunc quando Sirius ardet,
Sicque quaterdenis fervebit in ære diebus;
Si supponatur lecto confectio talis,
Effugat, ut dicunt, animalia cuncta nociva.
His quibus ex aliquo vitio digestio tarda
Evenit, ex vino prodest si sumitur albo;
Cum calida morsus stomachi lenire probatum est.
Illius succos oleo mixtos et aceto
Succida lana bibat, et sic superaddita membris
Luxatis et contusis multum juvat illa.
Provocat urinam, lumbricos projicit haustum,
Dente diu tritum solet inde fugare dolorem.
Omnia potatus succus juvat interiora;
Ejus cum succo si carica trita bibatur,
Sudorem poris producere fertur apertis;
Appositus coxis succus cum polline farris,
Harum sæpe gravem pellit reprimitive dolorem.

XXXII

Papaver.

Dicunt vim gelidam siccamque papaveris esse.
Tres illi tribuunt species : flos unius albus,
Alterius roseus, rubeus pallensque minoris
Flos est, hanc vulgo dicunt agreste papaver.
Cunctis nobilior est cui flos nascitur albus;
Ex hujus teneris opium faciunt capitellis,
Incisa leviter summa cute, lacque quod inde
Defluit, excipiunt cochleis, siccumque reservant,
Antidotis multis aptum variisque medelis.
Sunt qui contundunt cum lacte suo capitella.

De quibus expressum siccant in sole liquorem;
Post primum, succus vires habet iste secundas.
De specie vero, roseos quam gignere flores
Dixi, conficiunt oleum de semine tunso,
Non modicum gustu jucundum somniferumque.
Tertia, cui flos est rubeus semenque nigellum,
Præstat, si bibitur, reliquarum more, soporem.
Elixatura tepida cujuslibet harum
Æger si foveat faciem, vel si bibat illam,
Optatum capiet, nisi sit mors proxima, somnum.
Sperma nigri bibitum cum vino stringere ventrem
Dicitur, hocque modo-fluxus inhibet muliebres;
Somnum dat bibitum, tussim compescit iniquam.
Pondere denarii debent hæc semina sumi;
Nam plus lethargum vel mortem sæpius infert.
De foliis ejus tritis factum cataplasma
Eximie fauces dicunt curare tumentes,
Quosque vocant sacros exstinguere dicitur ignes;
Frigore vel cantu, potuve, cibove, vel æstu
Aspera si fuerit vocalis reddita vena,
Apposito tali fiet medicamine lenis.
Candida meconii species (sic nempe vocari
Græcorum lingua dicunt quodcumque papaver)
Longe nobilior est utiliorque duabus;
Tunc cum lacte fluunt capitella papaveris hujus
Lecta coquantur aqua, cui sit pars tertia mellis
Addita, cuncta coquas, donec decoctio spissa
Sit quasi mel, varios sic conservetur ad usus:
Sumpta facit somnum, tussim fugat, abstinēt alvum,
Vocalis venæ bene rheumatismata siccāt.
Ejus de teneris opium factum capitellis,
Sicut jam docui, roseo miscebis olivo;
Unge caput mixtis, sedabitur his dolor omnis
Et solet hoc unguen somni præstare quietem.
Prædictis admisce croci redolentia fila,
Auris curabis hæc infundendo dolorem;
Hoc quoque femineo cum lacte crocoque subacto
Ungendo calidam poteris sedare podagram;

Ano suppositum solet hoc adducere somnum;
Istud idem solo præstare putatur odore.

LXVI

Piper.

Carminè jam dictis aliquot vulgaribus herbis,
Nunc species illas, quas cunctis jam prope notas
Usus vendendi fecit, tentabo referre,
Atque prius piperis (quod notius ipsa coquina
Quam medicina facit) vires puto discutiendas.
Virtutis siccæ piper asseritur calidæque,
Tertius esse gradus conceditur huic in utroque.
Tres sunt huic species : album, longumque, nigrumque;
Sed quia sunt geminæ medicis tantummodo notæ,
De specie nigra dicam quædam mihi nota.
Crudum vel coctum sumptum, vel melle jugatum,
Vim digestivam stomachi jecorisque juvabit.
Morsus pestiferos curat, fastidia tollit,
Occurrit variis thoracis sæpe querelis,
Quodque movere solet frigus periodica febris
Compescit, febris si sumitur ante tremorem.
Cum lauri baccis vel cum foliis bene tritis,
Cumque mero tepido potatum tormina sedat,
Et scrophas reprimit admixtum cum pice dura
Et superappositum; recte quoque jungitur illis,
Quæ purgare solent oculos caligine dira.
Admixtum nitro maculas cataplasmate delet,
Usti stercoris humani cum pulvere tritum
Una junge piper, et sic superaddito cancris,
Experti nihil utilius hoc pulvere dicunt.
Nemo potest omnes piperis describere vires;
Namque piper ferme medicamina cuncta requirunt,
Antidotisque solet pretiosis pluribus addi.
Hinc puto tam paucas laudes de simplice dictas
Quod sit in innumeris hoc dignum laude medelis.

VI

Plantago.

Herbam, quæ nostra lingua plantago vocatur,
Hanc arnoglossam Græcus vocat, est quia linguæ
Agninæ similis foliis. Plantaginis hujus
Sunt geminæ species, et major prima vocatur,
Altera vero minor, quam vulgo lanceolatam
Dicunt, quod foliis, ut lancea, surgit acutis.
His infrigandi dessiccandique notatur
Tertius esse gradus, majoris vim tamen esse
Majorem dicunt, nimis humida vulnera siccant,
Si superaddatur cum melle, et sordida purgat.
Cum sale sicut olus si juncta coquatur aceto,
Ventrem restringit nimium sic mansa fluentem;
Si supradictis lens sit concocta, juvabit
Hic dysentericos melius cibus et cæliacos.
Stringit manantem superaddita trita cruorem,
Et nigris maculis fertur reparare colorem,
Ovi cum lacrymó mire medicatur adustos.
Sola canis morsum curat sedatque tumorem,
Et scrophas spargit superaddita cum sale trita.
Hydropicis ut olus decocta comestaque prodest,
Sic juvat asthmaticos, ferturque juvare caducos.
Sordida purgabit bene vulnera quælibet oris,
Ore diu tentus si succus volvitur ejus.
Hic introfusus curat syringia succus,
Et dolor hoc auris sedabitur et sacer ignis.
Fert hæmoptoicis hic opem, si sæpe bibatur
Per se; fortior est si sit conjunctus aceto;
Sicque juvat phthisicos; injectus vero per anum
Stringit non modicum fluxum dysentericorum.
Pellitur ex oculis tumor hoc fervorque perunctis.
Sæpius hanc ipsam si dentibus atteris herbam,
Gingivas reprimet tumidas et sanguine plenas,
Sicque solet dentis compescere sæpe dolorem.

Succus cum lana matrici subditus ejus
Stringit manantem nimium siccando cruorem.
Cunctis prædictis ejus decoctio causis
Prodest et potus cum vino seminis ejus,
Vesicæ renumque juvat potata dolorem.
Dicunt non nasci scrophas. gestantibus ejus
Radicem collo suspensam, vis sibi tanta est.
Radices ejus tres contere, jungito tritis
Vini tres cyathos et aquæ fac sit modus idem,
Hæc nondum tremulo potanda dabis febrienti:
Sic pelles febrem, cui dat lux tertia nomen;
Bis binæ quoque quartanis prodesse putantur
Cum totidem vini cyathis si dentur et amnis.
Cuncta potest *plantago minor* prædicta juvare,
Quamvis non tantas vires videatur habere.
Præcipue succus curat plantaginis hujus,
Quod juxta nares vel lumina nascitur, ulcus,
Si superaddatur cum lanis mollibus illi,
Perque novem cataplasma dies istud renovetur.
Ejus si succo tepidus venter foveatur
Acri depulso sanabitur ille dolore.
Lumbricos succus depellere dicitur ejus.
Si porcina vetus axungia jungitur illi,
Sedabit duos istud cataplasma tumores;
Parotidas vulnusque recens hoc adjuvat unguen.
Antè duas horas quartanæ quam tremor ægrum
Vexet si succum biberit plantaginis hujus,
Sentiet eximiam facili medicamine curam.
Ejus potatum depellit sperma secundas.
Si via longa pedum movet, ut fit sæpe, dolorem,
Acri cum vino superaddita trita juvabit.
Cum passo succus bibitur si sæpius ejus,
Vesicæ variis fertur succurrere morbis.
In dessiccando vis est *plantaginis* ingens
Majoris, queat ut veluti cauteria corpus
Appositum siccare, refert ut Plinius auctor.
Composuit librum Themison de viribus ejus,
In quo præclaris celebravit laudibus illam.

XIII

Porrum.

In multis causis usus medicamine porri
Dicitur Hippocras, medicinæ maximus auctor,
Istius succum solum dedit ille bibendum
Ægrotis, qui rejiciunt sputantve cruorem,
Quos hæmoptoicos soliti sunt dicere Græci;
Cum galla dant hunc alii thurisve farina,
Aut geminis drachmis porrorum seminis unam
Apponunt myrrhæ, vino quoque trita resolvunt;
Præ cunctis aliis dicunt hæc sumpta juvare,
Manantemque potes naris retinere cruorem,
Intus si nares ungas medicamine tali.
Contractas vulvas succo curabis eodem;
Reddit fecundas mansum persæpe puellas;
Ulcera cum melle tritum juvat appositumque.
Humorum capitis si destillatio fiat
Pulmones pectusque nocens vocemque canoram
Indeque consurgat tussis præcordia lædens,
Cum ptisana succum porri sorbere juvabit;
Et per se solum prodest his omnibus ipsum.
Si porri partes in lympa coxeris albas,
Sic ut aquam primam mutes, addasque secundam,
Utilis ejus aquæ duro sit potio ventri,
Dicitur hæc eadem cum vino stringere ventrem.
Cum vino porrum datur his quos læserit anguis
Quodlibet aut animal fundens lethale venenum;
Nec minus his prodest, si vulneribus superaddas
Sic velut emplastrum porrum cum melle subactum.
Commixtus porri succus lacti muliebri
Et bibitus tussim fertur sanare vetustam,
Et variis vitiis pulmonum subvenit idem.
Aurem compescit cum capræ felle dolorem,
Præstat idem pariter cum mulsa mixtus et auri
Infusus tepidus; fungis, si manditur, obstat.

Ejus jungatur succo pars tertia mellis,
Et sic per nares tepidum fundendo vel aures
Immensum poteris capitis sedare dolorem.
Cum vino bibat hunc, lumbrorum quem dolor angit.
Dicunt utilius tali nihil esse dolori :
Fracturas solidat cito, duritiasque relaxat
Appositum, vulnusque recens cito cum sale claudit.
Si crudum fuerit sumptum levat ebrietatem,
Sic venerem stimulat, sic duram mollit et alvum.

LXVII

Pyrethrum.

Est pyrethrum calidum siccumque, quartus in istis
Est gradus; excruciat dentes si frigidus humor.
Masticet hoc patiens, teneatque diutius ore,
Et juvat admixto si gargarizetur aceto;
Hocque modo tumidam reprimit de flegmate linguam;
Sic uvam relevat humoris pondere pressam,
Et multis aliis vitiis sic subvenit oris.
Non modicum prodest sumptum cum melle caducis,
Sicque levare solet morbum qui membra resolvit;
Suspensum collo pueris prodesse caducis
Creditur et solo succurrere fertur odore.
Ex oleo quo decoquitur si corpus inungas
Ante febris motum, minuet tolletque rigorem,
Renum sæpe gravem fugat unguen tale dolorem,
Miram sentit opem paralyticus inde perunctus,
Non leviter manibus fuerit si sæpe fricatus;
Unguine si totum corpus mulcebitur isto,
Largus per poros sudor procedet apertos;
Membrorum solet hoc quemvis curare stuporem,
Et corpus servare potest a frigore tutum,
Et medicamento solvetur tetanus isto.
Tantumdem prodest, si tritum solvis olivo
Sicque fricando locum quem vis medicare perungas.

XXI

Rosa.

Dici flos florum nobis rosa jure videtur,
Quod specie cunctos præcedat odoreque flores.
Non tamen hæc specie tantum nec odore juvare
Nos valet, at variis nos adjuvat illa medelis,
Ejus sicca gradu vis est et frigida primo.
Compescit sacrum, si trita apponitur, ignem;
Sic quoque, si stomachus calet aut præcordia, sedat;
Fluxum matricis cum vino stringit et alvi;
Illius succum collyria plurima quærunt,
Et siccae pulvis morbis bene subvenit oris,
Infriktus per se tantum cum melleve mixtus.
Omnes fervores superaddita trita coerces
Ipsa recens, vel si mulsæ commixta bibatur.
Ex hac conficitur oleum, roseumque vocatur,
Diversis morbis et multis utile causis:
Si bibitur, ventrem mollit stomachique colorem
Exstinguit nimium; bene si foveatur eodem
Et dolor et fervor capitis curabitur illo;
Permiscendo sibi si forte jugatur acetum,
Expurgat sordens vulnus repletque profundum
Et combusturis præclare convenit ignis;
Ore diu tantum dentis sedare dolorem
Dicitur et duras palpebras reddere molles;
Aufert suppositum pruritus interiorum
Et stercis variis solet hoc succurrere causis.
Hoc oleum quoniam variatur conficiendo,
Dicam Palladius quid scripserit inde peritus:
Quod rubeum fuerit foliorum sumito floris,
Uncia sic purgatorum jungatur olivi
In libra, vitreo sic claudens omnia vase,
Sub Phœbo tantum septem suspende diebus:
Inde medelarum varios servetur ad usus.

XL

Violæ.

Nec roseus superare decor, nec lilia possunt
Fragrantes violas specie, nec vi, nec odore.
Dicitur humida vis illis et frigida primo
Esse gradu; species tres esse leguntur earum,
Noscere quas tantum diverso flore valemus :
Nam sunt purpurei flores albique nigrique ;
Cunctis pæne pares sunt in medicamine vires.
Inflammata juvant loca, tritas si superaddas ;
Crapula discutitur bibitis, capitisque gravedo
Olfactu solo vel si caput inde coronas ;
Anginis potæ medicantur aqua resolutæ ;
Purpuream violam dicunt curare caducos
Præcipue pueros, si mixto sumitur amne.
Radices violæ cum myrrha tunde crocoque,
Hoc inflammatis oculis apponito nocte ;
Contritis foliis violæ cum melle perungens
Ulcera sanabis capitis ; si pungis acetum
Et cataplasma facis, cedit collectio quævis.
Illius curat elixatura tumorem
Matricis, tepida si sæpe fovebitur illa ;
Ani fissuras, quas appellant rhagadias,
Addita cerotis medicatur sæpe perunctas ;
Pustula si fuerit, melli superadde jugatam ;
Illius semen cum vino menstrua purgat ;
Tritæ commixto radices ejus aceto
Splen siccant bibitæ vel spleni si superaddas ;
Hocque modo calidam dicunt sedare podagram.
A stomacho choleram rubeam potata repellit
Herba virens violæ vel flos siccusve recensve ;
Morbos de cholera rubea vel sanguine factos,
Mollibus in costis aut in pulmonibus ipsis,
Sedat si mixto potabitur amne recenti ;
Infantum tussim sic et suspiria sedat.
Ex violis oleum sicut de flore rosarum

Conficiunt, multis quod dicunt utile causis,
Auribus infusum sonitum fugat atque dolorem,
Et capiti prodest quocumque dolore laboret,
Leniter infrigidans corpusque sopore resolvens;
Lumbricos necat infusum bibitumve vel unctum,
Et capitis furfur oleo depellitur isto.
Os capitis ictu fuerit si forte plicatum
In tantum, ut linguæ patiens amiserit usum,
Fac prius hanc violam cum vino sumere tritam;
Postea, si fuerit capitis pars dextera læsa,
Contritam plantæ pedis hanc adnecte sinistri,
Atque e conservo facies si læva plicata est :
Os resilit, linguæque die redit usus eadem,
Ut Justus tradit medicus, qui talia scripsit.
Altera vis violæ fertur mirabilis esse :
Albæ si violæ radix teneatur in ore
Et transglutitus sit succus sæpius ejus,
Vulneris immodicum tradunt mox sistere fluxum :
Hanc liquiritiæ tradit vim Plinius esse.

II. SALERNITAINS

GARIOPONTUS

XVIII

De Catarrho.

Catarrhon genera sunt tria : *Corrhyza*, *bronchos* (Tonsillitis) et tussis. Catarrhus dictus est a fluore. Græci enim fluorem, catarrhum vocaverunt. *Corrhyza* ab ossibus narium dicitur. Hæc est cum gravedine et constrictione narium cum fluore oris tenui aut crasso, cum sternutationibus assiduïs, et odoratu difficili, et oculorum lacrimatione. *Bronchos a præfocatione faucium dicitur*. Fit autem cum pruritu et titillatione faucium, et voce obscura, et sternutatione assidua, et deglutiendi difficultate. Catarrhum ex hoc apprehendimus, ex gravedine et constrictione narium, ut neque odorare, vel anhelitum reddere nisi per os queant. Cum fluore tenui, aut crassi et viridis humoris continuis sternutationibus, atque pruritu frontis, et frequenti conamine delectationis emungendi. Aliquoties aqua, quasi sinapin aut cepulas manducantium, per nares egeritur. *Aliquando pars una capitis ex ipso impetu condolet*. Quod si in viscera distillet, percutiens stomachum tussim vel nauseam provocat. Si vero in pulmonem venerit, tussim creat cum spumosis sputaminibus. Aliquibus cum raucedine et thoracis gravedinem facit. Quod si sanguinem expuerint, ad tussim veniunt, et tabidi moriuntur.

Cura. — Omnis cura capiti adhibenda est. Illud vero unguatur ex oleo irino, aut lorino, aut camomillino, aut cyprino, aut anetino, aut rutaceo et collum thoraxque acopo termantico et plantæ pice liquida unguantur. Capiti lana succida opponantur; balsa-

mum auribus instilletur. Optarmicum vero ex pulvere piperis, euphorbii, melantii, iris illiricæ, rutæ, cimini, tosti, pulegii in linteolo ligato naribus apponis, provocando sternutamentum. Ibi sorbiles levesque cibos accipiant : hæc corrhyzæ et broncho fieri conveniunt. Sed præter hæc bronchos arteriarum gargarisma et electuarium liniens asperas fauces et aperiens quærit. Præterea catarrhum patientibus si tussis dura fuerit sine sputorum fluore, merum calidum dare debemus. Et si non febrit, tres ficcus siccas et assas cum pulegio et pipere trito comedendas dabis, aut oxymelle, sive elixaturam fœnugræci, vel hyssopi in mulsa cocti. Item gargarismi fiant, quibus phlegma et rheuma foris provocentur. Item electuarium ex irei radice sicca et hyssopo, aut thymo simul æqualiter triti et cum melle mixtis, jejuno coclear et post cenam unum dandum est et sternutamenta provocentur. Cibos leves et sorbiles accipiant. Ibi causis sive singulis, sive conjunctis sic subveniendum est.

XIX

De Uva.

Uva aliquoties ex catarrho tumescit, aut inflatur plerumque ex sanguine; aut ex humoris abundantia, et in faucibus laxant suis clausis foraminibus. Aliquando est ut mamillarum capite humor retinetur, cujus pondere cogitur jacere; quæ primo distillando tussiculam facit; at si frequenter distillaverit, ad perniciem deducit.

Cura. — Illa vero quæ tumet et rubet, debet siccari. Quæ autem est pannosa tenuis et liquida et longa, cum summa diligentia incidatur. Post ex posca frigida gargarismus fiat. Non autem a radicibus incidatur, ne forte cicatricem non faciat.....

XX

De arteriacis.

Arteriacy sunt quibus dentes rheumatizant cum asperitate gutturis interius, et quando excreant asperitatem faucium, quasi

aliquid illis in gutture adhæreat, sentiunt, aut vox eorum secundum naturam clara non fit. Sequitur modica tussis cum coctura faucium interiorum. Aliquando excreatur phlegma spissum, et tarde redditur. Aliquando solutum ejicitur. Modica febris cum macie corporis sequitur. Passio hæc ex humore capitis fit.

Cura. — Curantur autem sic. Leves et sorbiles cibos accipiant. Farina quoque aut similia tenuissima cum melle cocta danda est. Lac caprinum cum melle jejuni sorbeant. Cerebella et minores carnes coctas in vino dulci manducent, et vinum granatæ bibant, jejuni tepidum gargarizent, aut diamoron, aut diacodion, aut de penna fauces unguantur. Item pro arteriarum asperitate rosarum flores siccos, aut mala cydonia matura in aqua cocta, aut sapam, ubi coxeris pulegium, gargarizent. Item tragaganthum in melle infusum tere cum nucleis, et addito melle despumato quantum sufficit, dato coclear transglutiendo mane et sero per triduum ad mansionem.....

XXI

De Synanchia.

Synanchicorum causæ duæ sunt, quas sic intelligimus. Una est quæ in faucibus nascitur, quæ facile apparet. Alia in gula et difficilis est ad videndum. Sed ejus, quæ in faucibus nascitur, quæ etiam periculosa non est, signa hæc sunt : Tumor magnus et rubeus, ore aperto, apparet. Anhelare, deglutire, bene loqui non possunt prefocationis causa quam patiuntur.

Cura. — Cura eorum talis est : Diacisma, vel diamoron vel gargarisma sic facis : foliæ rosæ siccæ, lenticulam, dactylos in succo moræ coques, et mellis coclearibus iij additis, ex succo ipso gargarizent. Item passi calicem plenum et liquiritiæ semel unciam similiter teres et addita aqua decoctionis caricarum, inde assidue gargarizent et extra hoc cataplasma, scilicet pollines fœnugræci et hordæi pari mensura in mulsa coctos, plagellis apponimus.

XXII

De secunda specie.

Altera synanchis species est quæ in gula periculosa nascitur; ejus signa hæc sunt : Tumor in gula et collo nascitur, pene non loquuntur vel anhelitum reddunt, cervicem torquere, ut umbilicum sibi videant vel inclinare non possunt. Hanc causam Hippocrates non synanchen, sed quinanchem appellavit, cui si non continua medicina subveneris, tertio die præfocans occidit. Hæc etiam causa in æstate magis fit periculosa.

Cura. — Si juvenis fuerit, phlebotomandus est, et venæ quæ sunt sub lingua scarificentur. Clysterizabis vero viscida ex hoc, id est aqua, oleo, melle, sale, nitro, aphronitro, simul mixtis. Guttur scapulas et pectus de caricis in aqua elixatis et semine papaveris agrestis et pollinibus hordei et fœnugræci calide cataplasmas. Corium malignanati in aqua infusum, et lenticulam alexandrinam cum terra sua, et omphacium simul coques, et exinde gargarizandum dabis, si bibi posset melius. Item passi partes duas et mellis unam mixtis, ibique hyssopo, et hypocystide, et caduca malignanati, et rore Syriaca de coctis gargarizare, aut bibere si potuerit dabis. Antidoti diacodion simplicis coclearia dabis il mane et sero quotidie, et trochiscos Andronii in passo solutos ei bibere dabis vel gargarizare, et ex mulsa vel melle solutis, cum penna loca perunges. Diacisma ex hirundinibus tale facis. Hirundines majores cum plumis suis in urceolo qui focum ferre possit includis, et pulveri earum in furno combustarum mej despumatum admiscens loca cum pennis perunges; quæ si minus valuerint, inter scapulas sanguinem tollis.

XXIII

De tertia specie Synanches.

Synanche dicta est a præfocatione, quia Synanchis græce præfocatio dicitur. Synanche est difficilis translatio spiritus, et præfocatio acuta, cum valido impetu circa ingluviem : sunt autem duo genera Synanchicorum : unum cum tumore, alte-

rum sine tumore. Hoc enim aliter diacosin possumus dicere. Ergo cum diacosin tonsillarum et uvæ et epiglottidis est, id est bronchi et ejus summæ partis, quam latine gurgulionem dicimus. Nihil sine molestia transglutiunt. Præfocatio modo impetum sequitur, quam Græci dyspnœam dicunt, nausea est illis, quasi qui conantur rejicere et nihil possunt. Qui enim hæc patiuntur, si quis eis os aperuerit, et linguam eorum digito compresserit, potest cognoscere utrum cum tumentia, aut sine ea sit. Si quando autem passio, per diacosin creverit, salivam in modum puris projiciunt, oculi eorum foris versi prominent et sanguinei fiunt, venæ tenduntur. Quod si adhuc interius vergat passio, excrevit tumor ultra dentes, lingua faucesque siccantur, summæ manus plantæque frigescunt, pulsus parvus aut pene nullus est. Inviti jacent supini aliquando in lateribus dulce est, sed dulcius est illis assidue sedere. Vox atque sermo incondite fertur et cum dolore, et cum ad mortem vergunt atque periculum, livescit eis facies, vox subtrahitur, oregmon malum patiuntur, quæ bibunt non trajiciunt, sine pulsa invenitur vena, quam Græci Affixiana dicunt. Sonum quidem subtilem reddunt, quidam et salivam agunt et in hoc mors et præfocatio. Verum altera hujus præfocationis species hæc signa habet. Gracilitatem vocis, cervicis tensionem, ut ante non possunt flectere cervices quæ tamen recte consistunt eis partes, ex quibus facies constat oculi concavantur, frons corrugatur color plumbeus sed et mæstitia et gravatio et profocatio est illis, dehinc mors. Quæ si ignis sacer in cervice aliquandiu permanens appareat, bonum est, quia impetus passionis exteriora petiit. Qui et si repente sine ulla ratione abcesserit, non evadunt, quia intus medullas invasit. Quod si ultra modum phlegmata salivasque agant in principio, malum est quia constrictio et præfocatio in fine bonum, quia laxatio ostenditur. Sæpe pro nimie valetudinis impetu fauces eorum quibus contingunt, cancerantur. Itemque anthereon et ipsum guttur locis interioribus omnibus manifestum est hanc passionem esse de instrictoriis acutam, sane aliquando continuam et aliquando ex intervallo agentem.

Cura. — Curantur autem sic : His qui constrictura laborant, cataplasma imponis janthereo aut in cervice, et si febris non est cucurbitentur aut phlebothomentur. Quod si volentes trajicere

aliqua potuerint, aqua mulsa adhibenda est usque ad declinationem. Et cataplasma quæ apponuntur non frigida, sed calida sint, et saccellos furfureos in aqua et oleo decoctos, aut venea in oleo calido impones aut quæ aperiant et hos calida pusca sub mento diutius foves, aut pyrias in ex calida ori et naribus applicabis. Deinde gargarisma laxativa quæ aperiant, aut hydroleon aut mulsa, aut lac cum melle, aut diamoron adhibeantur, seu ex his de penna fauces illiniantur vel cum calida mixta gargarizent, aut ex gallæ pulvere cum melle, de panna extra linies. Si tumor in faucibus erit, creta aut acatia cum aceto trita de penna linies. Item gargarisma ad item. Farinam cum furfuribus et liquiritia fœnugræcum et lini semen in mulsa coques. Quod si nimius tumor fuerit, passum cum mulsa addes, aut cum succi malvarum decoctione. Ros syriacus et adianthum et pingue dactyli et ficus aridæ coquantur, foveanturque manusque et pedes, et melotida lana ligata, ut solemus auriculæ facere, fauces legantur, post mulsam gargarizent. Quod si major impetus est, et tonsillarum et palati loca angusto scalpello scarificanda sunt. Post scarificationem, levioribus gargarismatibus utendum est, ex melle et lini semine, e fœnugræci decoctis, aut malva in mulsa decocta. Ante omnia phlebotomentur, et ad ventrem accipiant catharticum, et quicquid de succo aut sorbilibus fit, aut pulvis leves in mulsa coctas dabis, et in remissione porcinum cerebrum et agninum offeres, salsamentis et acrimoniis omnibus abstineant. Utendum est aut cerotariis de oleo dulci, aut ciprino aut glaucino, aut yrino, aut malagmate diaquilon, aut aliis cerotariis.

COPHRON

De Squinantia.

Phlegmatica iterum materia et sanguinea facit in faucibus synantiam. De dialthea et butyro partes extrinsecas mollire facias, et potius uti minutione sub lingua et scarificare et ventosam occipitaliam post hoc ponere. In ore mel rosaceum ægriteneant et mundificetur a putredine locus. Si fuerit synantia quæ circa tracheam locum habet, similiter minutionem facias, et da gargarisma Mithridati, vel theriacam cum vino distemperato. Caveas ab aliis gargarismatibus, ne materia morbifica decurrat ad locum dolentem. Pro cibis dentur sorbilia et hujusmodi. Inunge cum dialthœa commixta cum butyro. Hic morbus enim cito interfecit, vel cito curatur.

(*Thérapeutique.*)

CONSTANTIN L'AFRICAIN

De Angina.

In duobus libris præcedentibus tantummodo dictum est de infirmitatibus capiti et faciei accidentibus; nunc dicantur morbi membrorum ministrantium cordi : Cor enim lucerna corporis. Dicantur ergo morbi, et eorum causæ, et significationes subjungantur medicinæ, et incipiendum est a molestioribus, et suspectioribus, ut est angina. Unde Galenus : qualecumque, inquit, morbus in gulam venerit et inflatione spiritum tenuerit *συναγχή*, id est, suffocatio vocanda erit. Sed tamen hic morbus a se invicem diversatur. Angina enim passio aliquando est, ex humoribus a capite ad guttur descendentibus, aliquando primo die mortificans, vel secundo, vel tertio. Quia enim est peracuta, et mortifera, id est, hominem cito mortificat, et suffocat, idcirco *συναγχή* vocata est. Angustat enim flatum, ut infirmus neque cibum possit recipere, neque potum, vel si recipiat parvissimum; humores autem descendentes sanguinolenti sunt, vel cholericici, vel phlegmatici, viscosi et salsi. Ex melancholia enim nunquam hoc apostema fit, quia hic morbus cito prævalet cum sit semper acutissimus. Sed melancholia post longum tempus operatur. Unde impossibile est de nigra cholera esse. Flatus in angina laborantium proprie est longus. Causa ejus longitudinis strictura est gutturis. Quod cum quantum sibi sufficiat aërem in impetu sibi trahere non valeat longo spatio, necesse est ut expleat. Anhelitus ergo brevis, laudabile signum est in angina. Unde Galenus super Prognostica Hippocratis : Pessimum anginae generis est, quod comitatur spirandi difficultas, neque nimium dolorem, vel angustiam fecisse videtur exterius : in gula, sive in collo si tumor non apparet, neque rubor. Minus est malum si non anhelitum habet angustum sed cum tumore, et rubore, in gula, et collo facit dolorem nimium. Minus etiam est malum, cujus non nimius dolor est neque flatus angustiosus. Hoc

genus non est in gutture, sed in jugula, vel in collo, vel in utroque. Oportet ut signa humorum dicantur, unde hic morbus concreatur. Si sit ex sanguine, infirmus apparet plenus corpore rubet in faciei, venæ faciei sunt plenæ, densus pulsus, tumor calidus, et rubeus. Monstrat æger quasi vinum jugula sapiat. Diæta ejus antea multi sanguinis fuit generativa. Ex cholera rubea, fit fortis dolor, angustia nimia calor atque sitis maxima, fumositas in gula, pulsus vacuus, et fortis. Ex viscoso phlegmate dolor non est nimius, neque prædicta signa in eo videntur, tumet lingua, et mollescit, dolet parum. Ex salso phlegmate, sapit amarum salem in gula. Vox ejus sicut catulorum parvulorum. In hujusmodi medicandi, humores sunt perquirendi. In sanguine, cephalica vena est minuenda. Hippocrates in epidemis : « In angina inquit oportet incidere venas. » Galenus semper incidere dixit venas secundum quod oporteat, id est, quantum virtus satis valeat. Dat autem intelligi duobus modis debere incidi, secundum magnitudinem morbi, vel quantitatem virtutis. Synanche autem ex majoribus morbis. Si sanguis cum cholera rubea mixtus esset, perpenditur, ventrem humectare debemus cum cathartico de cassia fistula, oxyfœnicia, jujubis, viola, et similibus. Similiter, cum clysteribus de viola, et semine málvæ, chamomillæ, prunis, jujubis et similibus. Extincto autem acumine humoris cholerae rubeæ et egrediente cum cholerica egestionem, cephalica phlebotometur, ut exeat sanguis a cholera rubea incensus. Post phlebotomiam, et purgationem, redeundum est ad membra, ubi morbus maxime regnat. In principio medicemur cum his, quæ repugnant humoribus ad guttur descendentibus, et ipsum guttur confortantibus, sicut sapa est de moris, vel cum solatri, vel cum succo arnoglossæ. Detur deinde gargarismus, furfur quoque hordei aceto infusum, et colatur, et aqua detur ubi balaustia, rosa, vel galla sint cocta vel lentes, sive solatri succus, sive psyllii. Omnia sint stiptica, et repugnativa, quæ cum fecerimus, et humores extenuaverimus ad humores dissolvendos in infirmis membris clausos redeamus cum gargarismis de sapis mori, et sapa vini comixta et pauca myrrha vel ptisana cum saccharo, vel lacte caprino, sive asinino cum saccharo, et pauco croco, vel cum cassia fistula, et sapa in aqua calida, vel cum succo

portulacæ. Quodamque horum invenerimus, inde infirmo fiat gargarismus, quia humores dissolvuntur. Cibum demus parvissimum, qui sit vel medulla pistata, Amylum tragagantum cum amygdaleo. De his omnibus jus conficiatur, et jejuno detur, vel amyllum cum lacte, et amygdaleo. Nutriendus est cum chrysolocanna, blitis, portulaca, quæ cum amygdaleo sint parata. Si apostema sit phlegmaticum, quod ex predictis signis intelligendum est, cum cathartico phlegmatis depositivum erit purgandum cum clystere similiter et gargarismus, in morbi principio. Fiet aut de sapa nucum, cum anetho, vel ubi cortices nucum sint cocti, vel ubi mora, vel succus solatri cum oculis lucii, vel aloë. Humoribus his dissolutis ad membra curanda redeamus ubi humores mali includuntur. Gargarismum faciemus cum sapa nucum, addito pyrethro, vel sapa sola, vel oxymelle, vel sapa myrtina, vel aqua ubi ficus siccæ sint coctæ, vel cum caprino lacte, et stercore canis albo subtiliter pistato, et cum melle distemperato. Oris interiora omnibus his ungamus cum penniculo. Galenus dixit, hæc omnia utilia esse. Accipiamus item caninum stercus et pulveratum, in os projicietur cum felle taurino; melle buccam ungamus. Gargarismum faciamus. Item Galenus: Fel inquit taurinum suffocationi uvulæ cadentis est adjutorium, similiter fel ovinum. De cinere radicum caulii cum melle faciamus gargarisma. Similiter, succus radice juvat cum oxymelle. Aliud gargarismus valens ad anginam ex phlegmate: liquiritiæ drachm. 3 pyrethri, cassiæ, cicutæ seminis, ana drach. 2 fœnugræci, myrrhæ, ana 1, croci, piperis nigri, spicæ, ana dracht. II. Fac pulverem, cum melle distemperatam, et in modo avelanæ accipiat et cum aqua ubi cortex mali granati sit coctus; tempera cum vino odorifera forti, vel cum oxymelle. Aliud valens similiter: Rosæ drach. 2. Stercoris canini, croci, anna exagium; tempera cum oxymelle, inde os unge, et fac gargarizare. Aliud quoque valens: rosæ, liquiritiæ, anna exagium I cinnamoni, piperis longi, croci, a. I. drach, aluminis scissi. cardamoniæ, myrrhæ, et sinapis, zingiberis. costi, ana, scrup. II. Fac pulverem; adde mel quod sufficit. Accipe in modo avellanæ, vel cum sapa, vel cum aqua ubi cocta sit galla, vel cum succo solatri, vel cum melle et cum aqua calida.

(*Medicinæ lib. II.*)

POEMA MEDICUM DE CHIRURGIA

*(De Secretis mulierum, de chirurgia et de modo medendi,
libri septem (Renzi collectio Salernitana, t. IV).*

De cancro in naribus, labiis, gengivis et palato.

Naribus et labiis, gingivis atque palato
Insurgit cancer, locus et corroditur ipse
Circumquaque; locus etiam quandoque rubescit
Inversatque cutim, nec eam corrodit at ipsam
Interius carnem; si vero sit undique dura
Livida sive nigra caro, cura gravis tibi fiet!
Si vero labrum vel nares commaculata
Vel corrosa patent, hoc quod corrumpitur omne
Incidas usque vivum calidoque peruras
Auro vel ferro, superappositoque vitello
Aut porri succo donec cadat ignis ab illo;
Postea rumpentis unguenti cura sequatur
Ut prædicta docent. Insit si quando palato
Tunc calido melius est comburatur ut auro
Ast in gingivis si sit, prelotus aceto
Sit locus ipse dies per tres vel quinque, fricetur,
Inde locus talis vel alumine cum zucarino;
Abluat os æger istove liquore probato.
Vinum decoctum vel mel jungatur aceto
Pondus ad æquale, radix flosmi caprifici,
Maligranati cortex adjuncta pyrethro,
Zinziber atque piper, pulvis jungatur et illi
Postea subscriptus; locus at mundabitur ante
Abstersus panno nitido prelotus aceto.
Origanum, rosa si foliis jungantur olive
Dactila dent ossa cum cancris, hiis et alumen
Cum pyrethro, pipere gariofila, cinnama jungas
Cum nuce muscata et granati cortice mali;

Omnia præscripta sint æquo pondere trita,
Pulvere quo sparsus locus hoc prelotus aceto
In quo bullierant prius hysopus aut calamentum.

Si pimpinella succum plantaginis addas
Verbenæ, caprifolii, sic lanceolatae,
Sic apii, scissum quibus associetur alumen,
Ista trociscuntur, quo pulvere cancer obibit.
Est tamen hæc summa cancrum medicando medela
In quocumque loco sit corporis; ustio fiat
In fontinella capitis, quia fluxus ad illas
De facili tendet partes aliasque relinquet.
Istud erit gratum si vis corrodere cancrum :
Extrahitur succus apii cum petrosilino,
Cum sale pistentur simul hæc triticique farina
Sic apponatur. Aliud quoque sæpe probatum :
Ejicis albumen ovi retinesque vitellum,
Tunc atramento fuligine cum forte molestus
Si fuerit, plus hiis ovi superadde vitellum.
En subjungetur aliud tibi sæpe probatum :
Terra sigillata fuerint si cinnama juncta
Albo cum nitro, quibus atramenta jugabis
Hinc factus pulvis multum conferre solebat,
Si novus hic fuerit modice corrosus, oportet
Ex hiis subscriptis curam variare probatis.

Si quæ recens fuerit, ablutio facta valebit
Urinæ patientis ei si sit locus extra
Os — si sit vetus, hic corrosio fiat
Ære de viridi si pulvis cum sale tosto
Sit, fex argenti cum nitro crustula donec
Surgat, pura caro videatur. — Pulvere tali
Carnem restaures; sit thus cum mastice junctus
Consolidæque bolus, amidum, sanguisque draconis;
Pulvere quo trito carnis reparatio fiat. —
Aut cum radice rafani limacia nigra
Cortice cum rubeo quercus melli sociata
Pondus ad equale; simul hæc contrita coquantur

Et fac emplastrum quod sic apponitur cancro
Nocte dieque loco quod sic dimittitur tali;
Cum locus hic fuerit albescens, ponitur solum
Hoc semel emplastrum terna vel luce secunda
Quotidie positum nimium cito curat eundem.

(Liber I, cap. LI.)

FLOS MEDICINÆ SCHOLÆ SALERNI

(Renzi collectio Salernitano T. V.)

I*Materia medica.***Agaricus.**

Pectus flegmaticum solvit, pellitque venenum ;
Prodest pulmoni, splenis solvitque tumores,
Febribus occurrit, sic prodest sumpta venenis.

Aloes.

Vulnera dessiccat aloë, carnem creat; et aufert.
Preputii cancrum, ciliis cum melle nigrorem ;
Auriculas, oculos, caput et linguam bene purgat.
Confortat stomachum, juvat ycter, hepar reparabit,
Canitiem prohibet, sed solus viscera lædit.

Canella.

Vera canella tibi plurima dona reportat.
Mentem, hepar, pectus, vocem, præcordia firmat,
Innaturalem tollit de corde tremorem.

Fœnugræcum.

Ad grossum flegma fœnugræcum est cura salubris.

Juniperum.

Juniperi grana pectus comesta reformant;
Et tussim nimiam sedant atque inveteratam;

Expellunt sedule semper de carne venenum,
Et prosunt capiti carbonibus ista projecta.

Nasturtium.

Nasturtii succus crines retinere fluentes
Illius asseritur, dentis curare dolorem
Et squammas succus curat cum melle perunctus.

Pinea.

Tussim, ephemeram, hecticam tibi pinea tollit;
Masculi plus tussi valet, et passiva diarrhæa.

Piper.

Piper de mane comestum purgat ægrotum
Humores tollit de corpore mane comestum.
Dat bene calorem, pravum depellit odorem,
Est humidum, certum sic sanum debet esse.
« Quod piper est nigrum non est dissolvere pigrum,
« Flegmata purgabit, digestivamque juvabit.
« Leucopiper nervis, stomacho, tussisque dolori
« Utile, præveniet scotosim febrisque rigorem.

Plantago.

Hepar tum parit, plantago stiptica cum sit;
Prodest hæmoptoicis, sacrumque coercet et ignem.

Pyrethrum.

Masticet patiens vel gargarizetur aceto,
Hoc modo tumidam reprimit de flegmate linguam;
Suspensum collo poterit prodesse caducis.

Rosa.

Curat hæmorrhoidas rosa, semine, cortice dentes,
Gingivas, colicam, capitis juvat ipsa dolentes.

Sinapi.

« Est modicum granum siccum calidumque sinapi;
 « Dat lacrymas purgatque caput, tollitque venenum.
 Escæ mihi napi sunt bonâ, suntque sinapi.
 Senapis oculis pectoribus allia prosunt.

Zinziber.

Algores stomacho, thoraci, renibus aufert;
 Idem conditum solamen zinziber affert.
 Zinziber mane comestus pectus bene purgat,
 Mollificat pectus, renum flegmaque repellit,
 Clarificat visum zinziber sæpe comestum,
 Humores siccant, cruorem de corde repellit,
 Auget calorem stomacho, sic digerit escam.
 Zinziber expurgat stomachum, cerebrumque reformat;
 Atque sitim pellit, juvenes quoque cogit amare.

II

Influences astrales.

Arbor plantetur cum luna Taurus habetur;
 Ædificari potes, et spergas semina terræ;
 Et medicus timeat cum ferro tangere collum.

III

Etiologie morbide.

Hæc faciunt rheuma : coitus, repletio summa,
 Cæna nimis tarda, ventus, fumus, piper, assa.

 Nux, oleum, frigus capitis, anguillaque, potus
 Atque crudum pomum, faciunt hominem esse raucum.

 Si peccet sanguis, facies rubet, extat ocellus,
 Infantur venæ, corpus nimiumque gravatur.
 Est pulsus frequens, plenus, mollis, dolor ingens

Maxime fit frontis, et fit constipatio ventris,
 Siccaque lingua, sitis et somnia plena rubore,
 Dulcor adest sputi, sunt acria, dulcia quæque,
 Plectora vasa tenent, cacochymia tenet extra.

.....
 Accusant cholera frontis dolor, aspera lingua,
 Tinnitus, vomitusque frequens, vigilantia multa,
 Multa sitis, pinguis egestio, torsio ventris;
 Nausea fit, morsus cordis; languescit orexys (fames);
 Gravantis cholerae motus hæc signa sequuntur.
 Pulsus adest gracilis, durus. veloxque, calescens,
 Aret, amarescit, sitit os, tenebroso
 Contrahitur somnus, incendia visio fugit.
 Pulsatur capitis pars dextra, buccinat auris,
 Dum lucis medias librat sol igneus horas
 Ipsa movet, quoniam lux tertia suscitatur humor.

.....
 Phlegma supergrediens proprias in corpore vires,
 Os facit insipidum, fastidia crebra, salivas,
 Costarum, stomachi simul, occipitisque dolores,
 Pulsus adest gracilis, tardus, mollis quoque inanis;
 Artus suppendit laterum stomachique lacunam,
 Diffundit, replet et torquet vexansque propellit,
 Irritat et minuit nativi jura caloris;
 Insipidum reddit gustum, plurimumque salivæ.
 De salso salsus, de dulci phlegmate gustus.
 Visus hebes, motus tardus, pigritia, somnus,
 Et sopitivus dolor occipitis comitatur.
 Humor phlegmaticus nocturnis aestuat horis;
 Præcedit fallax phantasmata somnus aquosa.

.....
 Humorum pleno dum fæx in corpore regnat,
 Nigra cutis, pulsus durus, tardus, tenuisque urina,
 Sollicitudo, timor, et tristitia, somnia tetra;
 Acescens ruptus, sapor et sputaminis idem,
 Lævaque præcipue tinnitus, vel sibilat auris;
 Melan(cholia) dat splenem, ructum crudum, scotomiamque.

IV

Nosologie (Cap. III).

Si fluat ad pectus dicitur rheumata catarrhus,
 Ad *fauces* branchus, ad nares esto corhyza.
 A cerebro fluxus ad subdita rheuma vocatur,
 Qui veniens oculis scotomia dicitur; isque
 Naribus effusus corhyza, supercilii que
 Fit dolor hic; veniens aures facit has quasi surdes
 Si venit ad malas ex hoc raucedo fit, osque
 Vulnerat ut linguam, si derivetur ab illa
 Seu maxillares ad nervos, hinc dolor urget
 Gingivas, dentes, branchus fit faucibus inde
 In gula pestis squinantia; si petit illud
 Cannam pectoris vel tracheam, generatur
 Tussis, si turbet pulmonem dyspnœa fiet
 Asthmave, visceribus spumous fit fluor inde
 Et dolor atque tumor fit et indigestio ventris

.....
 Raucis salsa nocent, nux, pingua, nebula, ventus,
 Unge dialthœa, galli pinguedine pectus,
 Molliā sorbebis ova, sed piperata cavebis

.....
 Uvula si rubet et longa tūnere videtur,
 Diamoron, ne (?) mora, pyrethrum quoque gargarizetur

.....
 Quando dolet guttur velut ulcera si patiantur,
 Protinus abstineas, minuas, sic alleviatur.
 Succus amarisci tollit de fauce squinancem
 Potatus magis hanc quæ magis intus hæret.

.....
 Tussis sicca premit et pectus sæpe gravatur
 Uva, fœni, liqui(ritia) ficus tragacanthaque coquantur,
 Sacchara ponatur, ex his aqua cocta bibatur;
 Humida fit tussis tum hyssopus adjiciatur.

2. — De vulnere gutturis vel œsophagi.

Si vulnus fiat aut gutturis aut œsophagi
Aut trachea arteria scindatur vel penetretur
Cujuscumque modi, vulnus mortale videtur;
Aut si principium vel finem sumat ab illis
Sive, sit a telo vel re quacumque cavendum,
Si cutis aut carnis sit tantum, cura patescit.

3. — De squinantia.

Esse squinantiam nascens in gutture quoddam
Fertur apostema; species tres esse leguntur;
Nomine totius illarum prima vocatur;
Est locus istius isthmi (larynx?), quæ perniciosa,
Dicitur esse cito solique Deo medicanda,
Cura reservetur istius; et altera partem
Interius quæ retinet, cujus pars iminet extra,
Perniciosa minus est prima; dicta synantis.
Tertia sed species cujus transmittitur extra
Materies tota, minus illis perniciosa;
Dicta quinantia. Sunt hæc generalia signa :
Orthopnæa, cibum nec potum sumere possunt,
Mittere nec sputum, nec transglutire salivam,
Et vox omnino quandoque negatur ad horam.
His a principio sic subveniatur oportet,
Si virtus, ætas coeant, minuatur utroque
Ægrotans armo (brachio), de cephalica moderate,
Sive per antipasim fiat detractio sola
Sive diamoron sibi gargarismata præstent;
Et si sub lingua fortasse minutio fiat
Et nimius fluxus assit, teneatur in ore
Fluxum constringens, aqua sit calefacta parumper
Huic gargarismum faciat prodesse probatum;
Nilque reperiens morbum ponatur ad istum.
Sume liquiriciam, caricas, mel cum tragaganto
Et gargariza; vel fiat tale probatum :
Sume diureticum de multis talibus herbis
Oxymel factum; quod gargarisma valebit.

Hoc valet emplastrum quod fit de semine lini
Et fœnugræci trito, triticique farina
Melli commixtis, oleo vino quoque coctis.
Aut fœnugræci, bismalva, semine lini
Conjunctis butyro porcive sagimine (sagina), confert.
Aut berulæ tritæ porci conjunge sagimen.
Sive recens butyrum; sic fit cataplasma probatum;
Aut his unge gulam, fiet curatio mira.
Sive dialthea butyroque simul liquefactis,
Aut appone loco tali stupas ibi tinctas.
Sive cataplasma sibi fiat tale probatum,
Tertia quo species curabitur atque secunda :
Accipe radices ebuli nondumque remotos
Porros, absinthum, cardum pariter, benedictam;
His bene pistatis ex istis extrahe succum,
Alfita jungatur, pulvis de semine lini,
Sint tamen hæc liquida; post hæc liquefactus ad ignem
Sit porcinus adeps, tantum cui jungito mellis;
Omnia bullire facias commixta vicissim
Donec spissa tibi pateant embroca sit instar :
Quam calidum poterit istud cataplasma ligetur
Uno sæpe die, ter vel quater hoc removendo.
Cum saniem dederit, digito lignove licebit
Imposito cuneo per dentes rumpere tactum
Istud apostema dictum vitando periculum.

De branco.

Si tumet interius crescens ut amigdala, brancus
Excreat unde grave, fit spiritus anxius ejus;
Si non contulerint huic gargarismata dicta,
Usque cyrurgiam statim migrare licebit.
Infirmus primo coram te constituatur;
Os aperi cujus, infra sit lingua repressa;
Ut videas illas quot sint, ubi sit locus harum,
Cautius illarum valeas inscindere pelles;
Extrahe quas unco, sibi vicinasque relinquo
Illæsas, et aquæ roseæ jungatur acetum

Ac arnoglossæ succus, teneantur in ore
Ut gargarismus hinc fiat congruus illis,
Si multus sanguis fluat hinc, tunc conferet istud :
Confert cauterium factum mediante tuello
Per ferrum candens a partibus interiorum;
Quod si dat saniem, confert incisio longa;
Extractis illis vellas radicitus omnes;
Auro vel ferro locus hinc uratur honeste.

PLATEARIUS

(*De simplicibus medicinæ circa instans.*)

Alumen.

Alumen calidum est et siccum in quarto gradu. Alumen est terræ materies, secundum quosdam et secundum alios vena terræ dicitur esse, quæ propter nimiam coctionem in album colorem conducitur Théorie alchimique et sic efficitur alumen. In regionibus valde calidis procreatur et præcipue in locis sulphureis et ignitis; quod album est, illud melius est virtutem habet dessicandi et vehementer consumendi.

XVII

Ammoniacum.

Ammoniacum calidum est in tertio gradu, et siccum in secundo. Est autem ammoniacum *gummi* cujusdam arboris, quæ simili nomine appellatur, cujus rami in superficie minutatim inciduntur in æstivis diebus. Liquor inde distillans induratur; et dicitur ammoniacum, illud quod est albius et purius eligendum; et cui terra non admisceatur. Bene autem assimilatur albumini ovi cocto. Habet autem virtutem dissolvendi et relaxandi. Contra tussim antiquam humectatam et asthma ex grosso phlegmate viscoso tres guttæ ammoniaci accipiantur in ovo sorbili, vel distemperentur cum melle et dentur patienti; vel fiant pillulæ cum eo et melle et dentur, pectore prius mellificato cum dialthæa et butyro, vel semine ursi, vel brachia ursina.....

De gummi arabico.

Gummi arabicum simile est tragacantho, et in Arabia reperitur. Est duplex species; album melius est eligendum; est

etiam et citrinum et suffusum, et quod similiter clarum est eligatur. Et invenitur in recepto (ordonnance) simpliciter arabicum, album est ponendum. Habet autem virtutem relaxandi, humectandi et leniendi. Et contra asperitatem linguæ ponatur in aqua, donec agglutinetur, et ex tali agglutinatione humectetur lingua, et fricetur.....

De moris.

Mora domestica frigida et sicca. Sunt qui etiam fructus sycomori in receptionibus ponunt et sicut ista frigida sunt. Fructus sunt rubi, et cum maturi sunt, colliguntur. Virtutem habent dissolvendi, consumendi et mundificandi. Et contra squinantiam et uvam relaxatam et brancos et vitia faucis valet electuarium, quod diamoron dicitur. Et istud gargarisma fiat aliquando cum oleo et aceto, aut cum melle despumato.....

De nitro.

Nitrum est siccum et calidum in secundo gradu. Est autem nitrum vena terræ, quæ in multis locis reperitur. Cujus duplex est differentia, quod simile vitro et album eligendum est. Et citrinum et melli simile non adeo bonum est. Et virtutes dissolvendi et abstergendi habet ex nitrositate.....

Pyrethrum.

Pyrethrum est siccum et calidum in tertio gradu. In hyeme colligitur radix et per v annos servatur, et radices eligendæ sunt continuæ et non asperæ odore... Gargarisma factum ex aqua decoctionis ejus et ficuum siccarum vel in vino dulcerebrum a superfluitate phlegmatica mundificat.....

III. ARABISTES

A. ÉCOLE DE MONTPELLIER

(*Gordon et Valescus de Tarenta*)

GORDON

De Rheumate et corrhyza.

Rheuma est fluxus humorum a capite ad partes subjectas. Rheumatis autem tres species ab auctoribus distinguuntur corrhyza, bronchus, et catarrhus. Corrhyza quando defluit ad nares; bronchus quando ad fauces; catarrhus quando ad pectus. Rheuma autem potest esse genus, et ideo dicitur Rheuma, quasi ruens materia; Rheuma autem negligi non debet, quia forte est mater omnium ægritudinum, quod patet *quia si fluat ad aures, causabit surditatem* aut tinnitum; si *ad oculos*, caliginem; si *ad nares*, fœtorem aut polypum; si ad linguam, paralysim; si *ad guttur, squinantiam*; si ad pectus, phthisim aut pleuretin; si ad stomachum, fastidium aut vomitum; si ad intestina, fluxum ventris; si ad juncturas, arthritin, et ita de aliis omnibus membris subjectis, præterquam de splene, quoniam splen non apostematur, nec oppiliatur propter rheuma, quoniam passiones splenis fiunt ex materia grossa.

Causa. — Materia autem rheumatis est subtilis, aliter non rueret. Licet igitur vulgariter loquendo ex rheumate nullus plangatur, nihilominus citissime sunt remediandi, cum omnia

membra subjecta debilia ad ægritudines proximas sint parata. Succurrendum igitur est ita velociter, quod etiam medicinæ laxativæ possunt dari sine digestionem materiæ, et potissimum si flueret ad pectus. Rheuma vero aut provenit ab *exterioribus aut ab interioribus*. Exteriora sunt ventus septentrionalis, veniens post meridionalem, item calor nimius, aut frigus aut insufflatio ventorum, aut somnus; post nimiam repletionem et potissimum somnus diurnus, odor rerum fortis odoris, sicut est liliū, mentastrum, muscus, et similia, comestio rerum vaporosarum, sicut sunt cepæ, allia, vinum forte, crapula et ebrietas, balneum, phlebotomia, et breviter omnia, quæ dissolvunt vapores in capite, aut per modum compositionis, aut per modum dissolutionis.

Causæ interiores sunt humores in cerebro abundantes, sive sint calida, sive frigida; vel vapores a stomacho et toto corpore ascendentes ad caput.

Signa. — Si sint humores calidi, tunc caput tactu calidum invenitur, facies rubea aut citrina, punctura et mordicatio, ablatio appetitus cibi; sitis et similia. Si causa fuerit frigida, signa sunt contraria, et ista causa frequentius venit.

Prognostica. — (Hippocrates) Bronchi et corrhyzæ in valde senibus non maturantur (catarrhe chronique des vieillards). Qui etiam habent caput calidum, et partes inferiores frigidas, raro sunt sine catarrho; et converso, qui non caput frigidum et cor calidum habent, iis multi vapores ascendunt, qui in cerebro frigido digeri non possunt, et quando cerebrum est calidum, fit attractio multa vaporum. Catarrhus cum dolore capitis, difficulter curatur, quia caput videtur debile naturaliter. In autumno frequentius veniunt catarrhi, quam in alio tempore anni.

Cura. — Cura communis in omni catarrho, seu rheumate est, quod, si fluat materia ad membrum nobile, evacuetur materia, digestionem (coctionem) non expectando cum pilulis aureis, aut cochiis, parvitas cibi, et potus competunt, ut et vigiliæ multæ, et quod non dormiant, interdiu non utuntur balneis, nec fomentationibus, nec ablutionibus, nec exercitio forti; teneatur venter laxus, famem et sitim patiantur, quantum poterunt,....

De ægritudinibus colli, pectoris et mamillarum. De squinantia seu angina.

I

Circa istam materiam intelligendum versus radicem linguæ esse duos meatus, quorum unus est via cibi, alter via anhelitus, appellaturque, trachea arteria, et caput ejus vocatur epiglottis quemadmodum via cibi meri, seu œsophagus: et via media inter istos duos meatus guttur. Sed illa lingua, quæ est supra istos duos meatus ad modum digiti in fistula; appellatur uvula: Et caro illa addita in radice linguæ, duo amygdala; pars anterior colli, gula, est que proprie via anhelitus: pars autem posterior colli, per quam transit meri, cervix. In his membris (organis) accidunt nocumenta multa, et cum hoc anhelitus etiam redditur difficilis propter multa, et propter causas extrinsecas, sicut est arista, lignum, et similia, cum intromittuntur: casus et percussio, propter quod accidit dislocatio vertebrarum, et talis difficultas anhelitus raro aut nunquam curatur.

Accidit etiam difficultas anhelitus ex debilitate virtutis, sicut in pueris, item propter mollificationem nervorum et paralysim, propter spasnum et multa alia consimilia.

De tali autem difficultate anhelitus hic non agitur; sed de illa quæ sequitur ex apostemate gutturis, quod appellatur squinantia.

Squinantia igitur est *apostema gutturis impediens viam anhelitus et viam cibi*. Attamen hic non agitur principaliter de nocumentis accidentibus in prima digestiva, sed de nocumentis accidentibus in membris pectoris in toto clibano ejus.

Accidit igitur squinantia in lacertis gutturis et viarum duarum, sive anterioribus, sive posterioribus, et secundum hoc diversificantur; quoniam quædam est species squinantiae, in qua apparet tumor et rubor ore aperto.

Secunda species est, in qua nihil potest videri, nisi lingua fortiter deprimatur, et tunc latet apostema interius in istis viis.

Tertia species in qua nihil potest videri, etsi lingua deprimatur, latet enim apostema interius in istis viis.

Quarta species potest esse, quando apparet tumor interius in gutture, et exterius in cervice.

Causæ. — Causarum quædam sunt *extrinsecæ*, quædam *intrinsecæ*. *Extrinsecæ* sunt nimia caliditas, et frigiditas, insufflatio ventorum, *acceptio quorundam fungorum*, et *quorundam venenorum*. Sed ab intus, hoc potest provenire ut plurimum ex repletione capitis, et rheumatismo, item propter vapores ascendentes a pectore, stomacho et toto corpore : aliquando propter malitiam particulæ patientis, aliquando propter ægritudines præcedentes, quoniam febris continua terminatur ; aliquando per squinantiam, aliquando phrenitis, aliquando apostema uvæ, et ita de aliis, quæ est universaliter mala crisis et suspecta. Accidit etiam aliquando ex sanguine, aliquando ex cholera, phlegmate et melancholia, (licet raro ex melancholia).

Signa. — Tumor, rubor, calor, dolor, plenitudo, pulsus, significant *sanguinem*: color citrinus, punctura, mordicatio, *chole-ram*: albedo, tumor, mollicies, modicus dolor, multitudo salivæ, *phlegma*; durities et livor, *melancholiam*; ut tarditas afflictionis et duratio morbi. In particula (sede) autem a qua provenit materia, semper est pondus et aggravatio. Et si venerit ex ægritudinibus præcedentibus, vel ex causis primitivis, illa sunt satis manifesta ex patientis relatione et ex illis, quæ præcesse-
runt.

Signa autem squinantiae *interius latentis*, quæ videri non potest, sunt constrictio anhelitus, et quando bibit aquam, regurgitat ad nares, oculi sunt rubei, lingua frigida, vox catulina, (catuli) et collum rigidum. Signa autem demonstrativa sunt difficultas anhelitus, dolor, apertio oris.

Sciendum etiam circa istam materiam, squinantiam terminari aliquo istorum modorum, aut scilicet terminatur per *resolutionem insensibilem*, cujus signa sunt alleviatio doloris, bonitas anhelitus; aut ad *nervos*, et *lacertos* colli, cujus signa dolor, gravatio et tortura, pulsus, et durities. Aut ad *pulmonem*, quæ est semper mala terminatio, quoniam aut causat ulcerationem in pulmone, aut peripneumoniam; cujus signa, tussis, dolor pectoris, et difficultas anhelitus. Aut *ad cor*, quæ etiam est mala terminatio, cujus signa, tremor cordis, syncope, occultatio pulsus. Aut ad *stomachum*, cujus signa dolor et vomitus, et

potest esse ad bonum. Aut terminatur per saniem, quod id esset ad bonum, cujus signa apparet in screatu.

Ista igitur sunt signa permutationis. Si autem permutetur materia ad saniem, signum est, quod magis appetit cooperimenta, et cum sanies est generata, alleviatur, sed hoc non potest compleri, in quatuor diebus, sed bene potest inchoari, et postea compleri, quoniam omnis squinantia terminatur ut plurimum in quatuor diebus. Quos si transeat, materia ut plurimum videtur melancholica, cujus signum, quia sentit saporem stypticum in ore.

Prognostica. — Ista sunt signa mala in squinantia et pernecabilia seu lethalia, scilicet quando squinantia evenit in *fibris continuis* in die critica, syncope, vehemens difficultas anhelitus, sicut est dyspnæa, oregmon, difficultas transglutiendi, ita quod rejicita potum per nares, vox catulina, ita quod videatur loqui cum naribus, spuma in ore, emissio linguæ et frequens motus, sicut apparet in equo fatigato, color niger et lividus in lingua, oculis et labiis, frigiditas extremitatum, contractio colli, et quod non possit jacere supra dorsum, potissimum in squinantia, quæ est in viis anhelitus, quoniam quando est in viis cibi, accidit magis difficultas transglutiendi, aliquando tamen accidit utrunque.

Squinantia venit frequentius in vere, et quæ est cum febre, est magis periculosa. Signa autem vitalia, sunt quies, somnus, alleviatio doloris, bonitas anhelitus, facilitas transglutiendi, et breviter privatio malorum signorum.

Cura. — Ista ægritudo est admodum periculosa et brevis terminationis, ideo a principio statim succurrendum est, unde homines qui facile incurrunt squinantiam, cum sentiunt se repletos, deberent instituere phlebotomiam, antequam malum incurrant. In primis fiant clysteria, deinde si corpus est plethoricum, phlebotomia saphenarum ejusdem lateris, vel cephalicæ oppositi lateris.

Postea si indiguerit, et virtus possit tolerare secetur cephalica ejusdem lateris, prout dolor magis declinat ad dextram vel ad sinistram. Deinde si particularia convenient secetur vena, quæ est in fronte, postea labiorum, et quæ sunt sub lingua. Et si non possit transglutire, applicentur ventosæ in collo et sub mento. Ista autem valent in omni apostemate præfocativo cum convenientia particularium.

Quantum ad diætam, nihil comedat usque ad diem tertium, si virtus possit tolerare, et si non possit, sit contentus aqua hordei aut hydromelle, syrupo acetoso oxymel, aut brodio pullæ parvæ, Post diem autem tertium, utatur hordeato claro, aut pulla trita colata, et ita de aliis sorbilibus juxta convenientiam particularium. Universalibus igitur recte ordinatis, ad particularia veniamus. In primis fiat gargarisma, si causa est calida ex diæmoran et modico syrupo, julep, viol. aut syrupo de papavere. Aut fiat decoctio in aqua coriandri; cum sumach, gallis, hypocistide, malis granatis contritis cum toto, cui addatur aliquantulum sacchari; coletur et fiat gargarisma.

Pilulæ. — Deinde utatur istis pilulis sub lingua retinendis & granorum rosæ, sumach coriandri, sandarach conficiantur cum mucilagine psyllii-dragaganti facta in syrupo nenufaris, et fiant pilulæ, quæ teneantur in ore, vel fiat gargarisma ex oxymel. aqua et aceto, valet in utraque causa.

Anginæ frigidæ curatio. — Si causa est frigida, fiat gargarisma ex decoctione de nitro, et alumine assis, mastic. thure, hydromelle; deinde pilulæ, quas teneat in ore. & masticis, thuris uvarum passarum mundatarum ab arill. styracis calamita. ana 3.2 conficiantur cum oxymel. In causa calida, circumdetur collum undique lana succida, infusa in oleo de chamo. Si frigida, grossa et viscosa, & sinap. nitri, sulphuris, castorei, bulliant, in oleo, in quo lana intingatur, et circa collum involvatur.

Deinde postquam incipit venire ad augmentum, gargarizet cum aqua decoctionis fœnugræci, sem. lini, uvarum pass. mund. ab arill. summitatum papaveris, caricarum, liquiritiæ mundæ. Et si causa est calida, addatur saccharum ros. viol. nenupha. frigida, non oportet addere, nisi mel.

Item & olei viol. butyri, caricarum, fermenti, dialthæ, misceantur. Istud enim maturat et rumpit sive intus, sive extra applicatum per modum emplastri, aut quocunque; modo applicetur sive gargarizando, sive alio modo.

Postquam autem venit ad maturationem, rumpatur et gargarizetur oxymelle diuret. cum decoctione caricarum, et fermenti, aut scil. aut aperiatur cum digitis et ungue. Aut cum ruptum fuerit gargarizet oxym. cum vino. Et si materia fuerit admodum grossa, addatur piper, nitrum, cinamomum, sinapis.

Illa autem, quæ valent a tota specie, sicut dicunt magistri nostri, sunt stercus hirundinum, stercus pueri, stercus canis comedentis ossa, et stercus lupi, quæ debent aliquantulum desiccari supra testa, deinde pulverizari, et ori insufflari, aut decoquantur in hydromele et fiat gargarisma. Dicunt etiam, viperam si stranguletur cum filo et circumdetur collo, multum valere. Ista empirica non sum expertus, sed alia omnia, quæ dicta sunt, feci frequenter.

Hæc etiam valent in squinantia et in apostematibus suffocativis, arista et similibus. Spongia parva ligetur cum forti filo, stranglutiatur et subito extrahatur. Idem posset fieri de lardo. In ultima autem desperatione, aperiatur gula, ut possit respirare, et cum negotium erit completum, consolidetur. In curatione istorum apostematum non debet Medicus esse negligens, nec somniculosus, quia passio est acutissima.

Squinantia potest causari ex melancholia, sicut pleuritis licet raro : quoniam squinantia est brevis terminationis, melancholia autem facit longum morbum, et cum hoc melancholia non est humor admodum fluxualis, nec bene penetrabilis, ideo raro fit, possibile tamen est sicut Avic. testatur, licet contrarium dicat Viaticus, sed impossibile accipit pro difficili.

Secundo squinantia fit ut plurimum ex sanguine, postea ex phlegmate, tertio de cholera, raro ex melancholia. Et juxta hoc notandum, ut plurimum fieri per viam rheumatismi et per viam derivationis, ideo fit subito, tardius autem fit per viam congestionis et per ascensum vaporum ab inferioribus, quia talia tarde aggregantur et tarde ascendunt, squinantia autem fit subito.

Tertia quatuor sunt notanda circa istam materiam.

Primum, scilicet quod ad squinantiam sequitur febris continua, quoniam licet ista membra non sint nobilia, deserviunt tamen membro nobili, et ita habent nobilem operationem. Et quando istud evenit, scilicet quod febris sequatur squinantiam, tanto est deterius propter difficultatem anhelitus. In omni squinantia competit lac, quia obstergit, mundificat et maturat, nisi timeamus febrim, inqua solet corrumpi.

Secundum, quod debemus observare, est quod ad squinantiam sequatur eductio oculorum, propter colligantiam, quam habet trachea cum lacertis oculorum.

Tertium, quod sequitur, est eductio linguæ et hoc propter magnitudinem apostematis in radice linguæ.

Quartum, in omni specie squinantia competunt percussiva et diuretica. Et si objiciatur, nonne mittitur materia ad membra nobilia? respondeo quod non, quia multa membra sunt in medio, et dispartitur in multas partes, distributaque; per multa membra, melius rectificatur, quam si esset collecta in uno: et cum hoc, ista membra non sunt emunctoria, sicut sunt axillæ et inguina: et quia in principio, non habet tantam malitiam ista materia, et quia operatio membri nobilissimi impeditur.

Ex his igitur elici potest, in squinantia posse competere sit de percussiva, aliter posset contingere repentina suffocatio, cum perperacutis.

Ultimo considerandum circa istam materiam mucilaginem psyllij et citoniorum, una cum aliis, licet sint frigida et viscosa, posse maturare et rumpere quia faciunt alia adhærere: sicuti et caricæ et fermentum maturant et rumpunt. Si autem apostema fuerit in exterioribus, calx viva cum sapone judaico rumpit, et si sapo mollis inveniatur albus, tanto melius, sed possumus accipere saponem durum, album, ultramarinum, et miscere cum oleo laurino, eritque molle et album.

(*Cap. I, part. IV.*)

De passionibus uvulæ.

II

Uvula habet quinque juvamenta. Primum, quod præservat a fumo et pulvere, quod non eant ad pulmonem.

Secundo, alteratur ibi aër calidus et frigidus antequam proveniat ad pulmonem et cor.

Tertio, valet ad informationem vocis, et ideo stat supra foramine anhelitus, sicut digitus fistulatoris.

Quarto, quando homo loquitur, stat supra meri (pharyngem), ne aër ingrediatur ad stomachum: et quando homo comedit, stat supra viam anhelitus, ne cibus et potus eant ad pectus; et ideo non est bonum comedere et loqui simul.

Quinto præcavet, ne materia rheumatica descendat subito ad

pectus et stomachum, quoniam ibi remanet aliquo modo, ac sentitur, et tunc expellitur cum screatu. ideo qui amisit uvulam, amisit ista quinque juvamenta, et pro tanto non potest pati, nec calorem, nec frigus, nec sitim, imo læditur facile a quacunque causa, et ideo ut plurimum phthisicus moritur. Caveant igitur sibi, qui sani faciunt sibi incidi uvulam, *ut melius cantent*, quoniam sine dubio cum instrumentis vocalibus postea nunquam facient operationem pulchram. Vigilate igitur. Uvula aliquando relaxatur, et cadit inferius ac impedit viam cibi et anhelitus; aliquando et jam apostematur, ad quod valde modica materia sufficit, et sicut apostematur uvula, ita et *duo amygdala*, quæ sunt in radice linguæ.

Causæ. — Causæ sunt nec plus, nec minus, quam sicut dictum est capitulo de squinantia.

Signa. — Ista etiam sunt eadem cum prædictis signis.

Prognostica. — Hippocrates docet prognosticare uvulam tumidam et rubentem, periculosum est incidere, etc...

Timor enim est quintuplex, primo, quoniam timendus est nimis fluxus, qui non possit restringi.

Secundo, quoniam si non fuerit maturum, ex incisione accidit magnus dolor, ideo affluunt humores et magnificatur apostema.

Tertio, quoniam si amittatur pars substantiæ uvulæ, amittuntur quinque; ejus juvamenta, quæ naturaliter habet.

Quarto, quia si materia eat ad pulmonem, timenda est phthisis, aut peripneumonia, et ita de aliis.

Quinto, quoniam si eat ad stomachum, timendum est, quod causet ibi nocumentum; vigilate igitur.

Curatio. — Curatio fere est eadem quæ in squinantia. In primis igitur fiant clysteria, phlebotomiæ, ventosæ, purgationes et similia, quæ dicta sunt superius juxta convenientiam particulare. Corpore autem mundificato, repercutiatur materia cum diamoron et aqua calida, aut decoquantur in aqua gallæ, sumach, psidia, addatur modicum aceti et fiat gargarisma. Et si causa est frigida, addamus alumen assum, sal assum, mastice, thus, et mel. Si propter styptica, aut hujusmodi alia apostemata fuerint nimis indurata, mollificetur sic: ℞ Psyllii, dragaganti, gummi arabi, fenugræci, semina lini, malva, hordei;

conquassentur omnia præter psyllium, et fiat mucilago in aqua calida, et exprimatur. Isto possumus uti multis modis sive intus, sive extra. Primo, quod illiniantur partes induratæ frequenter cum pluma, aut istæ mucilagines bulliant in aqua calida et fiat gargarisma; decissetur et fiat pulvis, qui insuffletur usque ad locum. Postea dissolvamus sic: coquantur hyssopus et radix lili in oxymel. Scilliticum et fiat gargarisma. Et cum hoc bulliant succus agrimonie et centauree in oleo laurino, in quo intingatur lana succida et involvatur collum.

Si fuerit casus uvulæ cum febre, gargarizet diamoron cum aqua calida, aut bulliant rosæ, myrtilli, sumach, gallæ, in aqua cum aceto, et fiat gargarisma. Si est sine febre calore, addamus sal assum, alumen assum, sal ammoniacum, galliam muscatam, et fiat gargarisma. In pueris autem fiat ex istis illinitio cum pluma, et involvatur collum lana succida cum oleo de chamomilla; fricetur caput et claudantur commissuræ partis anterioris, cum thure et pice, ac præservetur omnino a rheumate, et administrentur exiccative sicut sunt vigilæ et minorationes cibi, potus et similia, licet non possit transglutire. Desiccetur igitur humiditas superflua illius uvulæ quantum erit possibile.

Ad incisionem uvulæ veniamus; quando igitur uvula gracilis est versus radicem, scilicet in palato superiori et grosso inferius nec rubea, sed vergit ad quandam albedinem ac livorem mortificatum, videnturque signa maturitatis, et corporis est mundificatum, et tanta grossities, quod timeatur suffocatio, tunc si aliqua hora incidenda est, comprimatur lingua, et uvula cum forcipibus incidatur, scilicet quantum augmentata est præter naturam, quoniam si abscinderetur in parva quantitate, non haberet ivvamentum; et si in nimia, magnum nocumentum, mediocritas igitur observetur. Vel potest hoc fieri cum tenaculis, illis cum quibus abscinduntur dentes.

Secundo modo potest abscindi hoc modo. ℞ Assa foetidae, arsenici, vitrioli, salis armoniaci, atramenti, aluminis, fiant pilulæ cum aceto scil. et ingenientur cum aliquo instrumento quod possint applicari uvulæ per unam horam, et cum incipit denigrari, iam sufficit, quod inter tres dies cadet.

Tertio, modus operandi est, ut restaurator percutiat uvulam

cum phlebotomo in parte illa, in qua major est maturatio, et statim sanies et sanguis exhibunt.

Quarto, acus de ferro ponatur in ignem, donec candeat, deinde eodem cauterizetur locus, sed acus transeat per calamus de ferro, ne partes vicinæ lædantur, et sit ita figurata, ut possit operatio completi. Ubi patiens debet tenere os apertum, ut sanguis et sanies possint effluere, quæ si fluerunt ad pectus, mundificetur illud cum tussi, et si ad stomachum, cum vomitu aut secessu. Post hoc autem, gargarizetur ista decoctione 2^æ. reos, hyssopi, liquir, capil, vel, re hordei, decoquantur in hydromele, hujus decoctionis accipe duas partes et tertiam oxymel, diureti, et fiat gargarisma, utatur frequenter.

Si autem velimus abscindere apostema, quod est in amygdalis existentibus in radice linguæ, tunc elevetur cum uncino, cavendo, ne auferatur tota pellicula, quia amitteretur humiditas salivalis.

Uvula magis declinat ad viam anhelitus, quam ad viam cibi. Cujus ratio est, ut præservet magis a nocumentis; quoniam membra pectoris non habent aliud foramen, per quod possit mundificari trachea. Sed stomachus potest mundificari per superiora, et per inferiora. Conservanda est igitur uvula, ne absindatur, quia qui eam amisit, pulchrum locale amisit.

Secundo via anhelitus, silicet trachea arteria declinat magis versus partem anteriorem et viam cibi; sed meri declinat magis versus partem posteriorem: cujus duplex est ratio; quoniam pectus declinat magis anterieus et stomachus posterius, quare oportuit meatum cujuslibet declinare versus partes suas.

Secunda ratio est, quoniam anhelitus est magis necessarius, quam cibus, et ideo oportuit viam ejus esse rectiorem, quare est anterieus; via autem cibi est magis tortuosa, et quia non est ita necessaria, ideo fuit posterius collocata.

Tertio via cibi est magis dilatabilis, quam via anhelitus, quia subtiliora sunt illa, quæ transeunt per tracheam, et propterea fuit cartilaginosa. Illa autem, quæ transeunt per meri, sunt grossiora, et etiam aliquando transglutitur magnus bolus, quare illa via fuit multum dilatabilis aliter sequeretur suffocatio.

Quarto ea, quæ ascendunt a stomacho, magis nocent suis

viis, silicet meri, quam illa, quæ ascendunt a pectore nocent suis viis, id est, tracheæ. Cujus ratio est duplex, quoniam ea, quæ ascendunt a stomacho, sunt magis indigesta et acuta, et cum hoc meri est magis passibile. Illa autem, quæ ascendunt a pectore, sunt subtiliora magisque digesta, et trachea non est ita passibilis, cum sit dura annulosa, cartilaginosa.

Quinto trachea dilatatur et magnificatur naturaliter circa tempus pubescendi, quare immutatur vox naturaliter, etiamsi homo nondum cojerit; sed si coëat, manifestius immutatur, cum coïtus violenter faciat ad augmentum, quoniam vox immutatur naturaliter secundum latitudinem, aut stricturam cannæ, secundum caliditatem et frigiditatem, et secundum virtutem fortem et debilem.

Ultimo si radix uvulæ esset grossa caputque acutum, non esset ita timenda suffocatio, quia viæ non ita clauderentur, et ideo non oportet eam incidere, sed quando, radix videtur gracilis per comparisonem ad suum caput, tunc cadit, oppilat et impedit vias, igitur propter timorem suspicionis est incidenda aliter non : et quocunque modo fiat, semper est magnum periculum.

VALESCUS

(*Philonii pharmaceutici liber tertius de vitiis membrorum spiritalium nimirum de gutturis, faucium, pulmonis, cordis, et thoracis vicinarumque mamillarum affectibus.*)

II

De Angina.

Angina est tumor faucium, vel gutturis, vel partium vicinarum. Cujus a Galeno quatuor ponuntur species : lib. 4 de locis affectis. *Prima* est, ubi fauces inflammantur.

Secunda, cum neque fauces neque reliquæ oris partes, neque partium externarum aliqua inflammari videtur, æger tamen suffocationis periculum in gutture sentit. *Tertia*, ubi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. *Quarta*, ubi gutturis partes, tum internæ, tum externæ, simul afficiuntur.

Causæ. — *Causæ externæ* sunt calor externus, dissolvendo, vel frigus externum, comprimendo, faciens fluere humores in fauces et partes vicinas : flatus aquilonius statim post austrinum, potio medicamentorum fortium, vel hellebora et usus ciborum sua proprietate anginam caussantiam, quales sunt fungi. *Causa antecedens* est humorum copia, in toto corpore, vel capite redundantium, vapor sursum elevatus, destillatio ut plurimum, vel morbi præcedentes, acutæ febres, phrenitis, vel columellæ inflammatio : tales enim morbi in anginam quandoque degenerant lethalem. Angina potest fieri a bile rubra, sanguine, et pituita crassa, tenui, vel salsa : non autem a melancholia teste Avicenne propter suam crassitiem et terrestrietatem, ob quam non potest subito eliquari, et ab uno membro ad aliud effundi : vel raro, quando scilicet aliis miscetur humoribus subtilibus.

Indicia. — Signa sunt, spirandi difficultas, deglutiendique, linguæ inflatio, rejectio potus aliquando per nares. In principio pulsus est frequens et inæqualis : in statu vero rarus, et parvus.

Si difficultas respirandi sit, cum deglutiendi facilitate, morbus magis declinat ad tracheam arteriam : et e contra Hyeme angina potius fit a pituita, autumnno vero a bile flava. Aliquando transmittitur anginae materia ad alia membra : nam pulsus durus et inaequalis, arguit materiam ad pulmones fluere : undosus autem et magnus cum tussi, verti in peripneumoniam, et convulsivus in convulsionem. Tremor cordis cum imbecilla virtute, prænunciant materiam ad ipsum corfluere : quæ si fluat in ventriculum, inducet vomitum, et dolorem in eo. Signa peccantis sanguinis sunt pulsus plenus, et undosus, rubor in facie, oculis, et lingua, sapor dulcis in ore, dolor magnus, et extensivus, cum anhelitus constrictione. Signa bilis sunt calor intensus, sputum paucum sitis, inflammatio cum siccitate, sapor amarus, intensus et inordinatus dolor, citrinitas linguae, biliosum ægri temperamentum, tempus autumnale, vel æstivum, et minor constrictione anhelitus, quam cum fit a sanguine. Multa humiditas in ore et visciditas, albedo in facie, et lingua, parva inflammatio, dolor remissus, et pauca sitis, pituitam arguunt : minus etiam impeditur deglutitio, ob mollitiem phlegmatis, sapor autem salsus et corruptus, et morbus diuturnus, viscidam innuunt pituitam. Sapor acidus, loci durities, color cinereus, et lentior morbi accessus, quam in aliis speciebus, humorem produnt melancholicum.

Prognostica. — 1° Quicumque ab angina liberantur, si ad pulmonem vertitur, in septem diebus pereunt ; si vero hos effugerint, suppurantur (aph. 10, sect. 5).

2° Ab angina habito si rubor vel tumor fiat in collo vel pectore, bonum : extra enim vertitur morbus (aph. 37, sect. 6 et aph. 49, sect. 7).

3° Angina pendens a pituita, securior et cæteris, et citius faciliusque curatur : teste Avic. in capite proprio.

4° Quo morbi symptomata, ut febris, et respirandi deglutientique difficultas, remissiora fuerint ; eo minus periclitabitur æger.

5° Tutior est angina cum facili respiratione, et difficili deglutitione, quam contra quoniam diutius vivitur sine cibo, quam sine respiratione.

6° Spuma præ nimia spirandi necessitate apparens in ore, est mortalis.

7° Angina periculosissima est, celeriterque enecat, si neque in faucibus, neque in cervice quicquam apparet et tamen dolor est vehemens, ac vix spiritus trahitur (com. 13, lib. 3, præsigium Hippocratis).

8° Viror in facie, vel nigredo, cum oculorum diminutione, frigiditas extremitatum, difficultas maxima respirandi, simulque vehementia febris, diminutio pulsus, linguæ extra os emissio et vox catulina, mortem prænunciant.

9° Pulsus mollis, ordinatus, æqualis, cum respiratione comoda, securam remissionem affectus indicat (com. aph. 10, sect. 5).

Curatio. — Ad curationem generalia quædam prælibanda; ea vero etiam collumellæ, et tonsillarum affectibus conveniunt.

1° Materia faciens inflammationem in faucibus, statim est evacuanda, non expectata concoctiones: medicari enim oportet eadem die, quando materia turget, suasu: Hip. aph. 10, sect. 4.

2° In morbis valde acutis, qualis est angina, materia revelenda est ad partes remotiores, sanguinis missione, cucurb. et clysteribus.

3° Sanguinis non est universim sed paullatim educendus, quoniam æger difficiliter deglutit, unde necessario vires deji-ciuntur.

4° Missionem sanguinis sequatur lenitio ventris ex cassia, tamarindis, manna, jujubis, prunis, et sebesten, si possint deglutire: sin minus, indantur idonei clysteres.

5° Fiant in principio gargarismi materiam a loco repellentes, et humoris fluxum cohibentes. Avicennas tamen in materia frigida vult addi, quæ parum abstergunt et incidunt. In medio vero et fine applicentur resolventia, et maturantia, tam intus, quam extra.

6° In parte exteriori nunquam applicentur repellentia.

7° Cibum et potus interscindatur omnino, modo vires ferant, donec allevetur æger: interea enim mali absumuntur humores.

8° Gargarismi mere resolventes non conveniunt in tumoribus palati, linguæ gutturis, et colli, nisi præcesserit sanguinis missio, vel potio solutiva, vel clyster: quoniam major materiæ copia ad locum affectum traheretur.

9° In principio harum inflammationum, si dolor sit intensus,

misceantur anodyna stypicis, ne, præ nimio dolore, humorum fluxus augeatur.

Curatio. — Curatio particularis est absolvenda, secundum causarum exigentiam. Nam causæ primitivæ contrarii, sunt removendæ: habendo semper rationem causæ internæ.

Si ergo fiat propter sumptionem maligni aut fortis medicamenti, ut hellebori: trahatur deorsum materia clysteribus acribus, ut ex colocynth. ne copiosa materia commota et ad gulam fluens suffocationem inducat. Deinde detur theriaca vel mithridatium. Post fiat gargarismus ex aqua plantaginis, et similib.

Si fiat a causa antecedente calida, mittatur sanguis de cephalica pro viribus et ægris temperamento: non tamen universim, sed paullatim, bis vel ter reiterando, ut vires melius ferant et major fiat materiæ revulsio. Postea venæ sub lingua aperiantur. Deinde fiat gargarismus ex his, quæ repellunt, et roborant: qualia sunt dianucum, diamorum, oxymel, simplex (valens cum rosacea et aceto in principio, sive causa sit calida, sive frigida) succus solani, plantaginis, malignan. muzi triti cum sua carnositate, corticum jugland, coriand. virgæ pastoris, caton. sorborum, succus vel rob pomorum acetosorum, rosacea cum sumach, aqua frigida, cum aceto. Syrup. acetosus paratus cum saccharo (quoniam cum melle non convenit in principio causæ calidæ, sed frigidæ solum) decoctum malicorii et balaust. cum aqua aceto medicamen. quod ꝛ malicorii vel foliorum myrti, hypocist. ana ꝓ aquæ ꝓ aceti quarta, j. fiat decoctio in aqua et aceto. Vel: ꝛ calicum gland, pediculorum rosar. sumach, balaust. psidiæ sing ꝓ ij caphuræ ꝓ j. fiat decoctio, loco prædictæ: posset etiam ex iisdem fieri pulvis et in guttur insufflari. Vel: seminis rosa. Portula. Amyli. Spodici. Sumach. Gummi tragac. sing. ꝓ ij. balaust. iij. sach. ꝓ j caphuræ, ꝓ j fiant pilulæ sub lingua tenendæ.

Post primum diem, nimium in augmento, suasu Avicennæ, miscenda sunt prædictis aliqua resolventia: fiat igitur gargarismus ex vino, cui prius miscueris pulverem gallarum et salem ammoniacum: vel ex decocto coriandri rec. vel lentium: ex diamoro cum myrrha, et croco: (nam myrrha, teste Avicen. facit alia penetrare, roborat, et maturat) atque ex ol. vio et aqua

quia lenit, et maturat. Idem posset fieri ex ol. communi aqua vel succi solani depurati ℞ j. rosa. rub. glycyrrh. rasæ, lentium cum cortice sing. ℥ j. vini rubelli ℞ ℥ fiat. Resolvēt, roborabit, maturabit, et leniet dolorem. Idem posset fieri ex sapa, myrrha, vel ex ptisana, lacte caprino, et sacch. vel ex decocto solani, lacte asinæ, vel capræ saccharo, croco, cassia. Resolventia porro citius cōpetunt in causa frigida quam calida : et in augmento, atque statu, non autem in principio.

Inter cætera missio sanguinis de venis, quæ sub lingua sunt, non est prætermittenda eodem die : nec fortes partium extremarum lingaturæ, acresque clysteres. Præsertim si deglutire nequeant, ad trahendum deorsim materiam : nec cucurbitulæ, quæ collo sunt applicandæ. Et si in muliere supprimantur menses, mittatur abunde sanguis de saphena. Hæmorrhoides autem consvetæ aperiantur phlebotomo, vel aliter si non fluant. Alvus etiam emolliatur haustu sequenti : ℥ passul. mund. florum borag. et buglo. ana ℥ ℥ prima num. X. ficus num. v. fiat de coctio, in qua dissolves cassiæ vel tamarind, vel mannæ ℥ j. plus, minus, fiat potia, si possit transglutire.

Si adsit destillatio, sistatur ab initio milio et sale, torrefactis : et potione syrapi de papæ. modo materia si calida.

Externa. — Applicentur extrorsum attrahentia, ut lana succida, oleo chamæ. vel communi imbuta.

Valet etiam pannus lineus, imbutus oleo amygdal. dulc. in quo ad fervorem aquæ bullierit spoliū serpentis, ut vult Arnaldus ad Papam Clementem : pulvis hirundinum, et eorum pullorum torrefactorum gargarismis additus, insufflatus, et cum melle illitus, ad eadem confert similiter, stercus canis rodentis ossa, stercus hirundinum, stercus puerorum torrefactum, stercus luporum, et nidus hirundinum modo prædicto adhibita. Possent etiam misceri vino, vel aquæ rosa. pro garga. Filum quo vipera fuerit strangulata, collo alligatum, ad eadem prodest.

Vigor anginæ quæ requirat. — In statu autem et prope statum, utendum est lenientibus, et anodinis tantum, ut gargarismis ex lacte caprinino, vel asino cum cassia, vel tamarindis : decocto caricarum, fœnugræci, passulariæ et glycirrhizæ, vel vino in quo dissolveris bdellium et succum glycirrhizæ, vel succo brasicæ cum melle. Vel caricas decem, dactylos quatuor, passulas

XX, fœnugræci ꝛ ij, lentium ij glycyrrh ꝛ j. succi glycyrrh ꝛ ℥ mellis lib j. Fiat decoctio pro gargarismate, ad maturandum, et aperiendum : Et si addideris ꝛ j pulveris stercoris anseris torrefacti, erit magis aperitivum. Vel : bauracis, myrrhæ anna ꝛ ℥ mellis ℔ ℥, lactis caprini ꝛ j ℥, fiat decoctio pro gargarism, ad leniendum dolorem, maturandum et aperiendum. Vel : calaminthæ, zingiberis, radicum iris, acori, singula ꝛ ij. Fiat decoctio in aqua et melle, pro gargar. loco prædictorum. Et si abcessus non rumpatur, colluatur os gargarismate, quod bauracis, myrrhæ, nitri, assæ fetidæ, piperis castorœi, stercoris hirundinum et anseris singula ꝛ j pulverata dissolvuntur in aqua et melle, et fiat gargarismus. Vel : pyrethri, harmel seu rutæ silvestris, seminis raphani, sinapi, salis ammoniaci singula ij fiat pulvis, cujus una pars in os insuffletur, altera vero dissolvatur in oxymellite scillitico, vel composito, pro gargarismo. Ad eadem : assæ fetidæ ꝛ ij rad. iris ꝛ j cum succo brassicæ fiant pilulæ sub lingua tenendæ.

Cucurbita magna retro admota collo dilatât œsophagum, valetque ad anhelitus et deglutitionis difficultatem. Vel : seminis cicutæ (rutam sylvestrem substitue), seminis raphani, salis ammoniaci, assæ fetidæ, bauracis, myrrhæ, singulæ partes fiat pulvis valens, teste Rhaze, insufflatus ad constrictionem anhelitus.

Aperto abcessu colluatur os hydromellite, vel vino et melle, in quibus bulluerit salvia, vel iris.

Si materia sit pituitosa, et corpus plethoricum, mittatur sanguis omnibus consentientibus : Indantur clysteres acres, qualis est qui ꝛ quinque remoll. sing. M. j. rad. iris, acori, utriusque centaurei, rutæ, hyssopi, chamæp. sampsuchi, sing. M. ℥ furfuris, hordei ana P. ij. Fiat decoctio, in qua dissolve hieræ Hermetis, vel hieræ Logad. vel hieræ pic. vel benedictæ, vel agarici, vel diaturbith, vel esulæ, secundum vires ægri : mellis, et ol. ana ꝛ iij salis ammoniaci ꝛ iij, fiat clyster. Si possit deglutire, purgetur antecedens materia pilulis cochiis, diaturbith hiera picra, cujus vires intendantur bdellio, vel colocynthide.

Deinde fiant gargarismi ex stypticis calidis addendo aliquid resolventium ut ex syrupo acetoso parato cum melle, vel ex ℔ j. hydromellitis et ꝛ j. sinapis pulveris vel ex hydromellite et succo raphani et succo corticum nucum cocto cum melle, myrrha et

croco, addendo aquam fœniculi, vel ex decocto pyrethri, vel radice urticæ, dissolvendo parum stercoris hirundinum. Vel: fœnugræci marat. ana $\frac{3}{4}$ j. cinamon. $\frac{3}{4}$ iij, mellis quarta. j. Fiat gargarismus. Vel: hyssopi, majorani, costi amari sing M $\frac{1}{2}$ lentium cum cortice $\frac{3}{4}$ ij. caricas nu. X. Fiat decoctio in qua dissolve pyrethrum, et fiat gargarisma loco prædictorum. Ad eadem valet diamorono cum pyrethro, vel: stercoris canis, triduum nutriti ossibus, myrrhæ, croci, zinziberis, sinapi, gallarum, balaust. sing. $\frac{3}{4}$ ij. fiat pulvis in os insufflandus, vel gargarismus miscendus. Insuffletur etiam in guttur nitrum, assa fœtida, et sal ammoniacum, pulverata semper expuendo.

Illinatur exterius oleum chamœmillæ vel commune, et superponatur lana succida. Radix althææ, et caricæ in vino et aqua bulliant, mox fortiter pistentur, et fiat emplastrum, addendo farinam fœnugræci, linique, et butyrum, vel axungiam porci. Valet etiam, ut sæpe expertus sum, ad sedandum dolorem, maturandum, extrahendum, et rumpendum, emplastrum ex furfure, cocto in vino, ad ipsius vini consumptionem: Addendo mel, axungiam insulsam et oleum chamœmillæ. Vel: $\frac{1}{2}$ dialthææ, fœnugræci, lini, cassiæ extractæ, butyri insulsi sing $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$. caricas num. X. oleum amygdalarum dulcium $\frac{3}{4}$ j. senecionis coctæ sub cineribus M. ij. Misce omnia simul pro cataplasmate. Vel: $\frac{1}{2}$ farinæ frumenti, fœnugræci, lini ana $\frac{3}{4}$ ij, aquæ $\frac{1}{2}$ j. oleum chamœmillæ quatuor j. uncoquantur pro emplastro. Idem posset fieri ex stercore anseris et sanguine porci, partibus æquis.

Ruptio abcessus. — Ante perfectam maturationem rumpatur phlebotomo, aut aliter, ore aperto, et compressa lingua, in parte interiore, *aliquando tamen rumpitur exterius.*

Galenus in magno antidotario sequens proponit: $\frac{1}{2}$ croci $\frac{3}{4}$ v, stercoris hirundinum $\frac{3}{4}$ vj, myrrhæ $\frac{3}{4}$ ij. spicæ nardi $\frac{3}{4}$ j, mellis despumati, quantum sufficit. Misceatur una pars diamoro, et hydromellitis pro gargarismate: altera vero teneatur in ore paullatim deglutendo; valet enim ad omnem gutturis phlegmonem. Idem posset fieri pulvere hirundinum crematarum, croco, myrrha, et specia celtica.

Ad eadem valet: quod Rhazes proponit, libro de secretis medicorum $\frac{1}{2}$. cassiæ extractæ, rob. prunorum ana $\frac{3}{4}$ j, aluminis jameni

3 iij. addatur succus citri, pro gargarismo. Prodest quoque *mas-ticatio* omnium specierum mororum, vel extremitatum mori, vel gargarismi ex succo mororum.

Sectio aspera arteria. — In desperata salute Avicennes præcipit, tracheam arteriam dividi inter duos annulos, ut per illum locum æger possit respirare; deinde ubi suffocationis aberit periculum, suatur, et consolidetur, sicut alia vulnera. Aliquando etiam fistula aurea vel argentea immittitur in asperam arteriam, ut per hanc fiat respiratio.

Diata. — Tribus primis diebus, adsit diæta tenuissima, potando solum in siti intolerabili aquam hordei, vel hydromeli: hæc enim diæta consumit per accidens morbi materiam. Nam teste Galeno, super secundum aphorisma 4 sectionis Hippocratis: inedia est de genere evacuantium. Post tertium diem redeundum est paullatim ad victum pleniorum, ut ad hordeatum, avenatum, [colaturam] furfuris, jura pullorum, et vitellos ovorum.

(*Caput II.*)

B. ÉCOLE ITALIENNE

BRUNUS

Squinantia.

Præterea fit in gutture et multoties quoddam apostema pessimum, quod dicitur squinantia, quæ est quasi suffocatio ægro-
tantis in brevi tempore, quoniam stringit flatum : ut neque
cibum, neque potum assumere possit; aut si assumat, est modi-
cum valde. Et præcipue quando est species mala; quæ fit
præcipue inter tracheam arteriam, et œsophagum in loco, qui
dicitur isthmus, vel epiglottis. Nam hujus apostematis tres sunt
species : quarum una dicitur quinantia, cujus materia intro
ex toto latens est, et tunc est mortalis; alia dicitur synantia,
cujus materia ex toto diffunditur, et tunc non interficit; alia
dicitur squinantia nomine utriusque partis, et materiam foras
emittit, ac partim interius retinet. Tunc distingue quia si secun-
dum plurimum interius fuerit, plurimi moriuntur. Et si secun-
dum plurimum exterius fuerit, plurimi liberantur. Fit autem hoc
apostema, aut ex sanguine, aut ex cholera, aut ex phlegmate, et
nunquam ex melancholia. Et signum *sanguinis* est rubedo
faciei, et venarum, et corporis magnitudo, et usus ciborum
sanguinem generantium, *cholerae* signum est sitis calor, et color
fortis. Ex phlegmate vero signum est paucitas rubedinis faciei,
alivæ multitudo. Et curatio illius quod et ex sanguine, vel cho-
lera est ut in principio, si virtus patientis aut aliud non pro-
hibet, fiat minutio cephalicæ, vel venæ quæ est sub lingua :
Deinde gargarizet patiens cum aceto et aqua, aut sapore de
moris, id est vino de moris, vel succo solatri, et arnoglossæ :
aut aqua decoctionis sumach et rosarum balaustium. Extra
autem non apponatur aliquod repercussivum omnino. Imo em-
plastretur locus cum medicinis solutivis et lenitivis, ut materia

trahatur ad exteriora: Et confert emplastrum cæpæ cocti sub cinere cum modico mellis triti et similiter injunctio dialthææ, vel olei muscel. et chamomil. cum butyro. Et ventosa quidem posita in cervice adjuvat ad dilatationem gutturis. Si autem apostema in gutture apparebit, incide ipsum; vel rumpe ipsum omni ingenio quo potes, ut si in eo sanies est collecta, foras egrediatur. Curatio vero illius quod est ex phlegmate, est ut patiens in principio gargarizet cum oxymellite, vel cum aqua decoctionis ficuum siccarum. Et cataplasmetur etiam locus cum medicinis attrahentibus et resolutivis, sicut monstravimus superius.

(Rubrica VII, liber II. Chirurgica magna.)

De elongatione uvulæ et tumefactione.

Quandoque uvula elongatur, et tumescit, et fit cum vehementi rubedine et caliditate, tunc cephalica phlebotometur: deinde fiat gargarismus cum aceto et aqua ros. aut decoquantur balaustiae, gallæ, ros et cortices mali granati cum aceto: et fiat gargarismus Q. Si non apparet in ea rubedo, immo declinat ad albedinem, tunc fiat gargarismus ex alumine et sinap. cum aceto, vel syrupo acetoso; aut fiat gargarismus ex sale armenico. Si hoc medicamen non valet, tunc necesse est quoque uvula incidatur. Verum tamen post considerandum est ne uvula sit sanguinea, aut rotunda, aut fusci coloris, vel nigri coloris, et pauci sensus, quoniam tunc fugiendum est ab incisione, sicut consulit optimus Hippocrates, et non incidenda est uvula, nisi quando est alba, longa, et subtilis; et modus incidendi est, ut facias ægrum in loco lucido sedere; et a discipulis lingua inferius deprimatur cum aliquo instrumento: deinde projice uncinum in uvulam: et extende ipsam ad exteriora: ac cum instrumento congruo incidatur. Sed cavendum est ne incidas ex ea, id quod ultra additum est supra terminum naturalem, ne accadat ex hoc læsio vocis vel sermonis assidua; deinde fiat gargarismus constrictivus cum aceto et aqua ros. aut cum aqua decoctionis ros. corticum gra. foliorum myrti, et similium stypticorum.

(Rubrica V.)

**De branchis sive amygdalis quæ in gutture nascuntur,
aliis passionibus gutturis.**

Nascuntur multoties in gutture apostemata quædam quæ branchi vel amygdalæ nuncupantur. Quorum signum est anhelitus et spiritus attractio, et difficilis excreatio, et aperto ore lingua depressa inferius visui non occultantur amygdalæ.

Et prima curatio ejus est gargarizatio stypticorum, sicut dictum est in casu uvulæ: quod si non confert, redeundum est ad chirurgiam. Oportet autem te diligenter inspicere, quoque si fuerit in ea hic offuscatio coloris, durities, et paucitas sensus: tunc non præsumas in earum curatione cum ferro: quoniam ex melancholia sunt: et sunt ex natura canceri. Et similiter quando est rub. coloris, et grossæ radices, non præsumas tangere ipsas cum ferro, propter sanguinis fluxum: immo dimitte eas, si non fiet in eis perforatio per se: et fiat gargarizatio mellis, ut sanies abstergetur. Amygdalæ igitur quibus chirurgia convenit, sunt rotunde, et albi coloris, et subtilis radices. Species operationis est, ut patiens in loco lucido constituatur; ejus ore aperto discipulus deprimat linguam inferius, cum instrumento; tunc si vides amygdalas, projice uncinum, et extrahe secundum quoque melius potes ad exteriora, deinde incide eam cum instrumento congruo unam radicitus post aliam. Cave tamen ne tunicae quæ sunt in eis propinquæ, alio modo lædantur; deinde gargarizet patiens cum aqua frigida vel aceto. Quæ si sanguinis fluxus supervenerit, gargarizet cum aqua decoctionis cortic. granatorum, aut foliorum myrti, et similium stypticorum, donec sanguis abscindatur; deinde curetur vulnus, donec sanetur. Illud autem quod securat a reditione ipsarum amygdalarum post earum incisionem, est ut locus *cauterizetur*; solent namque *multoties redire*. Et fit etiam in gutture quædam alia passio, quæ folium nominatur: eo quoque foliis assimilatur latis; et cura ejus est ut incidatur, sicut diximus de amygdalis.

(*Rubrica VI.*)

ROLANDO

De apostematibus cujuscunque generis in gula et partibus ejus nascentibus.

Sicut autem humores diversi sunt in humano corpore, ita quidem et collectiones quæ ex eorum superfluitatibus consurgunt, diversis nominibus nuncupantur; generali autem nomine apostemata vocantur: quorum quatuor sunt species; aliud est de sanguine et dicitur phlegmon; aliud est de cholera, vero alia naturalis, et alia, innaturalis. Naturalis cholera rubea: innaturalis melancholia. Apostema igitur quod fit ex cholera rubea, dicitur *herpes æsthiomenus*. Quod autem fit de melancholia, dicitur cancer. Aliud fit de phlegmate, et dicitur zinnia. Undecunque fiat, per propria signa cognoscitur. Si autem fuerit apostema de sanguine, rubor, pulsus, dolor, calor et tumor inerit. Ex phlegmate, signa sunt hæc: albedo, mollities, ut si digito compresseris, quasi signum foraminis facies. Ex cholera vero rubea talia signa procedunt: calor, rubor mistus citrónico colori. Ex cholera nigra cum melancholia innaturali signa hæc sunt: ingens durities cum quadam nigredine.

Nunc autem ad curas eorum veniamus: fiat ergo cataplasma hujusmodi. Accipe rutam, cyminum, lardonem(?), farinam tritici, et cepas: quæ omnia coquantur in vino albo et oleo, et diu agitentur: deinde superponatur quousque ad saniem venerit maturato vero apostemate, inferius ubi locus magis dependet, caute cum sagittella incidatur per longum: et si fieri potest, digitus intromittatur; et tota sanies diligenter exprimatur; qua diligenter emissa stuellus de panno intromittatur: et bis in die mutetur, et curetur deinceps ut cetera vulnera.

Si autem anthrax vel carbunculus fuerit, sic subvenimus cum frigidis circa loca patientia, ut oleo rosaceo, succo solathri, aceto, et succo capriolorum vitis, memitæ, vermicularis, et similibus calorem reprimantibus inungimus. Fit enim anthrax vel carbunculus de ferventissimo sanguine, Supra locum vero po-

natur scabiosa contrita cum axungia. probatum est. Consolidamajor inter duos lapides contrita divino quodam miraculo anthracem liberat, vel interficit: et ex toto concavat, et superligata intra unius diei spatium, ita curat, ut postea non egeat nisi cura vulnerum. Et est sciendum quoque secundum physicam differentia est inter anthracem et carbunculum; secundum chirurgiam nulla: quia carbunculus dicitur ante apostematis confirmationem, post confirmationem dicitur anthrax: ad cujus curationem, præter Rogerii auctoritates doctrina precipue est phlebotomia per metathesim: et apium risus appositum peroptimum est. Nota quoque omni apostemate ante sui confirmationem superponenda sunt frigida et calida: præter quam in anthrax et squinantia hæc etiam vitamus apponere apocrustica in locis ortis a nobilibus membris vel prope nobilia propter refluxum. Sed debemus statim purgare materiam, quia quatuor sunt casus in quibus debemus materiam indigestam purgare: scilicet multitudo materie, furiositas ejusdem, nobilis membri possessio, nobilis operationis læsio. In anthrace vero et aliis apostematibus periculosus frigida sunt apponenda circa loca, et maturantia desuper. Item nota quoque anthrax vel carbunculus non debet curari cum reperiussivis, hoc dico si cutis apta fuerit; sed cum folis calidis, et extrahas furiosam. Calida hominis egestio multum prodest ad anthracem interficiendum; sive testa nucum super caput apostematis posita. Item succus fetidæ datus in potu liberat multos. Item emplastrum contra anthracem et carbunculum: Accipe pulverem salis, fici, pinguium passularum, ana. omnia simul terantur, et superponantur; post appositionem hujus emplastri in prima vel in secunda aut in tertia die solet locus apparere totus niger. Et in medio quasi foramen: et cum per se crepuerit, appone pultes de farina tritici, et succo apii. et melle usque ad mundificationem: et cum locum a carne mundatum videris, pulverem mastichis et olibani apponere consuevimus.

Si fuerit apostema de cholera nimium calida et spissa in aliqua parte consederit, eam ulcerat: altera vulnera facit: cui sic subvenimus, ut in anthracis cura prænotandum est.

Si fuerit apostema de phlegmate, facimus cataplasma, quod
Re: malvavisci viij. unc. et decoquantur in xvij. unc. adipis

porcini, olei veteris sextariis duobus sublati radicibus, et coato oleo adantur spumæ argenti subtilissime tritæ, unc. viiij. et sine intermissione agitando lento igne coquantur : et admodum emplastri ponatur. Vel fiat cataplasma quod facere consuevimus ad omne apostema : quod saniem facere debet : fiat autem sic : Accipe malvam brancham ursinam, radices malvavisci primo coctas in aqua : et postea pista cum axungia : deinde adde butyrum, fermentum, lac mulieris, tamarices, id est limacas, et pultes quas superius diximus ad saniem provocandam, in vulnere mittimus. Et cum opus fuerit loco superimponere hoc. Accipe radices lilii, et coque in aqua : et cum axungia pista, ad ignem molla iterum calefacias : postea adde cepæ assatum, memitæ folia caulium cocta et pistata cum axungia, et farinam se : lini in vino coctam : et quæque talia per quibus materia possit maturari, et ad saniem duci. Ista omnia simul pista et incorpora : et superponatur donec apostema perducatur ad maturitatem. Cum autem maturatum fuerit : ubi locus magis dependet, aperiatur : et cæterea persequamur quæ dicta sunt in apostematis cura : quod fit de sanguine. Potest etiam fieri hoc emplastrum : quod est antea supradictum : et multum valet. Valet enim ad omne durum apostema : et ad carnes duras mortificandas : et ad materiam exterius extrahendam : et dolorem mitigat. Re : ficus siccas saginam porci, mel, ana. et radices althææ bene coctas, ab interiori stipite mundatas comisceantur : et fiat emplastrum.

Cancer aliquando vitio exteriorum, aliquando vitio interiorum consurgit in corpore : vitio interiorum fit ex humoribus putrefactis ; vitio exteriorum, ut in vulnere non bene curato. Omne enim vulnus postquam quatuor vel v dies præterierit, incuratum iam non vulnus sed cancer, sine fistula nuncupatur. Hujusmodi vero cancer aliquando habet esse ex multo tempore, aliquando ex brevi. Item alius est in nervosis locis et intricatis et plenis arteriis : alius in carnosus : unde aliter curandus est, qui in nervosis est intricatus, et plenus arteriis : et aliter qui est in carnosus. Nam qui in nervosis locis est, et intricatis et plenis arteriis, insicione vel incensione curandus non est secundum illud dictum Hipp. Quibuscunque canceri absconditi fiunt, non curare melius est. Curati enim cito pereunt : non curati multum

tempus perficiunt : quia igitur circa collum cervicem et guttur sunt nervi et arteriæ plurimæ et venarum abundantia, ab incisione et incendio est desistendum : prout tamen possumus subvenire. Si ergo fit cancer et non ex multo tempore, circa loca prædicta tale unguentum facimus. Accipe radic. linguæ bovinæ unc. iiij. radic. bardanæ unc. v. radic. chelidoniæ unc. i. cinnami, unc. zinzii. unc. ij. argenti vivi, unc. ij. ceræ, unc. iiij. resinæ quod sufficit : et axungię veteris, unc. vi. Confice sic supra dictas, radices herbarum in mortario marmoreo tere : quibus axungiam adde : et eas diligenter incorpora. de illis autem pulverem facias : et cum prædictis diligenter incorpora argentum vi. in fictili vase ad ignem pone cum resina, et liquefac. cumque liquefactum fuerit : cola, et usui reserva. Quæ si tale unguentum non subvenit : ponatur pulvis ad cancrum occidendum : qui est in nervosis locis : qui sic fit. Accipe elleborum alb. et aristolochiam long. et rotundam : et pulveriza : et cum opus fuerit, superpone.

Si vero tali pulvere extinctus fuerit, ponatur stупpa cum ovo et oleo, postea vero ponatur ibi unguentum viride : et sic usque ad finem cum talibus curabis. Aliud accipiantur cortices nucum, et terantur : et superponatur per totum cancrum, eum mortificantes. Signum mortificationis tale est : quando sanguis emittitur purus et spissus : et caro nova et bona crescit in extremitatibus, et non solummodo in medio : quia si cresceret solummodo in medio et non in extremitatibus : non esset signum mortificationis : unde adhuc oportet insistere cum mortificationibus. De cancro vero qui fit in carnis locis, suo loco dicemus.

(Cap. II, lib. I.)

De squinantia.

Squinantia est apostema quod in gutture nascitur : cujus tres sunt species. Quarum prima squinantia vocatur : et hæc inter tracheam arteriam, et œsophagum nascitur, in loco qui dicitur isthmus : quæ species est pernecabilis : cujus cura soli Deo servatur. Secunda dicitur sinantia : quæ partem materie retinet interius, partem vero foras emittit : ut tumorem exterius videre

possis : et hæc minus malitiosa est. Est et tertia species quæ dicitur schinantia : cujus materia tota foras emittit : de cujus malitia maxime timere debemus. Quæcunque vero istarum specierum fuerit : generalia signa sunt hæc : Difficultas inspirandi et respirandi : cibum quoque non potest suscipere : sputum a guttore emittere non possunt. Quibus a principio sic subveniamus.

Si virtus et ætas permiserit, sanguinem de vena cephalica vel de vena quæ est sub lingua extrahimus. Gargarisma de sapa, vel diamoron fieri volumus : vel fiat tale gargarisma. Summa. gallas, balaustias, rosas : lente facias bullire in aqua rosacea vel pluviali : et de hac sibi patiens gargarizet sæpius hoc enim gargarisma humores currentes ad locum dolentem reprimit. In principio, debemus insistere cum percussivis gargarismatibus ; quia fere semper fit de rheumatico humore pro majori parte ; deinde cum consumptivis et inspissativis humorum. Extrinsecus autem de dialthæa, et similibus ungatur. Vel fiat cataplasma : quod omnino secundam et tertiam speciem curat : quod sic sit. Accipe radices ebuli, porrinas, quæ non sint remotæ neque evulsæ a loco, in quo sunt natæ absinthium, cardum benedictum, senationes ad libitum ; ista bene pistentur, et succus extrahatur. Item accipe farinam hordei et farinam seminis lini, et cum succo supradicto distempera, et incorpora ; ita tamen quoque multum remaneant liquida, postea vero accipe axungiam porcinam, et liquefacias ad ignem in patella : et adde mellis æqualem quantitatem cum axungia : et facias bullire : deinde prædictum succum in farina hordei in eadem patella mitte cum prædictis admisce, et incorpora : et tandiu facias bullire : quousque ad spissitudinem veniant : et in modum aliqujus embrochæ tale cataplasma super locum illum ponatur : ter vel quater in die mutetur : et semper calidum removeatur. Cum autem tale apostema intus saniem fecerit, digito vel aliquo instrumento ipsum apostema rumpere, et saniem emittere non est inutile. Sic enim aliquos propria manu curavi.

Emplastrum ad squinantiam. Accipe althæam, et restas alliorum, et coque in aqua : et postea pistentur cum axungia : et desupere ponatur. Vel fiat emplastrum de radicibus lapathii acuti, et restis alliorum et axungia, et desuper ponatur. Contra

squinantiam fiat tale experimentum. Sumantur carnes bovinæ salsæ semicoctæ ad modum castaneæ vel ad modum avellanæ : et insuantur firmiter filo longo serico : ne forte patiens velit nolit carnem illam transglutiat : et medicus extrahat illam subito cum violentia : ut ita possit apostema rumpi.

(Liber II, cap. VII.)

GUILLAUME DE SALICET

De apostemate sanioso in collo et gula.

Tale apostema semper fit ex materia, et humore composita, et mista, sicut et ut plurimum omnia apostemata, declinante ad sanguinem, aut ad choleram, in qua est materia post purgationem in fine exitus saniei, manifeste videtur vestigium phlegmati et melancholiæ; et ad hoc sensibile tactu et visu satis apparent. Signa ergo ejus quod declinat ad sanguinem, sunt loci rubedo obscura, et pulsatio fortis, et non cum multa extensione in modum ponderis, et habitudo patientis est carnosa, sanguinea, et usus fit diæta calida, ut vino, carnibus, mellæ et breviter omnibus aliis sanguinen multiplicantibus. Signa vero ejus quod ad choleram declinat, sunt aliqua de dictis, sed hic est acuitas magna apostematis in acumine, cum punctura notabili, et rubedo quædam declinans ad citrinitatem.

Cura. — Ergo ejus quod ad sanguinem declinat, est, ut subito a principio phlebotometur patiens de cephalica, in manu opposita apostemati; aut etiam si sit corpus plenum et robustum, phlebotometur prius de basilica: et deinde de cephalica, et hoc virtute et ætate consentientibus.

Et si prohibet ætas vel aliud, ponantur ventosæ super spathulis, cum scarificatione, aut ponantur sanguisugæ super spathulas scarificatas. Quo facto, super apostemate fiat unctio cum oleo de chamomilla, et liliis albis, et de anetho, pinguedine gallinæ, butyro et hysopo; et antequam fiat hujusmodi unctio, fomentetur locus cum aqua decoctionis althææ, florum chamomillæ, semi, anethi, seminibus lini aut fœnugræci et hordei; imo et cum spongia fiat de hac decoctione embrocha apostemati dicto. Deinde exiccato loco optime cum panno calido, fiat tunc talis unctio cum ante dictis, aut ante inunctionem lavetur solummodo cum aqua calida apostema, et tunc exiccetur et ungatur ut prius, sed primus locus est artificialior. Factis fomentatione et embrochatione ante dictis, super apostemate

hujusmodi emplastrum apponatur : radicis althææ mundatæ, frustratim incisæ; tritæ et pistatæ optime, lib. I. farinæ fœnugræci, seminum lini et hordei, ana drachmorum ij. cæparum et liliorum candidarum coctarum cum prunis et althæa, et florum chamomillæ, quinque drachmorum ficuum pingium optime pistatarum cum althæa et cæpis, numero VIII passularum, drachm. II, vitellorum ovorum coctorum sub prunis numero V.

Incorporentur omnia simul cum decoctione althææ sufficienti, et bulliant, donec inspissetur ad formam emplastri: et dum quasi sit inspissatum, adjunge ei butyri et axungię porcine ana, ut sit bene pingue, liliorum alborum, chamomillæ et anethi ana drachm II. (Hoc enim apostema maturat et dolorem mitigat). Factam ejus maturationem cognoscit medicus digitis suis palpando apostema, et sentiet mundationem; et dolor, qui sentiebatur ante maturationem, valde remollitus erit.

Ita semper signa maturationis humorum. Cognita maturatione, incidatur apostema secundum *longitudinem* gulæ, et modo competenti, absque forti dolore si est possibile, sanies in parte extrahatur, non curando si tota non exierit illa hora. Remota tunc sanie in parte, aut in totum, illa hora impleatur locus cum stuellis stuppeis (charpie?) aut lineis, involutis in vitello et albumine ovi, cum oleo roseo, alumine zuccharino, et hoc enim mundificat locum, defendit partem ne plus recipiat, et dolores sedat. Sed si fluxus sanguinis infestaret, dimitte oleum et sic procede per tres aut quatuor diebus. Et tunc considera locum si indiget majori mundificatione, et tunc mundifica ipsum cum unguento apostolorum, de quo in fine operis faciam mentionem plenam; aut cum unguento viridi, de quo etiam dicam. Facta mundificatione, incarna et consolida ultimo cum incarnativis et consolidativis dictis supra, et dicendis in fine operis copiose. Diæta ejus sit similis ut in molestia præcedente et paulatim redeat æger ad suam vitam usualem...

Cura apostematis, quod ad choleram convertitur, est ut phlebotometur et ventosetur patiens modo dicto, et conditionibus dictis superius: sed non sit copiose. Et si facta phlebotomia patiens sit constans in virtute, bonum erit ut purgetur minorative cum hac decoctione. Reci: prunorum, violarum, endiviæ ana II

drach. coquantur ista in aqua unica bullitione, deinde collentur et adjunge tamarindorum indorum rhubarb : ana drach. I, cassiæ, mannæ ana III drachm. sumatur mane jejuno stomacho. Diæta ejus sit, quæ dicta est superius. Quo ad localia, incisionem, mundificationem, incarnationem, consolidationem, directæ ut dictum est de apostemate sanguineo. Diæta tamen sic in ipso poterit ordinari, quia a principio paucis sit contentus, succo hordei, aut ejus ptisanna cum zuccharo, aut in sola aqua, aut cum brodio pulli juvenis, lactucis, portulacis, endivia, cucurbitis et hujusmodi frigidis utatur, pro suo ferculo cum agresto aut vino granatorum, et zuccharo. De istis sic elixatis, suma: unum aut duos bolos cum forti aceto, aut agresto, aut vino granatorum, aut aqua decoctionis prunorum, endiviæ, capitum veneris, scolopæ et hujusmodi frigidorum cum antedictis, aut sola cum zuccharo pauco. Et ista sit ejus diæta, nisi virtutis debilitas impediret, quia tunc posset sumere carnes pullinas, et alias leves alterativas semper cum antedictis frigidis. Et post hoc redeat paulatim patiens ad ejus consuetam vitam, bonam tamen, secundum virtutis ejus debilitatem, aut vigorem.

In incisione autem omnis apostematis colli et gulæ considera bene nervos et arterias, et specialiter vita pro posse, incisionem inter duas arterias, quæ sunt prope cannam pulmonis in gutture apud eminentiam gulæ, ab utriusque latere gulæ, quia ex illarum incisione sequitur mors in brevi.

(*Chirurgia lib. I, cap. XXII.*)

LANFRANC

De apostematibus colli et gulæ.

Horum apostemata locorum aut in lacertis fiunt exterioribus ita quoque de materia nihil transit ad intra ; aut in lacertis fiunt interioribus: aut in ipsa substantia meri aut in quadam fiunt concavitate, quæ est inter cannam pulmonis, et œsophagum in loco, qui dicitur isthmos; et sunt ut plurimum sanguinea, et sæpe phlegmatica, rarius cholericæ, et rarissime melancholicæ. Humoris abundantia distinguitur per signa superius assignata. Quoque autem materia in lacertis contineatur exterioribus, cognoscitur per apostematis apparentiam; et quoque transglutio vel aëris attractio multo impeditur. Quoque autem materia in lacertis sit interioribus, cognoscitur, eo quoque pars tumoris apparet extra: quoque cum difficultate transglutitur. Quoque autem materia sit in isthmo sive intra, cognoscitur eo sic de tumore extra, ut aliquid non apparet: et quia æger non potest transglutire: et quoque vix respirat, et expirat. Et si accidentia hujus apostematis intenduntur, oculi foris eminent, lingua ore contineri non possit; nec ullo modo loqui possunt, et spiritum emittunt parvum: lacerti pectoris valde laborando salire videntur. Tunc non est necessarium medico dicere, nisi Domine miserere isti. Verum est quoque alii qui audace lignum aliquod violenter infixerunt in gutture usque ad locum apostematis impellantes, apostema ruperunt quare fuerunt a morte subito liberati. Sed talis operatio ab infamia non est tuta; quoniam inter manus medici operantis taliter plurimi moriuntur, quorum mors non ægritudini, sed medico imputatur. Illa vero species occulta, in qua non tantum accidentia sunt intensa, non est tantum periculosa.

Curatio. — Cum ægritudo incipit, si sit cholera, cum phlebotomia basilicæ, et si fuerit jam pluribus diebus incepta; quia vocatus a principio, non fuisti, cum phlebotomia mediante; quæ quidem phlebotomia fieri debet usque ad syncopem, maxime

si corpus forte fuerit et carnosum. Sequenti die fiat minutio de venis, que sunt sub lingua. Nec ullo modo audias consilium illorum, qui præcipiunt incipere a venarum linguæ phlebotomia : quoniam ex phlebotomia ipsarum, si phlebotomia basileæ vel medianæ non precedat, accidit sæpe ut eger subito, maxime si fuerit plethoricus, suffocetur. Facta phlebotomia detur ad gargarizandum et gallarum cum qua sit distemperatum diamoron ; aut gargarisetur stercus hirundinum distemperatum cum hydromelite, aut stercus passerum vel gallorum : aut stercus canis comedentis ossa solum : et stercus pueri lactentis desiccatum. Item Reci: Stercoris canis solum ossa comedentis, gallarum, satureiæ partes æquales fiat pulvis : et cum aqua mellis distemperatus fiat gargarismus. Aquam bibat hordei : nihilque comedat nisi candarusium factum de furfure in hunc modum. Re : furfuris de tritico recentis unam scutellam, et cooperi aqua calida, et permitte stuphari per horam. Postea tere in mortario cum pistello et cola. Colaturam bene decoctam cum modico sale et ægro cum penidiis administrabis.

Si vero comestionis hora transglutire non posset in colli fontanella, parvam pone ventosam cum igne : quia tunc transglutiet, dum ventosa locum ibi amplians permanebit. Gula toto exteriorius et collum cum oleo ungatur de chamomil. et supra uncturam lana ponatur succida. Ponatur utiliter emplastrum factum de nido hirundinis : quod est commune squinantiae seu apostematibus gutturis, et colli cujuslibet speciei squinantia quod componitur per hunc modum. Re : nidum hirundinis : et fac illum in aqua diu bullire, postea cum cribro raro collo, ut grossæ paleæ abijciantur : terreum suave quod relinquatur, retineatur, et in alia aqua bulliant radix lilij, radix bismal., radix bryoniæ, folia malva et viol. et parietariæ. Quæ bullita pistentur optime apte grossa unius cultelli sup. acida : et cum aqua hirundinis incorporetur fermentum bene acre, et farina lini ; et addantur herbæ pistatæ et oleum commune vel axungia por. sine sale : et bulliat totum simul : et conficiatur : et fiat emplastrum. Hoc enim emplastrum miraculose resolvit vel maturat squinantiam, sive sit intus aut extra, si extendatur super pannum, et ponatur calidum circa gulam. Valet etiam colli inunctio cum oleo de chamomilla misto cum butyro veteri non salato, si cum lana succida involvatur.

Bonum est etiam, si apostema fuerit interius, aut major ejus pars, cum tempus prolongatur quod non repercutitur nec resolvitur; et fit maturativus gargarismatibus ut hoc. Re: ficus sem. lin. malvæ, simul coque in aqua, et gargariscent. Aut aqua ficuum cum butyro, et vino mista quæ maturat omne intrinsecum apostema sive in gutture sive in stomacho sive in intestinis fuerit generatum.

Cum autem illud maturum cognoveris, et cognoscitur per doloris mitigationem et accidentium et febris, si fuerit apparens extra, cum sagitella illud perfora, nervorum cavendo læsionem, et arteriarum, et venarum. Post aperturam mundificetur cum mundificativis in antidotario nominandis. Si fuerit intra, nec rumpatur, cum gargarismate prædicto de butyro, ficuum, aqua et vino rumpatur cum ingenio subtili (Halyab). Scilicet cum gargarismate stipticorum, sicut decoctionis gallarum, acaciæ, psidiarum, balaustiarum, aluminis jameni, quoniam hæc partes loci contrahunt, et apostema crepatur. Rupto apostemate, sanieque foras educta cum aqua calida, in qua dissolvatur butyrum et oleum violaceum, donec sanies tota fuerit expulsa, postea cum aqua decoctionis liquirities, ireos, tamarisci, fac gargarisma. Valet etiam vitellorum ovorum sorbitio. Si vero materia fuerit frigida, minus repercutiatur et calidioribus gargarismis est utendum. Et post apertionem fortiori indiget abstersione cum mundificativis, in quibus sit aliquid de myrrha, sarcocolla, secundum quoque in capitulo de mundificativis in antidotario continetur.

Aliquando quidem propter rheuma descendens a capite nascuntur in radice linguæ ab utraque parte quædam excrescentiæ: quæ videntur quasi amygdalæ, quæ tracheam impediunt arteriam, ut anxia fiat aeris attractio, et emissio; quæ curantur cum prædictis medicinis, et per prædictum modum evacuando, repercutiendo, resolvendo, et per ordinem maturando. Et quoniam bona casuum narratio multum corroborat operantem, ponam in hoc loco quod mihi accidit in civitate Mediolani de quadam domina quinquageneria quinta, quæ habuit squinantiam phlegmaticam, quæ totam occupavit gulam intus et extra, ita quoque extra tumor maximus apparebat, et cum hoc non loquebatur, nec poterat transglutire, hoc fuit in cura cujusdam juve-

nis mei scholaris per plures dies, de malo in pejus quotidie procedebat. Tunc quasi in casu desperationis fui vocatus; et inveni eam in statu pessimo, quia pluribus non comederat diebus; nec audebat dormire; qui a timebat subito suffocari. Tunc tangens pulsum, ipsum in ultima inveni debilitate. Tangens locum corruptum sensi materiam in profundum; quod cognoscens cognovi quoque potius suffocaretur. Tunc mihi præparavi ratorium; et locum palpans cum digitis inveni maturam materiam inter mentum et epiglottum plusquam in alio loco congregatam. Tunc locum palpans cum digito, ut possem nervos, venas, et arterias evitare, vulnus secui ibi profundum, per quod de corrupta et male foetente materia magnam partem extraxi, magnam quoque partem dimisi, quam tunc evacuare poteram: sed ratione volui quam scivisti. Tunc ægra leviolem habuit anhelitum: pulsusque fuit fortificatus, timorque mortis subito diminutus, eo quod ad cor major poterat aeris quantitas delegari. Tunc administrans ei brodium, per vulnus magna ipsius quantitas exibat. Tunc ingeniavi, ut cum *argentea cannula*, quæ posita in ore totum vulnus transibat, sua cura reciperet ad ipsius necessaria nutrimentum, gulam totam, et collum cum medicinis mundificantibus; et residuum materiæ maturantibus circumdabam, donec extraxi de vulnere frustum magnum viscosæ materiæ et foetentis: quæ fuerat sicut quoddam intestinum longum plus, et grossum unius minoris digiti quantitate; quæ quidem materia calore fuerat extraneo condensata: quæ quidem remota remansit locus sine foetore: et ægra incepit maxime confortari; tamen in ea continuavi mundificativa, et incarnitivia, et cicatrizativa vulnus optime sigillavi, et ægra fuit saluti pristina restituta. Cum ergo in locis prædictis frigidam materiam et corruptam in venis, aperturam locis nullatenus expectabis: sed aperturam accelera, et si materia nondum ad plenum fuerit maturata: nam si naturæ ipsam aperiendam dimiseris, male faceres, quoniam materia grossa in membris profundo imbibita, non potest a virtute debili ad membri superficiem delegari; nec membra spiritualia non longo possunt tempore defectum aeris expectare.

(*Doctrina secunda, Tractatus tertius, cap. V.*)

ROGER

De apostematibus gulæ et colli.

Sicut autem humores diversi sunt in humano corpore, ita quidem et collectiones, quæ ex eorum superfluitatibus consurgunt, diversis nominibus nuncupantur : generali autem nomine apostemata vocantur, cujus quatuor sunt species. Nam aliud est de sanguine et dicitur phlegmone; et aliud est de cholera. Sed cholera alia est naturalis et dicitur rubea, alia innaturalis et dicitur melancholica. Apostema ergo, quod fit de cholera rubea, dicitur herpes œsthiomenus, quod autem fit de melancholia, dicitur cancer interior. Aliud fit de phlegmate et dicitur zimia. Unum quodque igitur propriis cognoscimus signis. Si enim fuerit apostema de sanguine, rubor, pulsus fortis, dolor, calor et tumor adsunt. Ex phlegmate vero signa sunt hæc albedo, et mollities, ut si digitum impresseris, quasi signa foraminis facies. Ex cholera rubea talia sunt signa, calor, rubor mistus citrino colori. Ex cholera nigra, sive melancholia innaturali, hæc signa sunt, ingens durities cum quadam nigredine. Nunc ad earum curas veniamus, etc., (pas de passage spécial pour la gorge).

(*Chirurgia cap. V, liber II.*)

De squinantia, et ejus speciebus.

Squinantia est apostema quod nascitur in gutture, cujus tres sunt species. Quarum prima dicitur Squinantia. S. nomine totius sic dicta, et hæc nascitur inter tracheam arteriam et œsophagum, in loco qui dicitur isthmus, et hæc cito est pernecabilis, ejusque cura soli Deo relicta est. Secunda dicitur Scinantia, quæ partem materie retinet interius, partem vero foras emittit, ut tumorem exterius videre possis : et hæc minus maliciosa est. Tertia species, dicitur Quinantia, cujus materia tota foras emittitur, et de hujus malicia non maxime timere debemus. Quæcunque vero istarum specierum fuerit, generalia

signa hæc sunt difficultas inspirandi et expirandi ; cibum quoque vel potum sumere non possunt. Vox quandoque denegatur ex toto, salivam non inglutire, nec sputum emittere possunt. A principio tamen istis sic subvenimus. Si virtus et ætas permiserint, sanguinem de vena cephalica attrahimus, vel diamoron fieri volumus. Vel fiat talis gargarismus ; sum : gallas, balaustias, rosas, et lentas, facias bullire in aqua ; et de hac patiens gargarizet sæpius : hoc enim gargarisma humores currentes ad locum dolentem reprimit. Extrinsecus autem dialthæa, et similibus ungatur (*a*), vel fiat cataplasma, quod omnino secundam et tertiam speciem curat, quod sic fit. Accipe radic. ebuli, porrinas, quæ non sint remotæ neque evulsæ a loco in quo nata fuerint absynthium, cardum benedictum, senationes ad libitum. Ista bene pistentur, et pistatis succus extrahatur. Item accipe far. hordei, et far. seminis lini, et cum prædicto succo distempera, et incorpora, ita tamen quod multum remaneat liquidum. Postea vero accipe axungiam porcinam, et liquefacias ad ignem in patella, et adde mel in eadem quantitate cum axungia, et facias bullire : deinde prædictum succum cum farina in eadem patella mitte, et cum prædictis admisce ; et incorpora, et tandiu bullire facias, quousque ad spissitudinem veniant ; in modum embrochæ alicujus, tale cataplasma calidum super locum patientem ponatur, ter vel quater in die mutetur, et semper calidum renovetur. Quum autem tale apostema interius saniem fecerit, digito, vel alio instrumento, ipsum apostema rumpere, ei saniem emittere, non est inutile : sic enim aliquos propria manu curavi (*b*).

a. — Additio. — In principio debemus insistere percussivis gargarismatibus, quia fere semper fit de rheumatico humore pro majore parte : deinde cum consumptivis et inspissativis horum extrinsecus autem de dialthæa, et similibus ungatur.

b. — Additio. — Emplastrum ad quinantiam. Accipe : althæam et rad. alliorum, et coque in aqua, et postea pistentur cum axungia, et desuper ponatur : vel fiat emplastrum de racidibus lapathii acuti, et restis alliorum et axungia, et de hoc ponatur. Contra quinantia, fiat tale experimentum : sumetur carnes bovinæ salvæ semicoctæ ad modum castaneæ, vel avellanæ, et insuatur firmiter filò longo de serico ne forte patiens, velit nolit

carnem illam transglutiat, et medicus extrahat illam subito cum violentia, ut ita possit apostema rumpi.

(*Cap. XIII, lib. III.*)

De Branchis.

Branchi interius tument, et quasi amygdalas duas creant. Unde difficilis est excreatio, et anxia spiritus attractio. Quibus gargarismata prius adhibeantur, a quibus si patiens non liberatur, ad chirurgiam est eundum. Infirmum ergo primum coram te constitue, cujus ore aperto linguam inferius premas cum instrumento, ita ut amygdalas illas videre valeas, et unco ferreo vel æneo capere, et competenti ferro incidere. Pelliculas autem illas, quæ stant juxta eas, illæsas relinqua, postea de aqua rosa cum aceto æqualiter, fac gargarismum, et cum succo arnoglossæ similiter. Si vero sanguis multus fluxerit, melicratum adde. Quod si putredinem fecerit, horum incisio sic fiat: cutis in longum incidatur, et instrumentis ad hoc factis, illa abstrahatur, et a radice funditus evellantur; locum vero, aureo vel ferreo instrumento, decoquimus (a).

a) *Additio.* — Est autem quædam alia passio, quæ nascitur in ore juxta epiglottum, quæ dicitur *folium*, quia ibi sunt una, vel duæ carunculæ tenues, et latæ, ad modum folii, quæ obstruunt tracheam arteriam, et vocem impediunt. Cum vero patiens os aperit ad loquendum, se elevant, et foramen tracheæ arteriæ oppilant. Cum vero os claudit, subsident. Unde patiens vix potest formare vocem, vel aliquod verbum intelligibile, quæ passio nunque curatur, nisi beneficio chirurgiæ.

(*Cap. XIV, lib. III.*)

De Uvula.

Uvula, elongatur sæpe, vel tumescit, quæ exsicceetur pulveribus constrictivis et gargarismatibus, et hoc pulvere, qui fit: Re balaustiae, gallæ, piperis, pyrethri, cinnamomi superponatur pulvis cum cavo ferro; fiat gargarisma, quod fit: Rec: vini dulcis, vel mellis, et aceti, ana, piperis, pyrethri, staphidis agriæ balaustiae, æqualiter de omnibus, pulverizata, cum prædictis

liquoribus bulliant, et utatur patiens hoc vino, mane et sero. Si autem non sic desiccetur, incidatur forficibus ad hoc factis, juxta palatum subtiliori loco, cave tamen, ne radices uvulæ tangas. Et fiat gargarismus desiccativus, seu cum desiccativis, de quo gargarizet die ac nocte: caveat sibi patiens, ne supinus jacet gargarizet etiam aquam ubi cocta sit pinguiissima gallina. Sæpissime caveat sibi patiens, ne multum dormiat per tres noctes (a). Velante incisionem, incendatur aureo nummo et gargarisma fiat, ut diximus (b). Utatur hoc emplastro, quod fit de melle calido, et pluribus baccis lauri, cymini, pulegii, origæi euphorbii, ana, et pone in summitate capitis cum stuppa.

a. — *Additio.* — Quia a somno provocatur rheuma.

b. — *Additio.* — Item ad relaxationem uvæ, coctura facta in occipitio confert, et emplastrum, factum de pice liquefacta super ignem, et de pulveremastiches et olibani commistis, et illud tepidum in occipitio ponatur. Fiant gargarismata constrictiva, nisi multus humor sit in causa: quod si fit, gargarismata fiant in parte consumptiva, et in parte dissolutiva.

(Cap. XV, lib. III.)

GUY DE CHAULIAC

De squinantia.

Est ergo squinantia apostema gutturis, et partium ejus, viam aeris, et cibi impediens. Cujus species secundum loca distincta, quatuor assignat Avicennes, sequendo sententiam Galeni in quarto loco de locis affectis. Una est, quando apostema est in lacertis *extrinsecis*, ita quod sit apostema solum apparens extra in membris continentibus.

Secunda species est, quando est in lacertis *extrinsecis* versus *spondylia* (vertebras): ita quod apostema solum apparet *intus* versus fauces et amygdala; quando comprimitur lingua.

Tertia species est, quando est in lacertis *intrinsecis ipsius meri*: Et tunc non apparet sensui; sed manifestatur rationi, per majorem offensionem transglutionis atque anhelationis.

Quarta species est, quando est in lacertis *intrinsecis ipsius cannae* seu epiglottis; et tunc etiam non apparet sensui, sed rationi, quia magis ostendit anhelationem atque difficultatem transglutiendi.

Unam aliam speciem assignat Galenus in quarto de locis affectis, quæ vocatur *strumosa*; quæ fit propter dislocationem primæ aut secundi spondylis colli, de qua in dislocationibus inferius fiet sermo.

Causa squinantiae. — Sunt sicut et aliorum apostematum universales, et particulares. Fiunt enim ut plurimum per viam derivationis; et habent materias calidas, et frigidas, ut in sermone communi apostematum fuit dictum.

Signa et indicia. — Quantum ad causas sunt, ut aliorum apostematum. Quantum ad locum autem secundum Galenum, ubi supra, omnes species quandam difficultatem operantur secundum transglutionem, et respirationem, et coguntur stare recti, et linguam extrahere. Et potus sæpissime ascendit ad nares. Avicennes addit oculorum egressionem, et linguæ difficultatem, secundum nares locutionem. *Signa mala et timorosa* in squi-

nantia sunt dyspnæa fortis, et origmonica, transglutiendi magna difficultas, colli contractio, emissio linguæ, et spumæ ad modum fatigati equi, color malus in lingua, labiis, et oculis, ac etiam extremitatum frigiditas, sudor frigidus et cordis defectus. Signa vero *bona* sunt quies, somnus tranquillus, alleviatio doloris, et anhelitus, et transglutionis, et malorum signorum privatio. Squinantia est ægritudo brevis et periculosa, et secundum Hippocratem, tertio (libro) de prognosticis, illa est pessima, et citius mortifera, quæ intus in gutture, nec extra apparet. Et quæ est cum dolore acutissimo, in spiritu, qui recto cervice trahitur. Hæc autem species in primo die, aut secundo, aut tertio, aut quarto suffocat.

Altera hujus species mala, est quando apparet *intus* in gutture, et non *extra*. Et ipsa est plus mortifera quam prima.

Tertia quæ apparet intus, et extra, prioribus diuturnior est.

Quarta autem species quæ omnino *extra* proeminet, tutior est aliis. Squinantia quæ non transmutatur, neque patiens putredinem exposuit et doloris requiem invenit, et subito malum istud evanescit aut mortem vel laboris iterationem promittit. Item quinto aphorismorum, decimo quibuscunque squinantia ad pulmonem convertitur, in septem diebus moriuntur. Si vero hos effugerint, empyici fiunt. Propterea in sexto aphorismorum trigésimo septimo: in squinantia bonum est apostema foras exire, et membra interiora dimittere. Amplius secundum Avicennam omne apostema præfocativum aut resolvitur, aut permutatur, aut collectionem facit, aut interficit. Signa *resolutionis* sunt signa bona jam dicta. Signa *permutationis*, sunt subita detumefactio cum nocumento alterius particulæ (partis). Signa *collectionis*, sunt lenitas, et prolongatio ultra quartam diem. Signa *mortis* sunt signa perniciose jam dicta: Amplius, squinantia critica est suspecta. Nam, secundum Avicennam, crisis cum apostematibus præfocativis procul dubio est perniciose.

Cura squinantiae. — Convenit cum cura apostematum communium in diæta, et subtractione materiæ, et in applicatione percussivorum *in principio*; et resolventium et maturantium *in fine*, et mixtorum *in medio*. Differt tamen in his, quia percussiva non administrantur ab *extra*, sed ab *intra*; cum hoc

etiam evacuationes, et derivationes fieri debent sine quacumque dilatatione.

Specificatur ergo curatio talium apostematum in quatuor : prima in victu, secundo in materia antecedenti, tertio in conjuncta (re), quarto in accidentibus.

Primum completur, quia ultra diætam communem dictam : superius secundum quod Mesue yult, sint contenti in principio cum hydromellite et aqua zucchari; deinde procedant ad aquam lentium excorticarum, et hordei. Extingunt enim sitim, acuitatem et inflammationem. Deinde ad jus cicerum cum aqua hordei; deinde gradatim ad sorbitiones ex farina fabarum, et ex amylo, et ex colatura furfuris cum melle; post hæc veniant ad vitellos ovorum, et similia; et nullo modo repleant se. Et venter eorum semper sit laxus. Somnus eorum sit mensuratus, nam in multitudine somni timetur subita suffocatio : quare oportet, quod parum dormiant, et sæpe excitentur.

Secundum completur per evacuationes, et diversiones cum phlebotomiis, et medicinas laxativas secundum materiam peccantem; et cum clysteribus acutis, et fortibus fricationibus factis festinanter; quia ægritudo propter membri operationem non dat judicia.

Fiant ergo primo fricationes et ligationes extremitatum, et statim clyster, et post in continenti fiat phlebotomia de *saphenis*; demum post si virtus tolerat, de *brachiis*, et post eodem die de venis *sub lingua*. Et si esset possibile transglutire, in crastinum detur sibi in materia calida diaprunis, aut diacatholicon acuatum cum electuario de succo rosarum. Et in frigida detur hiera picra, aut pilulæ cochiae, aut de agarico, et intercipiatur rheuma cum milio, et sale torrefacto, et super caput applicatis, aut cum stercore columbino. Et detur ad labendum diápapaver; aut pilulæ styracinæ teneantur sub lingua.

Tertiam rem complent secundum Galenum percussiva in principio ab intra, et lenientia ab extra ut materia non veniat infra guttur; et resolutiva in fine : et mixta ut dictum est in medio. Sed non quæcunque, quia non vitriolum, ut ipse dicit, nam nocivum esset, si descenderet ad inferiora. Sed certa et appropriata ad naturam particulæ, velut in principio concedit dianucum, seu diacaryon. In augmento diamoron in quo virtus

myrrhæ, et croci et consimilium sigilletur. In fine vero diaron in quo virtus ficuum siccarum pingium, calamenthi, origani seu pulegii, hyssopi, satureiæ, et ultra si necesse fuerit sulfuris et nitri sit sigillata. Et proprie utilia velut stercus hirundinis, canum et luporum et puerorum, qui nutriti sunt lupinis; et ut sunt capita allecium piscium salitorum, et herba dicta morsus diaboli, et consimilium. Diamoron sic fit secundum Galenum ut supra.....

Naturale autem apostemate, præcipiunt ipsum rumpere si est apparens, cum *sagitella*, et mundificare cum mundificatione de apio vel cum aliquo communium exiturarum. Si autem esset intus non apparens, rumpatur cum unguibus, vel fricando cum aliquo si est possibile. Aut cum gargarismis maturativis et aperitivis, ut est decotio ficuum, dactylorum, fœnugræci addendo fermentum. Et fortius cum Avicenne baurac, nitrum myrrha, piper, stercus hirundinum, et lupi, semen sinapis et harmelis (rutæ) et secundum Rogerium sumatur frustrum carniū bovinarum semicoctarum, et ligetur cum firmo filo et longo, et facias quod transglutiat, et dum erit in transglutiendo, extrahatur subito cum filo, cum violentia; et ita rumpetur apostema.....

II

TEMPS MODERNES

I. PROCESSUS COMMUNS

TRAITÉS DE MÉDECINE

FERNEL

Linguae fauciumque morbi, symptomata et causæ.

Tonsillæ sæpe tument imbutæ destillatione frigida; ac tum quidem sub maxillo tumor tactu visuque intus animadvertitura hicque seu frustulum quoddam faucibus, inhærescens male suppremit, obstatque ne cibus, potus et saliva facile vorentur, idque sine siti sine ardore. Sed et interdum inflammatio tonsillas exercet, quæ partis nomen etiam sortitur. Hæc tumoris notas præ se fert, præterea vero dolorem, ruborem, ardorem atque sitim. Concocta materia, interior cuticula facile disrumpitur, abscessoque facto, pus in os et in fauces emanat. Hinc ulcus sequitur sordidum, et quo graveolens fit expiratio. Oritur ejusmodi ulcus frequenter citra phlegmonem ex humore salso vel acri, qui molles, humidas, calidasque tonsillas prorsus excedit. Nonnunquam et ex contagionis labe incipienti hic Veneræ familiare, est. Sed et columella e palati extremo propendens plerumque molesta est. Lascior enim longiorque evadens, in fauces et œsophagi caput illabitur, titillatione molesta, qua qui afficitur, hanc perpetuo vorare frustra contendit, metuitque ne ejus impetu stranguletur. Hoc vitii nascitur cum ex humore multo superne defluente madet atque perfunditur. Quinetiam columella seu gurgulio interdum (at certe raro) inflammatur. tumetque cum rubore et ardore. Ac tum in fauces illapsus majore tædio quam

relaxatus, suffocationis metum concitat. Quum per inflammationem illius pars imo crassa summa vero tenuis et nigricans apparet; *σταφυλή*, inquit Hippocrates, id est uva, nominari solet. Siquidem figura, colore, atque magnitudine est uva acino persimilis.

At vero angina affectus est fauces, id est summas gulæ gutturisque partes per quas cum cibi potusque tum spiritus introitus est, præcludens. In hac spiratio fit difficilis, deglutire vix licet ac proinde potus resilit in nares, dolor acerbis fauces occupat. Atque hæc quidem omnis anginæ communia sunt signa. Singulis autem ejus differentiæ alia peculiaria existunt. Etenim angina aliâ *vera*, alia *notha* est; veræ et legitimæ quatuor sunt differentiæ. Una, quam omnium periculosissimam censuit Hippocrates, ubi inflammatio penitus abstrusa, graviora infligit symptomata, non sine metu strangulationis. Hac sæpe vidimus occidere ægrotum horis octodecim, constante mente, integrisque sensibus. Altera est, quum interiores laryngis fauciumque muscoli manifesto phlegmone tentantur. Hæc æque ac superiora symptomatis sæva sunt, sed minor tamen sit periculo si os expurgari potest. Tertia fauces interiores uno cum cervice occupat, in qua foris tumor atque rubor est conspicuus, cum calore ac dolore. Symptomata huic nihilo sunt quam cæteris levia, sed tamen spes salutis melior, quod inflammatio foras evocari et duci possit. De hac scripsit Hippocrates : ab angina habita si tumor fiat in collo bonum : foras enim morbus profertur. Quarto omnium lævissima atque tutissima censetur, quæ non interiores fauces, sed solam cervicem ejusque musculosprehendit, quorum tamen tumore interiores etiam laryngis muscoli comprimuntur introitusque, omnis coarctetur. Omnium causa est fluxio biliosa aut sanguinea; quæ e venarum jugularum ramis eo pertinctibus in has sedes influet, vel erysipelas vel phlegmonem parit. Evidentes vero causæ variæ : frigus potius quam æstus, ictus, ossa piscium imprudenter vorata, per media paristhmia trajecta, frigida potus temulentia atque quævis repletio nimia. Præter communia anginarum signa memorata. Adsunt præterea in hiis, tumor rubor, calor, atque febris, quæ omnis veræ anginæ comes est assidua. Angina vero quæ notha nuncupatur, febris est expers. Hæc autem fit cum pituitosa distillatio in fauces

cervicisque musculos decumbit; ac tum fortasse tumor inest, sed sine rubore, ardore et febre, quodcirca inter acutos morbos habenda non est. Huic ultima est ea anginae species, quae nullo quidem fit proprio faucium, affectu; sed cum cervicis vertebrae intro luxatae, fauces ac gulae gutturisque introitus premunt, et arctius coangustant. Nascitur hinc quod signorum, quae in aliis prodita sunt; nullum apparet, quodque cervix pone excavatur, aegreque et cum dolore inflectitur; casus quoque aut ictus antecessit, vel humor praeter naturam vertebrarum vincula laxavi, vel eas sua copia de proprio sede inficit.....

(*Lib. IV, cap. IX.*)

De julepo, apozemate et sirupo.

Potionum formae ad simplicem intemperiem, et ad corporis vel humorum praeparationem et ad alios plerosque usus, tres nunc praecipuae, usurpari solent, julepus, apozema et sirupus; julepum juniores Graeci julapium appellant, idque e quovis liquore stillatitio, aut succo defaecato addito mellis saccharive triplo conficiunt, coquuntque; sensim expumando dum toto fere liquore absumpto mellia consistentia fiat, nunc vero simplicior fit atque liquidior, quodque simplex sit ab apozemate. Quod liquidus a sirupo distat. Accommodatur autem is praecipue intemperiei corrigendae, leniendae siti et compescendo atque frenando humoris ardori, et malignitati frangendae. Fit proinde vel e cardiaco liquore stillatitio, vel e puro defaecatoque succo, ut limonum aut granatorum, vel e jure unius paucorumve simplicium, cui mellis saccharive quadrans permiscetur, leniterque coquitur, ac deinde clarificetur, et conditur aromate, ut citra aquae ullius vel liquoris permistionem, omnino jucunda fiat potio. Interdum etiam nulla ignis vi ex his fit quae coqui possunt, ut ex aquis stillititiis,* et succo limonum (Quae omnia saccharo ex purgatore affusa, colo denso subinde transfiguntur. Fere autem sacchari quadrans aut sextans conditur cinamomi vero unamquamque dosim scrupuli dimidium. Est et alia julepiratio cum hieme, aut in virentium herbarum penuria, quivis sirupus duplo aut interdum quadruplo stillatim alteriusve puri liquori divellitur, nullo ignis beneficio.

Apozema aequae ac julepus liquidum est, sed ex complurium

simplicium decocto compositum, quæ in multos variosque usus accommodantur; atque id fere ad tres quatuorve doses instituitur, id autem quoniam fere julepo insuavius est, raro in eisdem usus destinatur. Sed maxime in humorum attenuationem atque deteriorationem, in corporis præparationem et in reliquiarum expulsionem. Olim quidem veteres modo virentes, modo aridas herbas mulsas incoquebant, propinabantque jus colo transmissum: hieme vero carum pollinem tenuissimum mulsam inspergebant: hæcque sunt apozematis. Nunc vero decoctarum stirpium jus assumitur ea quam supra dixi ratione, in quod sacchari aut mellis aut cuius sirupi quadrans si non admodum insuave, aut triens si insuavius est; solvitur rursumque leniter et parce coquitur, aut solum calescit ut clarificetur et aromate condiatur ea dosi quam nunc in julepo dixi. Hæ quidem potiones in rem præsentem usurpari solent. Solet exigendis quoque humoribus præparatis se simplici apozemate carthaticum ex tempore fieri, incoctis scilicet in eo aut dilutis medicamentis purgantibus. Sirupus quod in herbarum penuria recundatur, asserveturque, diutius, crassuræ sit consistentia, in eos præcipue usus in quos et apozema, quamquam plerumque julepi etiam commoditatem habet.

Ex iis comparatur quæ vix hyeme suppetunt nobis, aut quæ æstate non facile sit aut promptum, cum necessitas postulat, ex variis locis tam multa congerere. Fit haud secus ac apozema e stirpium succo, vel ex earum coctarum jure, in quod adhuc tepidum pro libris ternis singula ovorum injicies, diuque scopulis agitabis dum sordes omnis spumæ adhærescat. Deinde in id ipsum mellis saccharive par pondus dissolve, et rursum eoque dum fervendo seposita que spumæ portione, sub hac detectus humor clarus appareat. Tum denuo coletur et leviter exprimatur reddaturque igni lento, dum percoctus sit in sirupi consistentiam, et in singulis libris binæ duntaxat liquoris unciae supersint. Quum tamen jus ipsum ex admixtis fructibus, ut ex prunis, ficibus, myxariis, zyziphis, aut ex quibusdam mucosis seminibus, ut althææ, cydoniorum, aut psyllii, aut ex tragacantho vel gummi arabico crassum lentumque evaserit, ut convenienter coletur, mellis saccharive minus indendum est. Accuratius is clarificatur diutius asservetur, nec putrescat facile, percoquiturque in mellis consistentiam, ac dum extracta guttula

atque refrigerata, non amplius perfluat, et diluti mellis crassitudine indurescat. Quoniam autem plus sacchari quam apozema habet, liquorisque minimum et vix sextantem retinet, ut valida integraque ejus facultas transferatur in saccharum, jus, ut supra dixi, meracius atque efficacius assumendum est. Omnium autem validissimi sunt ii sirupi, qui e defæcatis expurgatisque fructuum succis comparantur, in quo par quoque sacchari modus additur, expurgantur coquunturque ut superiores. Aut si forte succi vis coctione nimia disperditur in sacchari jam expurgati et perfecte cocti libra una succi crudi et residentia defæcati felibra sensim dissolvatur atque coquatur. Si metuitur ne hic sirupus ob succi cruditatem situm contrahat, insoletur dies aliquot. Hi enim si vel blando igne, vel diplomate lente ac sensim coquantur, tota et integra succi vis transferetur in saccharum : ex melle confectus sirupus quia diutius asservatur, minus neque ad consistentiam coquendus est, is quoque magis incidit ac detergit. Ex saccharo autem suavior, sed non æque efficax : percoquendus is est at fere tandem candesit, quod tamen vitium præcavetur, si mellis quadrans permisceatur saccharo. Harum compositionum formulas hic nullas descripsimus, quod multæ post hac omnisque generis passim occurrant.

(*Meth. med., lib. III, cap. XII.*)

HOUILIER

Angina.

Angina inflammatio est faucium aut musculorum qui ad fines asperæ arteriæ siti sunt; nonnunquam etiam exteriorum cervicis. Desperatio est, cum nunquam apparet et cum gravissimus dolor et febris, et cum os hiat, lingua exerta est, intercepta degliutendi via, et potus per nares refluit, aut si ad initia cervicis cavitas est introadducta vertebra. Hæc ut minuuntur ita levior morbus est. Oportet ergo statim initio collocare ægros loco satis amplo, nec frigido; ita residere in lecto; caput altius attolitur. Liquidiora sint alimenta; parcissime vivant quantum vires tolerare possint, abstineant iis omnibus, quæ fluxiones incitant, quale vinum, vaporosa et calida fere omnia. Vitent etiam glutinosa, quæ cum etiam non detergeant, vias jam oppressas angustia intercipiunt. Primis diebus, atque adeo initio morbi sanguis detrahendus est, adhibito prius hoc consilio. Mulieribus tum gravidis, tum quibus menses supprimuntur, angina fit aliquando. In gravida sanguinem detrahes sine ullo metu ad tres, quatuorve uncias, plus minusve, ut scopi phlebotomiæ indicabunt; minus si foetus major est, ut post septimum mensem, quod si mulieri gravidæ etiam tum menses fluunt, multo liberius sanguinem e cubito detrahes. Hic enim et ab angina matri, et ab abortione foetui periculum est. In iis vero, quæ uterum non gerunt, et menses supprimantur, venam e crure vulnerabis, copiosiusque detrahes. Tunc ad brachii venas quæ morbo conveniunt, phlebotomiam transferes. Hoc consilium multis aliis morbis, quibus corripuntur mulieres, commune est. In aliis, si quidem manifesta signa plenitudinis appareant, e saphena; si mediocria, e media cubiti. Alio qui e cephalica sanguinem detrahes mediocri vulnere, ne si amplius, nimium viribus detrahatur. Si angustius, effluat tenuis sanguis, crassus relinquatur. Hyeme, ubi sanguis fere phlegmaticus, parcior detractio, sed foramen majus esse debet. Vere et reliquis tem-

poribus copiosior, vulnusque angustius imprimatur. Cucurbitulæ *ex lib. de cucurb.* collocentur.

Mollis alvus esto levibus clysteribus, multo magis si febris est. In quibus interim dissolves cassiæ fistulæ $\frac{3}{4}$ j. vel B. cathol., vel hieræ 17 picræ. Hujus hieræ summa vis probatæ. Nam cum angina multos Romæ suffocaret, eaque veluti pesti tota urbe grassaretur, inventum remedium a medicis, ut post frugalem cænam $\frac{3}{4}$ ij pul. 18, hieræ in pilulas coactos exhiberunt.

Quo auxilio quicunque usi sunt, periculum declinarunt tam atrocis morbi.

Paulus 19, omissa phlebotomia acrioribus clysteribus utitur dissolutis $\frac{3}{4}$ iij hieræ diacolocynthidos. Sed quod ante dictum est, priusquam injiciamus clysteres acriores, levioribus uti oportet qui inveteratum stercus emolliant et detrahant.

Purgationes quoque leves ex cassia, vel manna $\frac{3}{4}$ j aut eo plus in 21 decocto passularum, hordei, florum cordialium, tamarindorum, sebestim, prunorum.

Suspectum pharmacum, quod Asclepiades imperavit ex aloë et colocynth. tum quia in 22 pilulas conformat, tum quia fortius est.

Dissoluta enim liquoribus, non coacta in pilulas, pharmaca magis conveniunt, propter difficultatem deglutiendi.

Atque dum hæc fiunt, gargarismis utendum est, initio quidem repellentibus : deinde admixta vi detergente, resolvente : post etiam, si fuerit opus, maturantibus.

Atque ubi dolor gravior est, et sentitur exulceratio, levientibus, quorum materiam et compositionem repetes. Recentiores medici iisdem etiam utuntur, vel his.

\mathcal{R} decoctionis rosarum sicc. $\frac{3}{4}$ iij cum diamor. $\frac{3}{4}$ ij. Ex sorbis, cornis, moris rubi, aut alioqui immaturis, e granatis acidis poterit exprimi succus, et quarto parte sacchari, aut mellis rosati dulcorati dianucum et diamoron initio dissolvantur in duplo liquore astringente, quales sunt supradicti succi. Decoctum rosarum plantaginis, sorborum, cornorum, mespilorum et similium adstringentium, vel in aquis inde distillatis. Conservæ sunt cornorum sorborum, mespilorum, mororum immaturorum, quarum uncia in duplo liquore adstringente dissoluto.

reprimentem 23, gargarismum efficit. Et hic quoque laudatus reprimendo et leniendo.

℞ 24 succi expressi e cassia fistul. ℥ iij decocti rosarum aut aquæ plantaginis ℥ iij, vel decocti sebesten iij aquæ e sorbis, cornis, aut mespilis distillatæ ℥ iij misce pro gargarismo.

Ut augetur morbus, ita repellentium (25), modus minuendus et augendus resolutivum. Itaque plus mellis admiscemus : utinurque hydromelite, plus minusve diluto in quo rosæ (26) præbullierint, sirupo rosato sirupo etiam de papavere, ubi fluxio tenuior est. Ubi his remediis nihil proficimus, venæ sub lingua incidendæ sunt. Alii ex Archigene et Asclepiade venam frontis, et quæ ad angulum oculi pertinet Hippocrates, lib. 3 de morbis venam quæ sub mammis est; Nonnullis venas cervicis.

Verum tutius est post universalem vacuationem perseverante malo cucurbitulas cum scarificatione ad initia cervicis ad figere uti. Postea venas sub lingua vel phlebotomo aperire, vel cultello scarificare.

Sanguisugæ iisdem locis, quibus cucurbitulæ affixi possunt : quæ ubi detractæ fuerint, cucurbitulæ inducuntur perpetuo habita virium ratione.

De cinere hirundinum, humano stercore, canino, et aliisque melli mixtæ, aut aliter præparata anginæ conveniunt. (lege postremos lib. Gal. de simplicibus ut de asellis et aliis remediis commentarios secundum locos.)

Lenies dolorem et asperitatem gutturis aqua, in quo mica panis albissimi coxerit. Aut (27), panis ita coctus vehementer exprimatur : colluatur succus eodem modo e furfurum tritici pinguium cremore. Lac etiam per se, muscillago semin. cydoniorum, lini, althææ, aut hic Sorani efficacissimus gargarismus.

℞ glycyrrhizæ recenter rasæ et conquassatæ ℥ iij melli rosati ℥ j aquæ fontanæ coquantur omnia ad crassitudinem, et colatura fiat gargarismus.

Penidia quoque in lacte dissoluta, Ptisanæ succus, hordeatum, lac amygdalarum dulcium similiter collatus, maturant.

℞ ficuum pinguium ℥ iij hyssopi P j. fiat decoctio ad dimidias, colatura colluatur.

..... Quod si his artibus nihil proficimus, utimur (31) auxilio Asclepiadis. Utendum est tum etiam omnibus fere medicamentis.

Hiante ore lingua deprimatur : culter ligneus acutus indatur in guttur, ut tumor dirumpatur. Tum prono capite sanie repurgetur. Ubi in faucibus manifestus tumor est, vellicandus est unguibus, aut ferro aperiendus.

Alii (32) : Spongiæ partem ad magnitudinem avellanæ suspendunt e filo, et ita ab ægro devorari jubent, intumescit spongia, atque dum vi retrahitur, tumorem rumpit. Hoc alii : bole carnis salsæ semicoctæ ita suspenso et devorato, tum vi retracto moliuntur. Alioqui scarificandus locus est sub maxillis, sub mento, in collo, vitatis semper nervis et arteriis. Sic enim aliquando sanies effluit. Alioqui cucurbitulæ scarificatis locis apponendæ sunt.

E nido hyrundinis in aqua decocto, aut oleo communi, vel chamæmelino emplastrum faciunt, quod inducunt collo. Alii e stercore humano recenti. Quidam, quod tolerabilius est, e lana succida insuccata in oleo communis, oleo liliorum, chamæmeli, aut simili quorum consilium est, ut foras materiam evocent.

(De morbis internis, liber I, cap. XXII.)

PROSPER ALPINUS

Morbi faucium.


Oris partem, quæ gurgulio et uva et columella dicitur, sæpius inflammari et vehementer quidem inflammari, non est medicus qui non observaverit; non minus etiam eas glandulas quas Græci Antiadas et Latini tonsillas vocaverunt, phlegmonē frequenter ob ipsarum calidam humidamque naturam vexari, omnibus itidem notum esse non ignoramus. In qua nonnunquam tunica, nonnunquam subjecti musculi patiuntur. Uvæ vero seu collumellæ phlegmon, si quis aperto ore linguam comprimat, statim aperte ex tumore, rubore, dolore deglutiendique difficultate, cuique notum est. Antiadarum vero phlegmonem iis signisprehendemus : scilicet rubore itidem, tumoreque exterius apparente, seu duricie juxta ipsas cum dolore, quæ aperte innotescunt, si digitis pars comprimitur. Adest quinetiam transglutiendi difficultas, et si malum ad gutturis partes propius accesserit, etiam respirandi difficultas, hanc inflammationem effatu dignam sequitur febris quæ in inflammata uva non apparet, vel lævis quidem. Uterque affectus cum morbus adstrictus sit, laxatoriis utendum mox erit, et etiam esse laxatoriis ubi affectus sit, quo tempore humor majori ex parte ad partem inflammatam defluxit. In principio vero, quo tempore humor fluit, non laxatoriis (quod nondum factus sit morbus adstrictus) sed adstrictoriis erit opus. Quamobrem tali tempore convenient per os gargarismata adstringentia, ut fluxionem prohibeant seu repellant. Hujus modi autem medicamenta erunt, aquæ stillatitiæ rosarum, plantaginis, lenticulæ palustris, polygoni, rubi, et similium, vel decocta in aqua parata ex prædictis herbis, cui decocto poterit permiscere sirupus aliquis adstrictoriæ facultatis; cujusmodi erit, qui ex succo mororum paratur, ex rosis siccis, ex granatis, atque ex myrto; aqua itaque convenient pro gargarismate hujusmodi, quæ (exempli gratia) accipiet, aquæ plantaginis libram, sirupi e succo moro-

rum (diamoronis vocati) uncias duas; at post principium erunt necessaria gargarismata laxatoria quæ erunt ex decocto malvarum, violarum, althææ, fenugræci, caricarum pinguium hordei, cum sirupo vel de glyziriza, vel violato, vel hydromele, vesimilibus; exterius vero convenient in unctiones calidæ ex oleis dulcibus laxatoriis, cujusmodi est commune dulcissimum, amygdalinum itidem dulce, lininum, irinum, et ex radice cucumeris sylvestris, vel althææ paratum, fomenta itidem ex decocto althææ, meliloti, fenugræci seminis lini, spongia excepta et calida gulæ et externis partibus apposita; hæc vero singula prædicta medicamenta non prius admovebuntur, quam præmisso clystere mollitorio fuerit (ita requirente phlegmonis magnitudine) sanguis evacuatus primo, aut secta vena interna dextri cubiti, aut scarificatis cruribus, et mox sectis venis sub lingua positis, scilicet morbo adhuc minime cedente. Principio convenient frictiones extremorum ad humorem revellendum; balnea ad pedes calida, in quibus bis in die ante cibum pedes immerguntur, quoadque plurimum rubeant, detineantur. Demum lenes frictiones fient, ex oleo calido dulci, ad omnes corporis partes, ut fuliginosorum excrementorum evacuatio per poros cutis addiretur. Victus iis congruet tenuis, boni succi, modicus (cum plenus, et crassus tumentiam in corpore angeat); a vino etiam abstinebunt, cujus loco bibent ægroti, aquam hordei cum saccharo vel mulsam dilutionem:

(*Medicina dogmatica, cap. IX.*)

De medicamentis ad gutturis phlegmonem, quam anginam vocant.

Phlegmonem gutturis fauciumque musculorum cum externorum tum internorum Græci synanchen a suffocatione, quam inducit, appellarunt Latini vero anginam. Juxta vero varias faucium, gutturisque læsas partes, variis nominibus Græci hunc affectum nominarunt, siquidem inflammatis gutturis musculis internis, συνάγχην et externis πασάσυναγχην dixerunt, et faucium musculis itidem internis affectis συνάγχην, et πασάσυναγχην externis. Compluribus cynanchen, a canibus, lycan-



then a lupis, atque a suis (qui et ipsi hoc malo vexati soleant) hyanchen, hunc affectum vocatum fuisse visum est : cum vero angina omnis (ea excepta, quæ cervicis vertebriis, auctore Galeno, introversis luxatisque, atque gutturis, fauciumque musculis vehementer siccatis fit) gutturis aut faucium musculi inflammati suboriantur; necessario in ipsa hæc signa elucebunt, scilicet omnibus anginosi cum spirandi, tum deglutiendi difficultas aderit; respirandi difficultas major observabitur, gutturis musculis plus phlegmone vexatis, et deglutiendi major erit itidem difficultas gulæ musculis plus laborantibus. Itaque primo ab hoc affectu homines in spirandi et deglutiendi difficultatem incidunt, cum gutturis vel faucium dolore atque febre verumenimvero synanche absque dolore quoque non raro fit a defluxu humoris pituitosi; in quam causam Asclepiades hunc affectum retulisse (cum ipse anginam rheumatismum esse voluerit) visus fuit. In omnibus fit deglutiendi difficultas, maximo in gula inflammata et minor (uti dictum quoque est) si guttur phlegmone vexetur. Quo fortasse non injuria *Soranus* definiendo hunc affectum, dixit : esse difficultatem transvorandi cum acuta præfocatione, atque febre. Dividunt aliqui hanc phlegmonem in occultam, atque in apparentem. In hac depressa lingua apparet tumor et rubor, vel circa externas gutturis partes, in collo, sub mento, vel in cervice, aut pectore atque hæc minoris est periculi. In occulto nusquam exterius, neque in oris partibus, neque in collo vel in alia parte tumor, et inflammatio conspicitur, atque hæc est summe exitialis. Alii triplicem faciunt, primam in faucibus, quæ non est periculosa, in qua lingua depressa tumor apparet magnus, rubens in faucibus, istique difficulter deglutiunt, difficulter respirant, atque difficulter itidem loquuntur; absque febre, ni vehemens fuerit inflammatio. Altera in gula fit, quæ est periculosa ni cito præsidia adhibeantur, in eaque tumor in gula et in collo observatur, vix loquuntur; et summa cum difficultate, si vehemens fit, respirant, cervicem torquere nequeunt. Tertia in gutture, quæ vel summas ipsius partes occupat, vel internos, quippe trachæe arteriæ musculos. Hæc vero synanche dicta est, quasi suffocatio, quod in hoc affectu suffocatio sit præcipua, veluti illius, quæ in gula est, transvorandi difficultas. In hac ipsa anginæ specie ægrotantes suffocantur, respiratio idcirco

difficillima est, unde recta cervice spirant, atque ingravescente morbo supini jacent; cibus etiam liquidus guttur non pertransit, per nares effluit, pulsus est parvus, extremaque frigida. Quorum aliqui spatio horarum viginti quatuor suffocantur; alii tertio die intereunt. Hæc summe exitialis esse creditur; minore vero cum periculo est, ubi vel in faucibus vel in collo, rubor et tumor erumpit, perseverat, atque augetur. Porro non perpetuo rubor atque tumor in faucibus, et in collo apparens salutem significat, aliquando enim æque internas atque externas gutturis partes vehemens phlegmon occupat. Quo merita Hippoc. de angina, qua interiit ait: Tertio, rigor, febris acuta, tumor colli et pectoris ex utraque parte subruber, durus, extrema frigida et livida, spiritus sublimis, potus per nares effluebat, devorare non volebat. At exitialis non erit, si tumores externi, et perstiterint, et plurimum aucti fuerint de qua Hippoc. ait: Angina corrupta si tumor appareat in collo, bonum, foras enim morbus existit. Siquidem ex profundis, et principalibus partibus morbos ad cutem transferri utile est. Ab hujusmodi anginae specie anno a Virginis partu MDCV, nos fuimus magno cum vitæ discrimine vexati, in hoc tumor sub mento tertia die exiens, dein plurimum auctus, quoad morbum resolvit, perseverans, me servavit. Perpetuo summe exitialis est, ubi cum difficillima respiratione deglutitioneque ægroti, nullum externum tumorem habeat; de qua Hippocrates dixit: angina gravissima est, ac celerrime interimit, quæcunque nec in cervice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit. Hunc morbum *strictum* (ex tumore aut faucium aut gutturis in musculis *adstrictionem* faciente) *methodici* fecerunt. Quem concitare ex causis procatacticis posse vomitum laboriosum, ebrietatem) vehementem exclamationem, nivis potationem, cibos acriores, violentam per elleborum album purgationem et quæcunque alia quæ fluxionem, et rheumatismum movere possunt, tradiderunt. Quando angina omnis fiat ab humorum fluxu, aut calidorum tenuiumque venas vel etiam subtiles obstruentium, aut crassarum, scilicet pituitosorum atque melancholicorum, quarum fluxio solet fauces atque spatia ampla occupare. In hoc morbo, qualiscunque sit, opportuna erunt præsidia omnia laxantia, inter quæ primum, locum habebit phlebotomia; primum enim præmisso

clystere laxatorio, secta vena interna cubiti, sanguis copiosior, permittente virium robore evacuabitur.

..... Qua facta sanguinis vacuatione, eaque corpore laxato, ni morbus cessarit, Hippocrates consulit, ut sectis venis duabus sub lingua positis missio sanguinis repetatur. In me eo morbo vexato primum secui venam internam dextri cubiti, ex eaque sanguinis libram detraxi, et mox cucurbitulis sex adhibitisspatulis atque lumbis cum scarificatione iterum sanguis detractus est, qua evacuatione minime diminuto phlegmone, demum sectis venis sub lingua positis ambabus sanguis etiam ad libram fere eductus est, quo præsidio morbus ita diminutus est, ut in securum statum salutis fuerim (Deo optimo maximo laudato) restitutus. Aurelianus, si vehemens passio sit, cito ob celerissimum laxamentum, phlebotomiam fieri voluit; laudavit non minus cucurbitulas collo, gutturi, atque cervici cum scarificatione adhibitas. Non minus etiam utilem esse voluit scarificationem linguæ, faucium, atque palati, quoniam, ut ille ait, locali sanguinis detractio tumentia relaxantur, ex quo non recte ipsum venarum sub lingua positarum sectionem tantopere ab Hippocrate commendatam damnavisse nobis liquido constabit incipiente statim phlegmone, seu (rectius ut dicam) fluxione ad faucium vel ad gutturis partes, adstringentium, repellentiumque usu erit opus. Unde gargarismata ex aquis adstringentibus vel decoctis ex medicamentis adstrictoriis paratis, erunt utilissima, utpote, quod partes roborent, quo minus humoris fluxum recipiant, ab iisque partibus affectis ipsum humorem repellant. Quæ ex medicamentis adstringant, alias abunde ostendimus (exempli gratia) hujusmodi gargarisma erit opportunum, quod recipiet aquæ plantaginis vel polygoni, vel solatri, vel portulacæ, vel rosarum, aut similium libram sirupi diamorronis uncias duas. Vel quod accipit decocti foliorum plantaginis, portulacæ, cymarum rubi libram, sirupi myrtini, de rosis siccis singulorum unciam, aut sacchari rosati unciam et semii. Itaque fluxione incipiente, quo tempore nondum est perfecto phlegmone, adstringentium usus erit ad internas faucium gutturisque partes convenientissimus. Vel decocta sint, vel aquæ stillatitiæ, vel succi ex medicamentis adstringentibus expressi : cujusmodi erunt : plantago, rosa damascena, polygonon, rubus, equi-

setum, myrti cum folia tum fructus, cichoreum, solanum, aizoon, balaustium, hypocistis, acacia et similia. Sed dices quamobrem in phlegmone, *quæ morbus est adstrictus* usus *adstringentium* erit utilis? Nos alias ex methodicorum placitis utile esse ostendimus, ut in phlegmonum principiis adstringentia, minimeque laxantia convenient, eaque præsertim ratione, quod in principio, scilicet fluente humore nondum factus sit phlegmon, qui est morbus adstrictus, at in perfecto phlegmone premissa sanguinis vacuatione laxantia solummodo convenient cum interius tum exterius. In principio vero per interius gargarismata mediocriter adstringentia, repellentiaque utilem usum habebunt. Non tamen per exterius adhibenda erunt adstringentia, quod cum magno errore nonnulli hujus temporis medici facere observantur, perpetuo in externis partibus laxantia convenient; adstringentia enim humorem compellendo intus internum phlegmonem adaugebunt. Unde gargarismata convenient ex decocto hordei, althææ, fenugræci, lini, passularum et similium cum saccharo candido, vel sirupo de liquiritia, vel melle rosaceo simplicis infusionis, prædicta autem medicamenta in aqua parum ebullient, ut decoctum viscidum non reddatur, tepidumque adhibeatur. Aurelianus parabat hoc decoctum ex mulso, quo pro gargarismate utebatur. Exterius gulæ partibus convenient calidæ inunctiones ex dulci oleo, cujusmodi est amygdalinum recens, irinum, lilianum, colloque et gutturi spongia vel ex aqua calida et oleo dulci, vel ex decocto althææ, seminum lini, fenugræci et similium fomenti modo adhibebuntur; in principio plurimi adjuventi erunt pedum lotiones ex aqua calida quoad pedes rubescant, frictionesque partium extremarum ac post principium præmissa vacuatione sanguinis ad totum corpus leves frictiones, et inunctiones calidæ ad universum corporis habitum laxandum convenient. Clysteres item laxativi utiles, erunt ex decoctis herbarum laxatoriarum (cujusmodi est malva, althea, mercurialis, fenugrecum, et linum, et beta) et ex oleo dulci, atque melle, vel ex saccharo, aut melle aut rosaceo parati. Victus tenuis, liquidus, temperate calidus, atque humidus conveniet, a vino abstinendum omnino, cujus loco aqua hordeata cum saccharo erit accomodata.

(*Medicinæ dogmaticæ, cap. X.*)

MASSARIA

De angina.

Antequam descenderemus ad morbos faucium et thoracis, operæ pretium fuisset, tractare de morbis linguæ, quæ, ut scitis duos præcipue in corpore usus obtinet : alterum ad *sermonem*, alterum ad *gustum*. Qui sane morbi sunt plurimi, in intemperie et simplici et composita, et cum materia, et sine materia; in conformatione et in soluta unitate. Sed cum multi morbi longe maximi momenti adhuc restent, neque liceat per angustiam temporis omnia persequi, venio ad anginam, de qua pro nostro instituto ordine agemus. Nomen anginæ dupliciter accipitur (ut notat Galenus 4 de locis affectis 3, uno modo apud Hippocratem, qui hoc nomine consuevit appellare omnia mala, quæcumque vel in faucibus et gutture, vel in cervice, quomodocunque accendant, et spirandi difficultatem inducant. Altera magis proprie definitur a Galeno, de loc. affect. 6, 4, aphorism. 34, quod sit inflammatio internarum partium gutturis, viam spiritus intercludens, ut propterea suffocationi proportionem respondeat. In qua quidem veluti communi notione omnes homines videntur convenire. Barbari (auctores medii ævi?) squinantiam appellant.

Differentiæ sunt plurimæ, ac primum a loco affecto in quo fluxio consistit; ex quo fonte Galenus 4 de loc. affect. 3 quatuor anginæ differentias constituit. Prima est, ubi fauces inflammatione laborant. Fauces autem intelligimus, sicuti ipse Galenus interpretatur, partem oris internam, ad quam et gutturis et gulæ extrema contingunt. Altera est ubi cæteræ oris partes, neque fauces, neque etiam ulla externarum partium apparet inflammatione laborare, tamen æger in gutture suffocationis sensum percipit. Tertia differentia est quando externa faucium sedes inflammatione laborat. Quarta ubi partes gutturis externæ una cum internis affectæ sunt.

Hujusmodi autem differentias nonnulli medici recentiores variis quoque nominibus voluerunt distinguere, qui primam

synanchem, alteram cynanchem, tertia parasynanchem, quarta paracynanchem soliti sunt appellare, ut notat Galenus in 4 aphorism. 34; quam tamen inquisitionem nominum veluti supersticiosam et supervacaneam, reprehendit Galenus 4 de ratione victus 30, 3, prog. 18, 4 de locis affect. 3, qui, inquit, hoc nimis curiosum nominum studium rerum ipsarum negligentiam et contemptum peperisse, sicuti iis evenit qui circa nomina nimium occupati, quæ utilia sunt, prætermiserunt. Itaque modo rem ipsam intelligamus, de nominibus parum est laborandum.

Coeterum Galenus præter has quatuor differentias ex Hippocrate quintam commemorat, quæ contingit, ubi vertebræ cervicis ad interiora distorquentur, de qua specie anginæ Paulus (Ægineta) quoque et Aetius mentionem faciunt, atque illius signa ponunt. Sed ut idem scribit Galenus 1 pro. com. 2 postremis vertebris, cum huiusmodi affectio raro admodum contingat, neque sine inflammatione musculorum gutturis fieri possit, hinc fit, ut talis differentia minus proprie accipienda sit, et commode ad priores differentias possit referri.

Secunda est differentia anginæ *ex natura humoris noxii*, et fluxionis, quæ potest esse duplex: altera ex glutinosa et frigida materia, quam pituitosam licet appellare, altera ex calida et acri materia quam si biliosam appelles, inquit Galenus, non peccabis. De quibus humoribus, diffuse tractat Galenus 3, aphor. 22, 4, de ratione 40.

Et si quis quærat, an angina ex utroque humore, tam calido sanguine et flava bile, quam frigida pituita et melancholia fieri possit, responde, etsi Galenus videtur solius flavæ bilis et pituitæ mentionem facere, tamen nihil prohibet, mea sententia, quin illa quoque ex utroque humore, calido et frigido fieri possit. Ac sane de sanguine, flava bile et pituita nullum dubium esse debet. Sed Arabes dubitant de melancholia, cujus nullus Græcorum videtur meminisse. Avicenna inquit id raro contingere, sed tamen fatetur anginam ex melancholia quoque fieri aliquando posse. Itaque habendum est, anginam quidem ex fluxione cujusunque humoris fieri posse; eam tamen, ut scribit Galenus 3, aphor. 18, magna ex parte biliosam esse, adeo ut erysipelas aut inflammationem erysipelati similem committat. Aliquando etiam sanguinea est et pituitosa, rarissime autem melancholica, quan-

quam forte id verius possit affirmari, frequentius contingere, ut hujusmodi fluxio ex variis humoribus vel omnibus inter se mixtis, constet, quæ quidem mixtionis ratio non solum ad humores, sed etiam ad superiorem differentiam ex loco desumptam, debet accomodari ; siquidem nulli dubium esse debet, quin sicuti varii humores inter se miscentur, illi pariter varias quoque partes faucium et gutturis possint occupare.

Tertia est differentia anginae a *magnitudine* : alia levis, et illa est, quæ vulgo dicitur *licagioni* ; alia gravissima, in qua inflammatio est insignis, et maximum imminet periculum inflammationis ; media medio modo se habet.

Quarto sunt differentiae a *tempore* : principio, augmento, statu, declinatione ; quæ varia tempora sunt maxime animadvertenda, cum variam curandi rationem et præsidia requirant.

Quinto sunt differentiae a modo *generationis* : namque angina alia succedit nonnullis morbis, veluti distillationi, pleuritidi, peripneumoniam et similibus. Alia primo et sine aliis præcedentibus morbis generatur, quod præcipue ac majore ex parte transmissa materia ex capite fieri consurit, sicuti aparte et diffuse demonstrant Hippocrates et Galenus 4 de ratione victus et pluribus sequentibus.

Postremo sunt differentiae a *conjunctis*, quæ possunt esse res omnes naturales, non naturales et præter naturam. Sed inter cætera, angina aut est cum febre, aut sine febre. Neque aliquis miretur dari anginam sine febre ; siquidem, ut Galenus docet, 2 de diff. rer. 2 de constitutione artis med. 15, ad hoc *ut febris fiat*, duo necessario requiruntur ; unum, ut læsa pars sit *prope cor* ; alterum, ut morbus pendeat ex *materia calidiore*. Quorum si alterum desit, inquit Galenus, tunc non ex necessitate febris consequitur. Itaque si angina pendeat ex humore frigidiore, tunc nulla febris potest excitari. Et inter cæteros Cælius Aurelianus lib. 3 de morbis acutis cap. incipiens tractare de angina, hæc habet : « Hactenus expositis morbis acutis cum febre, nunc de iis tractabimus qui sine febre esse noscuntur. »

Sed veniamus ad *signa*, quæ quidem a Paulo, Avicenna et reliquis, plurima afferuntur, et sunt hujusmodi : difficilis respiratio, difficilis alimentorum et potionum deglutitio, ut pocula quandoque per nares resiliant, dolor acutus, tumor, rubor,

calor, febris, frigidi aeris cupida attractio; quorum omnium signorum facile est cuique rationem reddere. Sed Galenus 5 de locis affectis 3, unum tantummodo proprium, perpetuum et inseparabile signum videtur posuisse: nempe *difficultatem respirationis*, nihil laborante thorace, vel pulmone; quoniam cœtera omnia signa non sint perpetua, sed modo unum, modo, alterum, modo omnia desint.

Signa differentiarum, sicuti etiam signa pathogmonica sunt satis incerta. Utrum inflammatio internas vel externas, hanc vel illam partem faucium occupet, potest intelligi ex tumore, dolore, calore, sed potissimum ex periculo suffocationis; namque si laborant partes externæ, aliquis tumor, aliquis dolor item calor et calor mutatus apparebit, neque tantum urgebit periculum suffocationis. Contra si laborent partes internæ, extra nihil apparebit, ægerque omnino majore suffocationis periculo premetur. De signis redundantiae singulorum humorum jam sæpe diximus. Signa magnitudinis vel parvitatibus sumuntur ex symptomatibus de quibus in prognostico. Signa ex tempore, ex symptomatibus desumuntur, et præcipue ex iis, quæ expuuntur. Siquidem in principio æger aut nihil, aut parum expuit, idque crudum et aquosum; in augmento copiosius et crassius, in statu et declinatione concocta solent expui. Signa demum ex modo generationis et a conjunctis, sunt manifestissima. Itaque venio ad curationem.

Cum angina sit morbus ex fluxione humorum, quatuor communes illæ indicationes nobis sese offerunt; vacuatio universi corporis, repulsio, revulsio, resolutio, quibus postremo, quoniam aliquando inflammatio devenit ad suppurationem, et illa addenda est, quæ ad puris purgationem pertinet.

Sed statim occurrit *dubitatio*, utrum *repellentia* in angina *conveniant*, nec ne. Siquidem noxia materia, non nisi ad partes principales videtur posse repelli, quales sunt pulmones et cor, et alias diximus de sententia Galeni, 6 de medendi secundum locos, initio fluxionem repellendam esse, præterquam si humores ad partem aliquam principem sint recursuri, et aliud majus periculum possint afferte. Unde etiam est aphorism. Hippocratis 10 lib. 4: « Quicumque ab angina liberantur, iis ad pulmonem vertitur, et in septem diebus pereunt. » Itaque repellentia non

videntur convenire. Altera autem ex parte nemo est qui nesciat, et Galenum et omnes rationales medicos in angina repellentibus uti medicamentis. Imo vero Galenus non solum principio, sed etiam post principium, et usque ad finem docet, nullo modo a repellentibus esse abstinendum; ad hanc difficultatem nonnulli respondent, majus periculum imminere ex præsenti morbo, et ex periculo suffocationis, quam ex repulsione materiæ. Sed forte hæc responsio non est generaliter vera, *neque satis difficultatem dissolvit...* Sed secundam doctrinam Galeni et Hippocratis non solum ad anginam sed etiam generaliter ad omnes morbos accomodat, qui scribit 6 aphor. 25, quemlibet affectum ex profundis et principibus partibus ad *cutem* traduci, et bonum signum, et bonam causam existimandum esse. Contra malum si ad internas et principes partes transferri, malum.

Sed præterea alia quoque symptomata anginæ salubritatem, vel perniciem demonstrant, et inter cætera duo sunt quæ anginam plane lethalem esse significant. Unum est si vehementissima fuerit febris, alterum est debilitas virium (Gal. 4, aphor. 34 et 10 method. medendi 5) de qua item scribit Galenus in pleuritide, in peripneumonia, in angina et in omnibus internis inflammationibus unicam salutis spem superesse *in robore virium.....*

(*Praxis medica, cap. XXXIX.*)

MERCURIALI

De angina.

Distillationem capitis solet quoque consequi ille affectus, qui noncupatur a Latinis angina, a barbaris squinantia. Et quoniam hæc res apud Græcos satis implicita et obscura est, breviter docebo nomina Græcorum, quibus appellant hujusmodi ægritudinem. Nam, ut scribit Trall. c. de angina et Aretæus lib. I, acut cap. 7. Græci solent communi nomine omnem speciem anginæ vocare synanchen.

Cæteri qui proprie et distincte loquuntur, alias appellationes faciunt. Nam aut hic morbus fit in larynge, aut in faucibus. Qui in larynge, aut efficitur in musculis internis, aut externis. Si nascitur in internis, proprie appellatur συναγχη aut λυπαγχη, vel quia canes et lupi frequenter tentantur hoc morbo, vel quia ægri sub hoc tormento exserunt linguam perinde sicut canes et lupi. Si oriatur in externis secundum Avic. et Paulum Ægin. vocatur παρασυναγχη.

Dixi secundum Paulum et Avic. quia Cæl. Aurel. sic scribunt quoties altera tantum pars *laryngis* afficitur. Si hæc affectio fit in *faucibus* aut fit in partibus internis, aut externis, vocatur συναγχη, eo quod sues creberrime hujusmodi ægritudine laborant. Unde apud Plautum in Trinummo, nescio quis dicebat sues angina interire acerrime; sint in externis, vocatur παρασυναγχη. Atque hoc pacto potestis versari in intelligendis medicis Græcis. Nam definiebat Praxag: nil esse aliud, quam præfocationem vehementem ex tumore, sive tumorem faucium et laryngis vehementer præfocantem. Veritas autem est secundum Gal. et omnes Græcos, proprie hunc morbum nil aliud esse, nisi inflammationem vel faucium, vel laryngis. Ex quo facile potest unusquisque comprehendere, quis sit proprie locus affectus in hac ægritudine, nec non etiam quis affectus sit, quandoquidem cum, ut intellexistis, sit inflammatio,

necessario sequitur, ut sit morbus in magnitudine auctus in mala intemperie. Adeo etiam morbum esse in via. Et ratio est, quia respiratio in hac ægritudine impeditur, et læditur immediate ab angustia viarum spiritalium, quæ angustia plane morbus est in via.

Fit autem hic morbus ab humoribus, qui vel colliguntur paulatim in ipsa parte quæ afficitur, vel a capite in eas partes mittuntur. Sunt autem humores qui faciunt hanc inflammationem vel acres et biliosi, vel sanguinei, vel pituitosi; sed utrum melancholici succi faciant quoque hanc ægritudinem, dubitatum inveni. Nam Constantinus Africanus medicus olim celeberrimus manifestissime negavit anginam fieri posse ab humore melancholico, impulsus hac potissimum ratione, quod humor melancholicus sua natura sit tardus, frigidus, et pene immobilis; angina vero sit morbus acutissimus, calidissimusque, et propterea minime morbus acutus et calidus videatur fieri posse ab humore tardo et frigido.

Constantinum videtur favisse Galen. qui, ubi loquitur de causis anginæ, ferme nunquam meminisse videtur alterius humoris, quam biliosi, sanguinei et pituitosi. Avic. 9, tertii cap. de angina contra dixit anginam quoque fieri ab humore melancholico, sed quam rarissime. Pro resolutionem dico, anginam vel fieri in larynge, vel in faucibus. In larynge nunquam fieri potest ab humore melancholico, sed tantum ab humore bilioso et sanguine, quia in hac parte vasa sunt tam angusta, ut non sint capacia humoris crassi et lenti, cujusmodi est humor melancholicus. Si autem loquamur de ea, quæ fit in faucibus, dico hanc fieri posse etiam ab humore melancholico, quia ubi vasa sunt ampliora, ut recipere possint humorem melancholicum. Quod scribit Constantinus Africanus, humorem melancholicum non posse morbum acutum producere, verum quidem est aliqua ex parte, sed minime ex toto verum est, eo, quia tamen si ratione sit hic humor faciat morbos longos, attamen ratione loci facit morbos acutos et perniciosos.

Igitur hoc verissimum est, anginam fieri frequentissime ab humoribus calidis et acris, quemadmodum testatum habetis 4. de C. P. cap. 20. 4 de acut. f. 3 et 3 aph 16. Rarius fit angina a sanguine, rarissime a pura pituita. Imo vero, quæ efficitur a

pituita potius spuria est angina, quam vera. Dico a pura pituita, quoniam a sanguine pituitoso certe fit frequentius.

Causæ mediatae, sed internæ, sunt sexus, de quo sermonem habet Cæl. Aurel. qui scripsit frequentius viros exerceri angina, quam mulieres; et inter viros frequentius tentantur juvenes quam pueri et senes! Habitus corporis autem has causas connumerandus est. Nam, qui habent caput magnum, collum breve, caput et corpus plenum sanguine, faciliter et frequenter tentantur angina.

Ex causis præternaturalibus est violentus vomitus, a quo exacerbatae fauces facile inflammantur; hæmorrhoides retentæ; menstrua retenta. Hipp. 2. epid. 2. et Galen. 3. de loc. aff. 3. scribit luxari quandoque vertebrae superiores intro, et ex hac luxatione fieri anginam. Causæ externæ complures quoque sunt inter quas primum locum obtinet aër calidus et humidus, frigidus et humidus.

Scribit enim Hipp. 3. aph. 16. ubi fiunt imbres frequenter grassari anginas. Sic in *regionibus humidis* grassantur hi morbi. Potissimum autem fiunt vere et autumnus, ut est apud Hippoc. 3. aph. 20 et 22. Refrigeratio capitis, exercitatio, quæ fit capite ad terram inclinato, clamores, vociferationes, iræ, magnam vim habent ad producendas anginas. Sicut et potus vini meracioris: stricturae colli, cibi calidi et potus calidi actus. Unde qui non possunt expectare, ut cibum refrigerentur, facile incurrunt in hanc ægritudinem.

Sunt quoque nonnulla, quæ scribit Avic. facere a proprietate anginam, ut sunt fungi, nimius usus cerasorum Andacocia vocatorum ab Avic. (Sunt quædam medicamenta Arabica.)

Signa. — Anginam optimum est præcognoscere, antequam adveniat; quoniam cum sit morbus perniciosissimus nisi præcaueatur, solet repente homines jugulare. Igitur ubi videbitis aliquem sine manifesta causa vix posse movere collum, vix posse deglutire difficulter respirare, destillatione laborare, et calorem insuetum circa fauces et laryngam percipere, statim suspicari debetis, ne fiat angina.

Factæ autem anginæ alia sunt signa *communia*, alia vero *particularia*. Communia signa sunt secundum Hippoc. libr. 2. de morb. insignis difficultas deglutiendi, loquendi, respirandi et

stertor. Hæc omnia sunt signa communia omni anginæ in genere. Cæterum, si morbus sit in *larynge*, cognoscetis, quoniam præter signa ante dicta ægri vix vident, *parum audiunt*. Si omnia spectentur, nihil apparet tumoris, nihil ruboris : et tamen dolor adest non exiguus, calor quoque non obscurus : torpor articulorum, inquietudo tanta, ut nequeant ægri loco consistere, nec locum accommodatum reperire.

Si fiat in *faucibus*, cognoscetis quia si intumescunt fauces, apparet rubor, calor, dolor, qui major est quando partes affectæ contractantur. Ad hæc adest insignis difficultas devorandi ; et si malum augeatur sive in larynge, sive in faucibus, oculi prominentes redduntur sanguinolenti et rubentes, exferunt ægri linguam ut canes, nec ullo pacto quiescere queunt. Cæterum, adest in utroque casu insignis febris, pulsus celer, durus densus, quemadmodum solet esse in omnibus prope inflammationibus. Cæterum si fiat inflammatio in partibus externis sive faucium sive laryngis, cuncta symptomata relata multo mitiora sunt.

Neque enim adest tanta difficultas devorandi, neque tanta anhelitus difficultas ; non adeo loquela impeditur. Et ut summatim dicam, multa ex relatis symptomatibus desiderantur in angina, quæ fit in partibus externis.

Sed dubitatur, utrum semper anginam comitetur febris Hip. enim in 2 de morb. et I de morbis scribit anginam interdum fieri sine febre. Idem quoque scriptum habetis a Galen. 4 aph. 25, Nec non a Cæl. Aurel.

Ex altera parte angina est morbus acutissimus. Et Gal. I. aph. 12. scribit, nec non 3. de difficultate spirandi, febrem inseparabilem esse a morbo acuto. Quod si quandoque Galen. dixit morbos aliquos acutos esse sine febre, ut apoplexia et epilepsia ; minime tamen connumeravit anginam inter hujusmodi morbos. Respondeo, febrem aut esse accidens purum, aut morbum essentialem. Febrem, quæ est accidens, ut scribit Galen. 5. aph. 66 veteres non dignatos esse nomine febris. Unde phrenitin et pleuritin non appellabant febrem, et si febris perpetuo conjuncta sit his morbis, propterea quoties veteres medici dixerunt anginam esse sine febre, locuti sunt de *febre essentiali* non de ea, quæ *accidens* : quia apud ipsos hæc non erat *vera et legitima* febris. Vel dicere possumus, anginam aliam esse *propriam* et legiti-

mam, aliam *spuriam*. Legitima semper copulatur febris vel accidens vel essentialis : angina spuria sæpe est sine febre : quia fit a pituita, fit extrinsecus, unde jure febris illi nulla conjungitur. Si fiat angina ab humoribus biliosis et acribus, cognoscitur, quoniam febres majores sunt sitis maxima, amarior et acrimonia percipitur in ore, dolor insignis est, et, si ora spectentur, colore pallido infecta sunt ; tumor tamen est exiguus. Si efficiatur a sanguine, cognoscitur imprimis ætate juvenili, complexionem sanguineam, vultu sanguine repleto, calor et dolor insignis est in faucibus tumor major, febres magnæ. Si efficiantur a pituita, cognoscitur similiter ætate et complexionem pituitosis. Nulla est coloris mutatio in faucibus, exiguus dolor, tumor effatu dignus, exiguus calor, febris aut nulla aut satis languida.

Omnis angina perniciosa est, non tamen necessario lethalis, propterea quod Hip. lib. I de morb. connumeravit anginam inter morbos dubios, qui neque salutem neque necem inferunt necessario ; attamen omnium perniciosissima est illa, quæ sit in *larynge* et præsertim in intima parte. De hac enim loquens Hipp. 3, libr. progn. dicit jugulare ante quartum diem.

(*Lib. II, cap. V, Praxis medica.*)

MERCADO

De internorum morborum curatione.

De Angina.

De angina et reliquarum partium oris inflammatione. — Dum eadem fluxionis differentiæ, quas præcedenti capite memoravimus, ad oris, laryngis aut pharyngis partes prolabuntur, sed non ut in præcedentibus affectionibus per irrigationem aut levem imbibitionem, sed per venas ipsas in carnosas earum partes procidunt, licet eadem sit materia, quæ defluit, et eadem etiam pars quæ afficitur, longe tamen diversius succrescit affectus ; quippe inflammautur, si per venas irruat, apostemosa inflammatione eo tempore, tum columellæ, tum amygdalæ appellatæ, tum vero laryngis, aut pharyngis musculosæ, in quibus solis anginam fieri arbitramur. Verum quia inflammationes prædictarum partium consimilem fere fortiuntur curationem, ob id uno hoc capite institui omnium meminisse, curatione tamen una solum prescripta, eaque anginæ proficua, quibusdam additis considerationibus ad aliarum curationem necessariis.

Est quidem inter prædictas particulas gurgulio seu columella, pars quædam, quæ in fine summi palati carnosâ appendens, aperto ore et lingua depressa conspicitur : quæ sane ob diversas dispositiones, quibus insequitur, diversis nomnenclaturis describitur : multi enim uvam appellarunt, quod acino uvæ persimilis existat. Quinimo hujus partis inflammationem Hipp. uvam appellat ; ut ex Galen. colligitur lib. de tumoribus præter nat. Dixerat enim Hipp. lib. de morbis : Fit autem uva, cum pituita de capite ad gurgulionem descendit, et gurgulio præceps dependet et fit rubicundus. Sed hujus uvæ aliam generationem constituit 2 de morbis dicens : Uvam fieri quum summa gurgulionis pars aqua impletur et rotunda fit, ac pellucida et respirationem interdicat. Sed hanc affectionem statuit Gal. 6 local. gurgulionis raro accidere, et longe rarius aliam,

quam lorum appellant medici, quæ sit, cum nimium ignitus gurgulio ipse gracilescit, et loro similis propendet. In qua re expendendum est, nomen hujus partis solum esse gurgulionem columellam vero ejus laxitatem et uvam tumorem in rotundum factum, lorum, angustiam et recrescit, dicitur inflammatum esse gurgulionem.

Præter hanc partem inflammari etiam dicimus glandulas, quarum varias differentias sortitur os: quippe earum triplex reperitur in prædictis partibus sors, officium et natura. Quædam enim in faucium et palati confinio positæ, utrinque ex gargaræonis latere assistunt, paristhmia, seu antiades, tonsillæ aut amygdalæ vocatæ. Item aliæ in capite arteriæ ad laryngem positæ sunt: reliquæ vero ad linguæ radicem pertinent. Ceterum primum illud glandularum genus non fruitur his nominum varietatibus, nisi dum aliquo insignitur affectu: quippe antiadas eas partes Galen. libr. 3. de symptom. causis appellat, cum tumore aut inflammatione, maxime fluxione a capite delabente tentatur: et Paulus lib. 6, cap. 26 et 30, per antiadas intelligit scirrhum tumorem paristhmiorum, maxime si contiguas partes fluxio apprehendat: nam tunc paristhmia appellat, quod sunt ex Gal. 3, aphor. com. 26 dum afferuit, paristhmia, quæ Latini tonsillas vertunt inflammationem esse locorum ad isthmum partem illam, quæ inter os et gulam interjacet. Itaque antiadas tonsillarum inflammationem appellare licet, paristhmia easdem cum ad isthmum et vicinas partes perducitur extenditurque inflammatio. Ex quo vocare oportet has inflammationes: folium tunicæ esse ventriculo, gulæ, faucibus, totique ori communem, nonnunquam vero subjectorum musculorum; quibus sane dolentibus, rubicundis, inflammatis et tumentibus, non læve periculum impendit difficilis respirationis, aut deglutitionis, ut in anginæ speciebus conspiciamus.

Angina vero gravissima quædam morbi species existit, quæ præter gravitatem et periculum, quod infert, difficilis quidem cognitu et curatu existit, propter diversas quas obtinet species, cujus tamen naturam in tres partes jure optimo dividere studuimus, omnes tamen unica communi ratione convenientes, quod suffocari in omnibus laborantes periclitentur, ac nonnunquam difficulter etiam deglutire possint. Est tamen prima, hujus

autem ultime meminit Areteus lib. 1 acutarum passionum, quæ quidem constat ex aëre quem inspiramus, crassiori facto, caliginoso, densiori et fuliginoso, quem, dum facultas per respirationem attrahit, nequit præ crassitie aspera pulmonis arteria capere, aut forsitan quia adstringentis et compressivæ est naturæ : quo factum est ut nihil minus suffocare possit, quam angustia meatuum, a quavis alia causa facta : præterquam quod attractus, nec ventilationem efficit nec refrigerationem, quin ejus consortio spiritus suffocantur, quia compressi et coerciti manent, ac quieti : quæ causa est potissima suffocationis, quemadmodum probari potest in *semisuccensis* carbonibus, dum conclavi undique conclusa via coercentur ; nam halitus ille caliginosus fumosusque facile prædictis modis inspiratus suffocationem efficit. Haud secus, quam si quis inspiret vaporem ex musto ferventi (Hispani tufa appellant) elevatum ; incredibilis enim est efficaciam ad efficiendam suffocationem in brevi tempore.

Illa vero anginæ species, quæ vertebra luxata intro prolapsa oesophagum comprimit, adeo laryngem coarctat, ut linguam ex ore prosilire coerceat, et laborantes aperto ore respirare. Ceterum ea, quæ ex musculis laryngis inflammatis suboritur, faucium procul dubio aut musculorum, qui ad fines asperæ arteriæ siti sunt ; inflammatio est præter naturam, cum rubore, dolore, colore et fluxu conjuncta, quam sæpe affectionem musculis externis cervicis contingere scimus. Verum cum prædictus tumor sensui conspicuus non sit, gravis incumbit de vita suspicio, ita ut si quis evaserit, peripneumonicus fiat, et intra diem septimum pereat ut placuit Hipp. 5. aphor. 10. In qua re primo sciendum est, per fauces intelligendam esse eam partem quæ gulæ et gutturi præjacet, quæque ore aperto conspicua est, continens duo prædicta ostiola. Per cervicem vero intelligimus id spatium, quod est a capite in thoracem, quod septem vertebriis comprehenditur, guttur asperæ arteriæ caput. Sed hanc inflammationem prædictarum partium et anginæ sortem in quadruplici esse differentia, consensu fere omnium constat : in qua re expendendum est, nihil in medicis disputationibus difficilius, nihil confusius et inconstans, ac omnibus minus commune usquam reperiuntur esse. Nam præterquam quod citra musculorum consideratio-

nem multi ex conspicuo aut occulto tumore, vel rubore, in faucibus et gutture, has quatuor anginae differentias veniuntur alii solum musculis annumeratis), in praesagio et periculi ratione longe dissident, quibusdam asserentibus majus periculum esse in gutturis inflammatione : alii in inflammatis faucibus. Quae sane res magni est momenti, cum ad cognitionem tum ad extirpationem affectus, tum etiam ad veram et genuinam curationem ; nam saepe levius aut gravius praestamus auxilium, prout affectio difficilior aut periculosior sese nobis ostendit, quo profecto medicum noscit perdifficile esse, ni exacte compererit, qualis naturae et officii sit pars, qua inflammatione aeger tentatur. Qua ratione expendisse oportet, in cervice, faucibus, gutture et ore ipso, praeter glandulosum genus, musculorum quoque reperiri varias propagines et sortes ; nam ex his quaedam conspicuae sunt, aliae omnino delitescent, et intrinsecus suis muneribus assistunt. Quod sane venantur medici, quia ex harum partium inflammationibus quaedam aperto ore conspicuae sunt quaedam juxta collum et cervicem supereminant et rursus aliae omnino delitescent, ita ut neque aperto ore, neque extrinsecus quidquam effatu dignum appareat. Ex quo unanimi plurium consensu constat, verae anginae et quae peculiare sibi arrogat differentias, quatuor esse proprias species. Nam ubi gutturis muscoli interni inflammantur, cynanche appellatur : si vero in faucibus fuerit inflammatio synanche : si tamen in exterioribus gutturis musculis fuerit, paracynanche ; si in partibus faucium exterioribus et mento parasynanche. Omnes tamen inflammationes sunt, praesertim per defluxum maxime a capite. Neque obstat Hippocrat. 6 por. part 7 tantum tres anginae species numerasse dum inquit : In summa qui solum deglutire non poterant, his valde mites ac toleratu faciles erant ; qui vero etiam insuper obscure loquebantur, iis molestiores ac diuturniores.

..... Signis monstrare nunc incumbit et anginae species, et causarum differentias, ut subsit expeditior curandi ratio ; sic anginae omnes differentias distinguere, et nosse facile cuivis est : nam ea, quae ex vertebra luxata prodit, ipsa se ostendit, quod in collo appareat locus cavus ex luxatione vertebrae ad oesophagum cum dolore ; musculorum circumjacentium tumorem respiratio difficilis, hiatus oris, lingua exerta, et a sua radice mota ;

cujus etiam meminit Aetius sermo. 4 tetra 2. c. 47 quod desumpserat ab Hipp. 2 popul. part. 2 Quæ vero ex fumo prodit, nulli est ignota. Ex quibus constat, quod privatione horum signorum reliquas facile possis cognoscere. *Qua vero in parte sit angina*, multa monstrant; nam licet in quavis parte sit, duo hæc signa assident, devorandi et respirandi nimirum difficultas cum dolore acerbo fauces occupante et difficili deglutitione, ut ob id potius in nares resiliat: ceterum magis minusve hoc, quam illud prævalere, prout in pharynge, aut larynge fuerit inflammatio, comperies magis; nam musculis gutturis interim inflammatis difficilimam efficit respirationem, adeo ut referat Hippoc. 4 de ratione vict. 34: fieri spiritus revulsionem, hoc est, fieri frequentem et violentam respirationem recto cervice et abrupta voce, cum acerbissimo dolore et febre admodum acuta; nihil apparet intra os, aut exterius in collo. Si vero fit Paracynanches, respirabunt quidem difficulter cum dolore sed apparebit circa fauces color mutatus in rubrum. Ceterum si sit synanches, *deglutiendi* difficultas major erit, quam respirandi; in cervice nihil apparet mutatum; in parasynanche vero, colora in collo mutatus apparet, et ipsæ partes tumidiores, et noxa, respirationis minima est, præterquam quod gulam esse inflammata, monstrant potus per nares excretus, et dolor in dorso qua parte incumbit oesophagus. Sed non est minoris momenti ad curationem, humoris fluentis naturam nosse; sic sanguis, dum fluit, omnium gravissimam infert anginam, quia tumorem efficit durum dolentem, et quæ distensionem minime pati potest. Quo fit, ut gravior hæc sit, cum propter duritiem nequeant distendi partes ad molliendam respirationem, neque comprimere ad deglutitionem; quo fit, ut vehementiorem ferant dolorem in devorandis rebus liquidis, quam solidioribus, quod facultas non audeat plurimum comprimere musculos, ut opus est in devoratione liquidorum; sic etiam major est respirandi difficultas, quia licet periculo suffocationis deterrita natura majorem respirationem efficere conetur, nihil tamen prodest, quia tumor durus est et minime cedit. Hanc autem causam cognoscas ex gravitate totius corporis et partis illius, est rubore in faucibus, ex venarum oculorum et totius capitis plenitudine et tensione, vel ex suppressione alicujus sanguinolentæ fluxionis. Alio prorsus

modo periculum minatur flava bilis; nam licet tantum non comprimatur respirationem, neque maximum efficiat tumorem, cum hoc tamen periclitatur laborans, ne facile mutetur humor ille tenuis a partibus externis ad internas; nam id damnaverat Hippocrat. 4 aphoris dicens: Quicumque tumores in faucibus repente occultantur, periculum maximum portendunt. Cognoscitur tamen biliosus hic fluxus, ex punctione partis affectæ, ex ingenti calore, ex mordicatione, et ex parum mutata respiratione, solum enim instar pali infixi dolorem se persentire laborantes referunt. Præterquam quod quæ ex bile aut tenui sanguine fiunt majori ex parte in internis fiunt musculis; quia cum externæ et conspicuæ partes majora habeant vasa, facilius pituitam susceperint; quinimo si bilem receperint, aut tensem sanguinem, facile defluere permittunt, et in tenues venas internorum musculorum prolabi sinunt, in quibus diutius immoratur, et inflammationem efficit, quod expendisse non est parvi momenti, ut antea retuleram. Pituita enim diversam periculi rationem habet; nam licet crassior sanguine sit, et tumorem quoque efficiat, is quidem neque durus est, neque renititur tangenti; laxum enim et indolorosum efficit tumorem. Quo factum est, ut liberalius respirare possint laborantes: ceterum alia lege periclitantur; nimirum quia pituita crassa, dum a medicamentis agitatur, modo crassis attenuantibus, inodo frigidis adstringentibus, et comprimantibus, facile ad infernas partes dilabitur; quo factum est, ut laborantes periclitentur pleuritide, pèripneumonia aut alio thoracis, vel pulmonis gravissimo affectu, qualis colli perversio et convulsio est, ut latius lib. nostro de pulsus arte et harmonia exposuimus. Verum si mixta fluxio fuerit ex utrisque permixta quoque aderunt predicta indicia. Quale præsagium ex angustia per pulsum liceat proferre, reperies eodem lib. de pulsu, cap. angina.

(*Lib. secundus, cap. XI, p. 163.*)

TRINCAVELLA

De inflammationibus, ac ulceribus omnium partium oris et faucium.

Eodem modo; et eisdem de causis in universum oriuntur inflammationes, in ore, et omnibus, quas recensuimus, oris partibus, quibus et aliarum particularum nostri corporis inflammationes; nimirum (ut Gal. multis in locis docuit) ex calida fluxione irruente in aliquam definitam particulam, ea porro ratione, quod partes fortiores, cum aut multitudine gravantur, aut prava aliqua qualitate eorum, quæ in ipsis congesta sunt, excrementorum irritantur, excitata expultrice facultate, nocuam materiam ad imbecilliores partes impellunt, in quas si infarciatur, illas replens in tumorem attollit. Si vero per venas diffluat, neque ex eis exprimatur, vel si etiam aliquid exeat, non tamen hactenus, ut repleat meatus, et inania spatia, sed tantum ut quasi humectet: non fit aliquis tumor in particula, verum vitiat, et immutat naturalem temperaturam illius. Et hoc modo consistunt morbi in intemperie cum materia. Quod si fluxio hæc, præter id, quod calida sit, sit etiam adeo acris, ut possit abradere, et erodere particulas, in quibus consistit, et per quas transit abradendo et erodendo, soluta particularum continuitate, ulcus infligit. Hoc tamen præterea considerandum, quod cum fluxio motionem significet morbosæ materiæ ab uno loco ad alium impulsæ. Ideo duo medico recte has affectiones curaturo sunt observanda. Primum, unde defluat ea materia. Deinde, ubi fluens consistat. Nam primum respiciens, causas fluxionis de medio tollere; alterum vero, morbum factum curare poterit. In his autem harum partium affectibus potest fluxionis occasio in variis, et diversis locis consistere; siquidem et vitio ventriculi interdum, et consensu cum eo lædi fauces, guttur, et os possunt. Sæpe enim si sit congesta aliqua vitiosa, et putris materia in ventriculo ab elatis vaporibus afficiuntur hæ particulae, et lingua, faucesque nigrescunt, exasperantur, et tandem

exeduntur, et ulcerantur. Unde hoc pacto in lactantibus infantibus, corrupto lacte in ventriculo, fiunt ulcera, quæ Græce αἰθαι dicuntur. Multoties quoque ex acri materia per vomitum rejecta abraditur, et ulceratur os. Nonnumquam etiam consensu cum pulmonibus male afficiuntur hæ particulæ, itidem ex vaporibus elatis ad os, et fauces. Sæpe namque id vidimus illis accidisse, in quibus purulenta materia in his partibus fuerat collecta. Unde suppurati, et saniosi, a Latinis, ἐμπύχοι a Græcis dicuntur. Sæpius etiam in febribus acutis, ubi fomentum febris, vel (ut juniores loqui solent), munera in spiritualibus membris sedem habet, id evenire solet. Quare Gal. in Prognos. referens quæ symptomata sæpius sequantur febres, cum earum fomentum, in membris naturalibus est, et quæ, cum in spiritualibus, ait, quod priores sequi solent alvi profluvia: has vero spirandi difficultas; præterea linguæ, et faucium asperitas, nigredo, et alia id genus. Tertio autem solent affici hæ partes consensu cum toto corpore, vaporibus videlicet a toto ad easdem elatis, ut in febribus præsertim vero malignis, et pestilentibus nec modo vapores, sed etiam interdum humores confluunt ad has partes, effervescentibus nimirum vitiosis humoribus tum ex putredine, tum ex igneo, et vehementi calore febrili atque inde fiunt in ore, et faucibus erysipelata, herpes, aphtæ, interdum exquisita erysipelata, interdum phlegmonosa, et multa alia mala his similia. Postremo autem, et frequentius solent ex superioribus partibus, ut Gal. tum tertio, tum sexto apho. testatus præterea et quarto de tuend. san. et secundo de ratione vict. in acut. mor. nimirum ex capite, et cerebro fluxiones ad guttur, fauces, aliasque; huc spectantes particulas deferri; unde inflammationes, erysipelata, ulcera, et id genus alia mala ortum habent. Quamvis autem fluxiones hæ, tum a capite, tum ab aliis locis defluentes: non semper in ori's, et faucium particulis consistant, sed et alias multas possint decumbere, his tum superiores (ut in prioribus libris fuit expositum) tum inferiores, ut in sequentibus dicetur: attamen ad nos in præsentia pertinet ea persequi quæ ad has particulas attinent. Sed primum de inflammationibus sermonem habeamus: utpote, quæ habent aliquam majorem diversitatem in acuties, molestia, et periculo non tantum ratione sui, videlicet fluxionis, et modi, quo generantur, et consistunt, quantum

ratione locorum, in quibus existunt, a quibus etiam diversa nomina sortiuntur. Cum ergo fluxio in lingua, et palato consistit, excitata inflammatione, ut non admodum gravis morbus est neque insigne aliquod periculum annexum habet: ita neque privatum aliquod nomen consecuta est. Nisi quod interdum sub lingua ad eius radicem, et venas quæ sub lingua sunt, succrescit tumor quidam, præfertim vero pueris, qui a similitudine, quam refert, græce βαθραχος, hoc est, rana vel ranunculus (ut retulere Paulus, et Aetius) dicitur. Et quamvis fiat a pituitosa, humida et lenta fluxione; aliquando tamen ad inflammationis naturam (ut ait Paulus) accedit. Unde et si plerunque ex siccantibus, et attenuantibus soleat curari. Ego tamen interdum suppuratum illum vidi, atque ex eo rupto prosiluisse pus copiosum. Inflammationes vero, quo magis in interioribus partibus, decumbente ad eas fluxiones concitantur, eo et molestiores, et graviores sunt; quo vero magis in illis, quæ exterius vergunt, eo minus periculi afferunt. Ut ergo prius diximus, duarum glandularum quasquidem juniores amygdalas appellant, inflammationes, tonsillæ a latinis dicuntur, quamvis et particulæ illæ ab aliquibus tonsillæ nuncupentur, græce vero αντιades. Columellæ vero, vel gurgulionis inflammatio, præfertim vero, quando adeo extenuatur eius radix, unde pendet, ut fiat similis pediculo, cui acinus uvæ inhæret, vocatur a similitudine, græce quidem σφυλη latine vero, uva. Diximus autem inflammationes partium, quæ inter has glandulas, et columellam, atque fauces, vel guttur, paristhmia nuncupari. Internæ vero, quæ in faucibus, et musculis, qui summo capiti asperæ arteriæ, et ligulam vel επιγλωττιν moventes, quæ sunt proxima vocis instrumenta, quas partes φαρυγγα Græci, nos fauces appellamus, latine angina, græce συνάγχη vel κυναγχη dicitur, eo quod hominem angat, prematque, atque quasi laqueo strangulet. Quia vero morbus acutissimus est, interdum et discriminis maximi. Ideo hic aliquantisper consistamus. Ubi primum hoc animadvertendum, quod antiqui medici, præcipue vero Hip. communii anginæ, vel πύλαγχης nomine omnes affectus nuncuparunt in hoc loco consistentes, qui spirationem lædunt, quomodocunque id faciant. Habet autem angina varias et diversas differentias, quæ cognitu necessariæ medico sunt, tam ad præfagiendi, quam ad curandi rationem. Bifariam autem eas partiendi

ratio iniri potest. Cum enim duo in ratione anginæ conveniant (ut ex prædictis percipi potest) nimirum inflammatio ex fluxione excitata, et locus, in quo consistit inflammatio, vel fluxio, tam ex diversitate loci, quam fluxio corripit, quam ex diversa fluxionis natura potest accipit ratio diversarum differentiarum istius affectus. Sed primum differentias a loco sumptas persequamur. Inflammatio ergo aut fauces corripit: fauces vero locum appello, vel partem illam quam *φάρυγγα* Græci vocant, quo pertinent, et quasi cocunt gulæ, et asperæ arteriæ sines, ac supremæ partes, quæ sunt quasi ostia, et aditus, tum cibo et potui ad ventriculum; tum spiritui ad pulmones: sicut extremum arteriæ, *λάρυγγα* Græci, nos guttur (ut puto) nuncupamus. Cum igitur in faucibus extuberat inflammatio, aperto ore, et aliquo instrumento lingua depressa, rubor, et tumor introsipientibus conspicuus est. Quod si ita interius malum consistat, ut in faucibus neque tumor, neque rubor appareat neque etiam exterius signa inflammationis percipiantur; attamen in gutture sentiat æger se strangulari: hæc est altera anginæ differentia. Tertia vero est, cum in faucibus quidem suboritur inflammatio, sed versus exteriorem partem. Quarta est, quando ex inflammatione tument externæ partes circa guttur. Medici vero Hipp. posteriores, has omnes differentias diversis nominibus, ut quarto aph. et tertio prognos. Gal. tradidit, distinguere volentes, primam *συναγχω* alteram *ηυναγχω*, tertiam *παρασυναγχω* quartam *παραηυναγχω* appellare: quos fere deridet. Gal. Sed et alterius etiam differentie meminere Hipp. et Gal. quarto de locis affectis cujus proxima causa est, luxatio vertebrarum, quæ cervicis sunt: nimirum quando luxatæ introrsum impelluntur; ita enim et gulam, et subinde guttur seu arteriam premunt. Periculosissima autem luxatio est vertebrarum superiorum, sicuti illius, quæ dentem appellatum habet, minus aut quo inferiores sunt. Et huic, quæ ex luxatione fit magis obnoxii sunt pueri quam adulti. Nec modo hac ratione distinguuntur differentie anginæ, verum et ratione fluxionis, unde excitatur, quæ plerunque (ut diximus) ex capite est; interdum tamen et aliunde. Fluxio vero non semper eandem habet naturam, sed differentem. Unde et diversæ etiam excitantur anginæ differentie. Nam aliquando ea fluxio calida est, tenuis, et acris ut quarto de rat. vict. in acu. mor. et tertio apho.

ait Gal. ait tamen ut aliquando magis inflammationis particeps sit: nonnunquam vero erysipelatis, ut idem quinto de loc. affect. tradidit: et in hoc quidem, dolor vehemens est, sitisque et vehemens etiam ibi calor percipitur: adest etiam febris, sed non adeo calida, neque pro ratione sitis. Aliquando autem fluxio magis pituitosa et lenta est, et ubi tumoris non multum calidus sit, alioquin enim nisi aliquem calorem habuerit inflammationem, quam tanquam genus anginæ constituimus, nequaquam poterit excitare. Sed de hoc in secundo libro, ubi de lethargo fuit habitus sermo, egimus. Ubi ergo non multum habuerit calorem, fere erit absque febre prior autem anginæ differentia, ut idem Gal. eisdem in locis docuit solet plerunque guttur vel λαρυγγα occupare; frequentiorque est in æstate, autumno: sicut altera hyeme, et vere; et fauces potius torquet. Unde in ea quædam inæqualitas in devorando percipitur. Nam cibus retineri alicubi videtur, præcipue qui crassior et durior est non sine levi aliquo dolore. At vero cum gulam angina corripit, quidam etiam dolor in dorso percipitur; ob id quia gula spinæ incumbit; sicuti cum in extrema arteriæ parte, vel gutture; tantam affert spirandi difficultatem, quod (ut quarto aphor. monet Gal.) sæpe in discrimen repentinæ strangulationis adducit. Omni autem angine hæc duo assident incommoda. Nimirum quod et ægre devorant ægrotantes, et non nisi cum dolore, ut sæpe per nares (ut quarto de loc. affect. idem ait) potum rejiciant: tunc autem major difficultas, dolorque angit cum iacens et supinus devorare nititur: unde mutata figura, considerare hi coguntur. Præterea assidet et spirandi difficultas; non tamen cuicunque tanta ut suffocationi periculum laboranti minetur. Quatenus vero ad præsagiendi rationem pertinet, hæc ex Hippo. et Gal. locis sæpius jam citatis colligenda, et annotanda duximus. Primum, quod angina, quæ ex luxationes fit, communi quidem (ut statim initio capitis monuimus) nuncupatione dici hoc nomine potest; quia angit, et strangulat citra noxam pectoris, et pulmonis: hac enim ratione imprimis angina a peripneumonia, et pleuritide discernitur, quoniam si proprie, et exquisite loqui velimus, angina partium oris, et faucium inflammationem significat; luxatio vero aliud est ab inflammatione. Quamvis luxatio hæc bifariam fieri possit. Vel enim ictu, et percussione, ex casu, aut alia occa-

sione; vel (ut ex sententia Hipp. in libro de articulis refert Gal. quarto de loc. affect.) ob crudum aliquod tuberculum in corporibus nervosis, quæ vertebriis incumbunt, succrescens, quibus ex tumore contractis, torqueri vertebrae necesse est; et ejusmodi quidem istius luxationis causa magis similem inflammationi, et subinde anginae rationem habere potest. Sed redeamus ad nostrum institutum; cum ex ictu et repente fit luxatio, curationem non admittit, cum vero ex tuberculo, censuit Hipp. (ut secundo libro Epidem. insinuat) interdum curari; esse tamen periculosas has anginas: et eo magis præceps periculum afferunt, quod cervicis superiores vertebrae fuerint luxatae. Reliquis autem anginae differentiis, quæ in inflammatione consistunt in majus, minusve periculum, ratione loci, cui incumbunt, hominem adducunt. Ea enim præ aliis acutissima est; et citissime strangulans, in qua maxima et spirandi difficultas, ita ut cogatur ægrotus recta cervice respirare, et a dolore plurimum cruciatur, quæque interiores gutturis partes corripuit; ut ore aperto, et lingua depressa, nullus in faucibus inspiciatur tumor, aut rubor. Ubi autem fauces et tumida, et tabentes videntur, dolentque, et insignis etiam spiritus angustia percipitur, non tanta tamen, ut in priori, periculum sane et hæc adjunctum habet, non est tamen perinde acuta ut prior. Longè vero minus periculosa est ea, in qua nec multus dolor, nec insignis spirandi difficultas molestiam affert, et præter fauces collum etiam tumoris et ruboris est particeps, nam extrorsum vergit malum. Quare sexto et septimo Aph. pronunciavit Hipp. bonum esse in angina tumorem, et ruborem, cum in cervice, tum in pectore apparere; tertio vero Prognost. unde hæc fere omnia descripta sunt, dixit eam anginam salubriorem esse, in qua tumor et rubor extrorsum convertitur. His autem præterea addendum est, quod si ægrotanti supervenerit angina, qui vires parum firmas habeat, desperata est omnino ejus salus: quicquid enim spei reliquum est in his acutissimis morbis, id (ut decimo methodo docuit Gal.) in robore virium situm est. Nec etiam præter eundem cujus quarto Aph. idem meminit, quod perniciosissima est angina, in qua febris vehemens est, cum multa spirandi angustia. Cum enim in magna febre multa sit refrigerii necessitas; quod larga spiritus attractio præstat, exiguus vero in his attrahatur;

citissime strangulantur, nullusque evadere potest. Ea autem angina, nec acuta admodum est, nec ad discussionem difficilis. In qua ex pituitosa fluxione fauces tument. Sed nec hoc ignorandum quod (ut idem quarto de causis puls, monet) angina transit in, peripneumoniam, translato videlicet impetu fluxionis ad pulmones. Nonnunquam vero in convulsionem, conversa nimirum fluxione ad nervos, et medullam spinæ. Et cum eorum pulsus, qui angina tentantur, particeps quidem cujusdam sit tensionis; hac ratione fit, ut quoquomodo pulsui eorum, qui convelluntur, similis evadat. Cum præterea non nihil undosus, et magnus sit, ut peripneumonicorum pulsus; inde etiam fit, ut ejus transmutatio in quam partem casum minetur, ex pulsu præcognosci possit. Nam si majorem habent tensionem, inditio erit vergere in convulsionem. Sin autem major, et undosior fieri pulsus videatur, in peripneumoniam inclinare anginam ostendet. Addit autem Gal. tertio Prognost. quod conversa angina ad pulmones delirium concitat, et strangulat intra septem dies, aut suppuratur, ut ait Hippo. quinto Aph. Sed de his satis; ad curationem drogrediamur.

(*Cap. VI, p. 102.*)

De ratione curandi anginam, et reliquas faucium, et oris inflammationes.

Cum item sit modus, quo omnes, qui in his partibus suboriuntur, inflammationes excitantur, nimirum ex fluxione, eademque fluxionum differentia: Nisi quod cum duplicem esse eam fluxionem dixerimus, quæ his partibus solet esse infesta; alteram videlicet crassiorem, et magis pituitosam, alteram tenuiorem, calidiorem, et biliosiore. Prior quidem (ut testantur Gal. et Hipp. 4. derat. vict. in acut. morb.) magis in faucibus, et frequentius solet consistere; utpote quæ latiores venas habeant, capacioresque crassioris, et magis lentæ fluxionis. Altera vero quæ tenuior et biliosior, e latioribus quidem facilius effluit, ab angustioribus autem facilius continetur, et sistitur, unde frequentius in gutture, quod *λαρυγγα* græce appellari diximus, solet inflammationem excitare; nam venæ gutturis sunt minores, et angustiores. Ad hæc cum natura harum omnium partium

similem pene indicationum rationem habeat; hoc excepto, quod earum quædam actionem, et officium obeunt vitæ, et salutis magis necessarium, sicuti quæ ad respirationem sunt magis necessariae, ut guttur, majus momentum, quam fauces habet in hac actione, et fauces quam gurgulio, gurgulio vero, quam aliæ oris partes. Unde postea affectus, et inflammatio gutturis acutior morbus est, et cui magis præceps assidet periculum, quam faucium; et harum quam gurgulionis; et sic subinde. Cum igitur ea omnia ita se habeant, similis quidem erit ratio curandi omnes harum partium inflammationes; ut tamen medicus magis sollicitus sit, et in administrandis opportunis remediis velocior, ubi majus, ac citius periculum impendet. Nam, ut 6 aph. dixit Hip. in his differre, hoc malum principium vero curationis a communi methodo accipiendum est cujus affectus. Omnes comprehendit a fluxione concitatos. Ea vero est, ut primum fluxioni morbificæ occurramus, ac eam sistamus. Sisti autem nequit, ubi præceps, et vehemens sit; fluxio factura morbum aliquem magnum, nisi (ut sæpe testati sumus), evacuatione tum corporis universi, tum harum particularum. Hac enim ratione, et facile reprimitur fluxio remota, nempe ejus causa; cum revellendi et avertendi ejus impetum vacuatio opportune administrata vim habeat; prætereaque, ut eodem loco docuit Gal. et commodiorem utiliorem, magisque efficacem usum localium remedium præstat, quæ subinde necessaria sunt ut et repellatur irruens humor et digeratur, qui jam influxit. Corporis autem inanitionem moliri possumus triplici usi instrumento medico. Nimirum ope manuum; sicuti secta vena, aut incisis cucurbitulis. Deinde usu medicamentorum purgantium clysteriumque, præterea tenuiori victus ratione. De horum igitur unoquoque particulatim, et seorsum sermonem habeamus. Primumque de sanguinis missione. Nam et hoc remedii genus, semper fere in his acutioribus morbis ex recta methodo alia omnia, nisi quidpiam aliud vetet, præmittendum est: Prohibere autem eam possunt hæc. Primum quidem si alvus astricta non dejecerit prioris assumpti cibi excrementa non modo unius, sed et alterius dici, quo in casu prius clysteri procurandum esset, ut dejiceret.

Quamvis Hip. in secundo de Rat. vict. in acut. morb. clysteri utatur post sectam venam. Ego vero, nisi valde esset astrictus

alvus, putarem posse differri clysterem post incisam venam ; sed si astrictior esset, præstare existimarem clysterem præcedere, lenem tamen. Et si quis diceret, nonne possumus et leniente pharmaco idem efficere, ut cassia nostra, quam Arabes plurimum commendant in inflammationibus faucium ? Porro et id fieri (inquam) posset quando in mora nullum esset periculum ; Sed quia in angina, præsertim quæ guttur interius tentat ; interdum adeo in præcipiti res est, ut intra spatium horarum viginti quatuor hominem jugulet. Ideo longe expeditius esset, illa eadem hora huic periculo occurrere, secta vena, et præmisso clysteri, aut paulo post imposito ; quam differre quousque alvus per medicamentum exoneretur. Quod si neque adeo acutus morbus esset, neque eo in loco suborta esset inflammatio, ut in devorando solidiori, vel liquido medicamento periculum immineret, recusaret que clysteres ægrotans, possemus tunc rem hanc lenienti pharmaco transigere. Deinde vero ob stare possunt ætas, et vires male affecti corporis ; quod quidem impedimentum longe majoris momenti est, ut prætereamus tempus anni, constitutionem, regionem, et id genus reliqua, quæ potius in magnis morbis modum evacuationi imponunt, quam quod omnino vetent. Sed primum agamus de iis, in quibus nihil est quod venam secare prohibeat. Statim ergo detecto principio inflammationis, si eo videatur fractura magna, et periculosa, pertundenda erit vena exterior in brachio, quam humeralem græci, arabes, et juniores cephalicam appellant, et in eo brachio, quod ex ea parte est, in quam vergit inflammatio e directo videlicet partis affectæ : copiosusque deinde sanguis detrahendus est ; habita semper ratione cum plenitudinis corporis et impetus fluxionis irruentis ad inflammatum locum, tum vel maxime ætatis, et virium affecti corporis. Inanito autem corpore universo, et consistente jam, aut omnino, aut magna ex parte fluxione, inveterascenteque morbo, cum jam indicatio, quæ est a fluxa materia, et facto jam morbo, vim majorem cæperit habere ; propterea quia obsisti non potuerit, quin tumor non creverit insigniter : si venæ qui sub lingua sunt, inciduntur, ac pro ratione tumoris, et virium effluat, non parum proderit, quia inflammatio, præsertim in faucibus, inde detracto sanguine, vacuabitur. Sed interdum in aliquibus, aut non pos-

sumus sanguinem ex ratione detrahere, vel etiam nolumus, non possumus vero; quia vel habitus, et natura corporis non facile admittit sectionem venæ, sicuti mulieres, quæ molliores, et albas habent carnes, quæque non admodum coloratæ sunt, itemque pueri et eunuchi. In ejusmodi itaque corporibus per scarificationem, et cucurbitulas scapulis, et dorso interdum vero et cruribus affixas sanguinem mittimus; quod et Gal. consuluisse, præsertim in lib. de cucurb. observavimus. Neque enim ex sanguine hoc modo detracto dissolvitur robur caloris nativi, neque spiritus ita exinaniuntur, ut ex liberaliore sanguinis missione per venam sectam. Quod si neque hac ratione audeamus sanguinem exhaustire, id erit agendum, quod consuluit Gal. quarto de sanit. tuen. qui in curandis lassitudinibus, quæ cum alioquin sanguinis detractationem requirerent, eam tamen ætas non concedit, vel timiditas hominis nempe, ut liberalius alvus deiciat, procurandum esse censuit. Quare jam ad hoc secundum instrumentum, quo medici utentes universum corpus inaniunt, exponendum accedamus. Communi autem nuncupatione purgatio dicitur, quam medicamentis molimur. Sed quoniam duplex est regio, qua imprimis universum corpus purgatur; nempe superior, et per os, ut quando ad vomitum imus. De qua ratione vacuandi non est, cur in præsentia agamus. Quia evacuatio, quæ inter initia molienda est, ea debet esse (ut eodem 4 de rat. vic. in acu. mor. docuit Gal.) quæ vim habeat non tantum corpus inaniendi; sed et revellendi ab affecto loco. Vomitus autem potius commovet humores sursum versus superiores locos, in quibus consistit inflammatio; quam ut inde avertat unde altera regio inferior et per sedem accommodiator est huic negotio. Per dejectiones ergo alvi potius curandus est is affectus. Et cum bifariam alvi dejectiones evocari possint. Vel medicamentis bibendis, aut devorandis, aut illis, quæ per clysteres injiciuntur inferius per sedem. Non erit procul a nostro instituto, si de utrisque agamus; cum utramque rationem ejiciendi alvum laudaverit. Gal. sexto de Comp. medicamentis, sec. loc. et eodem quarto de Rat. vict. in omnibus harum partium inflammationibus. Sed primum de medicamentis assumendis ore sermonem instituamus; deinde de illis, quæ supponenda sunt, verba faciemus; quantum ergo ad medicamenta, quæ sumenda

sunt, ut et universum corpus inaniatur, et impetus influentis humoris revellatur, atque alio convertatur, hæc imprimis considerata sunt, qualitas medicamenti, quantitas, et forma, vel consistentia. Et ut ab hoc postremo incipiamus, cum triplex soleat esse forma medicamenti, vel consistentia, quod in usum venire potest. Nam aut catapotii vel pilulis utimur, aut potionibus, appellatis *bolis* qui non ita solida, et dura substantia, ut pilulæ constant, sed teneriori, neque tamen fluida et liquida, ut potiones; verum fere inter hæc media. De iis enim, quæ ex saccharo parantur, in orbiculosque confecta rediguntur, et vulgo *confectiones* nominari solent; in quem modum, et diaturbith appellatum, et diaphœnicon interdum parant apothecarii, ut minus ingrata sint, et deglutiendi facilius possint, nolumus in præsentia loqui; quippe cum in his majoribus morbis hanc gratiam non quærimus, ubi ulceratio aut pus est.

Consulemus ergo in electione modi, vel formæ medicamenti exhibendi, facilitatem devorandi, vel deglutiendi. Nam, et si in omnibus aliqua sit istius rei habenda ratio, ea tamen major est in hoc affectu habenda; quia (ut paulo antea diximus) omnes harum partium inflammatione sequitur angustia faucium, unde difficilis admodum redditur devoratio, et non sine insigni dolore, quo deinde inflammatus locus irritatur; magis autem a re dura et solida, quam tenera et liquida. Quare et si solidius medicamentum efficacius, et vehementius trahat vacuandos humores; ob id quia diutius moratur in ventriculo, cum non ita facile dissolvatur, et diffuat. Attamen, ut aliqui ineptissimi sunt ad devorandas pilulas, vel catapotia, et id suapte natura: Ita omnes fere in his affectibus non citra insignem laborem, et dolorem, eas devorant. Præterea considerata est ratio morbi. Quoniam si valida, et multa adsit febris, pilulæ non admodum conducent, ut quæ calefaciant magis, et exsiccent, quam appellati boli, vel potiones. Aliis vero omnibus minus potiones, tum ex modo substantiæ; tum quia parari possunt, et dilui decoctis, vel aliis liquoribus, quæ vim habeant leniendi, et reprimendi inflammationes, refrigerandique, et humectandi. Cui et hoc addamus, quod si ex molestia medicamenti concitetur vomitus, non ita velox imminet suffocationis periculum, si liquidum fuerit medicamentum, veluti si solidum. Pilulæ enim, et boli, dum vomitu

excluduntur confertim, et valido impetu ad angustias oppressi ab inflammatione transitus, majus afferunt periculum. Unde aliqui hac ratione repente strangulati sunt. Ut accidit hic Patavii cuidam mulierculæ laboranti angina, quæ devoratis bolis aliquot cassiæ, et vomitu excitato a molestia medicamenti statim strangulata interiit. Qualitas autem medicamenti consideranda est, quatenus ad duo ea referri potest. Vel ad vim, qua humores respicit, ut hunc vel alium suapte natura magis respicit; unde in electione consulenda est natura fluxionis a qua concitatur inflammatio. Hipp. enim hoc docuit, ubi ait: si qualia oportet purgari, purgantur, et confert, et bene ferunt. Ea autem purgari oportet, (ait Gal. locum explanans) quæ lædunt, et morbos procreant. Nec modo in petenda electio medicinæ, quantum ad vim purgatoriam pertinet, sed etiam ad qualitates, quæ primæ vocantur. Si enim calida admodum et acris fuerit fluxio, declinanda erunt medicamenda, quæ interius non minus fere nocent calefaciendo, quam prosint vacuando. Peçuliari autem proprietate in his affectibus Ægyptiæ cassiæ liquorem laudarunt Arabes; et id duplici nomine. Primum quia purgat, deinde quia vim habet partes illas dum per eas defluit, leniendi, ac digerendi inflammationem, reprimendique et tunc præsertim, cum dissolvitur aqua vel decocto, vel succo solani. Sed et quantitas medicamendi bifariam consideranda est. Nam aut quantum refertur ad vires et robur medicamenti in vacuando. Aut quatenus proprie restituit quantitatem, hoc est molem, et copiam medicamenti in primo hæc consideranda velocitas motus, et acuties morbis, quoniam si videatur præceps, et violentus admodum motus fluxionis, et augmentum inflammationis, jam subit rationem turgentis morbi. Unde consuluit. Hip. in valde acutis, cum præceps est motus, medicamendum esse eadem die, quod quidem ad medicamenta valenter purgentia pertinere dixit Gal. Quare statim cassiæ, si cassia videatur utendum, et tenuis, calidaque fuerit fluxio, erit addendum electuarium ex succo rosarum descriptum a Nicolao, vel rosatum ex descriptione Mesue, de quibus superius fuit habitus sermo. Sin autem pilulis videatur utendum, *aureæ* erunt aptæ. Sed si fluxio fuerit pituitosa, aut diaphœnicon addemus, aut agaricum; pilulæ vero cochiiæ erunt accommodatæ. Pro cassia autem, si quis eam abominetur, rosaceo syrupo solutivo utemur.

At si morbus, et fluxio quæ ejus causa est, non adeo acuta sit, ut cogat nos ita accelerare, possumus acrioribus medicamentis parcere et uti facilioribus, et lenientibus. Si autem loquamur de quantitate, ut copiam, et molem respicit, debemus quo possumus minoribus medicamentis uti, et minori copia duplici de causa, primum propter difficilem assumptionem ægrotantis, ægre devorantis, ut diximus, deinceps quia amplum, et copiosum medicamentum facilius promovet vomitum, qui non parum in his affectibus molestus est, et noxius, et id, sive pilulis videatur potius utendum, sive bolis, sive etiam potionibus. Postremum autem medicum instrumentum evacuationis universi corporis, est victus tenuioris ratio quæ debet ex proportionem respondere. et acumini morbi. Nam hoc docuit Hip. 1 aph. cum ait, ubi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, et tenuissimo victu utendum est, ubi vero non, sed pleniorum victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quanto morbus extremis est mollior. Unde (ut ait Gal. 6 de comp. med. sect. loc.) protinus ægrotanti quies imperanda, et inedia, vel exquisita, si res plurimum urgere videatur, vel tenuis admodum victus, donec sistatur fluxio, et res jam in tuto sit. Vini potus omnino ægrotanti interdicens; danda vero aqua, aut mulsa, aut si pituitosior sit fluxio poterit aliquid, aut oxymelitis, aut acetosi syrupi immisceri. His autem temporibus pro mulsa utimur, julep appellato rosaceo, vel violaceo, quæ magis refrigerant et leniunt exasperatas fauces. Sed neque omnino frigida hæc bibenda; frigus enim mordet, et asperat partes has, sed potius tepida, ita enim magis sedatur dolor. Quibus recte institutis et fervatis locus affectus jam tuto tractari poterit remediis, et medicamentis, quæ topica, seu localia, dicuntur, et particulatim affecto loco adhibentur. Quorum primum. et in universum eadem penitus est methodus, quæ et aliorum medicamentorum inflammationibus aliarum particularum curandis administrandorum. Exceptis illis, quæ occupant adenosas, vel glandulosas partes, ut bubones, et parotides. Harum enim curatio in principio diversa, et fere aliis contraria, sed de his superius capite de parotide egimus. Methodus ergo hæc generalis his indicationibus vel etiam scopis constituitur ut sæpius diximus. Nempe, ut primum repellatur influens humor ab affecta parte,

deinde ut quod jam influxit, per maturationem, et digestionem discussum vacuetur. Sed de repellentibus prius agamus. Ea autem sæpius jam repellendi vim habere diximus, quæ refrigerant et astringunt, ut quæ austera sunt, atque adeo etiam magis, quæ acerbæ. Porro autem cum in his affectibus non sit eadem ratio, quatenus ad eorum vehementiam, et magnitudinem pertinet, tum ratione inflammationis, quam ratione loci quem corripit inflammatio, et impetus fluxionis, unde nascitur magnitudo, et celeritas periculi; non erit etiam idem modus, et ordo remedium, et medicamentorum. Nam ubi non multus fuerit impetus influentis humoris, neque magna videbitur excitari inflammatio, mediocria satis erunt medicamenta repellentia, qualia sunt austera. Sed cum vehemens sit irruentis fluxionis impetus, et inflammatio in insignem magnitudinem excrescere videatur, necesse erit, si hæc reprimenda sint, valentioribus ea aggredi, qualia sunt acerbæ. Quoniam vero (ut particulatim rem agamus) varia est forma medicamentorum quibus in his affectibus et possunt et solent uti medici. Nam aut decocta parant, quibus tum colluatur os, tum gargarizetur. Aut interdum linimenta conficiunt, quibus affectas partes illiniunt. Aut etiam aridis illis utuntur, medicamentis videlicet contusis, et in tenuem pulverem redactis; qua medicamentorum ratione præsertim in columella inflammata, vel ex nimio humore laxata, et longiori facta utimur. Non erit ab re nostra alienum, ut de collutionibus, et gargarismatibus verba faciamus. Nam præter id quod hæc sunt in frequentiori usu, commodiora etiam sunt in universum, in quocunque loco constet inflammatio. Quia laborantibus intimioribus, et penitioribus faucium partibus, non ita commode possunt linimenta adhiberi, vel arida inspergi. Mediocres ergo, et utiles erunt collutiones, si parentur ex palmulis, vel ex rosis aridis, vel ex pampinis, vel capreolis vitium, vel ex foliis germinibusve rubi, vel canini rubi, vel ex cytini mali punici vel mori radicibus; præterea vero ex malis, pirisve acerbis, quæ vel seorsum singula, vel plura mixta coqui possunt. Testatur enim Gal. quod sæpe observatum est, horum mixturam usu simplicium utiliore esse. Quæ quidem si ex aqua mellis addita modica portione, decoquantur, et illis, ad os colluendum, et in gargarismate utamur, non parum conducent. In secundo

ordine sunt, quæ sequuntur ; utpote quæ fortiora, et potentiora sunt, nimirum folia et fructus myrti, et cotonea acerba, salicis quoque tenuiora germina, aut etiam arbuti, aut smilacis, aut fagi, item glandes, mespila, corna. Supremum vero ordinem gallæ occuparunt, et rhus tum obsoniorum, tum tinctorum, et fructus myrticæ. Sed præ his omnis summe astringunt omnia aluminum genera ; in quibus cum scissile tenuioribus constet partibus aliis etiam est utilius. Verum medicamenta tria in maximo usu sunt, quorum duo ubique parata servantur in apothecis apud pharmacopolas : quæ ex succis horum fructuum parantur, primum ex succis mororum immaturorum, vel rubi, vel eorum, quæ domestica sunt, et sycomori appellantur ; sed mora rubi valentiora sunt in hoc negotio. Deinde vero ex succo expresso ex viridibus nucibus, quod et aliis omnibus præfert Galen. qui ejusmodi medicamento fuit inventor. Et quamvis horum fructuum succi ita per se, sine aliorum mixtura gargarizati statim inter morbi initia mirifice prodesse possint, attamen si melle excipiantur, et coquantur eo modo quo syrapi fieri solent his nostris temporibus, poterit et diutius medicamentum servati integrum (alioquin enim et acescunt cito, et putrescunt succi facillime), et præterea in usu erit suavius, et moderatius. Quo non solum inter initia statim, sed frequenti etiam tempore, immo usque ad perfectam sanationem, utiliter uti poterimus, præsertim vero si pro ratione mutationis affectus in his temporibus varia addiderimus ; ut si in principio aliquid, quod magis astringat, fuerit additum aliis autem temporibus, quæ aut magis dolorem sedent, aut magis digerant pro varia rerum opportunitate. Priscis etiam temporibus erat in maximo usu medicamentum confectum ex succo expresso ex triplici malorum punicorum genere, una cum putamine ; quo tempore nondum plene maturi sunt hi fructus, et ex melle coctum ad crassitudinem, ut fiunt syrapi. Verum (ut docuit Gale.) ex multis aliis fructibus, quicunque vel austeri, vel acerbi sunt, simile potest medicamentum confici, ut ex silvestribus pyris, ex cydoniis, ex mespillis, ex cornis, ex immaturis uvis, et id genus aliis. Propterea vero istiusmodi medicamenta, cum ex melle parantur, accommodari possunt, non soli in principio morbi, sed sequentibus etiam temporibus : quia ex melle aliquid consequuntur

facultatis digerendi. Aliquantisper autem obtunditur vis astringendi; unde et aliquid magis astringens adjici jubet Gal. cum in initio eis usuri sumus, sicuti sequenti tempore, cum majori opus est digestionem et aliqua maturatione, commode poterit aliquid croci, et myrrhæ addi, sicut si singulorum horum scrupulum libræ ejus medicamenti addiderimus. Sed ubi *consistere* jam morbus incœperit, utendum est illis quæ inflammationes lenire et concoquere possunt. Etenim rarissimum est, quod solis repellentibus queant hi affectus superari. Quod si contingat superari in hiis superantur, in quibus corpus ab excrementis mundum est, neque multus est impetus fluxionis. Nam ubi major sit affectus vel etiam a principio, vel paulo post, commiscenda sunt digerentia, usque quo consistat. Quo tempore si dolor sit infestus (ut nuper dicebamus) tum lenienda, tum concoquenda est inflammatio. Hoc autem præstare poterit lac nuper mulsum, atque ita tepidum gargarizatum, et decoctum glycyrrhizæ vel etiam caricarum pinguium, item et pinguium passularum, et aliorum id genus. Ubi vero jam inclinare inflammatio cœperit, eis quæ magis digerunt admixtis prædictis medicamentis procurandum, ut tollantur reliquæ influxæ materiæ, et illis, aut valentioribus, aut infirmioribus; prout crassior fuerit materia infarta in inflammatione, vel minus crassa, et magis, vel minus induruerit inflammatio. Nam aliquando crocus, et myrrha erunt satis, si medicamenti illis, quæ ex prædictis succis conficiuntur, sunt addita. Interdum alia, quæ efficacius discussionem adjuvare possint, admiscentur. Meminit autem Gal. nitri, aut aphronitri, aut sulphuris ignem non experti; præterea thymi, mentæ, hyssopi, pulegii calamenti, origani et aliorum istiusmodi medicamentorum; quæ non in multa copia, sed modice, pro ratione tamen naturæ, morbi, et materiæ contentæ in inflammatione, aut addenda sunt, dum coquitur medicamentum, aut facienda decoctio ex horum uno vel pluribus, qua deinde diluatur decoctum medicamentum, quo os colluendum, et gargarizandum est. Nam si faucibus et penitioribus partibus malum incubuerit, gargarismate erit opus, si in ore, satis collutio erit. Hæc autem sufficere possunt quatenus ad rationem curandi has inflammationes pertinet, et ad nostrum institutum spectare potest. Nisi quod antequam finem hujus capiti imponamus, non erit a re nostra

alienum, si meminerimus præterea duorum medicamentorum, quæ ab omnibus priscis medicis plurimum landantur; ita ut multos eorum usu se liberasse a periculo strangulationis Gal. prædicet. Alterum est, cujus mentionem fecit sexto de Com. med. sec. loc. *stercus canis* cum ille per triduum ossibus fuerit nutritus; illud enim et album est, et fædi odores in expers: hoc ergo melle subactum tonsillis, vel faucibus illinitur; atque nunquam reperiisse medicamentum quod valentius reprimeret, et arceret imminuentem strangulationem. Id ipsum etiam præstare *stercus pueri* cibis aptis nutriti decimo de Simpl. med. fal. multos asseverasse inquit; se tamen noluisse id unquam experiri. utpote quod nimis abominandum videatur. Alterum autem medicamentum est id, quod conficitur ex *cinere hirundinum* in vase fictili operto, et bene obturato, accensisque carbonibus opposito donec in cinerem vertantur, quæ simul cum plumis, et pennis urendæ sunt; qui deinde cinis melle excipitur. Illi vero Andromachus multa alia addebat, quæ magis discutiens medicamentum reddebant. Alia vero Asclepiades, qui sylvestribus utebatur hirundinibus. Quæ omnia a Gal. eodem sexto de comp. referuntur. Alii cinerem ex nido hirundinis cum stercore combusta trahebant in usum. Sed de his nimis multa diximus; quorum si quis diligentius examen desideret, citatos a nobis Gal. libros adeat. Nos ad alia sumus in præsentia transituri.

De earumdem partium ulceribus.

Sicuti autem nulla earum, quæ intra os contentæ sunt particularum tuta est ab inflammatione, ob id quia in quacunque earum potest ingruere calida fluxio, ita etiam ab ulceribus non sunt securæ, quin aliquando, vel ex influente acri, et mordaci fluxione, vel ex vitiosis vaporibus abrasæ et veluti exesæ non ulcerentur, quorum ulcera sæpe non minus negotium medicis, et ægrotantibus facessunt, quam et inflammationes. Quare subinde post rationem curandi inflammationes, *de oris ulceribus curandis* agemus. Si modo prius ea exposuerimus, quæ cognitu necessaria sunt ad methodum constituendam, qua hæc congrue curentur. Nimirum ut ea explanemus, quæ ad naturam et causas horum ulcerum pertinent. In universum itaque oris ulcera,

quando spontaneum ortum habent, neque ab externa aliqua occasione excitantur, ut quando esset cibus aut potus adeo calens, ut vesicas, vel crustas excitaret, ut aliquid pungens, vel incidens. Sicuti quidem cum acum in ore tenerent, ejus interdum oblit, pupugerunt os; interdum etiam, dum deglutiendus esset, faucibus infixus hæsit. A nulla ergo externa causa excitatum ulcus necesse est, ut ab aliquo mordaci succo, vel a vapore ortum habeat, qui elatus ab acri, et mordaci humore ad os, et ejus partes abraserit, aut exederit. Habent autem plurimas differentias istiusmodi oris ulcera, a variis rationibus acceptas, interdum ab *ulceris magnitudine*. Aliqua enim tantum summas partes, et cuticulam particularum earum, quæ intra os continentur, occupant, ut ea sunt, quæ proprie ἀφθαί a Græcis, alchola ab Arabibus dicuntur. Quibus præsertim infantes lactentes obnoxii sunt. Consistunt enim in summis partibus, et ignei cujusdam caloris sunt participes. Unde et aphthæ dicuntur, quod vocabulum incendium quoddam significat. Alia vero *profundiora* sunt. Aliquando a diversis symptomatibus, vel affectionibus, que cum illis conjuncta sunt. Alia enim simplicia sunt. Alia vero cum erosione, alia *crustosa*, quæ videlicet crustas obductas habent illis similes, quæ ab igne vel re ignita excitantur. Aliis et *putredo* adjuncta est, et putrida ulcera appellantur, in quibus interdum putredo non uno consistit loco, sed ulterius progressa vicinas partes depascitur, quæ inde νομον, vel νομοδλην græce, depascentia ulcera Latine dicuntur. Quædam præterea inflammationis aliquam naturam sapiunt, alia potius erysipelatis. Aliquando etiam moribus ulceris accipitur differentiarum ratio.

Quatenus, aliqua κακογη Græci, Latine mali moris, aut *maligna* dicuntur; alia malignitatis expertia sunt. Plerunque vero corosiva, crustosa et depascentia omnia maligna etiam sunt. Unde in universum Gal. protulit, quod ejusmodi omnia ulcera, ad quæ pravus humor confluit, maligna sunt. Quemadmodum sæpissime solet accidere in pestilentibus febribus, ut ex Hipp et Gal. tum tertio lib. Comm, in tertia Epid., tum etiam tertio item lib. de Præsagii. expul. percipi potest; immo evidens fere signum febris malignæ, et pestilentis est, cum aphthæ, vel erysipelatis, vel inflammationis participes fauces in febricitantibus continua

febre apparent. Postremo vero et a causa, vel humore, a quo infliguntur ejusmodi ulcera, eorum accipi potest differentia. Nam (ut dicebamus) necesse est, ut acrimoniam habeat humor, qui causa sit ulceris, aut putredinis. Propterea quandoque humor, is serosus est. Unde hoc præsertim in causa est, cur aphthis lactentes infantes corripiantur, cum lac, quo aluntur, serosior sit, et majoris acrimoniae particeps. Quia vel suapte natura nutritrix sanguinem biliosum, et calidum, serosumque generet. Vel quia cibus utatur, qui sint huic sanguini gignendo, apti ut sunt allia, cæpæ, aromata, salita, vina potentiora, et id genus alia. Quamvis id aliquando evenire possit vitio infantis, potius quam nutricis quippe, qui non probe lac conficiat aut quia imbecillioris sit ventriculi, aut quia natura ingluviosior plus lactis exsugit quam ventriculi vires ferant, unde lac corrumpitur et acrimoniam ex eo vitio contrahit.

Interdum etiam, immo sæpe et a bilioso humore ad os et fauces confluyente concitantur ulcera; unde ulcera oris inter eos affectus recensuit tertio Apho. Hipp. Quæ frequentius æstate solent humana corpora sollicitare. Nonnunquam etiam ex pituita fiunt ulcera, et id duplici ratione, quia vel acrimoniae particeps est, ut quæ salsa est; sæpissime autem id evenire solet, ut destillante a capite salsa pituita, ulcerantur fauces, et reliquæ oris partes, vel etiam quia in illis partibus putrescit pituita. Sed et aliquando, fiunt a sanguine, ut quæ naturam inflammationis referre diximus, quamvis non nisi a vitiato sanguine. Interdum vero a melancholico humore, quando per assationem contraxerit acrimoniam, cum jam incipit vergere ad naturam veræ bilis atræ. Omnes autem hæ istorum ulcerum differentiae possunt visu discerni, si quis diligenter ore aperto ea fuerit intuitus, et consideraverit eorum omnia symptomata. An videlicet summas tantum partes abraserint; an vero profundiores etiam partes corripuerint; An crustuosum sit ulcus, an putridum; nam et color, et odor id facile indicabit. Si sæpius etiam fuerit intuitus, percipiet, an depascatur vicinas partes, vel consistat. Præterea et calore percepto discernet has differentias, an calido succo, vel frigido fuerint procreatæ, et magis etiam ex colore. Nam si ad flavum inclinabit ulceris color, ex bile ortum habebit. Si exquisite ruber sit, sanguinis, et inflammationis, naturam sapiet. Si

vero ad album pituitæ, ut lividus, aut nigrescens color naturam refert atræ bilis, quæ vetarescens, et putrescens, vel exusta non parum ad malignam naturam accedit. Nec modo ulceris color contemplandus est; verum et sordes, quæ ulceri succrescit. Sed et hoc præterea addamus, cujus meminit et Gal. præsertim sexto de Comp. medic, sec. loc., quod facile oritur putredo in oris ulceribus, tum ob harum partium naturam (calidæ enim humidæque sunt natura) tum etiam, quia medicamenta parum possunt in ore, et ulcerata parte consistere, et hærere; a saliva enim eluuntur, et diffluunt. Sed ad rationem curationis instituendam jam accedamus.

(*Cap. VIII, lib. V, pars I.*)

PARACELSE

Squinantia.

Squinantia est apostema, quod ex omnibus venis, quæ ab inferioribus partibus sursum aut a superioribus deorsum, ad collum in centrum concurrunt; et est apostemati carbunculo simile. Terminatur in cura (salvatione) solum in eo quod concernit locus ipse requirit. Ab eo loco producitur, in quo nascitur, et *centrum est ibidem ubi apostema*. Protenditur in circumferentiam, quantum regiones ambæ continent, colli scilicet, capitisque. In circulo nuchæ collum intumescit, ac folium etiam una rubescit. caput admodum calet. Postea maturescit, ut apostema. Postea foramen post uvam incidit; inglutitionem et ejectionem aufert. Cave tum a purgationibus, a phlebotomis et ventosarum applicationibus.

R. Carbunculus (id.) (cap. III, livr. II chirurgiæ parvæ) carbunculus est apostema quod *peculiarem locum non habet*; nam ubicumque se *realgar* ponit, ibidem fit etiam demonstratio. Est illud realgar hujus morbi *tam subtile*, ut latius et magis aliis inficiat, eoque differt etiam quod hoc loco magis in aliis rubefiat. Estque morbus qui cum febrili paroxysmo sumit initium, eaque signa continet. Ubi *foramen concipit*, sperandum est de vita, *alias non*. In carbunculo et squinantia, maxima cura est animadversio, *ne quid reprimatur*; solum extingatur et refrigeretur mundificationibus, tum demum per seipsa maturescunt..... Item colores in apostematibus occurrentes ex realgaris conditione proveniunt. Nam carbunculus rubedinem suam accipit ex realgare rubeo, non ex sanguine, venis, aut carne. Saphyrus etiam ex suo realgare Chiadus etiam, cum in eo nigredo continuatur albedo, cœruleitas et postmodum flavedo cum virriditate.

(Cap. III, liber III.)

Squinantia.

Squinantia quidem oritur ex eodem loco, ex quo nascitur apostema, ejusque centrum est in apostematis situ, qui circumferentiam utriusque regionis, nempe capitis et colli totam occupat.

Nota.

Omnis morbus in gutture proveniens, hujus loco curari debet; in confiniis alius non est investigandus.

Signa.

Si collum in circulo nuchæ tumuerit cum rubore cacuminis ejus ac *folii*, caput inflammatum sit non secus ac apostemat tumor iste maturescat, postmodum retro cacumen, foramen inciderit, inglutitionem et sputum prorsus hæc abstulerint, signa sunt ejus.

Terminus.

Si forte *balsantum naturæ* deficiat in gutture, putrescit exterius et uvulam atque folium (velum) inficit.

Cautela.

Abstineas a purgationibus, a phlebotomia et ventosis.

Cura.

Per gargarismum incarnativum curari debet squinantia, cujus descriptio talis est: mellis rosarum iiij, aristolochiæ rotundæ ac pirolæ ana $\frac{3}{4}$, aquarum de prunis vel de prunella ana vii. Fiat gargarismus; accipiatur ille in ore, et gargarizetur. Si apostema est apertum, gargarizetur ter vel quater in die. *Tunc balsamum naturale curabit.* Sed si apostema non est apertum, gargarisma non proderit. Verum si magnus esset tumor, superpone defensionem extrinsecus.

(*De apostematibus, cap. XLI.*)

De Branco.

Brancus est liquor in faucibus suum centrum ponens et sibi-met exitum facit.

Nota.

Quivis liquor scissus descendens cum a vera deflectit origine transit in *emuntorium externum* (amydalas).

Signa.

Si tumor oriatur in faucibus cum dolore capitis, et postea fiat ulceratio, brancum existere judicabis.

Terminus.

Cum branchus progreditur, *uvulæ partem* arripit, postea descendens *squinantiam generat*.

Cura.

Ejus cura est in arcanis, et aqua brunellæ curat brancum optime.

Gargarismus ad branchum.

℞ pyrethri ʒ j, succi hypericorii ʒ ij succi persicariæ ʒ iij oxymellis scillitici ad pondus omnium; commisceantur.

Aliud.

℞ liquoris minimæ ʒ j, succi persicariæ ʒ ij aceti communis ʒ iij. Fiat mixtura.

(Cap. XL.)

Squinantia Gallica.

Sed ad signa pathognomonica hujus affectus progrediam, inter quæ primum locum obtinet, gargareonis ad faucium inflammatio ac exulceratio, deinde erosio ossis basilaris ad palatum atque nares usque, sic ut quandoque *per nares* cibus potusque *reddantur*; post hæc parulides ac epulides atque musculorum laryngis inflammationes exoriuntur. Ubicumque ergo hujusmodi erosa ulcera apparuerunt, cum signis propriis, Luis Gallicæ catarrhum cum Lue Gallicæ complicatum esse dices, quamvis etiam successu temporis in subjectas capitis partes quoque grassetur; tamen signa oris, faucium et laryngis ad productionem sufficiunt. Nam hujus speciei natura ea est, ut fere sua

regione desideat. Quod si alias quippe occupare contingat, aliam speciem huic complicatam esse, potius quam hanc alio migrasse dicemus. Quandoque cum squinantia, alias cum branco, nonnunquam cum folio (prout rheuma ipsum ceciderit) coquationem habere videntur, nullumque plane Morbi Gallici genus extitit, quod celerius ac vehementius putrescat, quam rheumaticum hoc.

(*Lib. VI, cap. I, de ulceribus morbi gallici.*)

Prunella.

De Tartareo, lib. II, § 1 « Stomachus igitur et hepar ac renes non nisi ex *tartareo* laborant. Oppilatione hepar afficitur, hæc tum a substantia, tum ab aëre accedit, qui ab intestinis adhuc crassus emittitur. Pestis, *prunella*, pleuresis, sitis, hydrophobia, febres, aliæque ægritudines quæ lividum colorem inducunt, omnes hepatis sunt. *Prunellæ novus morbus* fit ex hoc aëre, ex hepate erupto, qui ad gulam usque ascendit, atque pauatim afficit...

Prunella (lib. II cap. V) est passio principalis cum paroxysmo proprio, ducens originem ex *salibus vitriolatis*, contra regionem propriam et contra testem speciei una de speciebus pleuresis et pestis cum caloribus vitriolatis (realgar).

Accedit tanquam pleuresis calor gutturis cum rubedine, et deinde *calor persicus* cum cœruleo colore, mixto nigredini et calor ut prunus; atque apostema vertitur usque ad extremitatem (radicem) linguæ, cum humoribus adustis. Prunella genus Pestis est.....

Signa (p. 57) ejus sunt quod primo in *faucibus* et lingua rubedo venit, postea niger color; tetra est regio ut in carbunculo, sicut carbones vivi fuerint vesiculas excitantes; aut sunt duo aut tres diversi colores. Hæc sunt vera signa *prunellæ*. Reliqua signa sunt in pleuresi et peste. Cura est sicut in peste. Scabenda est lingua cum panno, ut ea coccinea fit, et gargarizetur et lingua iterum scabenda erit.

....Ex resolutio arsenico fit pestis, orpimento pleuresis, sale vitrio lato prunella.

....Vidimus in castris, cum milites ex febribus ardentibus *epidemicis* linguarum asperitate laborarent, *vulneribus* asperas *cuticulas* supervenisse, similes iis quæ linguas simul molestabant, ita ut fauces et vulnera invicem referrent (*chirurgia magna. Tractatus I, cap. VI.*)

(*Lib. VII, cap. IV.*)

SENNERT

De carbunculo.

Inflammationi affinis est, et proinde post inflammationem a plerisque recensetur carbunculus, utpote qui a sanguine adusto et corrupto originem habet. Tumor autem hic variis appellatur nominibus, Græcis dicitur anthrax; Latinis carbo et carbunculus; Avicennæ Pruna et Ignis Persicus; quibus vocibus etsi diversas tumores significari nonnulli credant, et peculiaribus capitibus de Pruna et Igne Persico, de Carbunculo, ac Anthrace egerint; tamen revera, iis omnibus unicum tumoris genus significatur; quod enim Græcis est anthrax, Latinis est carbunculus. Nisi quis hoc discrimen ex Avicenna ponere velit, quod qui sine pustulis atque humiditate incipit carbunculus, Prunaque vero cum pustulis vesicisque, atque effluente humiditate incipi, Ignis Persicus dicatur.

Atque hoc nomine appellatur hic tumor, quia crustam habet, quæ instar carbonis nigra est, qua de causa etiam pruna dicitur, quod caro nigra sit et quasi a pruna adusta, et forma similis; ignis præterea, quod ab igne quasi partes comburantur. Quæ autem Celsus et Plinius de carbunculo scripta reliquerunt, vix carbunculo in genere ita quadrare videntur, sed speciei alicui et forsitan epidemio alicui et novo morbo (diphtheria, vel typhus vel pestosus morbus?).

Celsus enim, lib. V, cap. XXVIII, scribit « ab his quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est, quæ interius corrupta aliqua corporum parte nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo pejus. Ejus hæ notæ sunt: Rubor est, superque eum non nimium *pustulæ* eminent, maxime nigræ, interdum sublividæ, aut pallidæ. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridum, et durius quam naturaliter oportet. Circa quem quasi *crusta* est, eaque inflammatione cingitur, neque in eo loco levare cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget, nonnunquam horror aut febris oritur, aut

utrumque. Idque vitium subtractis quasi quibusdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum tardius; supra quoque procedens inalbescit, dein lividum fit, circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum sæpe elidit. » Plinius vero (lib. XXVI, cap. I) quo de novis omnique ævo priore incognitis morbis agit, scribit « L. Paulo, Q. Marcio censoribus, primum in Italiam carbunculum venisse, annalibus conscriptum est, peculiare *Narbonensis provinciae* malum: quo duo Consulares obiere condentibus hæc nobis eodem anno, Julius Rufus et Q. Lecanius Bassus. ille medicorum inscitia sectus, hic vero pollice lævæ manus evulso acu ab semetipso, tam *parvo vulnere* ut vix cerni posset. Nascitur in occultissimis corporum partibus, et plerumque *sub lingua*, duritia rubens vario modo, sed nigricans capite, alias livida, corpus intendens, neque intumescens, sine dolore, sine pruritu, *sine alio quam somni indicio*, quo gravatos in triduo aufert, aliquando et horrorem afferens, circaque pustulas parvas, rarius febrem, stomachum, *faucesque* cum invasit, ocyslime (celerrime) exanimans, » Quæ qui perpendit, facile alium, aut certe quid peculiare a vulgari carbunculo habentem morbum, et in gangrænam ac sphacelum desinentem describi animadvertet.

Inter *novos* et antea *incognitos morbos* eum expresse refert Plinius, et in occultissimis corporis partibus plerumque sub lingua oriri scribit, sine dolore, sine pruritu, sine alio symptomate quam somno, quo gravati intra triduum exanimentur, nullo tumore existente. Celsus vero nonnunquam etiam sine febre oriri et circa stomachum ac fauces incidere scripait. Cum vulgares carbunculi in extimis corporis partibus oriantur, gravem dolorem conjunctum habeant, et sine febre non invadunt, et locus affectus manifeste intumescit.

Sed ut ad carbunculum vulgo inter tumores notum redeamus; ille est tumor ex sanguine adusto ferventissimo, qui partem corrumpit, ortum habens.

Causæ. — Continens causa carbunculi, adstipulante etiam Galeno in lib. de tumoribus cap. VI et ad Glaucon cap. I et de methoda medendi XIV cap. X est sanguis calidus fervens et crassus; quem in libro de atra bile cap. IV et V atram bilem

(melancholiam) esse dicit. Nimirum, ut ex lib. II de differentia febr. cap. XIX, videre est, oritur carbunculus ex sanguine fervente crasso, putrescente, et in naturam atræ bilis degenerante, aut atram bilem admixtam, et plerumque malignitatem conjunctam habente. Hic tumor etsi paulatim in corpore generari, et pravam illam naturam inducere possit; tamen ubi gradum pravitatis ac malignitatis illius adeptus est, a natura ab interioribus ad exteriora a membris nobilioribus ad ignobilia subito propellitur, quod etiam accidit, ubi ab *externo contagio* sanguis inficitur, et corrumpitur, unde nunquam excitatur carbunculus per congestionem, sed semper defluxu atro facto generatur. Et propterea merito inflammationibus subjicitur, neque enim solum ex atra bile, ut cancer, generatur, sed fit ex sanguine adusto in atram bilam abeunte, vel atram bilem admixtam habente.

Generatur autem iste adustus sanguis ex prava victus ratione, cibisque pravis sanguini toti materiam præbentibus. Ad quam rem etiam facit *externa aeris constitutio* humores adurens, et corrumpens, et imprimis occulta et maligna ejus constitutio humores depravans, ac vix datur carbunculus, qui omni malignitate careat.

Differentiæ. — Quia tamen malignitas hæc nunc major, nunc minor est, et carbunculi alii in *pestilenti aeris constitutione plurimos* invadunt, alii etiam sparsim sine pestilenti constitutione ægros corripunt; distinguuntur carbunculi in *pestilentes* et non pestilentes. Deinde alii oriuntur cum pustula vel pustulis, quales ab igne excitantur, quibus ruptis subjectum est ulcus crustosum, atque id plerumque accidit, et tales in specie ab Avicenna Pruna aut Ignis Persicus vocantur. Alii sine pustulis oriuntur.

Signa diagnostica. — Incipit, ut dictum, carbunculus plerumque a *pustula exigua*. Interdum vero non solum una majuscula erumpit, sed multæ exiles, veluti milii semina, crebræ in particula residentes, quibus perruptis ulcus crustosum fit, quale a candente ferro excitatur. Antequam autem pustulæ erumpant, pruritus in partē sentitur, mox pustula aut pustulæ oruntur. Interdum tamen citra omnem pustulam incipit carbunculus, et ulcus crustosum excitatur, crusta modo nigricante, modo colorem cinereum præ se ferente; mox brevi *instar bubonum* excrescit, in rotundum, et acutum cum ingente calore dolore et ardore, quæ

præsertim circa vesperam exasperantur, ægrumque adeo vexant, ut vix manum continere possit quæ partem fricet, ex qua frictione postea pustulæ plures oriuntur. Caro circumposita effruescit, caloremque habet, et maximam phlogosin concipit, colorem etiam obtinet quam in erysipelate et phlegmone nigriorem, veluti si cum rubro aliquid nigri permixtum sit. Accedunt deinde et alia symptomata, febris nimirum, quæ ut Galenus etiam 14 meth. méd. cap. X testatur, magis infestat eos, qui carbunculo corripuntur, quam qui phlegmone erysipelatode laborant, nausea, vomitus, appetitus dejectio, tremor ac palpitatio cordis, frequentia animi deliquia, deliria, quæ omnia eo magis infestant, quo malignior materia est.

Est enim carbunculorum quædam differentia, non solum quod sanguini illi adusto, qui est causa conjuncta carbunculi, modo hic, modo ille humor admiscetur; sed imprimis quod alius carbunculus est *pestilens*, alius non pestilens. Nam licet omnis carbunculus sit malignus, ob materiam ferventem adustam et *putrescentem*, quæ *carnem corrumpendi* vim habet, et in meliorem et benigniorem naturam aliquam reverti et pene suppurari non potest. Tamen non omnis est pestilens, neque omnis adventitiam habet malignitatem, sed interdum tantum præter nativam malignitatem carbunculi, etiam alia a communi aeris statu aut contagio accedit malignitas. Discernitur autem carbunculus pestilens a non pestilenti, primo pestilente aëris constitutione præsentem. Vix enim possibile est, ut vigente pestilente constitutione oriatur carbunculus, qui non ipse sit pestilens. Deinde omnia symptomata et signa, quæ in carbunculo apparent, et frequentiora et graviora sunt in *pestilente* carbunculo quam in non pestilente. Nam et febris, quæ carbunculo adjungitur, pestilentem naturam refert, et licet extra mitior, quam in non pestilente apparet, imo interdum vix percipitur; tamen intus magis urit et longe est periculosior. Color floridus faciei mutatur, lingua nigricat et sicca est, excrementa alvi sunt liquida et biliosa, appetitus dejicitur; adest nausea, vomitusque pessimorum humorum, difficultas spirandi, anhelitus fœtor, sudor est multus, tepidus vel frigidus. Somnus interdum plane profundus est, interdum vigiliæ infestant; deliria comitantur, animi deliquia et syncope. Quapropter etiam ab alio carbunculo plus

imminet periculi, ab alio minus. Etsi non omnis carbunculus sit perniciosus. Tamen ut testatur Galenus 3 epid. comm. 3. t. 12 perniciosissimus est pestilens, seu is, qui ultra privatam malignitatem eam quoque, quam aëris status affert, adjunctam habet, et perniciosis illis symptomatibus est stipatus. Quæ si plurimum remittunt, salutis aliqua spes superest; si vero non adsunt magis intenduntur, et vehementiora fiunt, nihil salutis sperandum est.

Prognostica. — 1° Quo *nigrior* est carbunculus, eo pejor, utpote qui a sanguine maxime corrupto productus est. Huic proxime succedit *lividus*, et *flavescens*. Minus maligni et formidandi sunt, qui colorem *rubicundum* habent, in quibus nimirum sanguis suam naturam nondum plane exuit, sed adhuc aliquid nativi caloris et coloris retinuit.

2° Sunt etiam illi carbunculi minus perniciosi, qui sunt *parvi*, quam qui sunt magni, et ex parva pustula subito ingentem magnitudinem acquirunt.

3° Sicut et illi qui soli sunt, quam qui alios carbunculos conjunctos habent.

4° Exitiosi valde sunt illi, qui ubi erubuerunt, mox iterum evanescent. Materia enim translata ad partes interiores interitum affert.

5° Considerandum et hoc nonnulli censent, an pestilens carbunculus ante febrem oriatur, an vero præcedente febre pestilenti demum erumpat. Eum enim qui ante febrem pestilentem erumpit, tutiorem esse existimant, modo nulla symptomata superveniant, utpote qui indicio sit, naturam esse fortem, et pestilens venenum ante febrem propellere, priusquam cor occuparet potuerit. Illum autem qui post pestilentem febrem demum erumpit, esse periculosiorem, utpote qui occupato corde a veneno et humoribus pravis in universum corpus sese jam diffundentibus, oriatur.

6° Locus quoque plus vel minus periculi metuere jubet. Mali enim habentur, qui in emunctoriis, et prope membra nobilia et præcipua hærent. Imprimis autem hic vires spectandæ, et vitendum an sint fortes vel debiles. Debilis etiam virtus a parvo etiam morbo prosterni potest.

(Cap. XIII, lib. V, pars I.)

De aphtis et inflammatione tonsillarum apud pueros.

Aphta. — Oriuntur in ore infantium sæpe ulcera quædam, quæ aphtæ vocantur, ortumque habent ex *lacte vitioso, vel in infantium ventriculo corrupto*. Cum enim partes oris internæ in infantibus sint molles ac teneræ, nec in utero ulli cibo assuetæ, si lac non sit plane dulce, sed *acre ac vitiosum*, facile ab eo exulcerantur. Idem accidit, si ex lacte in ventriculo corrupto vapores acres ascendant, idque eo facilius, cum tunica, quæ fauces investit, œsophago communis sit, et facile vitia ventriculi per eam faucibus communicentur. Horum cum quæ de aphtis dici possunt, omnia fere (lib. 2, part. I, cap. 18) proposita sint, eorum saltem hic mentionem facere volui; reliqua inde petantur.

Vesicula gingivarum. — Cognatæ sunt aphtis, vel fere eadem cum aphtis, vesiculæ, quæ in gingivis infantium interdum oriuntur, habentque enim ortum ex *lacte corrupto* vel vitioso, atque eadem etiam eas curandi ratio est: lentium excorticarum q. v. pulverisentur, et masticentur, et gingivis illinantur; fac linimentum.

Inflammationes tonsillarum. — Inter puerorum morbos Hippocrates, 3 aphorism. 26, et tonsillarum inflammationes recenset, de quibus quidem in genere, lib. 2, part. 1, cap. 22 actum, pauca tamen hic addam. Paristhmia tonsillæ dicuntur, et proprie locum affectum significant. Loco tamen allegato Hippocrates pro ipso affectu accipit, seu tonsillarum inflammatione. Equidem et infantibus, ut Hippocrates, de dentibus scripsit, dum dentiunt, tonsillæ inflammantur et exulcerantur; idem tamen alleg. aphorismo presbuteroisi, pueris jam grandiusculis, id est, ut Galenus, in com. explicat, ab undecimo ad decimum tertium annum progredientibus, malum hoc familiare esse scribit; quia tum vis expultrix fortior fit, quam fuit in prima infantia, et partes istæ, jam non amplius ita molles manent, sed humorem affluentem facilius retinent, cum antea, cum molliores erant, eum facile transsudare, et in fauces defluere paterentur.

Curatio ex allegato parte patet. Danda nimirum opera, ut alvus laxior sit, et, si opus sit, clystere movenda. Postea in principio repellentia adhibenda, deinde resolventia admiscenda, tandem sola fere usurpanda. Quæ commodissime in adultis forma garga-

rismi, et collutione oris usurpantur. Verum cum infantes minus adulti talia commode usurpare non possint, locus affectus illinendus melle rosaceo, sirupo de rosis siccis, myrtino, granat. diamoron, rob. nucum, prout morbi status postulat. Extra vero collum infantis illinendum oleo amygdalino, chamæmelino, hyperici. Reliqua allegato loco videantur.

(*Cap. XIII, de morbis infantium.*)

De tonsillarum inflammatione et ulceribus.

Glandulæ duæ utrinque ad radicem linguæ paulo supra laryngem positæ sunt, quæ latinis Tonsillæ, vulgo a figura Amygdalæ, Græcis *αντιades* et *παρισθμια* vocantur, cum quod inter se oppositæ, tum quod circa isthmum oris sitæ sint. Antiades dicit Galenus 3 de sympt. causis, cap 4 et in lib de tumoribus p. n. cap. ult. sunt illarum glandularum tumor aut inflammatio; *παρισθμια* inflammatio eorum, quæ circa isthmum sunt locorum. hoc est partium, quæ os et gulam interjacent.

Tonsillæ igitur cum conditæ sint, ut congregata saliva laryngem et tracheam irrigent sæpe humore nimio ex frigida destillatione oppletæ intumescunt, sed sine inflammatione, ita ut colorem suum naturalem retineant, et dolore careant.

Interdum vero eas occupat inflammatio cum rubore, ardore ac dolore, et siti, et cum quadam deglutitionis ac respirationis difficultate. Qua inflammatione in abcessum degenerante pus intra fauces effunditur, unde sæpe ulcus sordidum et graveolens relinquitur.

Fiunt tamen ibidem ulcera citra inflammationem, ex destillatione salsa vel acri molles illas partes exedente, aut tali habitu eo ascendente; quod lue Gallica infectis familiare est.

Nonnunquam maligna et serpentina ulcera in iis partibus oriuntur, tempore imprimis veris, et pestilente aëris constitutione (Aëtius tetra bibl. serm. 4. cap. 46) sive ex præcedente inflammatione efferata, sive ex quavis alia causa, ut ex aphtis in pueris et adultis, qui pravis humoribus abundant.

Interdum etiam tonsillæ plane indurantur; unde Mercurialis, de Morb. pueror. lib. 2. cap 12. Paulum Æginetam sub tonsillis etiam scrophulas seu tumores duros et scirrhusos complecti

scribit. Vide etiam historiam tumoris ejusmodi canerosi, apud Guilhel. Fabricium, centur. 3. observ. 84,

Causæ.

Causæ eædem sunt, quæ inflammatione gurgulionis concitatur scilicet inflammatione tonsillarum ex affluxu humorum ad illas; qui cum calidi sunt, partes illas calidas et humiditas inflammant, in iis præcipue, qui multo sanguine abundant; cum copiosi, tumefaciunt; cum acres et salsi, erodunt.

Et quidem tonsillæ magis obnoxie sunt inflammationi, quam gurgulio, propter mollitiem et laxitatem substantiæ et temperamenti proprii ac loci caliditatem ac humiditatem.

Inflammatione etiam tonsillarum magis laborant, qui sanguine magis abundant. Privatim vero, ut Aetius scribit lib. modo citato, cap. 45, pueris hoc malum frequens est, ob teneram corporis et pravam qualitatem.

Puellis quoque usque ad menstruæ purgationis tempora hoc malum frequens est. Aretæus lib. 1 cap. 9. In adultis vero generatur hoc malum ex nimia meri potatione, ac multa et avidiore devoratione, ciborum maxime acrium et asperorum. Ita cerasa avidius comesta facile aciditate sua tonsillarum inflammationem et gurgulionis laxitatem efficere perhibentur.

Signa diagnostica.

Tonsillis tumefactis foris sub maxillis tumor tactu visuque deprehenditur, et intus seu frustulum quoddam faucibus adhærescens mole sua premit obstatque, ne facilis fiat deglutitio, idque sine siti et ardore.

Inflammati iisdem præter deglutiendi, et quod Paulus addit, lib. 6 cap. 30, respirandi difficultatem, dolor adest, rubor, ardor, sitis interdum et febres.

Maligna tonsillarum *ulcera* partim alba sunt, maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis quæ ferro inuruntur. Accidit ergo siccitas in deglutiendo, et suffocatio confertim incidit, maxime cum rubor subit mentum; aut, ubi hæc acrimonia præterierit, *νομή* loca illa infestans succedit, et cum hac putrefactio, ut docet Aetius, tetrabibl. 2, serm 4, cap. 46.

Prognostica.

1. Tonsillarum inflammatio morbus acutus est, et sæpe suffocationis periculum minatur.

2. Tumor autem vel resolvitur, vel suppuratur, vel induratur.

3. Tonsillæ in febribus denigratæ et arefactæ mortem imminere portendunt.

4. Ulcera tonsillarum quædam familiaria sunt et mitia, quæ scilicet sunt munda, exigua, non alte descendunt, nec inflammata, nec dolorem excitantia; quædam aliena et pestifera, quæ lata sunt, cava, quodam concreto humore albo, aut nigro sordentia, quæ aphthæ etiam nuncupantur; quod si concreta illa sordes altius descenderit, eschara gignitur, quam rubor insignis, inflammatio, et venarum dolor circumsistit, sicut in carbunculo. Exigua quoque et rara exanthemata oriuntur, quibus supervenientia alia in unum ulcus coalescunt, latumque ulcus efficiunt. Id si interius in os depascendo serpit, columellam exedit, et linguam quoque et gingivas ac alveolos dentium occupat, unde dentium phlegmonode erumpit atque non multis post diebus phlegmone, feбри, fœtore, inediaque consumpti intereunt.

5. At si in pectus per tracheam id malum invadat, eodem illo die strangulat; pulmo enim et cor neque talem odoris fœditatem, neque ulcera neque serosos humores sustinet, sed tussis ac spirandi difficultas enascitur (Aretæus lib. I, cap. 9).

6. Tonsillarum ulcera sine febre securiora sunt.

7. Tonsillarum ulcera æstate suborta pejora sunt, quam quæ aliis oriuntur temporibus. Cito enim serpunt.

8. Serpentina circa fauces ulcera, quæ magnam molestiam exhibent, et acuta magis sunt, ut plurimum spirandi difficultatem adferunt. Videantur plura ejusmodi prognostica apud Hippocratem, lib. de dentitione.

9. Glandulæ istæ facile indurantur, et in scirrhum degenerant, qui nunquam aut raro curatur.

10. Aliquando tonsillarum tumores suppurantur et abscessus extra erumpunt, et ægri sanantur: cujus rei exemplum est apud Dodonæum, in observ. cap. 16.

(*Pars I, cap. XXII.*)

De angina.

Angina latinis ab angendo, quæ vox a Græco ἀγγω, id est, suffoco et strangulo, deducitur; Græcis Συναγγη et Κυναγγη, et masculina terminatione, ut ab Hippocrates, lib de loc in homine et 4 de rat vict, in acut aphor. 30 usurpatur Συναγγη et Κυναγγη eadem etymologia, a suffocando scilicet dicitur. Etsi enim ut postea in differentiis dicetur, posteriores Græci inter Græcas voces, dum per σ, Συναγγη et per κ Κυναγγη scribitur differentiam quandam constituerint, et κυναγγην quam a canibus ita appellari censent, seu quod canibus familiaris sit, seu quod ægri hiant ore et exerta lingua spiritum ducere cogantur, canum per æstum sitientium more, pro graviori affectu habeant; Συναγγην vero, quam dictam putant, quod *sues* ea frequenter corripiantur, pro leniore malo: tamen Galenus, 3 prognost. text 18, hanc de litteris contentionem tanquam inutilem contemnit; quod et 4 de vict. rat. in acutis. text. 30 facit.

Etenim et Συναγγη et Κυναγγη apud Hippocratem et antiquissimos medicos Græcos, generale nomen est quale apud latinos angina, quod in genere sumptum omnem faucium et gutturis affectionem, spirationem, nullo in thorace vel pulmone vitio existente, difficiliorem reddentem et deglutitionem impredientem, significat. Etsi enim per morbos thoracis, pluritudinem, peripneumoniam et alios respiratio lædatur: tamen affectus ille angina non dicitur, cum illæsis faucibus fiat. Hippocrates tamen interdum distinguit inter faucium inflammationem et anginam. Ita, 6. epid. sect. 7 t. I inquit: Quibusdam vero faucium inflammationes aderant, aliis angina. Ubi procul dubio per anginam intelligit inflammationem musculorum laryngis, quæ respirationem difficilem valde reddit, et viam spiritus intercludit; inflammationem vero faucium, partium aliarum vicinarum, quæ spiritus et cibi viam non ita intercludit. Possunt enim et tonsillæ, et musculi ossi hyoidis, et musculi in radice linguæ inflammari, ut postea dicetur, quæ partes omnes etiam in faucibus sunt: quia tamen harum partium inflammatio a gutture longius distat, anginam per se non parit. Anginæ ergo in genere ita sumptæ causa erit, quicquid spiritus cibique et potus viam angustiolem reddere, et hoc modo utriusque meatus

capite et principio quasi occluso respirationem difficiliorem reddere, et deglutioni cibi ac potus impedimentum esse potest.

Quod cum pluribus de causis fieri possit, duplex angina statuitur, una proprie dicta et *exquisita*, quæ est ab inflammatione summarum gulæ et gutturi partium, sanguine et venarum jugularium ramis in partes illas effuso; altera *notha*, quæ provenit a frigida et pituitosa destillatione, et capite in fauces, et cervicis ac nuchæ musculos decumbente, et tumorem διδηματωδῆ sine febre rubore ac dolore excitante; etsi dum primo fluxio concitatur, quidam inæquali, calor et horror sentitur, qui tamen paulo post desinit.

Post tamen et illa in faucibus inflammatio, quam Hippocratem ab angina discernere diximus, forsitan angina notha appellari, et ita duplex angina notha constitui, una ratione causæ, altera ratione subjecti. Nam harum partium inflammatio sæpe etiam respirationem et deglutionem non parum lædit.

Quo etiam referri potest angina illa, quæ fit a luxatione vertebrarum cervicis versus anteriora, vel latus, sive a causis externis sive ab humore frigido affluente fiat, itque citra inflammationem.

Si enim inflammatio accedat, vel ab inflammatione luxatio ortum habeat, ad exquisitam anginam pertinet, et acutissima angina est, ut postea de differentiis dicetur. Videatur etiam infra quæst. 1.

De angina exquisita.

Angina ergo exquisita est angustia summarum gulæ et gutturi partium seu faucium, ab inflammatione earundem ortum habens, difficilem respirationem reddens, deglutionemque lædens. Seu est inflammatio in faucibus et summo gutture, angustiam earundem partium, et hinc difficultatem spirandi inferens, ac deglutionem impediens. Seu, ut Galenus breviter definit, 4. de rat. vict. in acut text. 20 et 2 ad Glaucon. cap. 1 est φλεγμονὴ τῶν φαρινγος φυσικῶν μεσῶν. Per fauces autem intelligitur pars, quæ gulæ et gutturi præjacet, et duo dictorum meatuum ostioli comprehendit. Imo ut supra dictum, φαρυγξ etiam pro larynge et summo asperię arterię capite accipitur, ut ita, dum Galenus anginam per inflammationem pharyngis seu faucium definit, non

solum intelligenda sit ea pars, quæ gulæ et gutturi præjacet, sed ipse etiam *larynx* ejusque muscoli. Et quamvis simul vicina complecti soleat inflammatio, ut glandulas utrinque circa radicem gutturis ad latera trachæe positas, et musculos ossi *hyoidis*, musculos item in radice linguæ, et glandulas, quæ tonsillæ dicuntur, et quæ sub auribus et inferiori maxilla consistunt; tamen partium harum a gutture longius distantium inflammatio, anginam non parit, nisi malum faucibus, id est, parti gutture et gula constitutæ communicatum, respirandi impedimentum afferat.

Dodonæus etiam anginam statuit ex inflammatione pulmonem fieri; de qua postea in differentiis de Cynanche dicetur.

Causæ.

Ergo causa ut aliarum inflammationum, ita et hujus in angina, est sanguis seu purus, seu biliosus, pituitosus, aut melancholicus. Et is quidem e venarum jugularium ramis in has partes effusus. Nam frequentissime sit hoc malum per viam ductionis, raro per viam congestionis.

Affluit autem sanguis vel per modum attractionis, si fauces et guttur vehementer caleant et doleant; vel per modum transmissionis, si loca illa imbecilla sint, laxa, et ad suspiciendam fluxionem idonea; pleonexia vero humorum adsit sive in toto, sive in capite, ac imprimis circa fauces. Ubi enim sanguis vel copiosus in corpore adest, vel impurus atque is ad caput fertur, cerebrum vero robustum est, id cum non recipit, sed maximam partem per easdem venas ad subjectas partes retrudit, unde inflammationes earum variæ gignuntur, parotides, ophtalmiæ, anginæ et similes. Hinc etiam juvenes senibus angina crebrius corripuntur, quod multo biliosoque sanguine, qui aptissima hujus mali materia, abundant, et qui habitu corporis sunt crasso, ac multo sanguine, præsertim in capite, abundant. Viros quoque frequentius quam fœminas angina corripitur, ex Cælio Aureliano statuitur; idque videtur observasse Hippocrates 6 epid. sect. 7, t. 1, ubi epidemiam sui temporis constitutionem describens, qua angina tussis, peripneumoniæ vagabantur, paucissimas fœminas ægrotasse scribit. Aliam tamen causam non reddit Hippocrates, eo ipso in loco quam quod non perinde

atque viris in publicum prodibant, et ita aëris externi injuriis sese non objiciebant; id tamen quod dicitur, feminas minus ex sua natura anginæ esse obnoxias, quam viros, de vera et exquisita angina intelligendum. Habent enim fœminæ sanguinem frigidiorē, et præterea laryngem minorem, ac gutturis partes et venas angustiores exilioresque, quæ sanguinem non ita facile admittunt. Interim tonsillarum, columellæ, ac laxarum in faucibus partium inflammationibus (quæ minus exquisitam seu notham anginam quam Hippocratem loco allegato, simpliciter faucium inflammationem appellare, et ab angina distinguere diximus gignunt) ob partium laxitatem, et excrementitiorum humorum abundantiam magis obnoxie sunt, quam viri. Ad pleonexiam etiam humorum, quæ anginam excitat, cumulandam faciunt hæmorrhoides et menses suppressi, victus ratio multo et calido sanguini generando apta, potus vini meracioris.

Sæpe quoque angina accidit in febribus, ubi materiæ pars ad hunc locum depellitur, ut ita febris tum potius comitata sit quam appellant, quam *symptomatica*, talesque anginæ sunt fere *epidemiæ*, quæ nonnunquam publice grassantur, qualis fuit illa, quæ anno 1516 multos sustulit, ut annotavit Forestus: lib. 6, obs. 2, in schol. atque illa, quæ anno 1554 et 1545, plurima Germaniæ inferioris loca; Rhenique regiones vexavit. Sunt enim quandoque etiam anginæ, ut pleuritidis, peripneumoniæ, et similes morbi, *epidemiæ*. Nam etsi humores qui morbos epidemios excitant præcipue si non pestilentes sunt, et imprimis a fluxionibus provenientes, a manifesti aëris alterationibus, frigiditatisque et caliditatis, ac humiditatis excessu proveniant; tamen occultæ etiam qualitatēs, ab *astrorum influxu* pendentes miscentur. Atque hinc accidit, ut nunc ad laryngem et fauces, nunc ad pleurem, nunc ad pulmones humores fluant, ibique subsistant, nunc ad alvum perveniant.

Externæ causæ sunt, quæcumque fluxionem humorum ad istas partes concitare valent, quales sunt pluviosa anni constitutio, et imbrēs assidui, ut est 3 aphor. 16. Ἀμείνεια item quæcumque caloris et frigiditatis in aëre et ventorum flatibus, quorum hæc comprimendo expellit humores ad guttur et fauces, illa laxata facit, ut humores ad fauces affluant. Præterea subita a magno æstu refrigeratio, haustus plenus potus frigidis

simi, lotio capitis intempestiva pleno corpore, nimia capitis tectura vel nulla, vocis nimia intentio, denique ictus capitis cervicis, aut locorum prope fauces, infixæ in faucibus vel gula spinæ vel ossicula, ut et vertebrarum cervicis luxatio; si nimirum non solum ipsa angustiam in locis istis pariat, sed et inflammationem excitet.

Quidam etiam a cibis quibusdam et medicamentis, peculiari proprietate anginam induci statuunt, ut cerasis, fungis quibusdam, andacocha, ut habet Avicennas, quæ trifolii species est, quæ scilicet in se vel vim suffocandi, vel qualitatem aliquam laryngi et faucibus occulto modo adversam habent, easque sanguinis inflammationem excitatura suspiciendo aptas reddunt, aut quocumque modo has partes vellicant et offendunt et sanguinis ad eas affluxui occasionem præbent, sicut cantharides vesicæ peculiari modo adversæ sunt. Verum de hoc dicetur infra, quæst. 3. Nonnulli huc etiam referunt eam suffocationem, cujus Aretæus, lib. 1, passim acut, cap. 7, meminit, quæ accidat ex spiritus ad calidissimum et siccissimum conversione; quod aliqui de aëre illo crasso, qui e carbonibus accensis et musto ac cerevisia fervente attolitur, explicant. Verum ut postea, in quæstione 1 dicetur, non loquitur Aretæus de causa extrinsecus adveniente, sed intrinsecus hærente, ubi vitium præcipue est in pectore.

Non tamen ista suffocatio huc pertinet, sed ad respirationem læsam, ut postea dicetur. Neque enim omnis suffocatio angina dicenda est; alias enim et catharri suffocativi ad anginam reducendi essent, sed ea saltem, ubi nullo in pectore vitio existente (quod tamen in suffocatione illa ab Aretæo descripto accidit) ob faucium inflammationem suffocationis periculum imminet. Unde nec ardor in faucibus, qui in febribus ardentibus percipitur, et vulgo die Breune nominatur, cum scilicet fauces et lingua exsiccantur, exasperantur et denigrantur, angina nominandus est.

Differentiæ.

Differentias anginæ quatuor recentiores Græci, ut ex Galeno 4 de loc. affec. cap. 3, et Paulo Ægineta, lib. 3. cap. 27 et Traliana lib. 4, cap. 2 videre est, recensent. Inflammantur enim seu φαρυγξ, id est, gulæ musculi; seu laryngis id est, gutturis seu

capitis tracheæ arteriæ; sæpe etiam quæ utramque hanc partem connectunt. Has ergo differentias ut recentiores Græci etiam vocabulis distinguerent, generica illa vocabula *κυναγχη* et *συναγχη* cum aliis specierum nominibus destituerentur, certis differentiis accomodaverunt.

Prima differentia nomine generis *συναγχη*, ita dicta, ut auctoribus placet, quod suibus sit familiaris (quæ tamen differentia Græcæ linguæ analogiæ non respondet, ideoque potius a præpositione *συν* *αγχω* nomen hoc deductum videtur) nominatur; ubi interni faucium musculi vel ambitus faucium interior inflammatur, cervice quoque ad linguæ radicem simul comprehensa, et tumore foris ac intus apparente.

Secunda *παρσυναγχη* ubi externi faucium et colli musculi linguam et os hyoides contingentes, et qui œsophagum firmant ac retrahunt, sunt inflammati, sese nonnunquam etiam ad pectus diffundente.

Tertia *κυναγχη* ita dicta, quod canes ea frequenter corripiantur, aut quod homines ea laborantes, veluti canes sitibundi linguam exserant, cum inflammatio in internis laryngis seu gutturis musculis delitescit, et neque intus neque foris in cervice tumor apparet; unde etiam latens angina appellatur, tantusque est dolor, et spirandi difficultas tanta ut æger erecta cervice et ore hiant lingua exserta, canum sitientium more, spiritum trahere cogatur.

Cujus generis et illa est angina quam describit Galenus 4. aphor. 35, cum inquit, nullo, neque ore multum aperto in faucibus, neque extrinsecus tumore apparente, æger deglutire non potest. Symptoma enim perniciosum est, ob inflammationem musculorum gulæ substratorum, interdum vero ob gulæ ipsius morbum. Est enim partibus illis per nervos et ligamenta commune quid et societas cum spinali medulla, et membranis ipsam ambientibus, ac postea hisce extrinsecus adjacentibus vertebrarum ossibus. Cum itaque ad partes inflammatas ligamenta et nervi tenduntur, vertebrae quoque vel intra, vel ad latus, trahi necesse est. Nam si in altero tantum nervorum exortu tensionem fieri contigerit, ad latus; si in utroque et intra, fiet vertebrarum distorsio.

Hoc loco facienda est mentio anginæ, quam describit Remb.

Dodonæus, cap. 18, quam etiam latentem appellat, in qua circa laryngem et asperam arteriam talis dolor fit, ut nec contingi, quantumcunque leniter, citra gravissimum dolorem queant, sed nec moveri sursum, nec attolli. Quamobrem non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed et cibus et potus ægerrime, aut non demittitur. Inflammari autem statuit Dodonæus per hujusmodi anginam non interiores ac latentes laryngis musculos (id quod sectione se deprehendisse scribit) sed *pulmonem*.

Verumenimvero nulla est angina proprie dicta sine muscutorum circa laryngem inflammatione. Itaque morbus, quem describit, vel non fuit angina, sed peripneumonia, quæ tamen ob communem membranam laryngem et vicinas partes in consensum trahit, unde respiratio et deglutitio fuit læsa; vel fuit angina, quæ tamen subito in peripneumoniam gravissimam mutata est.

Quarta est παρακυνναρχη, ubi externi præcipue gutturis musculis inflammantur; tumor tamen intus manifeste conspicitur, ore diducto, et lingua depressa. Et cum hæc quarta differentia, nisi medicamentis occurratur, facile in κυναρχη degeneret, et si affectus augeatur, etiam interni tandem muscoli inflammantur; Galenus, 4 de loc. affect. cap. 3. in hac differentia tam externas, quam internas gutturis partes affici scribit. Verum istam accuratorem nominum distinctionem a posterioribus Græcis introductam, Galenus, loco modo allegato et 3 prognost. aph. 18. non magnificat, cum omnis angina sit faucium, id est partis ex gutture et gula constitutæ, inflammatio; et Hippocrates uno κυναρχη nomine omnes istas differentias complexus est. Non prætereundum tamen Hippocratem, lib. III de morbis, etiam in nominibus quandam differentiam observare, et duas anginæ species ponere: una quæ quæ sit angina gravissima, et altera quæ mitior sit.

Præter enumeratas istas quatuor anginæ differentias Galenus 4 de loc. affect. cap. 3. addit quintam, ex 2. épid sect. 2. ex luxatione vertebrarum cervicis, quæ tamen potius ad anginam notham referenda est, nisi inflammatio ipsi conjungatur. Fit autem, ubi cervicis vertebrae ad anteriora luxatis fauces comprimuntur, cavo pene in cervice apparente. Quod occidit vel a causis externis, ictu, casu; vel ab affluxu humoris pituitose vincula ver-

tebrarum laxantis, et vertebrarum internodia lubrica reddentis, aut copia sua vertebrae sede sua dejicientis; vel a vicinis musculis inflammatis quibus vertebrae ad anteriora trahuntur. Atque ubi anginae conjungitur inflammatio, vera angina est, dolorque etiam foris ad contactum in cervice sentitur. Vide Hippocratem, 2 epidem. sat. 2. Galenum 4 de locis affect. cap. 3.

Aetius qui quatuor illas differentias in tres contrahit, hanc vertebrarum ad anteriora luxationem quartam numerat eamque proprie *κυναγχήν* a veteribus appellatam ait, quoniam lingua a luxata vertebra juxta radicem suam a proprio loco depulsa, aeger hians ore ac exerta lingua spiritum ducere cogitur, canum per aëstem sitientium more.

Sunt et aliae quaedam anginae differentiae, quod scilicet inflammatio alia major, alia minor est; unde etiam majus vel minus periculum expectandum et quod alia est a sanguine puro, alia a sanguine cum aliis humoribus mixto; ut et quaedam epidemia est et maligna, alia malignitatis expers.

Signa diagnostica.

Anginam exquisitam ex iis, quae hactenus dicta sunt, cognoscere non ita difficile est. Verum cum sit morbus periculosus et peracutus, qui celeri suo motu saepe omnem medici diligentiam superat, utile est etiam imminentis signa cognoscere ut omni modo ejus incrementum praecaveatur.

Si qui ergo sine manifesta causa collum vix movere vix deglutire potest, ac difficulter spirare incipit, et dolorem ac calorem insuetum circa fauces percipit, anginae imminentis suspicio est, praesertim si tempus verum et pluviosum ac humidum sit, aut angina alias populariter grassetur.

Præsente autem angina, in quacumque etiam parte sit, adsumt imprimis duo: primo difficilis respiratio, citra aliquod thoracis ac pulmonis vitium, ita ut saepe et suffocationis periculum immineat; unde Plautus, in Mostellaria, act. 1. 3. v. 61.

« In anginam ego nunc me velim verti, periculosissimam.

« Faucium obstructione enecentem.

In qua deglutitio difficilis, adeo ut nonnullis potus per nares resiliat. Necque enim deglutitio solum oesophagi ministerio perficitur, sed etiam muscoli duo a larynge exorti, oesophagici dicti

ac circulatores, quod suis fibris transversis semicirculum imitantibus œsophagum complectantur, cibi et potus deglutitionem atque ad inferiora detrusione adjuvant, dum laryngem deglutitionis tempore sursum trahunt, ut descendentis cibo locum concedat; præterea etiam muscoli faucium, dum ad suum principium contrahuntur, cibum ad œsophagum detrudunt. Hi ergo muscoli cum in angina afficiantur, non mirum est deglutitionem lædi. Postea dolor circa guttur et fauces percipitur, rubor item et calor, plerumque et tumor, febris adest continua. Lingua ipsa intus tumet et rubet, et quodammodo coarctata est, unde etiam ejus motus impeditur.

Etsi enim in angina notha, quæ fit ab humore pituitosa fauces occupante, febris non semper adest; in angina tamen exquisita febris continua semper adest; seu ut symptomatica ex inflammatione generetur, seu sit primaria, cui angina accedit.

Differentiæ quoque non difficulter patescunt. In synanche est minor respirationis difficultas, deglutitionis vero maxima, ut etiam liquida vix transire possint, sed potus fere per nares rejiciatur. In parasynanche, inter omnes differentias, respirationis difficultas minima est, et rubedo foris in cervice conspicitur, dolorque percipitur, si locus contrectetur, cum inflammatio foras vergat. Interdum etiam pectus rubet, quia ibi prorepunt duo muscoli ad cartilagineum scutiformem. In cynanche vero, neque in faucibus intus, neque extra in cervice, quicquam ruboris vel tumoris apparet, et tamen fauces vehementer interim dolent, cum metu strangulationis, ita ut æger erecta cervice, et aperto ore spirare cogatur, lingua est livida et nigra, et ut scribit Hippocrates, 4. de rat. vict. in acut. inflexa vel retorta, ob summam venarum circa linguam repletionem; adest quoque febris acuta. Seu, ut Hippocrates, 3 de morb. describit: ex angina dicta homo suffocatur, et fauces magis occupata videtur, ut neque salivam, neque aliud quicquam deorsum trahat, oculi affecti sunt, et veluti iis, qui strangulantur, prominent, et per eos contente intuentur, neque eos convertere potest, crebro se jactat et exsilit, fauces et facies incenduntur, ac etiam collum. His vero qui intuentur, nihil mali habere videtur, et visus atque auditus hebescit, nihilque præ suffocatione intelligit, neque quid dicat, aut audiat, aut faciat, sed jacet ore hiantes salivam effundens. In

parasynanche respiratio non est tam difficilis, nec dolor tantus, et rubor ac tumor aliquis intus circa faucesprehenditur. Si ex luxatione sit angina, plerumque id accidit a causis evidentibus, et violentia. Postea et si sit ab inflammatione et accessu humorum,prehenditur ex inspectione cervicis. Cervix enim circa primam et secundam vertebra excavatur, ob depressam vertebra, et difficilis redditur respiratio, ob angustiam faucium ex compressione. Videatur etiam Hippocrates, 2, epid sect. 2 ubi incipit: *ἡδε των φλεγματικων παθηματα ταδε*, etc. Egregie enim et prolixè eo loco describit Hippocrates, *σκολιωσ.* et *λορδωσ.* inclinatione et perversione oritur; quem locum propterea Galenus, lib. 4. d. loc. aff. cap. 3 dignum judicavit, ut commentario explicaret. Videatur etiam lib. 2. prorrh. comm. 2.

Signa causarum et humorum ex aliis locis patent. Sanguis abundans ex habitu corporis, aliisque signis cognoscitur, adest major distentio, color faciei est rubicundus, faciesque ruborem et calorem habet insignem. Si adsit bilis, ardor et dolor major est cum siti, oris amaritudo, et morsus circa guttur. Si ex pituitoso sanguine sit, dolor minor est, febris exigua, tumor citra insignem ruborem. Et, ut Galenus, 4. aphor. 34 et 4 de rat. vict. iu acut. t. 30. docet, sanguis biliosus plerumque laryngis prius musculis quam faucium, seu gulæ inflammationem, et glandularum, quam laryngis excitat. Cum enim laryngis venæ sint exiles, in eas nonnisi sanguis tenuis penetrat; crassus vero, qui eas penetrare non potest, in faucibus potius et glandulis subsistit. Anginæ etiam biliosæ maxime æstate et autumnoproveniunt: quod in æstate bilis generatur, et in autumnoretinetur, quæ æstate genita est, at pituitosa fere fit ex pituita hyeme genita.

Prognostica.

1. Angina, teste Galeno, I aphor. 12 et 2, aphor. 19. Tral-
liano, lib. 4, cap. I. Celso, lib. 4. cap. 4. pestiferum acutumque
malum est, quod celeriter ad finem properat, vel periculo non
caret, ægrosque laquei modo strangulat et suffocat. Etsi enim
pars absolute princeps non afficiatur; ea tamen pars afficitur,
sine qua cor, membrum nobilissimum, salvum esse non potest;
quæ scilicet destinata est respirationi, et simul deglutationi in-

servit, quorum neutro homo carere potest. Adest simul febris continua, quæ et cordis, et ipsius corporis vires labefactat, ideoque Galenus, I aph. 12. hoc modo laborantibus salutis spem in virium robore consistere scribit. Et suffocatur plerumque æger, vel quia tumor eousque crevit, vel tanta facta est vertebrae colli luxatio, ut faucibus coarctatus spiritus plane percipiatur, vel quia rupto tumore pus in pulmones ruit, eosque implet.

2. Et quidem quo major est faucium et gutturis angustia, eo periculosior est angina, præsertim, si febris et ipsa sit acuta. Atque ita *κυνάγχη* a posterioribus Græcis in specie descripta omnium periculosissima est et gravissima, quæ intra unam diem, plerumque intra 4. jugulat: de quo Hippocrates, 4. aphor. 34. Si febrem habenti suffocatio repente superveniat, nullo tumore in faucibus existente, lethale est. Et 3. prognost. 16. et in Coacis: Anginæ gravissimæ sunt, et celeriter interimunt, quæcunque nihil conspicuum faciunt in faucibus, neque cervice, plurimum vero dolorem inferunt, atque orthopnœam. Hæc enim in eodem die, et secundo, tertio, et quarto, strangulant. Neque enim tum parvitas mali significatur, quod nihil conspicui sese prodit, sed quia magnus dolor adest, et summa respirandi difficultas, significatur, tumorem in internis gutturis partibus hære, ibique conclusum spitui aëris præcludere, atque ita subito strangulare. Alias si respiratio et deglutitio non valde lædatur, neque magnus dolor adsit, parvitas mali significatur. Idem tamen Hippocrates, 3. de morb. *κυνάγχη* ad nonum diem protrahi posse docet.

παράκυνάγχη paulo minori cum periculo conjuncta est, et potest diutius protrahi; de quo Hippocrates, 4. prognost. 17. Quæcunque vero dolorem alioquin alteri similem inferunt, in faucibus vero tumorem et ruborem excitant, valde quidem lethales sunt, præcedentibus vero diuturniores, si magnus rubor adsit: quia tandem in cynanchem transit. Sic mortua quinta die Bitonis uxor, 3. epid. sect. 2, t. 4.

4. Minus periculi autem adhuc est a *συναγχη*, in qua plus læditur deglutitio, quam respiratio. Homo enim sine cibo et potu aliquantisper vivere potest, non vero si ne respiratione, præsertim cum febris conjuncta est, eaque acutior. Et tumor ad

interna vergens evocari longius, et medicamentis digeri potest.

5. Levissima est, et omnium minime periculosa Parasyanche ; quia inflammatio longius a gutture abest. Hinc Hippocrates, 6 aphor. 37. angina correpto, si tumor in collo appareat, bonum : Foras enim morbus fertur. Et 7. aphor. 49. Ab angina detento tumor et rubor in pectore superveniens, bonum ; quia extra morbus fertur. Et 3. prognost. 18 : quibus vero fauces et cervix simul rubent, hæ sunt diuturniores, et maxime ex ipsis liberantur, quibus cervix et pectus ruborem contraxerit, nisi erysipelas intro recurrat. Et aphor. 20. 3. prognost. securissimum est, si rubor quam maxime foras, in cervicem scilicet et pectus feruntur. In his nimirum duabus differentiis, neque dolore nimium vexatur æger, neque difficultate spirandi tenetur. Etenim cum partes hæ sint glandulæ, molles laxæ, affluentem humorem sine magna difficultate recipiunt, et quia laryngis muscoli non inflammantur respirationis via non intercluditur. Eisdem sententias iisdem fere verbis tradit Hippocrates, lib. de Coac. prenot. Historias autem et eventus differentiarum, 7 epid. sect. 7. Ubi de signis anginæ epidemiæ loquens, tandem concludit ; in summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites, et toleratu faciles erant ; pessimæ vero his, quibus spiritus sublimis erat.

6. Angina laborantes nisi celeriter cocta expuant, male habent (Hippocrates in Coacis).

7. Angina biliosa periculosior pituitosa ; quia et dolorem majorem et febrem, et majorem respirandi adfert difficultatem.

8. Si in angina, tumore, et rubore intus in faucibus apparente, rubor die non critico evanescat, remaneat vero tuberculum sine dolore, quod nec naturæ, nec artis beneficio suppuratur, mortem vel ruboris recidivam minatur, ex 3. prognost. 19. Mortem quidem, quia relictæ foris crassa materia tenuior et ferventior intro ad guttur conversa est : Ruboris recidivam, quia materia calidior ex accidente aliquo intro repulsa est, non autem discussa.

9. Si in angina tumore et rubore foris apparente ista subito intro evanuerit, malum ; quia materia ad interiora recurrens suffocationem parit, ex 6, aph. 25. Nisi tamen critice discussa, aut alio depulsa materia hoc fiat, atque æger melius habeat.

10. Si febre detento repente collum intorqueatur, ac vix deglutire queat, nullo tamen tumore intus vel foras apparente, lethale est, 4. aphor. 35, ob luxationem scilicet vertebrarum.

11. Pueris angina fere accidit ex vertebrarum cervicis intus luxatione, 3. aphor. 26. Hujus curationem Paulus Ægineta, lib. 3. cap. 27. non aggreditur, cum nullam, uti censet, illa recipiat; quod tamen intelligendum est non de luxatione, quæ ex crudorum humorum affluxu paulatim facta evenit, quæ antequam plane perficitur, curari potest; neque etiam ex crudo tuberculo, modo vertebrae non plane suo loco dejectæ; quales fuisse videntur anginae, quas Hippocrates, 2. epidem. sect. 2. describit, ex vertebrarum colli luxatione factas quorum tamen neminem, qui tum laborarunt, mortuum fuisse refert; sed quæ sit ab inflammatione, vertebrae distendendo violenter suo loco dimovente. Hæc enim omnino incurabilis; cum quia ipsa inflammatio reductionem vertebrarum prohibet, tum quia respiratio et deglutitio valde læditur.

12. Quibus ex angina in pulmonem mali fit conversio, intra septimum diem moriuntur; si vero hos effugiant, *εμπνοί*, id est, purulenti evadunt. 5. aph. 10. et 3. prognost. 20. Si anginae materia in pulmonem convertatur, desipientiam affert, et ægri magna ex parte *εμπνοί* fiunt. *Εμπνοί* enim fiunt abcessu rupto, et in pulmonem effuso; vapores vero calidi sursum exæstuantur delirium excitant.

13. Si strangulatis et suffocatis, ita et anginosis, spuma circa os appareat, lethale signum est, 2 aphor. 43. Extremam enim cordis angustiam significat, fervoremque summum, a quo materiam agitante, spuma illa excitatur.

14. Quando in angina magna fit spirationis angustia, et spuma jam in ore apparet, nulla sanitatis spes relinquitur, nisi æger adhuc viribus valeat, et nutrimentum appetat. Quando vero infirmo ægro febris invalescit, et facies ægri fit viridis, et sinus oculorum denigrantur, extremaque frigent, et lingua nigra ac crassa cernitur, lethale est. Nam in forti febre, multa inspiratione opus est, quam angina negat, teste Avicenna, capite proprio.

15. In anginosis subarida sputa gracilium mala. Hippocrates, in Coac: Angina enim talis est periculosa, sine tumore in collo et

faucibus, uti prognost. 2. dictum, quod plerumque ægri suffocantur. Et licet, quod rarissime fit, suppuretur : si tamen sputum sit subaridum, febrilem calorem maxime indicat, quo sputum glutinosum et crassum redditur. Qui enim, ut ibidem habet Hippocrates, anginosi non celeriter expuunt cocta, lethaliter habet.

16. Qui in angina tumores faucium sine ulla ratione repente evanescent, lethales sunt, in Coac. Etsi enim aliquando præcedente evacuatione vel repellentium usu tumor subsideat ; tamen si sine his, atque ita præter rationem id fiat, malum periculosum est, cum non solvantur morbi manentibus iis, quæ eas faciunt, causis. Significatur enim materiæ ad interiora recessus ; unde periculosior in partibus internis morbus excitari potest ; vel quod interdum accidit, ad partem, unde discessit, repente iterum delata, subito suffocationem inducit.

17. In anginis sine signis dolores in caput conversi, lethale, in Coac. Etenim cum fiat sine crisi aut materiæ translatione, et manente eadem gutturis et faucium angustia, ac difficili respiratione, malum non imminui et tolli, sed diffundi, et cerebro communicari significant. Eodem modo si in hypochondriis vel cruribus dolor excitetur, et angina non solvatur, morbi augmentum, et humoris vitiosi etiam alias partes occupantis redundantiam significat.

18. Qui vehementer suffocantur, narium pinnas expirando contrahunt, inspirando vero dilatant (Galenus, 3 epid. comm. 2, text. 4). Cum enim ob extremum suffocationis periculum, aut caloris vehementiam, membranarum respirationi inservientium motus necessitati satisfacere non possit, natura ad cartilagineas illas diducendo sese convertit, quasi aliquid commodi inde perceptura.

19. Solvitur autem angina vel tumoris διαφορῆσει, causa ejus revulsa, distracta, evacuata aut discussa ; aut tumoris maturatione, et puris ex illo aperto evacuatione ; aut materiæ ad aliam partem translatione : quod ex doloris et tumoris subita cessatione, pulsusque mutatione cognoscitur. Optimum autem est, materiam discuti, vel tumoris maturatam materiam evacuari ; alio eam transferri periculosum, ut jam dictum.

20. Transfertur autem materia vel ad cerebrum, ubi statim dolor capitis gravis, deliria et phrenitis sequitur ; vel ad mus-

culos colli, ubi dolor et tumor, interdum et convulsio excitatur; vel ad pulmones et pleuram, unde dolor pectoris, tussis, difficilis respiratio oritur; vel ad cor, unde tremor ejus, syncope et pulsus obscuritas excitatur.

Indicationes.

Quas aliæ inflammationes habent indicationes, eædem et in angina observandæ, saltem partis affectæ habita ratione. Nimirum sanguis et materia, quæ adhuc affluit, aut affluxura est ad partem affectam, revellenda, derivanda; quæ jam affuxit, adhuc tamen in parvis venis consistit, vel in parte fluctuat, ne in partem recipiatur, atque in eo consistat, repellenda, et in parte affecta foras protrudenda per adstringentia; quæ vero extra venas effusa est in partis spatia, et repelli non potest, insensibiliter discutienda est per digerentia, quod tutissimum est; vel si digerentibus non cedat, et ad maturationem tendat, maturatio adjuvanda, et diligenter simul cavendum, ne astringentibus et refrigerantibus foris quocunque tempore applicatis materia intro repellatur; sed relaxantia potius extrinsecus adhibeantur, quibus materia foras evocetur, periculumque suffocationis avertatur.

Curatio. — Venæ sectio.

Cum ergo angina sit inflammatio, et quidem ejus partis, a qua præsens periculum suffocationis imminet, et a sanguine vel solo, vel cum alio humore mixto ortum habeat, in omni angina sanguinis missione et evacuatione opus est. Estque venæ sectio optimum, præsentaneum, et compendiarium in hoc morbo remedium. Ideoque ut sanguis ad fauces ruens revellatur et evacuetur, periculumque maxime urgens avertatur venæ sectio statim et sine omni mora instituatur, præmisso, si licet, clystere.

Et quidem aperiatur in cubito cephalica aut mediana, aut utraque, si magna adsit plethora. Hoc enim modo, et vena in brachio aperta, et universum corpus promptius evacuatur, et non parum sanguinis a parte affecta avertitur. Et primo quidem mediana, hinc cephalica aperiatur, si utriusque sectione opus. Et si inflammatio alteram partem magis affligat, vena in opposito primum brachio revulsionis gratia, postmodum in latere

eodem aperienda; aut si semel saltem venam aperire liceat, vena in eodem latere secetur. Si vero nullum lateris discrimen sit, aut dubitetur, ultra pars magis affligatur, sanguis ex dextro brachio emittatur; cum hepar sit plerumque mittens.

Si menses vel hæmorrhoides suppressæ sint, quæ vena primo aperienda sit, autores dissentiunt. Alii enim saphenam, alii venam in cubito primo aperiendam censent. Verum distinctione hic opus videtur. Etenim, si periculum non urgeat, ex poplite vel tali sanguinis missio primum instituenda, ut menses suppressi revocentur, et sanguis ad partes distantes revellatur, imprimis si purgationis tempus instet. Et si malum augeatur, mox vesperi aut sequenti die cephalica aperienda; non tamen neglectis revulsionibus, quæ in cruribus institui possunt. Si vero morbus urgeat, et periculum instet, quod plerumque fieri solet, mox vena in cubito aperienda. Periculosum enim est, neglecta cephalica cum affecta parte communicante, in distantissima parte venam secare. Vena autem brachii aperta postea venam in poplite aut talo secare licet. Sic enim et urgenti affectioni, ac celerem revulsionem et evacuationem requirenti, et suppressæ evacuationi satisfacit. Imo sunt optimi Medici, qui in angina periculosa, non solum in suppressis mensibus, venam primo in brachio secandam censent, sed etiam fluentibus mensibus. Et tali in casu, dum sanguis per venas superiores evacuatur, cucurbitulas femoribus affigendas censent, ut minor fiat sanguinis versus superiora retractio.

Evacuatur autem sanguis majore vel minore copia, pro ejusdem abundantia, magnitudine ipsius affectus, et vitium robore. Et si vero fuerint, qui in angina etiam usque ad syncopen sanguinem evacuandum censuerint, persuasi sententia Galeni, qui, I. aphor. 23. scribit, in ardentissimis febribus, in maximis inflammationibus et vehementissimis doloribus, usque ad animi deliquium sanguinem detrahendum esse; tamen Græci, Aetius, tetrab. 2. serm. 4. cap. 47. Paulus Ægineta, lib. 3. cap. 47. Trallianus, lib. 4. cap. 1 ut et Arabes plerique, item Cælius Aurelianus, lib. 3. acut. cap. 4. et posteriores Medici plerique, sanguinem non semel atque confertim, sed sæpius et repetitis vicibus evacuandum censent; ne, si confertim evacuetur, animi deliquio superveniente, suffocatio, quæ antea urget, augeatur,

ægerque suffocetur. Quanquam enim ipsa inflammatio, si sit magna, tale præsidium requirere videatur; prohibet tamen id respirationis difficultas, et inprimis suffocationis periculum. Respiratio enim cum sit actio vitæ valde necessaria, qua nec exiguo tempore vivus homo carere potest; plus valet hic prohibendo difficilis respiratio, quæ ex animi deliquio succedente ad largam sanguinis effusionem ita augeri possit, ut illico suffocatus æger interiret, quam inflammationis eam indicando. Itaque ubi minor est spirandi difficultas, copiosus, si inflammationis ratio postulet, sanguinem mittere licet, ut inflammatis faucium musculis. Si autem respirationis difficultas valde urgeat, id quod accidit, inflammatis laryngis musculis, cavendum est a larga sanguinis missione, quæ animi deliquium inducere posset, sed tum partitis vicibus, 4. vel 5. horarum intervallo sanguinem evacuare commodius est. Et repetita venæ sectio plus revellit, quam una larga sanguinis evacuatio. Præterea cum sæpe accidere soleat, ut ad partem affectam novus affluxus fiat, repetita venæ sectio etiam humores iterum affluentes avertit. Vitandum tamen, ne nimis parce prima vice sanguis evacuetur, ne antequam alteram aut tertiam sectionem adhibere possimus, æger interim moriatur.

Et quidem primo in opposita parte vena aperiatur, deinde in brachio lateris affecti. Et si malum fert inducias, mane una vena aperiri potest, vesperi vel sequenti die altero. Foramen non fiat nimis angustum, ne crassior sanguis intus remaneat, nec nimis amplum, ne spirituum magna copia dissipetur.

Gravidæ etsi sanguine emisso interdum abortiant, tamen in morbo tam periculoso necessitas postulat, ut sanguis, sed minore copia, detrahatur. Et plurimæ gravidæ ita sanguine abundant, ut venæ sectionem sine abortus periculo tolerare possint. Imo compertum est, nonnullas foeminas, nisi sanguis iis detrahatur, abortire, aut in alia mala periculosa incidere. Fiat autem sanguinis evacuatio ex vena cubiti.

Si phlebotomiam vires non ferant, aut saltem repetitam sanguinis evacuationem non tolerant, cucurbitulæ cum scarificatione apponatur cruribus, vel supra renes, postea etiam in brachiis, non in collo. Nam si statim in principio cucurbitulæ parti loco affecto propinquæ applicantur, major ad partem affectam

fluxus concitabitur, malumque augebitur. Postea vero in loco propinquo applicari poterunt sicut venas sub lingua secare licet, ut postea dicetur. Simul etiam alia adhibeantur, quæ repellere possunt, ut lotiones et frictiones ac ligaturæ extremorum, et curcubitulæ in partibus remotioribus, ut modo dictum.

Purgatio.

Venæ sectione peracta, mox instituenda purgatio, præcipue si bilis in corpore abundet, ut illa pharmaci irritatione motus humorum fiat *καραρρω*.

Cum autem anginæ jungatur febris, depurgatio initio anginæ instituenda Autores dissentiunt, dum alii, et plerique omnes Græcis ac Arabis, summum periculum attendentes, mox in principio purgandum esse censent; alii vero, inter quos præcipuus est Massarias, ad cruditatem humorum respicientes, purgationem in principio prohibent.

Verum febris natura hic attendenda. Nam, quod plerumque fieri solet, si febris vel præcedat anginam, vel simul cum ea invadat, et materia, peculiari motu naturæ, humores vitiosos extrudere conantis, ad fauces depellatur, atque ita humores turgentis materiæ conditionem referant, et errabundi quasi a natura e venis expellantur; nondum immobiles sint, et licet ad certam partem ferantur, vagabundi tamen adhuc quasi sint, et tales, qui etiam ad aliam partem mox moveri possint, sicut sæpe angina in pleuritidem et peripneumoniam mutatur; ad turgentem materiam merito referuntur, et propterea ex consilio Hippocratis, 1 aph. 22 statim evacuandi sunt. Id quod etiam a doctissimis Medicis hactenus cum commodo ægrotorum factum fuit, et ipse etiam Hippocrates præcepit, lib de locus in hom. et lib. 3 de morb.

Et omnino sum in ea sententia, etsi angina sit inflammatio; (quod et de pleuritide, peripneumonia, parotidibus et similibus affectionibus intelligendum) primam tamen occasionem ei præberi a cacoehymia, (nisi causa externa sanguinis affluxum excitet, ut spinæ vel ossicula gulæ infixæ, vel vertebrarum luxatio) Natura enim irritata a pravis humoribus, eos ad partes corporis externas detrudit, ad latera, tonsillas, fauces, post aures, ad

inguina, et alias partes. Verum, ut in hæmorrhagiis narium criticis, quæ in febribus acutis a natura sæpe instituuntur, non præcipue sanguinis, sed cacoehymię causa, ea evacuatio a natura instituitur; ita et hic natura quidem vitiosos humores expellere conatur, non tamen eos sine sanguine extra venas protrudit, sed cum sanguine permixtos extra venas in spatia partium effundit, unde inflammatio excitatur. Et ipsi tales humores e venis effusi, acrimonia et pravitate sua naturam stimulant, majori sanguinis affluxui occasionem præbent.

Si autem inflammatio præcedat, ne ea ex humoribus vitiosis, corpore protrusis ortum habeat, et postea febris sequatur; non adeo multum commodi ex purgatione provenit, nisi forsam metuatur, ex affluxu humorum vitiosorum inflammationem augeri posse.

Et quidem maturè statim in initio instituenda purgatio. Narratque Alexander Trallianus, lib. 4. se eodem die sanguinem misisse et purgasse, his verbis: Post missionem sanguinis, si nullus laxitavis sensus oriatur, sed sibi et aëris transitus adhuc impediatur, etiam venas linguæ subjectas incidere ne graveris, neque in crastinum differre, sed eodem die facito. Ego sane memini, me cum usus valde urgeret, venam mane aperuisse, venas linguæ subjectas secuisse, et vesperi ex cremore ptisanæ extractum scammonii exhibuisse, atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potuisse dissolvere. Imo alium quendam novi, me, postquam brachiorum duorum venas in cubito secuissem, repurgasse, sequenti die non expectato. Et omnino affectus gravitas sæpe purgatione ita urget, ut statim instituenda sit, nec tempus matutinum expectari possit. Etsi enim et ad venæ sectionem: Gallinar. Unc. sem. ol. lilior. alb. Unc. i. som. ceræ flavæ parum. M. pro Unguento, quo collum et partes tumentes inungendæ.

Vel parentur cataplasmata ex farina, vel cremore sem. lini fœnugræci, althææ, malvæ hordei, flor. chamæm. meliloti, et similibus.

Vei farinæ hordei, pulpæ passul. an Unc. ii. pulu. rad. althææ Unc. i. cum ol. amygd. dulc. Fiat Cataplasma.

.

Maturantia.

Si vero malum discutientibus non cedit, indicio est suppurationem tendere; quod plerumque quarto vel quinto die contingere solet. Quod si animadvertatur, adjuvanda est maturatio, tum externis, tum internis medicamentis. Intus quidem utile est frequenter cassiam extractam, seu medullam cassiæ in ore tenere, ut paulatim liquescens in gulam descendat. Lenit enim, maturat et resolvit. Gargarismi vero et collutiones fiunt ex lacte tepido cum saccharo, vel ex decocto radic. altheæ, malvæ, lilior. alb. caricarum, dactylorum, jujubarum, passularum.

Vel ꝥ Fol. malv. violar. an M. i. scabios. sumitat. meliloti. an. M. sem. nidi hirundin. Unc sem caricar pinguium N. V. passular. Unc sem se. lini Drach. ii. cydon. Drach. 1. coq. in aqua hord. simpl. Colat. adde sapa Unc. ii. F. gargarismus.

Vel ꝥ passular. exacinat. Unc. i. glycyrrh. Unc. sem. caricar. ping. N. v. sem altheæ Drach. ii. cydonior. Drach. i. Coq. in hydromel. vel aqua pro gargarismo.

Vel ꝥ Dactyl. N. ii. caricar. pinguium Unc, sem. Chamæmel. p. i. sem lini, fœnugræci, ana Unc. i. Coq. in aq. s. ad mediet. consumt. Colat. ꝥ. ℞. j. in qua dissolve sapæ Unc ii. M. F. gargarismus.

Extra vero applicari possunt emplastra maturantia, ex farina et remanentiis decocti sem. lini et fœnugr. cum butyro non salito, adipe gallinæ, et oleo lilior. alborum, et quæ antea fuerunt proposita, ex nido hirundinis.

Ut. ꝥ. Nidi hirund. pul., Unc. sem. lini. fœnugrec. rad. altheæ, ana Unc sem. Coqu. ad. formam pultis, et addatur, ol. Chamæmel. Unc. i. Fiat cataplasma.

Ut autem facilius rumpatur abcessus, aliquid nitri, vel cineris hirundinis, vel stercoris canini addi potest.

Vel ꝥ sem. sinapis Drach. i. coqu. in hydromel. ℞. i. Pro gargarismo.

Nisi sponte abcessus rumpatur, æger, ut screatu et leni tussi, vel vi id præstet, conetur. Nonnulli præcipiunt, ut æger spongiolam filo alligatam, aut carnem salsam semicoctam deglutiat, ut filo attracto abcessus rumpatur. Alii panis crustam deglutire jubent. Verum cum liquidus cibus vix deglutiri possit, multo

minus solida deglutientur. Commodum ergo, ceream candelam oleo admygdal. dulc. illitam in œsophagum immittere, ut ita rumpatur abcessus. Alii hiant ore linguam deprimunt, et cultro ligneo acuto, vel scapello tumorem, si conspiciatur, aperiunt. Quæ omnia tamen caute peragenda, ne in periculum suffocationis æger conjiciatur.

Abscessu rupto, ne pus in pulmones aut gulam influat, id prono capite expuat æger. Postea ulcus extergatur collutione vel gargarismo cum hydromelite vel aqua saccharata, vel decocto hordei adjuncto melle. Et si post puris evacuationem ulcus quiddam sordidum, vel putridum præ se ferat, fortius detergentia et putredinem inhibentia usurpanda, qualia supra in ulceribus oris proposita sunt.

Vel ꝥ fol. scabios. agrimon. an. M. j. nucum cupressi ꝑ. i. radic aristoloch longæ iridis Florentinæ an ꝑ. ʒ. for. rosar. rubrar. p. ii. myrrhæ ꝑ. i. Coq in hydromelite ad ꝑ. j.

Ad consolidandum usurpetur linctus ex bolo Armeniæ cum sirupo vel melle rosato; aut pulvis ex thuris, myrrhæ rosarum, boli Armeniæ æqualibus partibus. Qui si melle excipiat, forma linimenti exhiberi potest. Interdum tamen accidit, ut angina, neque resolvatur neque etiam intus tumor rumpatur, idque cum summo ægri periculo. Cum enim, ut supra etiam dictum, detur anginæ species, eaque deterrima, in qua nullus tumor, nulla rubedo, intus, vel extra apparet, ægroque tamen suffocationis periculum imminet, cujus Hippocrates, in prognost. Galenus, 4. de loc. affect. Cap. 3. Aetius, tetrab. 2. serm. 4. cap 47. meminerunt, in qua illis remediis nihil proficitur; in ultima desperatione sub maxillis et supra collum, altioribus, plagis scarificationem nonnulli instituerunt, et ægrum a suffocatione imminente liberarunt, nonnunquam pure, nonnunquam sanguine effluente, ægroque ita levato, ut postea reliquis præsidiis locus esset. Qua de re scribit Anton. Benivenius, de abdit. morb. causs., cap. 38 Angina laborabat Nicolaus Rota, sed nullus tamen rubor, aut tumor, vel intus in gula, vel extra videbatur, et ipse nihil omnino vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per os statim et nares rejiciebat. Quare cum arescente corpore pallente jam facit, ac vertentibus oculis spes omnis sublata esset, et medici, quibus cura demandata fuerat, ægrum et non amplius adirent,

me, licet-juniorem, convocant, ægrum ostendunt, et quæcunque acta fuerant, exponunt. At ego cum et ægrum ipsum ad mortem tendere, et medicos, quæcunque opportuna fuerant, præsidia adhibuisse intelligerem, cœpi mecum ipse cogitare: satiusne esset, ægrum ipsum Deo, et Naturæ, ut cæteri Medici incuratum dimittere, an aliquid, licet insolitum, utile tamen auxilium experiri. Verum adhortantibus his, qui ægro assistebant, consilium capio, et locum altioribus plagis sub ipsis maxillis, ac etiam supra colum incido ex quo cum sanies multa prorumperet, adeo morbus levatus est, ut faucibus spiritum simul, et cibum capientibus, facilis deinde ad bonam valetudinem ægro ipsis daretur regressio.

Hoc etiam in curatione anginae animadvertendum, semper usque ad morbi declinationem aliquid detergentis medicamenti admiscendum esse, sicut in omnibus inflammationibus, quæ tenui cute teguntur, per quam semper aliquid resultat; id quod in angina copiosissima sæpe sputi rejectio monstrat. In quem finem mel commode adhibetur.

Atque ut usum topicorum hactenus propositorum in summam contrahamus; in principio utendum repellentibus et nonnihil abstergentibus; in augmento abstergentibus et repellentibus parum digerentium admiscendum; in augmenti fine et circa principium status, abstergentia cum æquali quantitate digerentium et adstringentium permiscenda; in declinatione tandem fere solis digerentibus utendum, et pauxillum saltem roborantium et adstringentium admiscendum.

Specifica medicamenta.

A proprietate prodesse traduntur fungus sambucinus coctus et bibitus, et foris etiam impositus. Lignum quoque hederæ a proprietate valere dicitur ad apostema gutturis. Unde Johannes Marquardus, in practica, scribit, quod comedens ex cochleari de ligno *hederæ*, vel bibens ex vase hederaceo nunquam vel raro in apostema gutturis vel uvulæ incidat. Commendatur et ad tumores faucium rumpendos, si in decocto radicum althææ et ficuum cum momento zingiberis, addita vini quarta parte, maceretur, et decoctum diu in faucibus teneatur.

Commendant etiam tanquam expertum lupi guttur seu aspe-

ram arteriam, si angina laborans per eam bibat. Laudatur et *hirundinum pulvis*, si sale aspersi una cum pennis in fictili comburantur, et cinis melle mixtus illinatur. Galenus, 6 de compos. med. sec. loc. Et Celsus, lib. 4. cap. 4. scribit. Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederet, angina toto anno periclitari, servatumque eum ex sale, cum is morbus urget, comburi, carbonemque ejus contritum in aqua mulsa, quæ potui datur, infricari, et prodesse.

Laudant et filum sericum purpura tinctum, quo *vipera strangulata* sit, collo circumligandum, Galenus, 6 de simpl. med. facult. Varignana, lib. 7. de cur morb. cap. 1 commendatur et *exuvie serpentis* in oleo amygdal. dulc. coctæ si in oleo illo linteam tingantur, colloque circumponatur. Stercus item canis ossa comedentis, ut et *cochleæ* cum testis ustæ, et *cancris* usti. Item *rasura dentis castorei*, scrup. ꝑ. vel. Drach sem. pondere in aqu. scabios. propinata; vel rasura dentis caprini, si ejus scr. j. cum ol. amygdal. dulc. recent. Unc. sem. misceatur, et cum saccharo albo dulcoretur ac assumatur.

Rejicit tamen hæc a proprietate substantiæ medicamenta Bert. Paulus Pereda, ideo quod angina est morbus manifestus, non occultus. Et non abs re est medicamentorum quorundam, quæ a proprietate substantiæ hic prodesse creduntur, rationes reddi posse. Ita stercus hirundinis, et canis, ut et cochleæ et cancri combusti proculd ubio vi exsiccandi et discutiendi, quam a sale in primis habent, hic prosunt. Si quæ vero sunt medicamenta, quorum causa facile reddi non potest, illa proculdubio causæ anginæ opponuntur, in qua aliquid maligni et occulti inesse potest. Qua ratione forsitan filum purpura tinctum, quo vipera strangulata fuit, prodest. Refert etiam Cardanus lib. 7. de varietate rerum, cap. 25, quod rubeta cocta et pro emplastro imposita, adeo damno prosit, ut quendam hoc auxilio jamjam moriturum liberarit; creditque et filum, quo rubeta suspensa interiit, conferre. Vide etiam Plinium lib. 30. cap. 4.

(Cap. XXIV.)

An omnis angina sit ab inflammatione?

Angina per inflammationem vulgo, et quidem ex Galeni doctrina, 4. de rat. victus in acutis, text. 20 et 2. ad Glaucon. cap. 1.

definiri, supra diximus Galenus tamen, 4. de loc. affect. cap. 3 addita Hippocratis, ex. 2^o epidem. Sententia, etiam inter anginæ species recenset eam, quæ ex vertebrarum ab interiora luxatione et perversione sit. Et Aretæus, de caus. et sign. acut. morbo lib. 1. cap. 7 aliam, quæ sit solius spiritus prava conversione ad calidissimum et siccissimum mutati, vitio, nulla corporis parte inflammatione laborante, addit.

Verumenimvero non omnis suffocatio, multo minus respiratio læsa est angina. Equidem si vocabulum anginæ spectes, quod ab ἀγγω deducitur, suffocatio angina dici posset: usus tamen obtinuit, ut proprie et in specie illa suffocatio saltem dicatur angina, quæ salvo thorace, a faucium et gutturis, et partium huc pertinentium læsione provenit. Et quidem cum vulgatissime a partium harum tumore et inflammatione accidat, angina etiam harum partium inflammatione determinatur. Luxatio vero vertebrarum cervicis, etsi eandem suffocationem inducere possit; tamen cum rarius accidat, et a causa externa pendeat, inter anginæ quidem in genere ita dictæ differentias referri potest; est tamen alterius rationis, quam ea quæ ab inflammatione provenit. Angina vero, cujus Aretæus mentionem facit, vix ad anginam commodè referri potest, sed potius ad respirationem læsam de qua parte secunda dicitur, pertinet; cum, sicut ipse Aretæus scribit, in pectore vitium sit, ubi spirandi initium ponitur quodque hominem celeriter eodem die jugulet. Neque tamen, ut nonnulli existimant, de ea suffocatione loquitur hic Aretæus, quæ ex aëre crasso et denso, qualis e carbonibus accensis exhalat, originem habet. Expresse enim scribit Aretæus, causam mali non extrinsecus advenire, sed intus excitari. Sed si ea, quæ tradit Aretæus, diligenter perpendamus, de acutissima aliqua pulmonis inflammatione, aut certe de æstuosissima et acutissima febre, qua spiritus calidissimus redditur, loqui videtur. Heurnius anginam hanc fieri existimat ob inflammationem nervi, *qui enatus e colli vertebra ac per pericardium elatus, etiam diaphragmati implantatur*. Videatur etiam Hippocrates, 4 de ra. victus in acut. text. 21 et seqq. et Galenus, in comment. Et fortassis talis fuit angina, cujus mentionem facit Dodonæus, in observat. cap. 18. qui in dissectis talibus ægris demortuis pulmones purulentos fuisse deprehendit. Scribit autem

eo loco Dodonæus, destillante a cerebro humore asperæ arteriæ ramos primo repletos fuisse : deinde eodem ad alia vasa transmissis, liberari quidem arteriam, pulmonis autem male affecti partes a dolore occupari. Tale quid Polemachi uxori 5. epid. sect. 61, accidit, quæ cum primum angina teneretur, sanguine misso faucium suffocatio desiit, sed humore ad pulmones procul dubio decumbente, septimo mortua est. (*Quest. I.*)

De angina notha.

Angina, quæ notha appellatur, oritur a pituitosa et frigida materia e capite in fauces, aut cervicis et colli musculos decumbente, et tumorem *αιδηματοδην* efficiente. De hoc loqui videtur Hippocrates, 2 de morbis, dum scribit; oritur autem angina, cum pituita in capite agitata deorsum confertim fluxerit, et in maxilla ac circa cervicem constiterit. Abestque in angina notha inflammatio, quæ anginam veram contituit. Itaque etsi etiam a melancholia anginam fieri posse, postea ex Heurnio dicetur; tamen ea non est notha angina, sed quia melancholiæ admiscetur sanguis, parit veram anginam, etsi non puram.

Signa.

Cognoscitur ista angina, quod inflammatio, calor, rubor; febris abest, dolor est exiguus aut nullus. Atque cum a materia in externis colli musculis hærente excitetur, minus periculosa est hæc angina. Diuturnior contra est, ita dolores sæpe longo tempore durent.

An Laryngotomia tuta et utilis sit?

Equidem nonnulli Laryngotomiam plane improbant, ut pote quæ periculosa sit, cum primo ossa, et cartilagines, e quibus et trachea pulmonis arteria constat coalescere nequeant ex sententia Hipp. 6, aph. 18, atque ita ægroq interitus afferatur: deinde metuendum sit, ne sanguis e vulnere effluens in pulmones ruere, ægrumque suffocare possit. Tertio etiam Aretæus et Aurelianus fide experientiæ hanc operationem destitui existimant.

Verum vulnera tracheæ plane insanabilia non sunt, sicut exemplo docet Albucasis, chirurg. lib. 3, cap. 43. Atque aliquot etiam Schenkus, lib. 2, obs. 40 collegit. Atque ipse etiam arte-

riam ita vulneratam, ut vulnus in cavitatem ejus penetraret, sanatam fuisse bis vidi. Et quamvis ipsa cartilago non coalescat, tamen carnis duræ et veluti calli interventu, et membranæ, quæ junguntur annuli asperæ arteriæ, conglutinatur. Neque etiam de fluxione sanguinis in pulmones metus est, si sectio recte instituat. Nullum enim insigne vas est eo loci. Iis vero qui experientiæ idem in dubium vocant, merito ex exempla, quæ passim apud Medicos occurrunt, opponenda, quæ Schenkius, loco allegato, collegit. Refertque etiam. Anton. Musa Brassavolus, in comment. in 4. Hipp. lib. de vict. rat. in acut, se suis manibus, cum Chirurgus quidam imperitus id non auderet, angina laboranti morti propinquo guttur dissecuisse, quod et alias pluries cum felici successu se tentasse scribit. (Quest. V.)

ETHMULLER

(Traduction anonyme.)

De la déglutition blessée.

La déglutition est blessée par diminution, par abolition et par dépravation : 1° par la faute de l'œsophage ; 2° par celle de l'orifice supérieur du ventricule (cardia).

C'est par le vice de l'œsophage en premier lieu, lorsque les trois paires de muscles, qui forment la gorge en s'élargissant, sont relâchées avec le sphincter par la paralysie, ou quand la tunique musculieuse de l'œsophage est attaquée du même mal — pour ce dernier vice, voir la pharmacopée raisonnée de Willis (vol. I, p. 11) et pour le premier voyez Tulpius, livre 1, obs. 42 — en second lieu quand l'œsophage est trop rétréci par les tumeurs qui lui sont propres, ou par les tumeurs des parties voisines. Les premières sont l'inflammation ou esquinancie, les tumeurs squirrheuses, les excroissances charnues, dont vous avez des exemples dans Rhodius (obs. 46 et 47, cent. 2). Les dernières sont les tumeurs et inflammations des amygdales, de la trachée-artère, de la luette. La dysphagie peut résulter aussi de la contraction trop étroite des fibres, tantôt à cause des convulsions, comme il arrive aux hypocondriaques et aux femmes hystériques, qui souffrent de ces resserrements de la gorge, par la communication des mouvements convulsifs des nerfs (théorie iatromécanique) que quelques-uns attribuent mal à propos aux vapeurs styptiques, qui s'élèvent des hypocondres à la gorge et qui la resserrent. L'étranglement dans les maux de la mère (utérus), dont fait mention Van Helmont au traité Asthma et Tussis, § 31, et la déglutition difficile, ou abolie dans le paroxysme épileptique sont de ce genre ; tantôt à cause de l'extrême sécheresse des fibres de l'œsophage, comme il arrive dans les fièvres ardentes continues (dysphagie des états ataxo-adiynamiques), et dans le défaut de salive qui empêche plus ou moins la déglutition ; tantôt à cause de leur adstriction et corrugation, comme

le resserrement de gorge, dont parle Hochteterus (décade 3, cap. 5), pour avoir bu du vin de Malvoisie, dans lequel on avait fait infuser de la racine de grande consoude. En troisième lieu, la dysphagie peut survenir par l'obstruction de l'œsophage, lorsque ce qu'on avale reste attaché au détroit de la gorge, ou à l'entrée de l'œsophage, comme les morceaux trop gros, les noyaux de pêches, les corps pointus qui s'y fichent, savoir les os, les arêtes de poissons, les épingles, etc., qui empêchent la déglutition par leur simple présence, ou par la douleur, l'inflammation, ou l'abcès qui s'ensuivent.....

Plus la déglutition est difficile et plus la vie est en danger. La déglutition blessée par la paralysie des muscles de la gorge est un mal dangereux et difficile à guérir. Si le mal vient du défaut des esprits animaux et de la dissolution entière des forces, comme il arrive quelquefois dans les fièvres aiguës, c'est un très méchant signe. La boisson tombe alors dans l'estomac avec un bruit semblable à celui que fait une liqueur qu'on verse dans une bouteille vide (glouglou). Dans les plaies, lorsqu'il survient des convulsions qui empêchent la déglutition, il y a beaucoup à craindre. Les convulsions de la gorge sont plus dangereuses dans les maladies aiguës que dans les maladies chroniques. Si le mal vient des tumeurs, et d'une cause interne, le pronostic sera facile à faire suivant la nature des tumeurs, qui seront faciles ou difficiles à guérir ou entièrement incurables. Telle est l'impuissance absolue, et par conséquent mortelle d'avaler, causée par un ulcère chancreux (cancéreux) de l'œsophage (partie supérieure de l'œsophage suivant les anatomistes d'alors, pharynx suivant les modernes), telle est la déglutition entièrement abolie par l'œsophage devenu cartilagineux (rétrécissement fibreux), dont parlent quelques auteurs modernes.

Les choses étrangères, qu'on avale, s'arrêtent ou à l'entrée de la gorge, nommée Isthme, ou plus bas, ou enfin elles descendent dans l'estomac. Lorsqu'elles demeurent en chemin, outre que leur présence seule est incommode, elles causent quelquefois de la douleur, qui est suivie de tumeur, d'inflammation et d'abcès, qui sont mortels ou non. Ainsi Fabrice de Hilden dit (cent. 1, obs. 35) qu'un petit os arrêté dans l'œso-

phage cause une tumeur, de la douleur, de la fièvre, une inflammation, et de la mort. Souvent, quand l'abcès s'ouvre, les choses étrangères sortent avec le pus, ou descendent. Le même Fabrice de Hilden (cent. 1, obs. 35) écrit qu'une femme ayant avalé un petit os, avec danger de suffocation, elle le rejeta le septième jour, l'abcès ayant suppuré. Quelquefois ces corps étrangers se font une issue par les parties plus ou moins voisines. Paré (lib. XXIV, cap. XXIX de sa *Chirurgie*) rapporte l'exemple notable d'un épi de blé avalé, qui ressortit tout entier entre deux côtes (abcès de l'œsophage intrathoracique) et Fabrice de Hilden déjà cité (cent. 1, obs. 33) assure qu'une arête de poisson, ayant resté deux ans dans l'œsophage, sortit enfin par un abcès qui se fit à la partie inférieure du col...

La cure est différente suivant la diversité des causes et du mal. La paralysie des parties qui servent à la déglutition se guérit par la décoction de sauge dans du vin qu'on retient dans la bouche, par l'infusion de thym, par la décoction de sauge et de roquette en gargarisme, par la noix de muscade machée et avalée, par l'huile de succin distillée, par l'huile d'anis et de sauge distillée, dont on met quelques gouttes dans la gorge avec beaucoup d'efficacité, par l'essence de castoréum, l'esprit de cerises noires, celui du muguet, par l'esprit thériacal joint avec l'essence de castoreum, et par l'eau analthina, qui est merveilleuse. On oindra le col et la nuque avec *l'huile de vers de terre*, l'huile de costus, ou les huiles distillées de succin, d'anis, de lavande, etc.

Les tumeurs se guérissent, quand on les peut connaître, comme celles de même nature dans les autres parties.

On remédie à l'adstriction convulsive de la gorge et de l'œsophage par les aromatiques et les nervines tant internes qu'externes, à quoi on ajoutera des préparations opiacées. Si le mal vient des hypocondres, on choisira les remèdes pour absorber l'acide, l'opium, le castoréum. S'il vient de siccité dans les fièvres, le mucilage de semences de coing extrait avec *l'eau de semences de grenouille* sera salutaire. On appliquera extérieurement l'onguent de Zacutus pour cette affection, qui est composé de l'onguent du fils de Zacharie, de l'onguent rosat, de l'onguent resumptivum, de l'huile d'amandes douces et de violettes, des

mucilages, et du *lait de femme*. Le défaut de salive est réparé en buvant du vin, ou de la petite bière.

..... A l'égard des corps étrangers avalés, on les retira si possible au plus tôt avec longue pince appropriée, ou on les poussera vers le ventricule. L'instrument de Willis (*Pharmacopée raisonnée*, vol. 1, p. 45) et celui de Fabrice de Hilden (cent I, obs. 31) sont propres à cet effet... (Cap. IV.)

Esquinancies.

Outre les causes communes à toutes les inflammations, l'esquinancie vient des choses impropres à être avalées, qui s'arrêtent au passage de l'œsophage, compriment ou resserrent la gorge par leur grosseur, et resserrent par conséquent les vaisseaux, ou qui picotent et irritent les parties par leurs pointes, d'où s'ensuivent les *contractions* et les *convulsions* des *fibres* et l'inflammation.

Schenkius observe une inflammation du *larynx* et du *pharynx* par une arête de poisson, et plusieurs auteurs font mention de diverses inflammations ou abcès à la gorge par des morceaux de verre arrêtés. La gorge et l'estomac sont souvent corrodés, comme on sait, en avalant de l'eau-forte ou semblables liqueurs corrosives.

La *lymphe* trop visqueuse qui farcit les amygdales, y produit souvent la tumeur et l'inflammation ; ce qui vient de ce que la circulation du sang est empêchée dans ces glandes. Outre cela la lymphe, qui se filtre par les glandes de la bouche, étant trop âcre ou trop acide, comme il arrive dans les affections catarrheuses, excorie ou corrode par son acrimonie les parties de la gorge et y font des inflammations plus ou moins grandes.

Les *amygdales* ont un trou assez considérable à leur tunique du côté de la gorge, d'où suinte une lymphe gluante, douce et salivale dans l'œsophage et le gosier. Quand elles sont gonflées et enflammées, ces trous paraissent fort ouverts et grands ; les ignorants s'y trompent souvent et prennent ces trous pour des ulcères. C'est ce qui a été observé il y a déjà longtemps par Schenkius liv. 2, de ses observations sur les amygdales.

Enfin l'*inflammation* ou *ardeur de la langue*, dont nous avons parlé sur les fièvres malignes, se nomme quelquefois esquinancie,

mais improprement. Elle a les mêmes causes que les autres inflammations et spécialement le froid subitement inspiré ou la boisson trop froide dans une chaleur excessive du corps, ce qui offense les entrées du gosier et de l'œsophage, car tandis que le sang est raréfié par la chaleur, il se coagule facilement par le froid subit ; *il s'arrête et excite l'inflammation.*

Les parties affectées dans l'esquinancie sont la gorge et surtout la partie du col qui est composée du pharynx ou sommité de l'œsophage, du larynx ou sommité de la trachée-artère, et des muscles joints à ces parties. Souvent les deux parties ensemble, savoir : le pharynx et le larynx, et leurs muscles tant internes qu'externes sont attaqués, et quelquefois les muscles internes ou externes séparément ou inégalement, ce qui a donné lieu à quelques-uns de distinguer l'esquinancie en quatre espèces.

La première est la synanche quand les muscles internes du pharynx sont affligés.

La seconde est la parasynanche quand les muscles externes de la même partie sont enflammés.

La troisième est la kynanche quand l'inflammation est aux parties internes du larynx.

La quatrième quand les muscles externes de la même partie sont attaqués, est nommée *parakynanche*.

Les poumons sont le plus souvent affligés dans l'esquinancie aussi bien que les muscles internes du larynx, et c'est la raison pourquoi la difficulté de respirer n'est pas alors moins grande que dans la péripneumonie.

Après les impressions de l'air froid ou de la boisson, la suppression des évacuations ordinaires, spécialement de la rétention des mois, disposent ordinairement à l'esquinancie.

Car d'abord qu'une partie a été une fois maltraitée, le sang, supprimé par la force diminuée ou inégale de la partie, s'enflamme facilement et par cette raison les femmes qui ont leurs mois arrêtés ou d'autres évacuations accoutumées, sont sujettes à l'esquinancie ou à la pleurésie. Remarquez en passant que la saignée du pied est beaucoup plus salutaire que la saignée du bras.

On a vu une *esquinancie épidémique* jointe à une fièvre ardente continue qui disposait le sang à arrêter son cours et à

exciter des inflammations. Comme le levain morbifique, attiré par l'inspiration, s'attachait en passant aux parties du larynx et du pharynx, il déterminait le sang à faire inflammation en ces parties et, par conséquent, l'esquinancie. Vuietus en rapporte plusieurs exemples.

Pannarolus (Pentecost. 5), met un exemple singulier d'une esquinancie *maligne, épidémique, si contagieuse* qu'un enfant qui en était malade, ayant mordu les doigts de sa nourrice, il s'éleva d'abord un charbon sur la partie mordue et la nourrice fut attaquée de la même esquinancie.

Les *frictions du mercure* dans la vérole, faites mal à propos, agissent ici. Car comme la salivation copieuse guérit cette maladie, de même si la salive ne coule pas bien, en croupissant avec le sang qui abonde, elle produit une inflammation à la gorge suivant l'exemple de Schenkus, liv. 6, de ses observations.

Les *dysenteries* mal guéries ou supprimées, spécialement les épidémiques, donnent quelquefois l'esquinancie. La matière traitée du flux dysentérique, chap. 5, en apporte un exemple. Et Hildanus, au traité de la dysenterie, dit que la suppression des dysenteries épidémiques est souvent suivie de l'esquinancie.

On dit ordinairement que la *luxation des vertèbres* du col cause l'esquinancie, mais ceux qui savent la structure des vertèbres connaissent bien que cette opinion ne vient que d'une fausse hypothèse pour n'avoir pas bien entendu l'aphorisme d'Hippocrate, sect. 4, aphor. 35, qu'on interprète l'esquinancie par la luxation des vertèbres du col, au lieu qu'Hippocrate ne parle que d'une convulsion semblable à celle qu'on nomme *emprostotonos*.

Il est évident que l'esquinancie ne peut arriver par la luxation des vertèbres du col, puisque cette luxation est impossible à moins qu'on y apporte une extrême violence, et que la moelle de l'épine ne souffre une grande contorsion, d'où s'ensuivrait l'abolition du sentiment et du mouvement et l'apoplexie plutôt que l'esquinancie. Car les apophyses des vertèbres sont tellement accrochées l'une dans l'autre, qu'on ne peut les luxer sans fracture et sans danger de mort.

L'esquinancie est *exquise* ou *non exquisite*. La première vient du sang pur, la non exquisite vient du sang et de la lymphe et on

la nomme *inflammation fausse* ou pituiteuse. Elle peut être compliquée avec l'exquise, parce que les glandes compriment beaucoup la lymphe.

Les signes sont les mêmes que dans les autres inflammations, savoir la rougeur, la chaleur, la tumeur, la douleur qu'on peut facilement voir en faisant ouvrir la bouche. Les signes particuliers sont la difficulté et la douleur à tourner le col, la respiration laborieuse à cause du conduit rétréci, la déglutition difficile, plus quand l'inflammation est au pharynx, moins quand elle est au larynx, enfin la douleur ardente qu'on sent à la gorge.

Lorsque l'esquinancie est forte, la respiration est presque abolie; on ne respire qu'avec une peine extrême, et on est prêt d'étouffer. La déglutition est abolie, en sorte que la liqueur qu'on tient dans la bouche ne peut pas entrer dans l'œsophage resserré et ressort par le nez; Joseph de Aromatariis dit que cette espèce se trouve dans l'hydrophobie, mais peu d'auteurs sont de ce sentiment.

Enfin, il y a une fièvre aiguë ou légère, ou bien il n'y a point de fièvre; la langue est aride ou fendue, et quelquefois enflée ou couverte d'une matière visqueuse et gluante, ainsi que la gorge. Cette croûte n'est rien autre chose que la lymphe et la salive des glandes des amygdales épaissies, laquelle forme une espèce de peau.

Le pouls est dépeint par Galien en ces termes. Le pouls est retiré, dans l'esquinancie, par une espèce de tension et comme convulsif, grand et onduleux, semblable à celui des péri-pneumoniques; ceux qui en sont suffoqués ont le pouls petit et rare, tantôt fréquent et inégal.

Ces signes sont plus violents et plus dangereux dans l'esquinancie, moins dans l'inflammation des amygdales, et très peu dans l'inflammation de la sommité de l'œsophage.

Prognostic.

Ces inflammations se dissipent ou viennent à suppuration; celles qui suppurent, surtout les inflammations des amygdales, dégénèrent en ulcères durables et difficiles à guérir. Si le malade en meurt, c'est le plus souvent de suffocation.

Elles se terminent quelquefois par une crise, et Forestus,

liv. XV, obs. 14, parle d'une esquinancie véritable qui fut guérie le quatrième jour par un flux mensuel critique.

Souvent l'abcès se rompt et le pus descend dans la poitrine, ce qui étouffe quelquefois le malade. Forestus, liv. XV, obs. 23, rapporte l'exemple d'une esquinancie suppurée dont le pus tomba dans la poitrine et dans les poumons, qui pensa suffoquer le malade.

Il arrive souvent que l'esquinancie se dissipe dès le commencement et se change en *pleurésie*; ce changement est très dangereux, suivant Amatus Lusitanus, cent. 5, curat. 37. S'il se fait un transport au cerveau, il en arrivera de la céphalalgie, des délires, de la *phrénésie*; s'il se fait aux poumons, la *péripneumonie* et la pleurésie sont à craindre; s'il se fait au cœur, la *syncope* surviendra; si c'est en d'autres parties, il y aura d'autres maladies.

L'aphorisme 10 d'Hippocrate, sect. 5, est de ce lieu : « Ceux, dit-il, en qui l'esquinancie passe de la gorge aux poumons meurent avant le septième jour; s'ils passent le septième, ils tombent dans l'empyème. » Lindanus attribue très à propos cet aphorisme à l'esquinancie qui est dans la *trachée-artère* vers le larynx, laquelle venant à suppurer, comme elle fait ordinairement si la membrane qui tapisse la trachée-artère vers le larynx se rompt par l'abondance et l'acrimonie du pus, la matière tombera dans les poumons et les malades mourront avant sept jours parce que cette décharge enflammera le poumon, d'où s'en suivra la peripneumonie, ou le poumon suppurera, ce qui fera l'empyème.

La fièvre jointe à l'esquinancie est pour l'ordinaire continue, et quelquefois tierce continue ou hemitritée. Celle avec la fièvre continue et dont les paroxysmes sont de trente-six heures, a coutume d'être mortelle, suivant Lindanus sur Hartmann.

Moins la tumeur se manifeste aux yeux, soit dans la bouche, soit en dehors du col, plus il y a de danger, parce que les parties internes du larynx et du pharynx sont attaquées. Plus la tumeur est en dehors, plus elle est sûre; la tumeur interne et profonde est toujours à craindre.

La plus dangereuse de toutes les espèces, c'est la *kynanche*; la *parakynanche* l'est moins. La *synanchie* est plus légère que

ces deux premières, et la parasynanchie la plus légère de toutes.

L'esquinancie, qui disparaît facilement et rentre pour ainsi dire en dedans, menace de suffocation ou de quelque autre grande maladie.

Enfin, s'il paraît de l'écume à la bouche de ceux qui ont l'esquinancie, comme aux pendus et étranglés, c'est un signe mortel.

Après avoir considéré les inflammations des parties de la gorge, tant internes qu'externes, examinons

La Cure.

A l'égard des remèdes externes, les gargarismes, les cataplasmes sont usités dans les inflammations de la gorge, de la bouche, des amygdales, de la luette, du larynx et du pharynx également, qu'on peut réduire sous l'esquinancie.

Les internes qui conviennent sont ceux des autres inflammations, spécialement de la pleurésie. Par exemple la mixtion simple, *l'esprit doux de nitre*, la *dent de sanglier*, l'*antimoine diaphorétique*, et spécialement les *fientes* des animaux, que Paracelse et Hartmann recommandent instamment, tant intérieurement qu'extérieurement, au commencement des esquinancies, parce qu'elles sont empreintes d'un sel nitreux, volatil, de la nature de l'ammoniac; les plus usitées sont la fiente de chien qui ronge des os, les crottes de brebis, de chèvre, la fiente d'hirondelle, etc. Elles sont propres surtout intérieurement, d'autant qu'elles calment la fièvre, qu'elles dissolvent le sang et qu'elles ôtent ainsi l'inflammation.

Valeriola, liv. 2, obs. 10, assure que la râpure de dent de sanglier, jusqu'à une dragme, avec de l'huile d'amandes douces, donnée dans l'esquinancie, est un remède présent comme dans la pleurésie.

On peut dire la même chose de l'album græcum ou merde de chien jusqu'à une drachme. (Tome II, page 19.)

Inflammation des amygdales et autres parties avoisinantes.

Dans l'inflammation des amygdales de la bouche, outre les remèdes généraux des autres inflammations, il faut avoir tou-

jours égard en même temps à la lymphe, qui est tantôt grossière, tantôt acide, toute viciée, d'une autre manière, ce qui demande les *remèdes internes contre les catarrhes, le succin la myrrhe*, et tels autres corrosifs.

Dans les *inflammations pour une cause interne*, les remèdes les plus convenables sont ceux qui dissolvent le sang et le dépurent par une douce sueur, et ils ne manquent guère de réussir si on les donne à temps ; si non on doit avoir recours à la *saignée*. On commencera par celle du pied pour faire la révulsion universelle, on viendra ensuite à la *saignée du bras* pour la révulsion particulière ou la diversion. Enfin on fera la saignée *sous la langue* dans l'état de la maladie pour faire dérivation.

Lorsque les mois sont supprimés ou s'arrêtent dans leurs cours, lorsque les hémorrhoides sont enflammées ou que quelques maladies de cette nature sont compliquées avec esquinancie la *saignée du pied* est toujours nécessaire.

Quoique la *saignée* soulage en quelque façon, il ne faut pas s'y fier ni se contenter de ce seul secours, car souvent lorsque les malades semblent être mieux, meurent subitement. Vous en avez un exemple digne de remarque dans la Pratique de Barbette, liv. 2. chap. 1, ou une malade, qui semblait guérie après plusieurs saignées, fut étouffée quand on y pensait le moins.

La saignée se doit réitérer suivant les circonstances et les sujets ; quelquefois une seule suffit, quelquefois il en faut plusieurs, selon l'âge, selon l'abondance du sang, selon l'effervescence de la fièvre, et selon qu'on y est accoutumé. D'autant plus que les *remèdes internes* n'ont pas le succès espéré.

Il y en a qui conseillent la *saignée des jugulaires*, entre autres Rivière, p. 398, et Barthole au *traité de l'esquinancie épidémique des enfants*, mais elle est dangereuse et demande un chirurgien adroit et expérimenté.

Pour la *saignée de dessous la langue (des ranules)*, elle ne convient que dans l'état et lorsque l'esquinancie ne prend plus d'accroissement. On ouvre alors les ranules, par où le sang qui est arrêté dans les parties voisines a coutume de s'en aller ; cette saignée l'empêche de croupir, et le remet dans son mouvement naturel.

Quelquefois la *saignée seule des ranules* prévient l'esquinancie,

et quand on la sent venir on doit y avoir recours, en cas que le corps ne soit par trop replet, que l'effervescence du sang soit empêchée par quelque obstacle. Dans ces circonstances *la saignée des ranules* au commencement coupe chemin à l'esquinancie. Sinon il ne la faut point faire que dans l'état de la maladie après les autres secours.

Le Journal des Savants d'Allemagne, année 3, page 376, marque le pronostic qu'on peut faire de la manière dont le sang coule dans *la saignée des ranules*. Savoir s'il en sort peu de sang ou point du tout, que c'est un signe mortel.

Les gargarismes, les emplâtres externes, les onguents, les cataplasmes, etc., dans la cure de l'esquinancie, doivent avoir les vues suivantes qui sont :

- 1° De résoudre et de dissiper le sang arrêté, si on ne le peut ;
- 2° D'en faciliter la suppuration et la maturité ;
- 3° D'ouvrir l'abcès formé, de le purifier et de le consolider ;
- 4° De fortifier les parties rétablies par les astringents.

La méthode ordinaire est d'employer au commencement *les astringents externes*, ou seuls ou avec des *discussifs*, pour empêcher le trop d'accroissement de la tumeur, en restreignant les parties externes de la bouche et de la gorge. Mais nous avons montré ci-dessus l'absurdité de cette pratique en examinant la doctrine des répercussifs, et il est à craindre que ces sortes d'*astringents* ne resserrent seulement que les parties extérieures, et que l'inflammation des parties intérieures ne s'augmente trop, comme Sylvius le remarque judicieusement, liv. 1, pact. chap. 44, these. 58. et Deckerus dans le Commentaire sur Barbette ; par conséquent les *astringents* valent mieux à la fin du mal.

Pour les *résolutifs internes*, ils doivent rarement être employés seuls au commencement, mais toujours avec quelques *astringents*, afin de resserer tant soit peu les parties internes de la bouche et de la gorge, pour éviter que la déglutition ne s'abolisse et que la suffocation ne survienne. Par cette raison nous nous servons souvent au commencement des *astringents* seuls dans les *gargarismes*.

Les remèdes externes qu'on applique au commencement, doivent être *ramollissants, résolutifs*, parce que *la tumeur et l'in-*

flammation de la partie externe est moins dangereuse que celle de la partie interne qui a souvent des sujets très fâcheux.

Les gargarismes sont suspects d'autant qu'ils émeuvent les parties enflammées qui demandent du repos. Il vaut donc mieux s'abstenir, car, dans le conflit de l'air avec la liqueur gargarisée dans le detroit de la gorge et pendant ce mouvement laborieux, l'inflammation devient plus grande.

Par cette raison, quelques-uns défendent absolument de gargariser, et se contentent que le malade tienne dans sa bouche ce qu'il peut du *gargarisme* qu'il laisse descendre doucement vers la gorge, sans agitation, et qu'il rejette par la bouche après l'avoir retenu quelque temps. Pour une plus grande facilité le malade demeure couché sur le dos.

Dans l'esquinancie *symptomatique* des fièvres malignes, qui est presque la même que l'esquinancie épidémique, la première chose qu'on doit faire c'est de dissiper et de chasser la malignité, après quoi les symptômes s'arrêtent d'eux-mêmes.

Alors la *saignée* n'a point de lieu non plus que la *purgation*, si ce n'est au premier commencement, avant que la malignité commence à agir. On se tiendra plutôt aux *sudorifiques* et aux *alexipharmaques* seuls, pour calmer l'ébullition fiévreuse et chasser la malignité.

Le médecin se donnera cependant garde de l'*haleine* du malade, pour ne pas être surpris par la malignité.

Plusieurs recommandent le vomitif, par exemple Hartmann dans sa Pratique, et Rollandus, qui s'en est souvent servi. Voyez leur usage singulier dans Rivière, cent. 2, obs. 10, 24, obs. 60, et dans beaucoup d'autres endroits.

Il y a du pour et du contre, et il faut bien prendre son temps qui est l'âme de la pratique, dans l'usage des vomitifs. Il y a deux temps où ils conviennent, savoir le commencement et l'état lorsqu'il est très dangereux.

Au commencement de la maladie les vomitifs sont utiles, en ce qu'ils ôtent souvent la cause occasionnelle, savoir les excréments viciés de l'estomac et des premières voies, spécialement l'humeur qu'on appelle bile érugineuse, dans laquelle l'acide pêche comme chacun sait.

Si donc les malades se plaignent au commencement de cer-

taines saveurs déposées, qu'ils sentent sur la langue une acrimonie rance et un picotement ou érosion comme il est ordinaire dans l'esquinancie, il faut d'abord faire vomir, à quoi il n'y a rien de meilleur que l'eau *benedicte de Rollandus*, qui vide non seulement les humeurs viciées du ventricule, mais qui pousse encore par les sueurs. C'est la pratique de Rollandus, qui lui a toujours bien réussi,

Dans l'esquinancie maligne et qui se gagne par contagion, comme le levain entre par la gorge, ainsi que dans la peste et les fièvres malignes contagieuses, il n'est rien de meilleur que de donner un vomitif, dès le commencement, qui est très utile. et nécessaire.

Outre le commencement, les vomitifs conviennent dans l'état périlleux, lorsque la suppuration est faite, et qu'à cause du détroit du lieu l'abcès suppuré ne peut s'ouvrir et menace de suffocation, ou supposé que l'abcès s'ouvre de lui-même, il est à craindre que le pus ne tombe dans les poumons et n'étouffe le malade, où dans l'estomac et ne la corrompe. Dans ce cas où on manque de secours pour ouvrir l'abcès, le vomissement est le dernier refuge qui secoue puissamment l'abcès, l'ouvre, et pousse le pus par en haut.

Ce remède est à la vérité hardi et dangereux, mais il est unique et par conséquent sûr, suivant Celse. Quand les malades ne peuvent pas bien avaler les vomitifs, on en doit enduire une plume, pour irriter de temps en temps la gorge, ou bien on versera goutte à goutte de temps en temps la liqueur vomitive, ou bien on recevra du mercure de vie dans du miel, pour appliquer à l'entrée de la gorge ; par ce moyen, l'estomac sera irrité pour vomir, l'œsophage secoué et l'abcès rompu.

Dans les inflammations des amygdales qui reviennent souvent, surtout par le vice de la lymphe, par exemple dans le scorbut ou quelque autre maladie habituelle, et quand l'âge et les autres circonstances font désespérer qu'on les puisse guérir à fond, *un cautère au bras* est un excellent préservatif, spécialement à ceux qui ont eu une inflammation avec abcès dans quelques parties, où, peut-être, il est resté quelque chose du levain ulcéreux, qui engendre une inflammation à la première occasion et à la moindre irritation, surtout dans les parties glanduleuses ; en ce

cas la cure palliative par un cautère est très convenable.

Il ne faut pas confondre les inflammation et les autres tumeurs de la gorge et des parties voisines, excitées par le sang ou par les autres humeurs, avec l'esquinancie ordinaire, dans les fièvres aiguës particulières, dans les fièvres militaires ou hongroises, qui est un symptôme de la langue et de la gorge, nommé prunella. La plupart des praticiens, en traitant de l'esquinancie, proposent en même temps les remèdes contre la prunella, et qui sont spécialement les yeux d'écrevisses, le sempervivum ou joubarbe, la prunelle, le tussilage, le sel d'ammoniaque, le nitre, le beurre, le lard, etc., lesquels ne sont pas propres dans l'esquinancie s'ils ne sont tempérés par d'autres et appliqués avec circonspection. Voici à peu près les remèdes qu'on peut employer pour gargarismes, pour liniments, ou pour cataplasmes :

En un mot, tous les remèdes proposés dans la cure générale chirurgique ont lieu ici. Les doux astringents seront ajoutés dans le commencement aux gargarismes. Par exemple les roses, les myrtilles, le sumach, les balaustes, les écorces de grenades, la prunelle, les écorces de noix, les fleurs de mauves en arbres, les feuilles de ronces, de myrthe, de campanule ou uvulaire, les fleurs de bellis, le phlegme d'alun, le phlegme de vitriol, le nitre, tant le simple dépuré que le fixe ou le sel de prunelle, l'esprit de vitriol, l'eau de noix distillée, l'eau de prunelle, de plantain, l'eau des forgerons, l'eau ferrée, l'eau de solanum, de bourse à pasteur, etc.

Le rob de noix, le rob de diamoron, le rob de figues, le suc d'acacia, le suc de citron, de grenade, le sirop de grenade, le sirop de roses sèches, de myrtille, le suc de coings, le sucre de saturne, la céruse.

Les résolutifs, les maturatifs, qu'on emploie pour gargarismes, pour liniments ou pour cataplasmes sont :

Les racines d'althea, de lis, de mauve en arbre, de plantain; j'ajoute celle-ci pour cause, le grand sempervivum ou joubarbe, qu'on met au nombre des astringents, mais je ne vois pas par quelle raison.

Les feuilles de menthe crispées, de sauge, de véronique, de thym, d'origan, de pouliot, d'hyssope, de melilot, de camomille, de scabieuse, de mort du diable, la semence de lin, de fenugrec

d'aneth, du cumin, la farine de ces semences, spécialement de semence de moutarde, dont le sel volatil est excellent pour *mûrir et ouvrir les abcès*.

La racine de réglisse, les dattes, les figues grasses, le sophora, les raisins passé grands, petits, les jujubes, les oignons, etc. La décoction d'orge, l'eau de verveine, de scabieuse, d'hyssope, le lait tiède, le suc d'écrevisses, le suc de grande joubarbe.

Le sel ammoniac, le vinaigre simple qui relache, résout, le vinaigre de sureau, l'oxymel, la casse nouvellement extraite.

Le mucilage de semence de lin, de fenugrec, la cendre d'hirondelle, de cochlearia brûlées, d'écrevisses calcinées, la cendre de chauve-souris, le nid d'hirondelle, les fientes d'animaux, spécialement de chien ou album græcum, d'hirondelle, de poule, de pigeon, d'homme, de cheval, etc.

Les huiles d'amandes douces, de lis blancs, de camomille, d'aneth, de violette, le beurre frais, l'huile d'iris, l'huile d'œuf, l'huile de décoction de dépouilles de serpent, l'huile herachinum ou de coudrier de Rolandus.

Le camphre, le suc de concombre sauvage dans du miel.

La graisse de chapon, de poule, de porc, d'oie, la graisse humaine.

Les cataplasmes de pain de froment, avec miel, de nid d'hirondelles, d'album græcum.

Les emplâtres de melilot, diachylon, celle de fiente d'oie, de miel cuit ensemble dans du vin.

Les onguents d'althea resorbants, etc.

Le cataplasme d'absinthe pilée avec de la graisse de porc est excellent, et par ce seul remède Rollandus a guérit une esquinancie très violente.

De tout cecy on peut composer diverses formules.

Au commencement pour gargarisme, le suc d'écrevisses exprimées avec la grande joubarbe est recommandé comme spécifique par Hartmann et Paracelse.

Le suc de la grande joubarbe dans lequel on a dissout un peu de sel ammoniac, est excellent pour un gargarisme.

L'eau distillée de la même plante, dans quoi on dissout du sel ammoniac, était d'après l'expérience de Conradin, éprouvé au commencement de l'esquinancie.

Le *sel de prunelle*, seul on dissous dans une décoction de prunelle, guérit l'esquinancie dès le commencement.

Ces gargarismes se font en partie avec des décoctions, en partie avec des eaux distillées.

Hartmann dans sa *Practica chymiatr.*, p. 85, met un gargarisme presque universel dans toutes les affections de la gorge. A son imitation on peut prescrire le suivant pour restreindre, dissoudre puissamment au commencement de l'esquinancie.

⌘ Prenez une poignée de fleurs de mauve en arbre, des roses, rouges, de la prunellé, de la véronique, de la sauge, demi-poignée de chacune; du polypode de chêne, de la semence de moutarde hachée, deux drachmes de chacune; faites cuire le tout dans deux livres et demie d'eau simple, ou demi-livre de vinaigre jusqu'au déchet d'un pouce. Exprimez légèrement la colature, ajoutez-y trois onces de sucre, mêlez le tout pour un gargarisme. Il est merveilleux au commencement dans l'accroissement de l'esquinancie; il est astringent résolutif, car la moutarde résout et ouvre l'abcès mûri.

⌘ Prenez de la prunelle, de la véronique, de la sauge, de la scabieuse, une poignée de chacune, de la racine de polypode de chêne, de réglisse, deux drachmes de chacune, une drachme d'alun crû, deux onces de miel rosat, quatre onces de vinaigre rosat, faites cuire le tout dans une quantité suffisante d'eau simple. La colature, avec une légère expression, servira de gargarisme, au commencement et dans l'accroissement.

Autres d'eaux distillées :

Prenez de l'eau de prunelle, d'oseille, de plantain, de roses, demi-livre de chacune, au rob de sureau, du diamoron, une once de chacun; faites distiller le tout, ajoutez sur deux onces de la liqueur distillée un scrupule de sel de prunelle ou de nitre fine, pour un gargarisme. Autre :

⌘ Prenez six drachmes d'eau de mort du diable, de bétoine, de scabieuse, trois onces de chacune, du rob de noix, du diamoron, une once et demie de chacun, demi-once d'album græcum; mêlez le tout pour un gargarisme.

Le gargarisme de Scultet dans son *armamentarium chirurgicum*, obs. 32, est éprouvé au commencement et dans l'accroissement pour arrêter l'augmentation de la tumeur, pour résoudre,

ôter le mucilage qui enduit la gorge, enfin pour rompre l'abcès.

ꝯ Prenez demi-drachme de semence de moutarde en poudre, une once de vinaigre de vin, trois onces d'eau de plantain, deux drachmes de sucre blanc, mêlez le tout. Riviere, cent. 4, obs. 76, a eu un admirable succès de ce gargarisme.

Quand les mucosités visqueuses se trouvent dans les inflammations des amygdales, la semence de moutarde broyée depuis une drachme jusqu'à deux, cuite comme ci-dessus servira de gargarisme ; si la liqueur est trop âcre, on ajoutera à la colature une once ou deux de sucre, ou une quantité suffisante de miel.

Les modernes et spécialement Deckers (in Barbette) fait ajouter l'esprit de vin, le sel ammoniac, et tels autres volatils aux gargarismes, et je ne doute pas que l'esprit de vin brûlé n'y soit très bon, aussi bien qu'un peu de sel volatil autant que les parties malades fort sensibles en peuvent souffrir ; ce qui est confirmé de ce que l'urine propre nouvellement rendue est excellente en forme de *gargarisme dans la tumeur et l'inflammation des amygdales*, et parce que Lindanus dit que le remède du vulgaire *dans l'inflammation des amygdales*, c'est d'appliquer *leurs bas* sur les glandes de la gorge, et que de cette manière, la tumeur se dissout ; la raison c'est que les bas sont empreints de la sueur et de la vapeur des pieds, qui ont la force de digérer et de résoudre par les sels volatils dont ils abondent. Ce qui fait voir que les sels volatils sont excellents pour résoudre les inflammations de cette nature, par exemple :

Prenez des feuilles d'hysope, et des fleurs de sureau, de camomille, de l'herbe de melilot, une poignée de chacun ; une demi-once ou six drachmes de petit raisins passés ; faites cuire le tout dans une quantité suffisante d'eau simple ; prenez une livre ou une livre et demie de la colature ; ajoutez-y une once, ou une once et demie d'esprit de sel ammoniac, pour un gargarisme.

Ou bien dissolvez une quantité suffisante de sel de tartre, et de sel ammoniac dans quelque décoction délayée, afin que le sel volatil mis en liberté puisse mieux pénétrer. Pour tempérer l'acrimonie des sels volatils, ajoutez-y du miel rosat, du sirop violat ou quelqu'autre tempérant.

Ce liniment externe contribuera en même temps à la même indication :

Prenez une once d'huile d'amandes douces, une quantité suffisante d'esprit de sel ammoniac, pour la consistance d'un liniment, pour enduire souvent en dehors la partie enflée. Autre :

℥ Prenez de la térébenthine malaxée avec le sel volatil d'urine ou le sel amoniac, mêlez ensuite avec l'onguent dialthea, ou l'emplâtre de melilot. Autre :

℥ Prenez deux onces d'onguent dialthea composé : demi-once d'huile de camomille, deux drachmes d'huiles de philosophe ; mêlez le tout pour un liniment à appliquer extérieurement. Autre :

℥ Prenez une quantité suffisante d'emplâtre de melilot malaxée avec l'huile distillée de succin, ou de cire que vous appliquez pour dissoudre.

Dans le *progrès* de la maladie, les âcres et les salins sont moins convenables, les humides suffisent, qui détergent doucement sans acrimonie, et facilitent par leur douceur la maturité, la suppuration. Par exemple dans le progrès du mal pour résoudre et murir l'abcès, faites ce gargarisme :

℥ Prenez de la racine de réglisse, d'hyeble, d'iris, deux drachmes de chacune, de fleurs de camomille, des roses rouges, d'hysope, deux pincées de chacune, trois dattes, une figue, deux drachmes de semences de fenugrec, trois drachmes d'album grœcum, faites cuire le tout dans une décoction de raves, ajoutez à une livre demie de la colature du sirop de capillaire, de jujube, une once de chacun, mêlez le tout pour un gargarisme. A cause de la sensibilité et de l'excoriation des parties dans la suite du mal, la moindre âcreté est très douloureuse. Par cette raison, les deux détersifs qui mûrissent en détergeant sont très convenables.

Ainsi si la douleur est excessive, on peut faire cuire les simples du gargarisme dans du petit lait ou du lait frais, car le petit lait, et le lait même déterge, adoucit puissamment.

Les *onguents* qui sont employés extérieurement sont entre autres : l'onguent d'althea avec l'huile de camomille ou d'amandes douces ; l'emplâtre de mélilot est pareillement usité.

Pour les *cataplasmes*, on les compose ordinairement de pain

de froment avec la racine d'althea, par exemple, pour un cataplasme commun :

℥ Prenez demi-livre de mie de pain blanc, de la racine d'althea, de lis blanc, une once de chacune, six drachmes de semences de lin, demie-once de fenugrec ; faites cuire le tout dans une suffisante quantité de lait doux jusqu'à la consistance de bouillie ; passez le tout par un tamis, ajoutez-y de l'huile d'amandes douces, de lis blancs, demi-once de chacun, trois drachmes de safran, un jaune d'œuf ; mêlez le tout pour un cataplasme.

Ces remèdes doux et tempérés modèrent l'*acrimonie des sels* qui font effervescence, dans la suppuration de l'inflammation, et en modèrent l'acrimonie, ils diminuent la douleur et l'inflammation, et facilitent l'union des *sels opposés au pus*, qui est un troisième *sel salé*.

Les cataplasmes spécifiques sont ceux de nid d'hirondelle ; plus il y a de fiente, meilleur il est, parce que le nitre, l'ammoniac conviennent spécialement à la cure de l'esquinancie. On pétrit le nid d'hirondelle avec du miel, de la graisse de porc et de l'album græcum, et on fait un cataplasme, simple à la vérité, mais excellent dans cette affection. Autre :

℥ Prenez un nid d'hirondelle, une poignée d'album græcum, faites cuire le tout dans du vin, appliquez en forme de cataplasme. Il est admirable.

Les cataplasmes composés des boutiques ont lieu ici, comme le cataplasme de Mindererus, de nid d'hirondelle. Exemple d'un cataplasme composé :

℥ Prenez un nid d'hirondelle, ajoutez-y des feuilles de mauve, de guimauve, une poignée de chacune, des fleurs de camomille, de mélilot, deux poignées de chacune, trois onces de farine d'orge, une drachme de safran, deux onces et demie d'huile rosat, demi-once d'huile de camomille ; faites cuire le tout et l'appliquez en forme de cataplasme.

On peut ajouter à ces sortes de cataplasme, des oignons cuits sous la braise, ou le suc d'oignon, qui mûrit puissamment, et ouvre l'abcès, par exemple :

℥ Prenez de la racine de guimauve, de lis blancs, une once de chacune, six drachmes d'oignons cuits sous la braise, un nid,

d'hirondelle, des figues, des dattes, trois de chacune, demi-once d'album græcum, faites cuire le tout dans une quantité suffisante d'eau d'orge, ajoutez à une livre de la colature, de la farine de froment, de semence de lin, de fenugrec, d'althea, une once de chacune, deux jaunes d'œufs, deux drachmes de safran d'Orient, deux onces et demie d'huile de camomille; mêlez le tout pour un cataplasme.

Avant que d'appliquer ces cataplasmes, c'est la coutume d'oindre extérieurement les parties avec l'onguent approprié d'althea, ou quelque autre ramollissant, ce qu'il faut réitérer autant de fois que le cataplasme est sec, car alors il ne sert de rien.

Quelques-uns recommandent comme un spécifique dans l'esquinancie un fil de soie couleur de pourpre avec quoi on a étranglé une vipère, on met ce fil autour du col; je m'en rapporte à l'expérience qui est sujette à caution.

Des abcès.

Lorsque *l'abcès est formé* et mûr, il faut l'ouvrir.

S'il s'ouvre de lui-même, c'est une bonne affaire.

Quelquefois, il y a du danger à faire l'ouverture; on se sert ordinairement de semence de lin dans une livre d'hydromel pour gargariser.

D'autres touchent l'abcès avec l'esprit de vitriol, et il se rompt aussitôt.

Quelques-uns font un gargarisme à l'imitation de Rollandus, avec deux livres de vin blanc, et trente gouttes d'huile de vitriol; on mêle le tout pour s'en gargariser souvent; l'abcès se rompt promptement.

Bartholethus propose comme un secret pour ouvrir l'abcès, un cataplasme de racine d'iris, avec du beurre, de l'huile violat à appliquer en dehors. Il assure que l'abcès s'ouvre aussitôt, très heureusement.

Le crachement, la toux, le vomissement servent à rompre l'abcès.

Si on peut atteindre l'abcès avec le scalpel, c'est la meilleure manière de l'ouvrir.

On dit que la *cendre de chauve-souris* calcinée, enduite avec du miel, produit le même effet.

L'abcès ayant été ouvert, il faut modifier et consolider l'ulcère. A quoi convient surtout le gargarisme d'hydromel, dans quoi on a éteint plusieurs fois un fer rougi au feu.

La décoction de véronique avec du miel, et rendue acide avec un peu d'esprit de vitriol, purifie, consolide l'abcès.

La décoction de plantain et de feuilles de chêne avec le rob diamoron, fait la même chose.

Si le *scorbut caché rend ces ulcères rebelles*, il est à propos d'imprégner du miel rosat d'une quantité suffisante d'esprit de sel bien rectifié jusqu'à une agréable acidité, ce qui est d'une grande vertu dans les ulcères de la gorge et de la bouche.

Quand les *ulcères sont sordides*, il faut avoir recours au verdet, savoir à l'eau verte de Plater ou de Hartmann que vous pouvez voir dans sa pratique chymiatr. ch. 52, hist. 4. On en touche les ulcères avec un pinceau, et on fait ensuite un liniment ou un gargarisme avec du miel rosat, au lieu de quoi les chirurgiens mêlent de l'onguent égyptiac avec du miel rosat, pour en tempérer l'acrimonie; ils appliquent le tout avec un pinceau sur les *ulcères sordides*, et qui inclinent à la *gangrène* pour les modifier.

Enfin il y en a qui ajoutent un peu d'alun aux liniments pour consolider l'abcès.

La mixtion consolidante de Timœus qui suit a rapport ici :

℞ Prenez de la racine d'Iris de Florence, d'angélique, de caryophyllata, une drachme de chacune; deux scrupules d'alun brûlé, deux onces de miel rosat; mêlez le tout pour enduire l'abcès.

La boisson ordinaire doit être la décoction d'orge, ou seule, ou avec du nitre bien dépuré en mettant sur deux livres d'eau d'orge demi-once de nitre dépuré.

La *laryngotomie* regarde la chirurgie; c'est une opération sûre et sans danger.

Enfin, s'il est nécessaire de fortifier les parties, on fera une décoction de prunelle, de plantain, de fleurs de rose, dans du vin. A quoi on ajoutera une quantité suffisante de dianucum, pour un gargarisme, légèrement astringent. Dans tout le cours de la maladie, vous mettrez toujours dans la boisson du nitre dépuré, ou antimoine qui soulage merveilleusement la soif dans les fièvres et les autres maladies.

Al'égard de l'esquinancie fausse ou blanche, voyez Mindererus, med. militaire, pag. 109 etc., où il en traite savamment. Lorsque le mucilage visqueux encroûte la langue, nettoyez la gorge avec un linge et du vinaigre, et ensuite, donnez un gargarisme avec une décoction de fleurs de troëne dans de l'eau avec un peu de vinaigre, et tant soit peu de sel ammoniac. S'il y a des aphtes, ou élevures dans la bouche, prenez de l'alun en place du sel ammoniac; le suc de joubarbe récent animé par le sel ammoniac est utile en place du vinaigre, pour nettoyer la langue.

Après avoir nettoyé la bouche, on frottera avec le rob nucum, ou le diamoron, mêlés avec un peu de miel rosat.

Apthes.

Ce sont certaines excoriations, ou légères exulcérations de toutes les parties de la bouche, et quelquefois de l'œsophage et du ventricule, ce qui paraît par les matières rejetées qui sont farineuses, et mêlées d'écailles ou de petites croûtes.

Les aphtes surviennent communément aux grandes fièvres, et ardentes en forme de pustules, qui dégénèrent successivement en petits ulcères. Elle naissent des humeurs âcres, et dans les fièvres qui attaquent des sujets qui ont le ventricule (estomac), plein de crudités ou de matières érugineuses, ou porracées qui engendrent les aphtes, lorsque le médecin ne vide pas ces matières à temps. Quoique l'estomac soit net (sain), les aphtes ne laissent pas de venir, savoir de la salive corrompue, salée et âcre. Les aphtes qui tirent leur origine du ventricule paraissent enfoncées dans la gorge. Celles qui viennent de l'aigreur de la salive corrompue ont coutume d'encroûter la langue, qui devient sèche, pâle, visqueuse, et différente suivante les humeurs qui pèchent. Les plus dangereuses sont celles qui viennent des impuretés du ventricule, car elles occupent tout le canal de l'œsophage jusqu'à la gorge.

Les meilleures sont blanches, jaunes, claires, fongueuses, molles et gonflées comme de la laine; les unies, les visqueuses, les plates et compactes marquent que la maladie est durable et dangereuse. Les enfants ont le plus souvent des aphtes les sept premiers jours par la corruption du lait; alors il n'est rien de meilleur que le lait même qui les déterge, les humecte médio-

crement et les ramollit. Il y a des aphtes rouges et molles pires que les premières; les livides, les vertes et les noires sont les plus funestes de toutes. C'est un mauvais signe, si elles ne se mûrissent et ne ramollissent pas, ne s'humectent pas facilement, quand elles sont trop longtemps sèches, acides, compactes, plates et égales. Plus elles durent, plus elles sont dangereuses. Les aphtes qui paraissent et disparaissent en trois jours prognostiquent une longue maladie. Il en survient toujours de nouvelles, et plus le médecin purge, plus la maladie sera longue, car il n'y a rien de pire que de purger souvent quand les aphtes paraissent. Nous connaissons que les aphtes veulent venir par l'assoupissement, et par le hoquet, si les malades, qui n'ont point dormi tout le cours de la maladie, s'assoupissent et les aphtes sortent. Le hoquet marque les aphtes du ventricule qui sont les pires.

Toute la cure consiste dans une humectation, qui ramolisse et échauffe doucement.....

BOERHAAVE

Angina.

(*Aphorismi de morbis cognoscendis.*)

783. — Impedita valde, dolens admodum, vel et impedita et dolens simul Deglutitio, atque Respiratio, quæ contingit a causa morbosa agente in partes binis his functionibus inservientes, supra pulmones, et supra stomachum positas, Angina vocatur.

784. — Cujus duplex observatur species; prima sine ullo signo tumoris externi, internive apparet; altera vero cum aliquo tumore in aliqua parte organorum descriptorum (783) deprehenditur semper.

785. — Illa prior in fine morborum diuturnorum, maxime post ingentes et sæpe repetitas evacuationes, contingit; palorem faucium, siccitatem harum, tenuitatem simul, comites habet; quare nervos et musculos resolutos plerumque habet; fere semper est *signum imminētis mortis*; raro curatur, et tum tantumque remediis replentibus vasa vacua bono succo vitali, calefacientibus, corroborantibus.

786. — Eadem prior species aliquando oritur subito sine signis manifestis prægressis ullius morbi; vix capit medelam; et fere semper, post mortem, *suppuratum pulmonem* demonstrat.

787. — Quæ cum tumore accidit varia nomina accipit, vel a *natura* tumoris, vel a *loco* per tumorem occupato. Hinc est œdematosa, catarrhosa, inflammatoria, purulenta, scirrhosa, canerosa, convulsiva Angina.

788. — Occupant hi tumores (787) linguam, ejus musculos; *palatum, tonsillas, uvulam*, hujus musculos; *cava* (sinusites) ossium frontis, maxillæ superioris, ossis sphenoidis, enato et ibi radicato polypo increcente, nares obturante, palatum deprimente pendulum, fauces angustante, pharyngem laryngemque occludente; musculos ossis *hyoidis* omnes, vel aliquos; musculos laryngis externos, internos, communes, proprios; asperæ

arteriæ membranam interiorem, muscularem; pharyngis musculos superiores, et œsophageum; ipsum œsophagi musculus; glandulas asperæ arteriæ, et œsophago ita vicinas; ut hæ fistulæ ab iis tumentibus comprimi queant, ut sunt salivales omnes, tum vagæ circa hæc loca, ac tandem ipsæ thyroideæ.

789. — Ex qua historia (785 ad 789) perspecta apparet ratio tam multiplicis, improvisi, et funesti sæpe eventus hujus mali (783).

790. — Cum vero tam varius ille morbus sit, tam varium effectum producat, variaque adeo remedia et artem medendi postulet, quantum brevitatis hic necessaria permittit, eum recenseri necesse est.

Angina aquosa.

791. — Angina aquosa, œdematosa, catarrhosa tenuis, est impedita, vel dolens respirandi, vel deglutiendi exercitatio, cum tumore lymphatico partium, quibus illa fit, vel vicinarum.

792. — Habet ergo, ut ceteræ aquosæ colluvies, sedem in parte glandularum, ubi reconditur atque excernitur secreta arteriis lymphæ.

793. — Ergo pro causa agnoscit, quidquid exitum liberum lymphæ impedit; eorum vero est numerus ingens, et diversitas. Compressio venarum quæcumque; in quas forte earum glandularum emissaria se evacuant; obstructio nata in ipso folliculo glandulæ a gypso, pituita, lapide, fungo et similibus ibidem enatis; obstructio facta in ipsis emissariis a causis eisdem; compressio eorundem locorum; frigus finibus excretoriorum meatuum applicatum; debiliior humorum circumactio.

794. — Effectus talis mali sunt: tumor aquosus, albus, frigidus; vicinorum compressio; impeditum functionum, quæ a non compressis pendebant.

795. — Hinc signa diagnostica (791-792-793) et prognostica (797) facillime patescunt.

796. — Curatis autem hic peragetur iis, quæ 1^o causas obstruentes resolvunt, movent, aut rodendo, vel secando tollunt; huic spectant emollentia, aperientia, laxantia, forma fofus, cataplasmatibus, gargarismatibus, injectionibus, collutoriis, vaporibus, applicata; tum frictiones; caustica; scalpellum; 2^o quæ copiam lym-

phæ, per opposita loca evacuando, minuunt : quod fit apophlegmatismis, vesicatoriis, sudoriferis siccis externis, internis, diureticis similibus, hydragogis per alvum ; 3° abstinentia ab liquidis, victu calefaciente, exsiccante ; 4° augendo vim, circulationis per remedia nota (98-99.)

Angina scirrhusa.

797. — Si vero glandulas descriptas (788) scirrhusus, et multum increscens tumor occupaverit, signis scirrhi (392) cognoscitur; atque ex noto ejus situ futura angina prævidetur, nata vero perspicitur; tum si extirpatio possit fieri, ea sola *remedio* erit tuto; aut in internis circa fauces *corrosio* multa cum prudentiâ tentanda (Hypertrophie amygdaliennæ).

Angina inflammatoria.

798. — Verum quando ab inflammatione, glandulæ, vel musculi occupantur, tum oritur morbus huc proprie referendus ob summam, qua funestus est, acutiem, et velocissimam, et insuperabilem sæpe violentiam.

799. — Hujus (798) mali causa : 1° in genere est omnis ea, quæ inflammationem quamcunque potest producere (375, 376, 377, 378); 2° illa omnis, quæ inflammationis causas determinat imprimis ad loca descripta (388), maxime ad laryngem, pharyngem, os hyoïdes, horumque musculos, tum ad fistulæ pulmonalis superiora: talia autem sunt, dispositio propria juvenibus, sanguine divitibus, rufis; exercitium frequens, validumque harum partium, oratoria exercitatio, cantus, clamor, fortis equitatio adverso vento et frigido, tubarum et fistularum inflatus, labores validi in aëre frigido; calor æstuans magnum frigus excipiens tempore verno; aridæ fauces ob aëris recepti et expulsi fervorem in æstu solis, vel in febre inflammatoria.

800. — Ubi ex his causis (779) nata est, varia, et inter ea horrenda, symptomata creat, pro diversitate partis ejus, quam occupat.

801. — Si sola laborat pulmonalis fistula (trachée), illæsis aliis, in interna sua membrana musculosa, tum oritur ibi tumor, calor, dolor, febris acuta calida, cæterum externa signa nulla,

vox acuta, clangosa, sibilans; inspiratio acutè dolens; respiratio parva, frequens, erecta, cum summo molimine; hinc circulatio sanguinis per pulmones difficilis; pulsus mire et cito vacillans; angustiae summæ, cita mors. Estque hæc una ex iis, quæ funestissimæ, nec externa dant signa; quo vero proprius glottidi et epiglottidi malum, eo sane magis lethale.

802. — Si larynx imprimis acute inflammatur et sedem habuerit malum in *musculo albo* glottidis, et simul in carnositas ei *claudendæ* inservientibus, oritur dirissima, subito strangulans, angina.

Signa ut priora (801); dolor in elevatione laryngis ad deglutitionem ingens, auctus inter loquendum atque vociferandum; vox acutissima, stridula; citissima, cum summis angustias, mors. Estque hæc, sine signis externis, omnium pessima.

803. — Si soli muscoli elevando ossi hyoïdii, et laryngi servientes inflammantur valde, signa evidentia sunt hæc: respiratio satis liberà; deglutitio in prima actione suæ exercitationis acutissime dolens; tum signa inflammationis in genere; et eadem in iis musculis, qui apparere examinanti possunt.

804. — Quando autem *sola pharynx*, eodem infestatur malo, signa specifica sunt, infectis faucibus apparentia; respiratio satis commoda; deglutitio dolens, impossibilis; materia deglutienda per nares veniens; eadem in asperam arteriam pulsa, et tussim violentam excitans; hinc defectus, cibi et potusque ingerendi; exsiccatio et exasperatio omnium humorum in corpore; febris non adeo intensa; major morbi duratio ante illatam mortem.

805. — Si vero tonsillæ, uvula, velum membranosum pendulum, muscoli ejus quatuor pterygostaphylini, inflammantur valde, tum fiunt fere eadem ac in priori (804); respiratio incommoda, difficilis, per nares nulla vel parva, per fauces angusta; materia deglutienda ob angustias et summos dolores per os redeuns; excreatio perpetua; pituitæ ad cava tonsillarum stillicidium perpetuum, copiosum; *dolor acutus in aure interna*, et via eo tendente a faucibus: crepitatio in aure dum deglutitio fit; surditas sæpe perfecta. Hoc mali genus hodie a *lue gallica* frequens, et valde metuendum.

806. — Quod si omnes hæ inflammatoriæ species (801, 802, 803, 804, 805), vario concursu, simul ægrum infestent, conclu-

ditur facile eo sæviorem fore morbum, quo plures in unum conspicerint; tumque simul eo plura, et sæviora symptomata evenitura esse.

807. — Nam impedito tum cruoris in jugulares externas, vel per has ipsas compressas, reditu, fit tumor faucium, labiorum, linguæ, vultus; linguæ exsertio, intorsio, inflammatio; oculorum rubedo, protuberans tumor horrendus; cerebri ob eadem suffocatio; hinc visus, auditus, tactus hebetes; delirium; hiatus oris; stertor; decubitus impossibilis præ suffocatione; rubor, tumor, dolor, pulsatio, sæpe in collo, pectore, cervice, conspicitur; unde venæ jugulares, frontales, raninæ varicosæ tument.

808. — Decurrit autem omnis Angina consuetum inflammationis generalis iter, eademque facit, ac patitur mutationes in resolutionem, pus, gangrænam, scirrhum.

809. — Ergo si signa docuerint, anginam esse (801-802), contestim examinandum, an pura hactenus inflammatio adsit (382, 383, 384); tumque citissime per efficacissima remedia (395 ad 402) tentanda resolutio est (386). Itaque 1° cita, magna, repetita missio sanguinis, eousque ut debilitas, pallor, refrigeratio, vasorum collapsus, doceant, vim susperstitis non posse augere tumorem et rigiditatem vasculorum, exercenda erit. 2° Valida alvi subductio per purgantia ore hausta, vel clysmatum instar injecta, repetita. 3° Victu, potuque tenuissimo, et lenissimo opus. 4° Nitrosis, subacidisque medicamentis. 5° vapore humido, molli, tepido assidue hausto; fomentis externis; derivantibus epispasticis.

810. — At species (803) raro tam periculosa ac (801-802) eadem remedia (809), sed leviora, petit. Hic autem imprimis cataplasma anodyna, laxantia, emollentia externa necessaria.

811. — Dum denique angina (804-805) adhuc inflammatoria, infestat, tum eadem remedia (809-810) requiruntur unita, sed addendæ perpetuæ humectationes oris et faucium, per lenissima attenuantia *nitrosa*, diluentia aquosa calida, laxantia pinguis, quæ ore quieto contineri, leniter gargarisando applicari, fistula injici possunt; requiritur continua opera, ne arescant partes.

812. — Si omnibus his non, sero, vel frustra tentatis (809-810-811), morbus sit maxime recens et strangulans a causa superiori, quam erit locus sectionis, cum symptomatibus pessimis

(807), nec tamen adhuc gangrænosis, statim post acerbam prognosin instituenda erit *bronchotomia*.

813. — Quæ fiet, præparato corpore ægri, in aspera arteria infra laryngis inferiora ad pollicis distantiam; discissa cute, et integumentis; amotis musculis; secto interstitio inter annulos arteriæ asperæ; imposito canaliculo argenteo, dein ablata causa, quæ exegerat hanc operam, vulnus percurando; interim clysmata nutriente applicando, si deglutitio impossibilis.

Angina suppuratoria.

814. — Verum si malum jam eo processerit, ut suppuratio loci affecti jam incipiens cognoscatur per signa (387), erit tentanda via abcessus per artem et remedia generalia (402 ad 412), maxime autem molli, assiduo gargarismate, largo cataplasmate laxante; pertusione loci, sensibus deprehensi; bronchotomia (812-813).

815. — Illa autem anginæ species, quæ prior descripta (801-802) raro eousque adolescere potest, sed vel prius resolvitur (809) vel necat.

Angina gangrænosa.

816. — Si tandem causæ anginæ (799) augmentur, et in parte nobili magis (801-802) hærent, velet in externis (804-805) sæpe in gangrænam abit lethalem; id vero novimus 1° Ex signis hujus generalibus (426-427-428-429) applicatis ad partes obsessas, quarumque functio læsa; 2° ex signis propriis, si tumor, ruborque prius conspicui subito, sine bona causa, disparuerint; si dolor similiter sic abiverit; fauces subito æquales, lævesques fiunt; siccæ, glabræ, lividæ fauces: tum nullam capit magnitudine nimis propecti mali medelam.

817. — In scirrhum circa tonsillas, uvulam, palatum abit angina eorum locorum, ex causis descriptis (392), unde cognoscitur facile, curatur difficulter, maxime ubi in *cancrum* jam abiit. Vid. (79. 7).

Angina convulsiva.

818. — Si nervi motores organorum deglutitionis, vel respirationis, impediuntur suas exercere functiones in illa organa,

oritur *paralytica* angina; talis a luxatione dentis vertebræ dicitur contingere, aut alterius vertebræ cervicis ad interiora. Si *convulsionum* causa quæcumque musculos pharyngis, laryngisve occupaverit, oritur subita, suffocativa angina; talis in epilepticis, spasmodicis, hystericis, hypochondriacis sæpe numero fit, abit, redit: curatur imprimis his, quæ iis morbis curandis propria sunt.

819. — Ex hac historia data (783 ad 819) intelligitur ratio observationum Hippocraticarum.

Angina sine ullo signo conspicuo, solo strangulatu orthopnæico se prodens, cum febre acuta, dolore magno capitis, vel crurum, sine signis bonis, cito lethalis, primo scilicet, secundo, vel tertio die.

Angina ἐπιγενέση orta ex iis aliis inflammatoriis morbis; aut si species (801-802) nata ex (803-804-805), lethalis.

Angina spumam oris excitans, serum tenue exprimens, fæces alvi sine sensu dimittens, in febre valde acuta sine ullo signo conspicuo occupans, cum recessu tumoris, ruboris, pulsationis in faucibus vel lingua tamen strangulans, ubique lethalis, et præceps.

SAUVAGE

Esquinancie.

(*Angine, trousse galant, estrangillon, avives des chevaux, Soleysel; cynanche, squinancia de Gardon; prunella de Paracelse; angina inflammatoria de Boerhaave.*)

C'est une inflammation aiguë dont le principal symptôme est un obstacle à la respiration et à la déglutition, que l'on sent dans le gosier, sensation qui est accompagnée d'une fièvre aiguë, de rougeur au gosier, avec chaleur, douleur, enflure, etc.

Quoique dans les écoles, on n'attribue la cynanche qu'à l'inflammation du larynx ou du pharynx, il est d'observation que les amygdales, quelquefois même la luette et le voile du palais sont enflammés dans cette maladie.

La cynanche diffère de l'angine, comme la phrénésie de la manie, la néphrésie de la névralgie, en ce que la cynanche est accompagnée de fièvre et qu'il n'y en a point dans l'angine.

Esquinancie ordinaire.

(*Cynanche tonsillaris, cynanche des Grecs, espèce d'angine, Boerhaave aph. n° 805.*)

Cette espèce d'esquinancie est caractérisée par l'inflammation, a rougeur et la douleur d'une ou des deux amygdales, avec engorgement dans les parties voisines, prolongement et tumeur de la luette, ou inflammation du voile du palais; ce que l'on peut aisément apercevoir en abaissant la langue par le moyen d'une cuillère. Les variétés de cette esquinancie sont l'esquinancie catarrhale, l'esquinancie sanguine ou pure, la synochiale ou compliquée de fièvres putrides.

Dans ce cas, la respiration est gênée, difficile; elle ne se fait point par les narines, ou du moins n'y passe-t-il que très peu d'air; celle qui se fait par le gosier est laborieuse, à moins que le malade n'ait été plusieurs fois attaqué de cette maladie; car on observe que la cynanche est plus fâcheuse la première fois

que dans la suite ; surtout, si cette première fois, une des amygdales a été emportée, ou lorsqu'elle a suppuré, les aliments que l'on veut avaler reviennent par le nez, l'épuration est fréquente, muqueuse, épaisse ; on éprouve dans l'oreille une douleur qui s'étend le long de la trompe d'Eustache. On sent un craquement dans cet organe lorsqu'on avale quelque chose ; quelquefois même le malade devient sourd.

L'esquinancie *catarrhale* vient de ce qu'on s'est exposé au froid, le corps étant en chaleur ; elle commence par le rhume de cerveau, l'éternuement, la toux ; ensuite la fluxion tombe, comme on le dit communément sur la poitrine, et quand la maladie est calmée, le malade est pris d'un rhume ou d'une toux âcre ; la dyspnée devient plus considérable, l'expectoration est visqueuse, mais la fièvre est moins aiguë et les symptômes moins violents, (Voir l'angine, de Claudin, cons. 115, p. 275).

L'esquinancie *sanguine* ou *pléthorique* vient de la métastase d'un sang trop abondant sur les amygdales, lorsque l'on fait des cris trop aigus ou que l'on voyage à cheval contre le vent, lorsqu'on se livre à des travaux trop pénibles, qu'on est exposé à des vents coulis près d'une fenêtre, surtout en été. On connaît cette espèce au tempérament du malade, à ce qui a précédé la maladie, et à l'absence des signes de l'esquinancie catharrale et synochiale.

L'esquinancie *synochiale* commence par le tremblement et le frisson, sans cause externe ; ensuite on sent de la douleur dans le gosier, à peine peut-on avaler la salive ; la fièvre survient, elle est accompagnée d'une grande toux, de la dyspnée, et de la difficulté de respirer ; la langue est blanche, sordide ; on perd l'appétit, on a souvent des nausées qui augmentent avec la toux et l'expectoration : on a un mauvais goût dans la bouche, et ce mauvais goût ne va pas alors sans cardialgie, sans pesanteur à l'estomac ; la fièvre devient plus intense, la tête est pesante ; non seulement les saignées répétées conviennent dans cette espèce (il faut cependant moins saigner que dans l'angine sanguine, mais plus que dans la catharrale), mais après une ou deux saignées, rien n'est plus utile que de faire vomir le malade avec le tartre stibié ; il sort alors du gosier, même avant les vomissements, une si grande quantité de pituite visqueuse, que l'action

du vomitif semble délivrer le gosier et le soulager aussitôt qu'on l'a pris; du moins ces remèdes détruisent-ils le foyer de la fièvre; c'est pourquoi une seconde saignée et un autre vomitif rétablissent bientôt le malade.

Dans toutes ces espèces d'esquinancies, on peut cependant ordonner les gargarismes répercussifs ou détersifs faits, par exemple, d'une décoction d'orge, avec le sirop de mûres, de grenades, les baies de sumach ordinaire, le sumach des jardins, le nitre, le sel de prunelle, le miel rosat. Dans l'esquinancie catharrale, on se trouve très bien de tenir dans la bouche de l'eau-de-vie: c'est un bon résolutif.

M. Pringle recommande comme un bon remède contre toute espèce de cynanche, de tremper des morceaux de drap dans parties égales d'huile commune et d'esprit de corne de cerf, pour les appliquer ensuite autour du cou; on aura soin de réimbiber les morceaux de drap toutes les heures. Ce remède excite la sueur et suffit avec une saignée pour diminuer ou emporter l'inflammation. Il est bon aussi de faire des gargarismes avec la décoction de figes cuites dans du lait, auxquels on ajoutera un peu d'esprit de sel ammoniac.

Esquinancie épidémique.

(*Epidémique, coqueluche ordinaire; Febris anginosa de Huxham, lib. I, p. 92, Cynanche epidemica; morbus epidemicus.*)

Cette maladie est bien différente de la cephalitie à laquelle Mezerey avait donné le nom de coqueluche.

Cette cynanche ravagea au mois de juillet 1557 la Gaule Narbonnaise, et fit périr beaucoup de personnes en peu de jours. Les malades toussaient, leur gosier était rude, ils y ressentaient une inflammation brulante; ils avaient une fièvre continue, un grand mal de tête, une toux ferine, d'où résultaient l'insomnie et une douleur continuelle dans les reins et dans les lombes, un rhume de cerveau constant.

On guérissait quelques malades en les saignant et en leur donnant des béchiques qui déterminaient une sueur fétide. Ceux dont le gosier ne pouvait admettre les aliments, parce qu'on ne les avait pas secourus à temps, étaient consummés par la

fièvre, périssaient d'inanition. On pouvait purger avec la manne et la casse.

Esquinancie maligne.

Cynanche maligna (Panaroli pentecost. 5).

L'esquinancie épidémique maligne est celle qui est compliquée de triteophite, ou d'hémétritée maligne, et dont les paroxysmes sont fort longs. Cette maladie est fort dangereuse et souvent mortelle suivant Hartmann et Lindanus ; elle est peut-être la cynanche contagieuse de Strauss, l'angine pestilentielle dont le siège est dans le cerveau, de Bonet-Paliath. Les amygdales pestilentielles d'Aétius ; le lac du gosier, l'ulcère syriaque d'Arétée ; Garotillo des Espagnols ; le pœdancone de quelques Grecs ; l'angine sèche d'Hippocrate, 1. Prognost. Severinus dit qu'on reconnaît cette espèce au charbon qui se trouve à la base de la langue et au larynx. C'est une maladie qui moissonne beaucoup d'enfants et c'est ce qui la fait appeler pœdancone c'est-à-dire strangulatrice des enfants.

Il y a plus de soixante-dix ans que cette maladie régna épidémiquement aux environs de Nîmes, surtout parmi les bœufs ; quelques hommes en furent aussi attaqués. La langue des bœufs était rongée à la racine, et tombait. Le meilleur remède, que l'on pût employer était de râcler la langue de ces animaux avec une pièce de monnaie ou une cuillère d'argent et de laver la plaie avec un gargarisme détersif ; on faisait aussi des gargarismes avec l'ail, le poivre, le sel, et autres choses semblables. C'est au praticien à juger si cette espèce est différente de celles dont nous venons de parler. Collect. Acad., tom. 2, p. 295. Voir aussi sur le même sujet le paragraphe suivant.

Esquinancie ulcérée.

(Vandermonde, 1758, page 577, mal de gorge gangréneux M. Boucher.)

Les malades étaient faibles, leurs tempes battaient fortement. ils avaient une amphimérine aigue. Les purgatifs que l'on donnait entraînaient des déjections séreuses ; le sang sortait goutte à goutte par les narines ; les règles coulaient aussi pen-

dant ce temps-là. On sentait de la douleur dans le gosier ; le voile du palais était rouge, le pouls faible ; on voyait des escharres grises s'élever de tous côtés sur la voûte du palais ; les bords de ces escharres étaient rouges et très sensibles. Parmi tous les gargarismes, il n'y en avait aucun, si l'on en excepte celui de M. Raulin, qui put en arrêter le progrès. Voici la formule de ce gargarisme :

On fera dissoudre un scrupule de sel de saturne dans deux onces d'eau de plantain ; l'on trempera dans cette solution des plumaceaux de charpies avec lesquels on touchera les escharres plusieurs fois dans la journée. Ce remède diminue l'ulcère et le consolide. On arrête tout-à-coup cette maladie, si l'on touche six fois dans le jour les escharres avec un pinceau que l'on aura trempé dans un mélange de demi-once de miel rosat, avec douze gouttes d'esprit de sel ; on fera un gargarisme avec une infusion de fleurs de sureau. M. Van Swieten le donnait même en boisson.

Esquinancie gangreneuse.

(M. Marteau, *Journ. de médéc.*, mars 1736, octobre 1757, *Contagiosa pestilensque cynanche, dissert. de Rabours de ulcere tonsillarum*, 1749.)

Le prélude de cette maladie n'est pas toujours le même. Communément elle commence par la chaleur et le frisson, la pesanteur et le mal de tête, la douleur du gosier, l'enrouement, une petite toux quise déclare tout à coup, une faiblesse excessive, une grande oppression ; les enfants ont des nausées et le tenesme. Dans tous les malades, le pouls est petit, vite, agité ; les urines sont pâles, crues, souvent colorées dans les adultes, troubles, et en petite quantité. Les yeux sont pesants, rouges, larmoyants ; le visage plein, un peu bouffi, coloré, rarement pâle, déprimé. Tous les symptômes étaient plus vifs pendant la nuit, la fièvre plus intense ; l'accès, qui revenait tous les soirs, fut accompagné d'un délire souvent subit, pendant tout le temps de la maladie. Les amygdales s'enflaient plus tôt ou plus tard ; les parotides et les maxillaires se tuméfiaient souvent tout-à-coup, et suffoquaient presque le malade. Alors le visage devenait

presque cramoisi ; on voyait, au fond de la bouche, des taches blanches qui s'étendaient avec rapidité, et formaient des ulcères qui rongeaient la luette et les amygdales. La langue est blanche et humide à sa pointe, couverte d'une saburre épaisse, brune ou jaune à sa racine. L'haleine est d'abord désagréable ; elle devient peu à peu très fétide. Les symptômes deviennent plus violents dès le second ou le troisième jour, et la fièvre est plus vive. Ils se calmaient après trente ou quarante heures, mais l'insomnie, la dysphagie et l'anxiété augmentaient ; à ces symptômes succédaient des vertiges, des douleurs et des pesanteurs de tête, souvent accompagnées d'un délire phrénétique ou carotique, pendant lequel les malades marmottaient entre les dents. La toux était chaude, sèche, rude ; cette toux était suivie de sueurs ; les urines étaient les mêmes qu'avant la maladie ; les enfants surtout avaient des nausées et la diarrhée ; leur respiration était beaucoup gênée ; elle était accompagnée d'un ronflement orthopnéique, d'une voix rauquée, creuse, qui leur était particulière.

Le quatrième ou le cinquième jour était marqué par des crachats muqueux, fétides, purulents, sanguinolents ou livides ; en un mot, extrêmement dégoûtants. Les narines de quelques-uns étaient enflammées, excoriées ; une ichorosité caustique corrodaient les joues et les mains, surtout dans les enfants, ce qui leur occasionnait des éternuements. Quand l'écoulement de la bouche ou des narines venait à se supprimer, les enfants mouraient tout à coup. Lorsque les malades avalaient ce venin, ils avaient des coliques et des dysenteries, sans que l'anus ou les fesses en fussent affectées. La toux détachant les *tuniques* de la trachée artère, cet organe se pourrissait ; une fièvre hectique consumait les malades ; souvent ils étaient attaqués d'une *péricapneumonie* qui les faisait périr. Vers le troisième jour ou environ, il se faisait sur la poitrine ou sur les bras une *éruption cutanée* d'un rouge cramoisi, ou érysipélateuse ; les pustules avaient la couleur du suc de framboises ou du vin. Quelquefois elles paraissaient sur le visage, ou du moins un prurit et une desquamation furfuracée qui soulageait le malade. Lorsque l'éruption était brune ou livide, et disparaissait tout à coup, c'était un très mauvais présage, car elle était bientôt remplacée par un pourpre noir.

Les urines devenaient limpides. A tout cela se joignaient des convulsions et l'orthopnée.

La maladie était à son plus haut degré, dans les enfants, dès le cinquième ou le sixième jour, et un peu plus tard dans les adultes. Ils mouraient péripneumoniques, comateux, phtisiques ou dans une fièvre lente ou phtisique, quand la lenteur et l'égalité du pouls, la séparation facile des escharres du gosier, la détersion des ulcères, leur couleur rouge, la vivacité des yeux et une respiration plus libre, annonçaient la sueur; les urines devenaient alors *troubles, épaisses*, ou déposaient un sédiment furfuracé ou le malade suait abondamment, ou *l'épiderme se séparait* sur tout le corps et tombait en écailles, et le malade était guéri. Si les tremblements revenaient, si l'éruption disparaissait tout à coup et devenait livide, si le pouls était petit, vif, la peau brûlante et sèche, la respiration difficile, les yeux éteints, les urines pâles et limpides, si le malade devenait phrénétique ou tombait dans l'assoupissement, si le visage était couvert d'une sueur froide et visqueuse, le hoquet survenait bientôt; le malade était suffoqué; sa face était œdémateuse, onctueuse, brillante, son regard cadavéreux, et il périssait. Une seule saignée a souvent été très utile; une seconde fut toujours nuisible. Dans la première, le sang se couvrait dans la palette d'une *croûte gluante et plombée*; au-dessous de cette croûte, et dans la seconde saignée, il était *gélatineux, verdâtre* ou noirâtre et point séreux; il formait un coagulum qui était presque dans un état de *dissolution*. A l'ouverture du cadavre on trouvait dans les viscères un sang putride, dissous et sphacélé. M. Lorane le père a donné un mémoire sur cette maladie, dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Montpellier.

Le traitement de cette maladie consiste à corriger la putridité du sang par les *antiseptiques* chauds, sans faire usage de sel alcali. Je commençai par un lavement émollient. Rarement je ne fis qu'une seule saignée. Je donnais des purgatifs doux dès le commencement, lorsqu'ils étaient indiqués, ce qui n'arrivait pas souvent. Dans la plupart des cas, je purgeais sur le déclin de la maladie. Cependant quand le malade avait des nausées, j'ordonnais dès le premier temps l'oxymel scillitique, ou un autre

vomitif doux, et, par ce moyen, je calmaï les symptômes de l'esquinancie.

Aussitôt après ces évacuations, j'ordonnais une potion composée avec le sel d'absinthe ou le sel volatil de corne de cerf et le suc de limon mêlés dans de l'eau alexitère, avec un peu de contrayerva, de myrrhe et de safran; quand la fièvre était un peu plus intense, on préparait des bols avec les ingrédients de cette potion, auxquels on ajoutait le nitre. On pouvait aussi faire prendre aux malades adultes un ou deux grains de *camphre*, quand leur estomac pouvait le supporter, ou bien le julep, ou le vinaigre camphré avec le sirop de groseilles. Le second ou le troisième jour, on ajoutait à tous ces remèdes une légère teinture de quinquina. Par ce traitement on favorisait l'éruption et l'on aidait la sueur; on donnait aussi, dans les mêmes vues, les diaphorétiques légers avec une décoction d'orge. Quand les sueurs étaient fétides, je jetais quelques gouttes d'*élixir de vitriol* dans la *teinture de quinquina* ou je donnais tout simplement de l'eau et du vin avec du sirop de limons. Il fallait sans cesse déterger la bouche avec une décoction de figues ou de roses, avec la myrrhe et le miel, l'esprit de vitriol et les mucilagineux. On obligeait le malade à recevoir par les narines la vapeur d'une décoction de *sisymbrium* ou de *cochlearia*, de roses, de camomille avec la myrrhe et le camphre, qu'on faisait bouillir dans le vinaigre. On appliquait des épispastiques sur les parotides ou derrière les oreilles. On faisait ensuite, sur ces parties, des fomentations émollientes.

Esquinancie exanthémateuse.

(Collect. Acad., tom. 3, obs. 42. Wincler. *Angina variolosa*. Sydenham, pag. 659, 664. — *Angina morbillosa*, Sydenham : p. 144. Morton, de morb.)

Cette espèce d'esquinancie a lieu quand les boutons de la petite vérole sont en suppuration, ou prêts à se dessécher, c'est-à-dire onze jours environ après l'invasion de la maladie. Comme les arrière-narines et le voile du palais sont couverts de pustules, les bouillons que l'on donne aux malades reviennent par les narines; ils ne peuvent cracher le mucus, parce

qu'il est desséché; la respiration est gênée; ils sentent un obstacle dans le gosier; ils ont une fièvre secondaire, quand la petite vérole est confluyente.

Rien ne fait plus de bien à ces malades qu'un gargarisme avec une décoction d'orge et de miel rosat, que l'on injecte dans la bouche et dans les narines avec une seringue, pour ramollir les parties et procurer une détente d'où dépend la guérison.

L'angine rougeoleuse s'annonce, même avant l'éruption, par une voix rauque, une toux sèche très incommode, le rhume de cerveau, le larmolement, la difficulté d'avaler et de respirer, à cause de l'engorgement de la trachée-artère et du pharynx par la matière morbifique, qui cherche à sortir. Il faut, dans ce cas, donner des loochs et des tisanes adoucissantes, comme dans le traitement de la rougeole.

M. Allioni s'étend fort peu sur l'esquinancie miliaire, avant l'éruption, dans son *Traité des maladies miliaires*. Mais cette cynanche s'évanouit ordinairement quand l'éruption paraît. M. Borgiani, professeur à Pise, a observé, *lib. de Venenis*, p. 101, que les malades atteints de l'esquinancie scarlatine ou rougeoleuse avaient quelquefois une horreur de l'eau, comme les *hydrophobiques* et que ce symptôme était heureux pour les malades.

Esquinancie trachéale.

Cynanche vera des Grecs, Cynanche laryngea; angina canina, Zacutus lusitanus, lib. 1, obs. 88. Première espèce d'angine. Boerhaave, aphor. 101.

Lorsque l'inflammation attaque la seule membrane musculieuse de la trachée-artère, sans se communiquer aux autres, on sent dans ce canal une tumeur, de la chaleur, de la douleur; le malade a une fièvre aiguë, chaude. Au reste, cette affection ne se manifeste par aucun signe extérieur. La voix est aiguë, glapissante et se fait avec sifflement; on sent une douleur aiguë pendant l'inspiration. La respiration est petite, fréquente, élevée, extrêmement pénible. Le sang circule difficilement dans les poumons. Le pouls change étonnamment de minute en minute; les anxiétés sont très grandes; le malade meurt bientôt.

Cette maladie est une de celles qui sont le plus funeste et ne se manifeste par aucun signe extérieur. Plus le mal est près de la *glotte* et de l'*épiglotte*, plus il est mortel; mais lorsque l'inflammation est dans les muscles du larynx, surtout lorsqu'elle est interne, le malade éprouve une douleur très vive quand le larynx s'élève pour la déglutition; cette douleur est plus vive encore quand le malade veut parler ou crier; la voix est très aigue, bruyante; il meurt au plus tôt dans une cruelle agonie. Cette variété trachéale est la plus funeste de toutes les esquinancies. (Voyez à ce sujet Dodoëus, obs. c. 18. Tulpius, lib. 1, c. 51. Georges Horstius.)

Esquinancie du pharynx.

Paracynanche des Grecs. Dysphagia inflammatoria.

Quatrième espèce d'angine, Boerhaave, n° 804.

On voit si le pharynx est enflammé, lorsqu'on fait ouvrir la bouche aux malades attaqués d'esquinancie. Ils respirent assez aisément, mais la déglutition est douloureuse, impossible; les aliments et les liquides reviennent par les narines: ils sont poussés par la trachée-artère et excitent une toux violente. De là naît l'impossibilité de boire et de manger; les humeurs se dessèchent, s'alcalinisent; la fièvre n'est point violente et la maladie dure longtemps avant que le malade meure.

Esquinancie du Thymus.

Cynanche thymica Bonnet, sepulchret. obs. II, p. 478.

Cette espèce est très rare; elle dépend de l'inflammation du thymus, qui comprime l'œsophage, la trachée-artère et forme une tumeur à la partie inférieur du cou, près du sternum. Le malade rejette, par le vomissement, ce qu'il a avalé; mais on n'aperçoit aucun changement au gosier.

Esquinancie hépatique.

Les avives des chevaux; Cynanche hepatica. Garinon, cons. 161.

Angina salva laringis a jecore corrupto ortum ducens.

Bonnet, sepulchret.

Un homme mourut dans trente heures; on crut que la cause de sa mort était une esquinancie. A l'ouverture de son cadavre,

on ne trouva rien contre nature dans le larynx, mais le foie était si pourri, qu'il s'en allait en dissolution comme une motte de terre. La quantité d'exhalaison et de sanie qui s'en détachait avait comprimé le larynx, au point de faire périr le malade. Cette maladie attaque ordinairement les *chevaux* lorsqu'on les mène à l'abreuvoir, tandis qu'ils sont baignés de sueur. Les glandes du cou s'enflent, et ces animaux périssent souvent au bout de deux jours.

Glisson a observé que l'on trouve leur foie entièrement dissous par la putréfaction.

Esquinancie par métastase causée par la gale ou des dartres repercutés.

De Mezerey. tom 2, n° 518, Esquinancie goutteuse.

Voir Angina arthritica de Musgrave.

Esquinancie fausse.

Cynanche ad eglutitis, Angina spuria, Etmuller (Voir dysphagie).

C'est celle qui succède à des accès de goutte régulière; elle est entretenue par la nature arthritique, et accompagnée de douleurs vagues dans les articulations; souvent elle se termine par un abcès, d'où l'on voit sortir beaucoup de pus. Cette esquinancie tient alors lieu de goutte et le malade vit longtemps sans avoir des accès gouteux; enfin, quand on fait rentrer cette esquinancie, la goutte survient.

La cynanche arthritique est précédée par une fièvre violente, et presque ardente, qui est bientôt suivie de douleur et d'une tumeur phlegmoneuse dans le gosier, qui rend la respiration si difficile que le malade ne peut quelquefois rien avaler au bout de deux jours. La salive coule abondamment, le ventre est resserré, et le sang se trouve coueneux dans les palettes où on le reçoit.

TRAITEMENT. — Il faut délivrer le corps des humeurs qui le fatiguent, par la saignée, les purgatifs, les gargarismes et les vésicatoires, comme dans l'esquinancie ordinaire. Mais il faut s'attacher surtout à attirer la matière morbifique sur les membres, et c'est en cela que le traitement de cette goutte diffère

des autres. Pour remplir cette indication, on ordonnera au malade, sur le déclin de la maladie, et après l'avoir purgé, de boire du pommé, du vin blanc, ou du vin du Rhin. Par ce moyen on attirera la goutte sur les articulations. On aura eu attention en même temps d'appliquer sur la partie affectée un emplâtre céphalique, oxycrocéum, et de poix de Bourgogne, ou une toile couverte de Cérat, ou un vésicatoire âcre et stimulant ; on pourra même faire mettre les pieds du malade dans de l'eau aussi chaude qu'il pourra la supporter. Quand la partie s'enflammera, on couvrira la tumeur avec une compresse double ; l'esquinancie cesse et disparaît quand la goutte se jette sur le genou ou sur le pied.

Esquinancies causées par frictions mercurielles.

Astruc, des Malad. vener., liv. 4, chap. 8. Cynanche mercurialis, Schenklius, liv. 6. obs.

Cette esquinancie arrive quelquefois après trois ou quatre frictions mercurielles ; les glandes salivaires et maxillaires, les parotides et les amygdales se tuméfient tout à coup, et s'échauffent ; on y ressent de la douleur ; la langue s'enfle aussi et sort de la bouche, le visage et la tête sont également tuméfiés, la déglutition et la respiration sont laborieuses ; la voix s'éteint ou change étonnamment. Quand le malade parle, on croirait qu'il mugit. Il est assoupi ; une fièvre aiguë l'agite ; sa salive est puante, abondante, visqueuse ; on voit des petits ulcères s'étendant sur les côtés jusqu'aux joues. On sent une douleur semblable à celle que causent des dents prêtes à sortir ; les gencives sont tuméfiées, les dents vacillent dans leurs alvéoles surtout quand elles sont attachées par le moyen du tartre. Tous ces symptômes, ou des maux plus graves encore, arrivent quand on donne trop de frictions mercurielles, sans les avoir fait précéder par un assez grand nombre de bains.

Le traitement exige que l'on fasse quitter au malade les linges qui l'ont enveloppé ; nettoyage de la peau à l'eau tiède ; faire une saignée pour calmer le mouvement du sang ; purgatifs, gargarismes avec lait tiède, etc.

Esquinancie brûlante.

Cynanche, prunella, Etmuller, p. 202.

C'est un symptôme de la tritéophytée ardente; le malade est tourmenté par la soif, sa langue est sèche, aride, d'un rouge obscur; il sent de l'ardeur dans le gosier, la déglutition et la respiration sont gênées.

Il convient de mouiller souvent la langue avec le mucilage des semences de psyllium et de coings, extrait dans l'eau de joubarbe; gargarisme avec l'eau de plantain, de laitue, de solanum, de pourpier, de prunelle, de troëne, avec le sirop de mûres de berberis, de citron, la pierre de prunelle ou le nitre, etc.

La *prunelle* de Paracelse est la même maladie que l'esquinancie.

Esquinancie dysentérique.

Lamonière, traité du flux dysentérique. Cynanche à dyssenteria, Etmuller, de angina (Manget).

Cette esquinancie succède à une dysenterie mal traitée ou arrêtée mal à propos. Elle est accompagnée d'inflammation au gosier, de fièvre, de lipothymie. Hilden croit que cette maladie est causée par des pustules qui sortent dans le gosier, tandis qu'elles eussent dû paraître sur les lèvres, comme dans les convalescences.

Traitement : gargarisme de lait et décoction d'orge, fomentations d'huile de lis ou d'amande sur le cou avec de la laine écrue. (Voyez *Bibliothèque anatomique* de Manget, de *Angina*, p. 77.)

CULLEN

Cynanche.

Pyrexia, aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Synonymia. — Cynanche, angina (Hoffmann, Junck) angina inflammatoria (Boerhaave).

Species. — Species sunt:

1° *Cynanche (tonsillaris)* membranam faucium mucosam, et præcipuè tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synochia.

Cynanche tonsillaris (Sauvage).

Angina inflammatoria (Boerhaave 805).

2° *Cynanche (maligna)* tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens, tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis, vel citrini, serpentibus, et ulceribus tegentibus; cum febre typhode et *exanthemate*.

Cynanche maligna (Sauvage).

Cynanche ulcerosa (S. J. de med. 1758).

Cynanche gangrænosa (S. J. de med. 1756).

Ulcera faucium et gutturis anginosa, et lethalia Hispanis Garotillo (Mercat. consult. 24).

Angina ulcerosa (Fothergill, account of the ulcerous sore throat, 751. Huxham, on the malignant ulcerous sore throat from 1751, t. 1753).

Febris epidemica cum anginâ, ulcusculosa (Douglas practical history 1736. Boston).

Angina epidemica (Russel œconom. nat. p. 105).

Angina gangrænosa (Witherings. Diss. inaug. Edimb. 1766).

Angina suffocativa (Bards. inquiry. New-York. 1771).

Angina maligna (Johnstone on the malignant angina, Worcester 1799. Walls. Works, p. 58.)

III. — *Cynanche (trachealis)* respiratione difficili, inspiratione strepente, voce raucâ, tussi clangosa, tumore fere nullo

in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synochia.

Synanche trachealis (Sauvage).

Cynanche laryngea. (Eller de cognocendis et curandis morbis.)

Angina inflammatoria. (Boerhaave 801).

Angina latens et difficilis. (Dodonæus obs. 18).

Angina interna. (Tulpius obs. 51).

Angina perniciosa. (Horst. ob. 4, III, obs. 1).

N. R. — An hæc Sauvagesi synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti ; sequentia autem ad morbum characteris datis manifesto pertinere videantur.

Suffocatio stridula. (Scotis the croup. Home).

Asthma infantum. (Millar, on the asthma and chickcongh).

Asthma infantum spasmodicum. Rush, Dissertation, London 1770.

Cynanche stridula, Crawford. Diss. Inaug. Edimb. 1771.

Angina epidemica ann. 1743. Molloy apud Rutty's history of the weather.

Morbus strangulatorius, Starr. Phil. Trans. No, 495,

Morbus truculentus infantum. Franco f. ad Viadrum et in vicinia grassans., ann., 1758. C. a Bergen. A. nova. N. C. tom II, p. 157.

Angina inflammatoria infantum. Russel, Econ. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadosensis, ann., 1758 Hilarg's Barbadoes, p. 134.

Angina polyposa, sive membranacea. Michaelis, Argentorati 1778, et Auctores ab ingenioso et erudito Michaële allegati.

Morbus anginae polyposæ similis Soc. Royale II. Hist. p. 206.

IV. — *Cynanche pharyngea* rubore in imis præsertim faucibus, deglutitione maxime difficili, dolentissima, respiratione satis commoda, et febre synochia.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. Eller de cogn. et cur. sect. 7.

Angina inflammatoria, sp. 4ta, Boerhaave 804.

V. Cynanche parotidea cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno ; respiratione et deglutitione parum læsis ; febre synochia plerumque levi.

Cynanche parotideia, S. sp. 14. Gallis Oreillons et Ourles. Tis-

sof Avis au peuple, n° 118 Encyclopédie, au mot Oreillons.
Angina externa Anglis the Munps. Russel. Econ. natur. p. 114.
Scotis, the Branks.

Catarrhus Bellinsulanus, S. sp. 4.

Osservazioni di Girol. Gaspari. Venez. 1731.

Osservazioni di Targ. Tozzetti, Racolta ima p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15, vel ad malignam, S. sp. 3, vel ad scarlatinam pertinere videtur.

Cynanches symptomaticæ sunt :

a. A; causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphymerina anginosa. S. sp. 12.

Febris anginosa, Huxham de aëre.

Cynanche prunella. S. sp. 12.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A. causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7 rara inflammatoria est, et vix ejus loci.

VICQ D'AZYR

De l'inflammation des amygdales.

L'inflammation des amygdales, surtout lorsqu'elle est jointe à l'esquinancie, est une des maladies les plus violentes que l'on connaisse. Pour prévenir la gangrène et les autres accidents qui peuvent en résulter, il est bon de réitérer les saignées du bras et du pied, des jugulaires, et de scarifier même les amygdales, pour évacuer le sang épais qui les engorge. Les anciens chirurgiens avaient coutume d'appliquer des ventouses et de faire des scarifications sur toutes les parties extérieures du cou près des amygdales ; quelques médecins modernes ont aussi éprouvé le succès de cette méthode dans la maladie dont il s'agit. Les Français et les Anglais scarifient la substance même des amygdales ; cette dernière pratique est la plus efficace et plus sûre, pourvu qu'on emploie en même temps les remèdes internes et convenables, les boissons délayantes, les lavements émollients, et en général les divers topiques les plus propres à détendre et à relacher les parties enflammées, tels que les gargarismes et les cataplasmes adoucissants.

Il arrive quelquefois que l'inflammation des amygdales, au lieu de se résoudre, se termine par un abcès. Ces sortes de dépôts ont quelquefois une étendue considérable ; alors la tumeur gêne tellement la déglutition et surtout la respiration, que le malade courrait risque d'être suffoqué, si on ne s'empressait de l'ouvrir dès qu'on s'aperçoit, par la vue et le toucher, que le pus est formé. Les chirurgiens se servent communément, pour cette opération, d'un instrument qu'on nomme pharyngotome, et qui est très commode pour remplir le but qu'on se propose ici. (Voyez art. Pharyngotome.) Dans le cas où on se trouverait dépourvu de cet instrument, on pourrait pratiquer également l'ouverture de l'abcès par le moyen d'une longue lancette, entourée d'une bandelette de linge ou de peau, de façon qu'il ne restât qu'un travers de doigt de la pointe à

découvert. Après avoir garni ainsi sa lancette, l'opérateur abaisse d'une main la langue du malade avec une large spatule, ou avec le manche d'une cuiller, et tout de suite il plonge de l'autre main la pointe de son instrument dans la partie de la tumeur qui lui paraît la plus saillante. La douleur et tous les accidents s'apaisent aussitôt que la matière purulente est sortie.

L'abcès des amygdales étant ainsi ouvert, on s'appliquera à en favoriser la détersion par un fréquent usage de gargarismes tièdes, fait avec une décoction des plantes vulnéraires, dans laquelle on délayera un peu de miel rosat, ou simplement avec une décoction légère d'orge mondée dans laquelle on aura fait dissoudre ce miel ou avec du vin trempé. Le malade s'abstiendra de toutes les substances âcres et salées qui, s'attachant à la plaie, pourrait renouveler l'inflammation, et lui faire courir de nouveaux dangers.

(*Encyclopédie méthodique*, article Amygdales.)

Du skirrhe ou de l'endurcissement des amygdales.

Lorsque l'inflammation des amygdales se termine par l'induration, la tumeur, qui en résulte dans l'arrière-bouche, est quelquefois si dure et si volumineuse, qu'elle bouche presque entièrement l'œsophage, surtout si les deux amygdales sont affectées à la fois. Comme il est très difficile de résoudre une pareille dureté, il est souvent nécessaire de la détruire par l'action des corrosifs, ou de l'extirper avec le bistouri ou la ligature.

Si on se détermine pour les caustiques, il faudra bien se garder d'employer les plus violents, de peur que, tombant dans l'estomac, ils ne causent les plus grands désordres. Il vaut mieux se servir, par exemple, de l'huile de tartre par préférence, ou à son défaut d'une solution bien saturée de *mercure* dans l'*acide nitreux*. On touchera une ou deux fois par jour, avec ces remèdes, ou tels autres semblables, la partie des amygdales qui paraîtrait la plus dure, jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment diminué, en observant les deux précautions suivantes : 1^o de ne point appliquer les escarrotiques sur les par-

ties saines ; 2° de ne manger ni boire que quelque temps après l'application du remède, de peur qu'il ne s'en glisse quelque partie dans l'estomac. Il est donc à propos que le malade tienne la tête baissée pendant l'intervalle d'une demi-heure, pour que l'escarrotique puisse sortir avec la salive, et qu'il se gargarise avec de l'eau tiède avant de prendre de la nourriture.

Les anciens extirpaient les amygdales par l'*incision*. Pour cet effet ils ouvraient la bouche du malade avec un crochet propre à cet usage, et achevaient cette opération avec un bistouri. On paraît avoir abandonné cette méthode à cause de la difficulté qu'on trouve à la mettre en pratique.

Aujourd'hui l'extirpation par le moyen d'un instrument tranchant n'est guère employée que lorsque la racine de la tumeur squirreuse formée par la glande est très grosse. Dans ce cas, Cheselden perçait cette racine avec une aiguille particulière, et il faisait l'extirpation de cette tumeur en la liant des deux côtés. Plusieurs chirurgiens se servent, dans cette opération, d'une espèce de *ciseaux courbes*, qui sont très commodes pour cet usage.

Enfin la *ligature* a lieu lorsque les amygdales ne tiennent au gosier que par un pédicule mince ; on peut appliquer cette ligature à l'aide de divers instruments. Cheselden et plusieurs autres praticiens employaient pour cet effet une sonde ; on resserre et on tortille le lien tous les jours jusqu'à ce que la portion squirreuse et corrompue de l'amygdale soit tombée ; ce qui arrive ordinairement au bout de trois ou quatre jours, lorsque la ligature a été bien faite, et selon que le pédicule de la tumeur est plus ou moins gros. Il ne faut pas oublier d'assujettir avec un emplâtre les bouts du fil ou de la ligature sur la joue, de peur qu'ils ne glissent dans la gorge.

(Article Amygdale.)

Angine ou esquinancie. Angina. Cynanche.

On appelle de ce nom une maladie inflammatoire, accompagnée d'une respiration et d'une déglutition difficiles, avec fièvre aigue, douleur, rougeur, et un sentiment de constriction dans

le gosier. On la trouve rangée dans le second ordre des phlegmasies, par Sauvage et par Cullen.

L'angine diffère quant au siège et quant à la fièvre qui l'accompagne, et l'une et l'autre de ces différences sont caractérisées par des signes qui leur sont propres.

1. Quant au siège, je pense que l'on doit admettre comme espèces :

1^o *L'angine du gosier. Angina tonsillaris de Sauvage et de M. Cullen, quinta spec. Boerhaavii*; — je l'appelle *angina faucium*. Alors l'inflammation ne se borne pas aux amygdales; elle s'étend à tout le gosier; c'est l'angine la plus ordinaire; souvent il survient des abcès dans les amygdales; le voile du palais et les colonnes sont aussi très affectés dans la plupart des malades; quelquefois les divers points de la surface du gosier sont couverts d'*aphtes* ou de *petits ulcères*.

Plusieurs médecins ont appelé *esquinancie pharyngée*, *cynanche pharyngea*, une angine dans laquelle l'inflammation occupe principalement le fond de la gorge ou le pavillon du pharynx et de l'œsophage et dans laquelle la déglutition est surtout très difficile. Mais, comme l'observe M. Cullen, ce cas ne mérite pas d'être distingué de l'angine tonsillaire, ou du gosier; il exige seulement, ajoute-t-il, que l'on ait recours plus promptement à la saignée et aux autres remèdes convenables.

2^o *L'angine du larynx et de la trachée-artère, angina trachealis, latens, seu interna, prima spec. Boerhaavii; cynanche laryngea auctorum; cynanche trachealis de Sauvage*. — Ici le siège est plus profond que dans la précédente; la respiration est très difficile, l'inspiration est surtout laborieuse; la voix est rauque, la toux est comme étouffée, et quelquefois accompagnée de cris aigus; il n'y a presque aucune tumeur apparente au gosier; la déglutition est peu douloureuse.

3^o *L'angine de la trachée-artère, et des poumons, appelée croup ou angine membraneuse des enfants; cynanche trachealis de M. Cullen; angina polyposa, sive membranacea*. — Dans cette maladie, la voix est rauque, l'inspiration se fait avec une espèce de sifflement, la toux est accompagnée d'un bruit souvent très sonore, et il sort par la bouche une matière muqueuse, plus ou moins épaisse. L'ouverture des cadavres a démontré : 1^o que le

foyer du mal s'étendait jusque dans les poumons; 2° que la surface interne de la trachée-artère était tapissée d'une membrane polypeuse, ayant plus ou moins de consistance en différents sujets.

4° *L'angine externe*, les ourles, ou oreillons; cynanche parotidæa de Sauvage, et de M. Cullen; angina externa, Ruffel, angina, seu cynanche parotidea infantum. — Elle s'annonce, dit M. Cullen, par les symptômes ordinaires de pyrexie, auxquels se joint immédiatement après un gonflement considérable des parties externes de la gorge et du cou principalement des glandes parotides et maxillaires. Elle est, ajoute ce médecin, souvent épidémique et évidemment contagieuse. Elle attaque aussi les adultes et alors l'engorgement des glandes n'est pas si marqué; dans cette espèce la fluxion est à l'extérieur, la respiration et la déglutition sont à peine lésées.

II. — Quant à la nature de la fièvre qui accompagne l'angine, on doit distinguer;

1° *L'angine gangreneuse ou maligne*, dans laquelle les amygdales et toute la surface du gosier sont couvertes de croûtes blanchâtres ou cendrées, qui cachent des surfaces ulcérées. Elle est très contagieuse, communément épidémique et toujours accompagnée de fièvre typhoïde, d'un typhus. Cette affection est très dangereuse, surtout pour les enfants.

2° *L'angine externe* est ordinairement accompagnée d'une fièvre synoque légère; la fièvre synoque est plus grave dans l'angine du gosier, et dans celle du larynx.

3° Souvent l'angine se trouve compliquée avec la fièvre scarlatine, *scarlatina anginosa* (Sauvage); *scarlatina cynanchica* (Cullen) ou avec la rougeole *rubeola anginosa*, (Sauvage et Cullen); Je parlerai séparément à la fin de cet article de la scarlatine angineuse. Quant à l'angine simple, on peut, relativement au traitement qu'il convient d'employer dans cette maladie, la diviser en plusieurs espèces principales, qui sont: l'angine inflammatoire, l'œdémateuse, la catarrhale, celle qu'on nomme maligne, l'angine sèche, l'angine squirrheuse, et l'angine membraneuse ou polypeuse. Cette division embrasse toutes celles de ces maladies qui sont idiopathiques. Quant à celles qui sont symptomatiques, telle qu'est l'angine convulsive de Boerhaave,

et plusieurs autres, nous croyons plus naturel et plus méthodique de les renvoyer aux articles des maladies dont elles dépendent. Toutefois, nous ajouterons, à la fin de celui-ci, quelques détails sur la maladie décrite par le docteur Foterghill, sous le nom d'angine pectorale (*angina pectoralis*); celle-ci doit être reportée aux affections des poumons.

Angine œdémateuse ou fausse.

Cette angine est une tumeur blanche et séreuse, située de manière qu'elle gêne la respiration ou la déglutition, ou l'une ou l'autre. Elle n'est accompagné d'aucune inflammation considérable, et elle l'est rarement d'une douleur vive; si elle fait éprouver un sentiment douloureux, c'est la distension des parties tuméfiées qui en est la cause. Cette esquinancie n'attaque guère que les sujets faibles, pâles, cachectiques.

L'angine œdémateuse a pour cause tout ce qui s'oppose à l'excrétion de la lymphe, comme le relâchement des fibres musculaires, les obstructions des vaisseaux ou des glandes lymphatiques; et ces causes dépendent elles-mêmes de beaucoup d'autres, telles que le froid, l'humidité, le sommeil et le repos trop longtemps prolongés, les aliments visqueux, la tristesse. Les effets de cette angine sont le gonflement, la pâleur, la mollesse et le froid des parties affectées, la compression des parties voisines, et le dérangement de leurs fonctions.

Le traitement de cette maladie, lorsqu'elle doit son origine à l'épaississement des humeurs, exige l'usage des émollients joints aux apéritifs, aux incisifs administrés sous forme de potion, de gargarismes, de vapeur, etc.

Si le mal est causé par le relâchement des fibres et par la lenteur de la circulation, il conviendra de recourir aux remèdes sudorifiques, aux diurétiques, aux hydragogues, aux apoplegmatismes, aux vésicatoires, aux frictions sèches et toniques, aux scarifications. Les sudorifiques sont les uns aqueux, les autres stimulants et secs. Ce sont ces derniers qui conviennent ici. On en peut dire autant des diurétiques. Les vésicatoires doivent être appliqués derrière le cou; la diète, dans ce cas, doit être sèche et un peu échauffante.

Il arrive quelquefois que cette angine œdémateuse est accom-

pagnée d'engorgements sanguins. La saignée alors peut être utile; mais il faut l'employer avec beaucoup de circonspection.

(Voir p. 741, t. 129.)

Angine maligne.

Cette espèce est beaucoup moins fréquente que celle dont nous venons de parler; mais aussi, quand elle survient quelque part, elle exerce des ravages plus considérables. De tous les auteurs qui ont traité de cette maladie, le docteur Fothergill est celui qui a le plus contribué à nous la faire connaître, et à nous éclairer sur son traitement. Ce sera surtout lui et quelques autres médecins habiles, tels Chomel, Huxham, Tissot, et quelques autres qui nous fourniront la matière de cette section.

Arétée de Capadoce est le premier qui ait donné une description exacte d'une angine maligne et contagieuse, semblable à celle dont nous parlons. « Les amygdales, dit-il, sont souvent exposées à s'ulcérer; ces ulcères sont ou superficiels et sans danger ou mortels et contagieux; si l'ulcère gagne, s'il devient profond, les Grecs l'appellent escarre; à mesure qu'il s'étend, il ronge la luette et les parties voisines; les malades périssent consumés par la pourriture; les poumons s'échauffent, s'ulcèrent, se gangrènent. Ce sont surtout les enfants qui sont attaqués de cette maladie. Leur visage est pâle et livide, leur voix change et devient rauque ». Aetius, qui vivait à la fin du cinquième siècle, parle de la même maladie, et en termes aussi clairs.

Depuis, on n'en connaît aucun, ni parmi les Latins, ni parmi les Arabes ou autres, qui en ait fait des observations, jusqu'au commencement du dix-septième siècle, où elle devint épidémique en Espagne, de là s'étendit dans la Sicile et à Malte, de même que dans la Pouille, la Calabre et la Campanie; elle gagna le royaume de Naples, qu'elle ravagea pendant plus de vingt années consécutives. Depuis il se passa près d'un siècle sans qu'il en fut question.

Les Espagnols appellent cette maladie Garrotillo parce qu'elle étrangle comme une corde dont on serre le cou. Chez d'autres nations, elle a été nommée morbus strangulatorius, pestilens gutturis affectus, epidemica gutturis lues, etc. Ludovic. Mercatus, médecin de Philippe II et de Philippe III d'Espagne, en

parle, dans un écrit publié en 1612, comme d'une calamité toute nouvelle, qui se faisait sentir alors dans différentes provinces de ce royaume. Après lui plusieurs médecins, la plupart italiens, en ont fait mention. Selon ces auteurs, la maladie dont il s'agit était extrêmement maligne et particulièrement très funeste aux enfants, quoique les adultes en fussent aussi fort souvent attaqués, et elle l'était plus aux personnes du sexe, qu'aux autres. Ils croyaient avoir aussi observé qu'elle était principalement funeste à celles de ces personnes qui avaient les yeux noirs.

Ceux qui en étaient attaqués commençaient à ce plaindre d'une douleur à la gorge, avec une raideur du cou et une difficulté douloureuse de mouvoir ces parties, comme si elles étaient serrées par une corde. Ils éprouvaient une grande difficulté d'avaler, et souvent de respirer; ils rendaient une odeur fétide, et éprouvaient un goût désagréable. La luette, le pharynx, les amygdales et toutes les parties de la gorge de ces malades paraissaient d'un rouge vermeil, très remarquable, semblable à celui que l'on observe dans un érysipèle. Cette couleur n'était cependant pas partout de la même force; il y avait des endroits d'une teinte plus foncée que les autres. Toutes les parties dont nous venons de parler étaient plus ou moins enflées, sans cependant que la respiration fut aussi gênée que dans l'angine ordinaire. Mais quand l'attaque était violente, les malades éprouvaient une extrême difficulté de respirer et d'avaler, avec une espèce d'oppression douloureuse et de retrécissement de la poitrine et du dos. Une rougeur assez forte paraissait sur tout le visage et au cou; ils ressentaient une grande chaleur à toutes les parties affectées; leur voix était étouffée; ils avaient une soif qu'on ne pouvait éteindre et paraissaient en danger d'être suffoqués.

Dans quelques-uns, l'enflure et les ulcères de la gorge se montraient quand on regardait dans la bouche; on ne pouvait rien voir dans les autres; mais on sentait une odeur putride très désagréable. La fièvre survenait ensuite; elle était accompagnée d'éruptions, les unes un peu élevées, les autres semblables à des piqures de puces.

Lorsque la maladie devait prendre le plus mauvais caractère, elle ne montrait pas toujours, dans le commencement, toute sa

malignité; mais le jour même où elle avait commencé, ou le suivant, l'entrée de l'œsophage, qui avait paru plus foncée que le restant de la gorge, commençait à prendre une couleur blanche, cendrée ou noire, qui n'était pas occasionnée par quelque matière répandue sur ces parties, mais par une colliquation ou dissolution gangreneuse de ces organes.

La voix était aussi rauque et obscure qu'elle l'est dans ceux qui ont des ulcères vénériens à la gorge; ce qui, indépendamment de toute autre symptôme, était suffisant pour faire juger de la nature de la maladie.

Le cou et la gorge commençaient peu après à s'enfler extérieurement; la tumeur était d'une espèce molle et œdémateuse et elle prenait de l'accroissement à mesure que la maladie faisait des progrès. Tous les symptômes devenaient plus graves pendant la nuit. Si les malades avaient quelque intervalle de repos, c'était communément dans le jour. En quatre fois vingt-quatre heures, cette tumeur parvenait à occuper une fort grande étendue, et les taches blanches de la gorge commençaient à devenir noires. Une sanie putride et corrosive sortait par la bouche et par les narines; l'haleine devenait extrêmement désagréable. Si jusqu'alors la respiration n'avait pas été beaucoup gênée, elle commençait à devenir difficile; et le malade expirait en très peu de temps.

Quoique ce fût là le progrès ordinaire de la maladie et les termes malheureux où elle aboutissait ordinairement, cependant elle ne se montrait pas toujours sous les mêmes apparences; elle était quelquefois accompagnée de symptômes forts différents.

....Elle avait commencé à se faire remarquer en Angleterre vers 1739; mais quoiqu'on en vit de temps en temps quelques exemples dans les années suivantes, elle resta inconnue à la plupart des médecins jusqu'en 1746. Un grand nombre d'enfants qu'elle fit périr à cette époque et depuis, la fit observer attentivement. Vers le même temps où le docteur Fothergill la traita dans sa patrie, elle régnait parmi les enfants à Paris et en particulier dans le couvent des Dames de la Visitation de la rue du Bac. Elle s'était répandue quelques années auparavant dans le collège Louis-le-Grand, parmi les demoiselles de Saint-Cyr, de même qu'à Rouen et plusieurs autres endroits du

royaume. Quelques années après elle fut observée à Edimbourg et aux environs par M. Huxham; à Aumale par M. Marteau et en 1761, en Suisse, par M. Tissot. Enfin M. Réad, médecin à Metz, a donné les détails d'une pareille épidémie qui se déclara au village de Mousson dans la province des Trois-Evêchés, au commencement de novembre 1777.

Quoique cette maladie se développe dans tous les temps et à toutes les températures, elle se montre néanmoins plus fréquente en automne et au commencement de l'hiver. Les enfants, les personnes du sexe, et tous les sujets délicats y sont plus exposés, et en souffrent plus que les autres.

Quand une fois elle entre dans une famille, ordinairement tous les enfants la gagnent, si l'on n'a pas soin d'empêcher ceux qui se portent bien, de communiquer avec les malades. Les adultes qui se trouvent fréquemment avec ces derniers, et qui respirent de trop près leur haleine, éprouvent souvent la même maladie.

Elle s'annonce de différentes manières dans les différents sujets. Quelquefois on se plaint d'un frisson accompagné de mal de gorge, d'une plénitude, et d'une tension douloureuse au cou. Quelques sujets éprouvent des frissons et des chaleurs alternatives avec un peu de mal de tête, des vertiges, des assoupissements. Tantôt cette maladie se déclare par un fort accès de fièvre, un grand mal à la tête, au dos, et dans les membres, une grande oppression autour du cœur et des soupirs continuels. On a vu des adultes ne se plaindre que d'un malaise qui les forçait à s'aliter.

Quoique le poulx soit ordinairement vif, petit, agité, il est quelquefois lourd et ondulant; et quoique les urines soient le plus souvent pâles, claires et crues, quelques adultes les rendent en petite quantité, fort colorées, et même troubles.

Quelquefois le délire se déclare dès la première nuit, et le redoublement vient exactement tous les soirs pendant tout le cours de la maladie; « lors même qu'elle était sur son déclin, dit Huxham, j'ai souvent appris avec surprise que le malade avait passé la nuit dans le délire, quoique je l'eusse laissé dans un grand calme pendant le jour. »

En général, les malades éprouvent plus ou moins de délire; quelquefois c'est une frénésie continuelle, avec insomnies. Plu-

sieurs sont comme stupides; ils travaillent des mains et parlent entre leurs dents; la peau est sèche, rude, raboteuse; il y a cependant de la disposition à la sueur; les malades ont souvent des envies de vomir; souvent il survient un flux du ventre, et surtout dans les enfants; leur respiration devient beaucoup plus difficile, et est accompagnée d'une espèce de sterteur si forte, qu'on dirait qu'il vont étouffer; la voix est excessivement rauque comme l'ont ceux qui ont des ulcères vénériens à la gorge; le bruit qu'on entend quand les malades parlent ou respirent, a quelque chose de si particulier, que, pour peu qu'on soit familiarisé avec cette maladie, on la reconnaît sur le champ. Ce symptôme est produit par l'état de la bouche et des parties environnantes, la luette étant pendante et différentes parties se trouvant ulcérées.

L'haleine des malades parvenue à ce point est d'une puanteur insupportable, surtout jusqu'à ce qu'il survienne une crise; plusieurs, vers le cinquième ou sixième jour, crachent une grande quantité de matière mousseuse, purulente, puante, et quelquefois teinte de sang; d'autres rendent une matière tout à fait livide et d'une odeur insupportable. On voit assez fréquemment des malades être attaqués violemment et subitement d'une *péritneumonie*, à laquelle ils succombent communément; l'angine précède les *exanthèmes*, mais dans certains sujets elle suit les éruptions cutanées, qui sont quelquefois fort considérables; d'autres malades n'ont aucune éruption, mais ils ressentent des démangeaisons, et quelquefois leur épiderme se lève par écailles. Huxham dit avoir observé ces accidents sur les grandes personnes et rarement dans les enfants. Quelquefois l'éruption ne paraît que dans certaines parties, et quelquefois elle est universelle; le plus souvent elle se fait au visage; tantôt c'est une espèce d'érysipèle, tantôt ce sont des pustules, qui sont ordinairement fort saillantes, enflammées, et d'un rouge foncé; l'éruption ordinairement est d'un rouge cramoisi comme frottée avec du jus de framboise, jusqu'au bout des doigts; elle soulage ordinairement le malade. Cependant on observe quelquefois le contraire, et Huxham a vu un ou deux malades de ce genre, périr dans un terrible accès de frénésie; apparemment parce que la matière avait beaucoup de peine à sortir.

Lorsque cette éruption est douce, qu'elle se fait au commencement, et qu'elle est suivie d'une grande desquamation de l'épiderme, elle est d'un heureux présage; mais quand elle est d'une couleur brune et livide, le malade est en grand danger.

Quelques sujets ont non seulement le visage bouffi, pâle, luisant et comme onctueux, mais tout leur corps est gonflé, et ils ont un aspect cadavérique; quelquefois tout le corps est œdémateux et la peau est une fois plus élevée qu'à l'ordinaire.

Dans l'épidémie de Mézières, dit M. Réad, le principe putride s'annonçait bientôt par des nausées et par des excréments verdâtres, d'une odeur insupportable, et toujours mêlés de vers; les malades en rendaient aussi par la bouche; les urines étaient rouges et enflammées au commencement de la maladie; elles devenaient blanchâtres et fort troubles vers le quatrième jour et elles se maintenaient dans cet état jusqu'à la rémission des symptômes; la concentration du pouls, l'abattement des forces, la noirceur des dents et des lèvres déterminaient évidemment le caractère de malignité; des taches livides, des phlyctènes gangreneuses aux cuisses, annonçaient enfin le plus haut degré d'activité de la cause morbifique, une sorte de pestilence.

Les taches pétéchiâles disparaissaient dans quelques-uns, le même jour qu'elles avaient paru; d'autres les conservaient deux ou trois jours; ceux sur lesquels elles duraient quatre ou cinq jours, les perdaient avec une efflorescence farineuse, qui tombait, quelques jours après, en desquamation furfuracée; les sueurs seules, spontanées ou procurées par les infusions chaudes d'herbes émollientes, ont accéléré cette desquamation, et borné la durée des taches pourprées.

Dans un malade dont parle Marteau (*Journ. de méd.*, mars 1756), la difficulté d'avaler était grande et quoique il n'y eût ni vomissement, ni rapport, ni dégoût, et qu'il n'y eût pas la moindre apparence de fièvre, le mal n'en était pas moins très grave. Dès le sixième jour, le sujet dont il s'agit avait la gorge très gonflée; la langue sortait, la bouche écumait, les yeux étaient convulsifs; il mourut le septième jour, conservant la connaissance jusqu'au dernier moment.

Cette maladie excite quelquefois les règles à un âge ou dans un temps auquel elles ne doivent pas paraître.

Une des malades dont parle M. Chomel rendait la boisson par le nez.

L'esquinancie de cette espèce, observée par M. Tissot, ne paraît pas avoir été des plus malignes. Voici ce que contient de particulier la description de ce célèbre médecin. 1° Les malades crachaient moins qu'on ne crache dans un mal de gorge ordinaire, et ils avaient la langue sèche ; 2° Quoiqu'ils eussent de la peine à avaler, ce n'était pas ce qui les inquiétait le plus, et ils pouvaient boire suffisamment ; 3° Le gonflement des amygdales, de la luette et du fond du palais n'était que peu considérable ; les glandes parotides et maxillaires, surtout les premières, étaient extrêmement gonflées et enflammées ; la douleur dont ils se plaignaient le plus était cette douleur extérieure.

Presque tous les enfants, et un très grand nombre d'adultes avaient, ou dès le premier jour ou seulement les jours suivants, jusqu'au sixième, une ébullition qui dans quelques-uns ressemblait assez à la rougeole, mais qui était d'une couleur moins vive et sans élévation ; elle commençait au visage, ensuite au bras et elle diminuait peu à peu et dans le même ordre qu'elle avait observé en paraissant ; d'autres en très petit nombre éprouvaient des accidents très graves avant l'éruption, et ils étaient attaqués du vrai pourpre ou du millet blanc. Quand ces ébullitions avaient paru, ils se trouvaient ordinairement mieux ; la dernière durait quatre, cinq ou six jours, et elle se terminait souvent par des sueurs abondantes sur la fin, car au commencement elles étaient inutiles, et même nuisibles.

M. Tissot a vu quelques malades dont le mal de gorge s'est dissipé entièrement sans interruption et sans sueurs, mais qui restaient dans une inquiétude ou dans une angoisse très forte avec un pouls fréquent et petit.

Soit que les malades aient eu l'éruption ou qu'ils ne l'aient pas eue, tous ont perdu la première peau ou épiderme, par grandes écailles sur tout le corps.

Dans quelques sujets, il n'y a point de symptômes inflammatoires, et le mal dépendait uniquement d'un embarras putride dans les premières voies. Quelques malades rendaient des vers ; il y a des endroits dans lesquels il n'y avait aucun caractère inflammatoire.

Plusieurs malades, traités par Huxham, étaient attaqués d'une

péripleumonie ou d'une affection comateuse; quelques-uns périssaient d'un ulcère au poulmon, ou d'une fièvre hectique.

Dans les ouvrages que nous avons cités, il est peu question d'*ouverture des cadavres*. Chomel, en rapporte deux; dans l'un et dans l'autre, les amygdales et la luette étaient rongées; les poulmons étaient plus ou moins gangrenés et remplis d'une sanie purulente; dans l'un de ces sujets la trachée artère était ulcérée.

Cette maladie est en général *facile à connaître*. Quand, avec les symptômes communs aux angines, tels que la difficulté d'avaler, celle de respirer, l'altération de la voix, et autres accidents qu'on observe dans toutes ces maladies, on remarque de plus un grand abattement de force accompagné de vomissements ou de dévoiements, à plus forte raison quand tous ces symptômes surviennent dans quelques heures, ce qui arrive généralement lorsque la maladie est violente, on peut la regarder avec raison comme étant de l'espèce gangréneuse; et il n'y a pas lieu d'en douter, si avec ces accidents on découvre dans la gorge une tumeur érisypélateuse accompagnée d'ulcération et d'escarre.

La rougeur du visage, du cou, de la poitrine et des mains est un autre symptôme qui ne peut guère tromper. Il est rare surtout chez les enfants et les jeunes personnes, qu'il manque d'accompagner cette angine, et il ne se trouve jamais joint à d'autres.

Cette maladie est surtout aisée à distinguer du mal de gorge inflammatoire; celui-ci ne se fait sentir que dans la partie où il a son siège, au lieu que, dans le mal de gorge gangréneux, tout le corps souffre; de plus, quoique dans ce mal la gorge soit plus ou moins affectée, c'est cependant la partie dont les malades se plaignent le moins.

Quant au *pronostic*, si dans le troisième ou quatrième jour il survient une douce moiteur, si les escarres se séparent avec facilité, que la gorge paraisse nette et d'un beau rouge; si la respiration est plus libre et que les yeux conservent de la vigueur et de la vivacité, on doit espérer qu'il surviendra une crise salutaire par les sueurs, ou par les urines, ou par une expectoration abondante ou par une desquamation universelle de la surpeau: Mais s'il y a des frissons, si les exanthèmes disparaissent tout à coup, et deviennent livides; si le pouls est petit ou vif, si la peau reste brûlante et sèche, la respiration difficile, les yeux morts,

les urines pâles et limpides ; s'il y a frénésie ou affection comateuse avec une sueur froide et gluante au visage ou aux extrémités, c'en est fait du malade, surtout quand le hoquet survient.

On ne remarque pas que cette maladie ait aucun jour de crise déterminé. Quelques sujets en meurent dès le premier, d'autres le second, le troisième et ainsi de suite jusqu'au septième, quoique la plupart meurent avant le quatrième ; mais quelquefois le danger dure quarante jours et plus, et les suites de ce mal se font sentir longtemps après qu'il a cessé ; une langueur et une faiblesse excessives continuent pendant plusieurs mois ; la voix et la déglutition sont quelquefois tellement affectées, que dans quelques personnes on peut encore en remarquer des vestiges une année après.

Il résulte de la description que nous avons donnée de cette maladie que sa cause prochaine est une disposition putride qui affecte les amygdales et les parties circonvoisines ; ses causes éloignées sont tout ce qui favorise la naissance et le progrès de cette disposition. Aussi apprenons-nous par l'histoire des épidémies de cette espèce, comme nous l'avons déjà observé, qu'elle règne surtout pendant ou après la saison de l'automne, temps où l'on observe cette constitution humide et chaude ou tempérée de l'air, très favorable à la putréfaction. Plusieurs auteurs ont remarqué que cette disposition avait duré longtemps, pendant l'épidémie ; ils joignent à cette cause toutes celles qui accumulent les miasmes en certains lieux, la multitude des cadavres non enterrés, les eaux basses qui reçoivent beaucoup d'imondices. Si cette maladie se fixe de préférence à la gorge, c'est apparemment parce que cette partie donne passage à l'air, à l'eau, qui sont véhicules de l'infection....

(P. 742, t. 129, *Encyclopedie methodique.*)

Fièvre scarlatine angineuse.

(*Angina scarlatina, scarlatina cynanchica. Extrait d'une dissertation de M. André Coventry, écossais 1783.*)

Dans cette maladie, l'angine n'est que symptomatique, mais elle est un symptôme constant et inséparable.

M. Coventry définit cette affection par les caractères suivants :

c'est, dit ce médecin, une pyrexie contagieuse, qui n'attaque qu'une seule fois une même personne. Le malade, ajoute-t-il, respire et avale difficilement. Les amygdales et la membrane muqueuse du gosier sont enflées, rouges, douloureuses et couvertes d'ulcères qui s'étendent aux environs, sous des croûtes blanchâtres ou de couleur cendrée ; le visage devient un peu enflé ; la peau, dans plusieurs régions, est marquée de taches rouges, plates et larges ; ces taches se joignent peu à peu ensemble ; elles se dessèchent et au bout de trois ou quatre jours elles tombent en écailles farineuses, dont la chute est souvent suivie de l'anasarque.

La scarlatine angineuse se montre sous des aspects différents ; quelquefois elle est bénigne et elle se guérit sans le secours d'aucun médicament ; d'autrefois elle résiste à tous les remèdes, et fait mourir promptement les malades.

Son invasion, de même que celles de toutes les fièvres exanthématiques, est accompagnée d'un malaise général, d'une lassitude plus ou moins grande et d'un frisson qui est bientôt suivi de chaleur. Le malade devient triste, il se plaint de mal à la tête ; il a des nausées, il fait des efforts pour vomir, et vomit quelquefois ; il est fort assoupi. Quelquefois le coryza se joint à ces symptômes, aussi bien que l'épiphora. En même temps, ou bien un peu avant, le malade éprouve dans le gosier un sentiment incommode, son cou se raidit. La déglutition est plus difficile que douloureuse, la peau est sèche ; le pouls est fort et quelquefois dur. Ces symptômes qui se déclarent à toute heure du jour, augmentent le soir et dans la nuit. La soif survient, le malade est attaqué d'une grande anxiété ; souvent il éprouve du délire. L'haleine n'a point de mauvaise odeur, mais elle est très chaude. Tout l'intérieur de la gorge devient fort rouge et enflé, comme nous l'avons dit ci-dessus ; cette inflammation est ordinairement érysipélateuse. Dans quelques malades, ces parties, surtout la luette, le voile du palais, et les amygdales, se couvrent de taches blanches, qui sont de véritables croûtes, et dont quelques-unes cachent quelques petits ulcères. La langue, qui au commencement était sèche, devient enduite d'une humeur épaisse et jaune, excepté à son extrémité et sur les bords qui sont humides et rouges, quelquefois cette mucosité remplit la bouche ; les

malades rendent une petite quantité d'urine très colorée ; le ventre est constipé. Ils ont du dégoût pour tous les aliments solides ; quoiqu'ils soient tourmentés par la soif, ils craignent de boire, à cause des nausées et des douleurs qu'ils éprouvent en avalant.

C'est ordinairement dans le troisième jour qu'il paraît des taches rouges, plus ou moins larges, consistant en une infinité de très petites pustules, entassées, à peine élevées au-dessus de la peau, qui causent de la démangeaison, se colorent de plus en plus, se réunissent, s'étendent insensiblement au visage, au cou, à la poitrine, aux bras, au tronc, aux extrémités inférieures, et enfin, qui teignent presque toute la peau d'une couleur rouge foncé.

Les mains et les doigts, où cette couleur a quelquefois le plus d'intensité, sont en même temps enflés, raides, douloureux. Il y a aussi quelques enflures aux autres parties, principalement au visage ; et si l'on y applique le doigt, elles blanchissent, mais aussitôt qu'on l'a retiré, elles paraissent de nouveau.

Quoique ce soit là le temps ordinaire de l'éruption, cependant il varie beaucoup ainsi que la durée ; et suivant que cette sortie est plus ou moins prompte, le mal est plus ou moins dangereux. Le froid peut faire disparaître les taches et alors le mal augmente. Mais, quand cet accident n'arrive pas, elles pâlisent ou plutôt noircissent au bout de trois à quatre jours, et elles quittent les parties dans le même ordre ou elles avaient paru ; le visage et le reste du corps se désenflent, les pustules desséchées tombent en écailles. Avant cette chute il s'en élève souvent d'autres qui sont blanches et qui ressemblent assez à une éruption miliaire, pour tromper aisément ceux qui ne sont pas exercés à observer. Celles-ci en disparaissant à leur tour laissent la peau toute crevassée, raboteuse, et tourmentée d'une démangeaison ordinairement très considérable.

L'éruption abat assez ordinairement la fièvre, et par là elle rend à proportion la maladie plus douce, mais plus souvent la fièvre et ses symptômes ne diminuent que lorsque la desquamation commence, c'est-à-dire le septième jour ou un peu plus tard. Alors le pouls se ralentit ; des sueurs modérées coulent ; le gosier est soulagé ; le sommeil et l'appétit reviennent ; le malade est guéri, ou *semble* l'être.

Mais plusieurs de ceux qu'on croit sauvés de cette manière, tombent, après une ou deux ou trois semaines dans une hydro-pisie qui s'annonce par les signes suivants : les malades, qui paraissaient être convalescents, se plaignent d'abord d'un abattement, d'une lassitude qui augmente peu à peu; ils passent les nuits sans dormir, et ils rendent avec un sentiment de chaleur une petite quantité d'urine briquetée, souvent même sanglante, qui dépose un sédiment semblable à du son. Leur peau est toujours sèche; leur appétit diminue beaucoup, et ils sont toujours tourmentés par la soif; on voit un peu d'enflure au visage et au bas des jambes; enfin l'*hydropisie* se déclare; elle affecte ordinairement tout le corps, et dans ce cas, le coma-vigil, le délire et la cécité en sont quelquefois les suites.

Plenciz a observé : 1° que l'hydropisie, dans cette maladie survient plus particulièrement à ceux chez qui les exanthèmes sont malins ou abondants; 2° que l'enflure est ordinairement proportionnée à la quantité d'écailles qui tombent; 3° qu'elle est plus fréquente et plus considérable dans les enfants que dans les adultes; pendant l'été que pendant l'hiver; quand on s'expose au froid que quand on se tient dans un air tempéré; 4° qu'elle est plus dangereuse et plus meurtrière que la maladie primitive. Coventry pense néanmoins que si l'on y applique de bonne heure les remèdes convenables, elle se guérit aisément.

Tel est l'état ordinaire de cette maladie; mais souvent elle est accompagnée de symptômes beaucoup plus graves, qui peuvent la faire confondre avec l'angine maligne, et dont il va être parlé dans le diagnostic.

La maladie dont il s'agit peut d'abord être prise pour une simple *angine tonsillaire*; mais la première est toujours contagieuse, la seconde ne l'est jamais. On n'a celle-là qu'une fois; le nombre des attaques de celle-ci n'est point limité, et elle est sujette à devenir habituelle par la répétition. Les symptômes de la scarlatine angineuse sont plus violents que ceux de l'angine tonsillaire, et, dans la première attaque, la scarlatine angineuse est accompagnée d'un assoupissement et d'un degré de violence étranger à l'angine tonsillaire. Presque toujours, dans celle-ci, on éprouve un sentiment de pulsation, une douleur poignante, et tout le mal a son siège dans le gosier; la

tumeur de cette partie est considérable, de couleur phlegmoneuse, et elle augmente rapidement. Au contraire, dans la scarlatine angineuse, une chaleur brûlante est jointe à une douleur obtuse, et l'incommodité, au commencement, est générale; la gorge, qui s'enfle moins, plus lentement et plus irrégulièrement, est d'un rouge vif et offre des croûtes sous lesquelles sont ordinairement de petits ulcères. Enfin, après quelques jours, l'apparition ou l'absence de l'éruption ne laisse plus à cet égard aucun doute.

Lorsque la scarlatine angineuse est à ce point où elle approche de *l'angine maligne*, la petitesse, la fréquence, l'irrégularité du pouls, le grand abattement des forces, l'anxiété, les vomissements, la diarrhée, ainsi que tout ce qui a été dit ci-dessus au sujet de cette dernière angine font suffisamment connaître cet état. Ce qui le caractérise surtout est un son de voix semblable à celui d'une personne qui suffoque, et l'écoulement d'une matière fétide, corrosive, par la bouche et par les narines.

Les *aphtes* des enfants produisent des escarres blanches, qui commencent par se montrer aux bords de la langue, d'où elles s'étendent aux lèvres, aux gencives et dans tout l'intérieur de la bouche. Dans la scarlatine contagieuse, les croûtes ne sont jamais sur la langue, ni au dehors, mais elles paraissent d'abord aux amygdales, au voile du palais, à la luette. La pyrexie accompagne fort rarement les aphtes, et quand elle s'y joint, elle n'est point contagieuse.

Cette dernière circonstance peut servir encore à distinguer la scarlatine angineuse de plusieurs autres maladies, telles que *l'angine trachéale*.

Morton a regardé celle dont nous traitons comme une espèce de rougeole, mais, dans la rougeole, on voit, outre les taches, des interstices anguleux et une couleur vineuse, qui ne s'observe pas dans cette scarlatine. D'ailleurs, la toux et les symptômes catarrheux qui appartiennent à la première de ces maladies ne se rencontrent que dans la plus mauvaise espèce de la seconde, et alors on reconnaît celle-ci au typhus (pyrexia typhodes) et aux exanthèmes qui paraissent le second jour. De plus la rougeole n'affecte *que peu le gosier* et n'y produit pas de croûte.

Plus cette maladie approche de l'angine maligne, plus elle est dangereuse.

Angine squirrheuse.

C'est encore ici une angine rare, mais moins que la précédente. Van Swieten en cite plusieurs exemples, d'après divers auteurs et d'après lui-même. La plupart ont été recueillis à l'ouverture des corps.

Les tumeurs squirrheuses occupent ordinairement les parties supérieures du canal alimentaire ou celles qui les entourent, et elles ne nuisent guère qu'à la déglutition parce que la trachée-artère se défend contre la compression extérieure par ses cartilages. Les causes de ces tumeurs peuvent être une inflammation précédente, un usage excessif des boissons spiritueuses, ou de celles qui sont prises fort chaudes, un air froid qui agit longtemps sur la gorge, surtout quand elle est nue.

Peut-on croire que la guérison de ces squirrhes soit possible? Les plus puissants résolutifs, la salivation même, employés par d'habiles médecins, n'ont rien opéré. Les décoctions émollientes et lubrifiantes ont facilité la descente des aliments dans l'estomac, mais elles ont laissé subsister le mal dans son entier. Un chirurgien tenta d'ouvrir le passage en y introduisant une petite éponge attachée au bout d'un morceau de baleine. Il ne fit qu'irriter ces parties et augmenter la tumeur. Une pareille tentative réussit cependant une fois; c'est Willis qui l'a faite et qui la rapporte. Un homme, d'ailleurs assez sain et robuste, dit cet auteur, vomissait depuis longtemps presque tout ce qu'il avalait. Il employa inutilement beaucoup de remèdes; enfin, le mal parvint au point que l'estomac ne reçut plus aucun aliment. Ils s'arrêtaient au-dessus de l'orifice cardiaque et, aussitôt que l'œsophage était plein, ils étaient vomis, de sorte que cet infortuné, mangeant toujours, mourait de faim. Willis, le voyant sur le point de périr, lui conseilla l'usage de l'éponge de la manière que nous venons de le dire. Le malade suivit son conseil et fut assez heureux, dans sa triste situation, pour ouvrir un passage à la nourriture sans en éprouver aucun accident. Depuis ce jour, à chaque repas, il eut recours à cet expédient, et il y a seize

ans qu'il continuait à l'employer avec le même succès lorsque Willis écrivit ce fait.

Le seul secours sur lequel on puisse compter dans un tel cas, c'est *l'extirpation*, si la situation de la tumeur et la nature de la partie où elle se trouve permettent cette opération. Lorsqu'elle n'est pas praticable, il ne reste plus qu'une de ces ressources que l'on réserve pour les cas désespérés, c'est l'application du feu ou d'un *cautère potentiel*, tel que l'huile de tartre par défail-lance, l'un des moins dangereux, ou l'esprit de sel marin. On trempe dans quelqu'un de ces caustiques un pinceau de charpie avec lequel on touche ensuite la partie squirrheuse, en le faisant passer par la canule, afin de ne pas offenser les parties voisines; après quoi, on ramollit les escarres par des décoctions qu'on tient dans la bouche. Quand les escarres sont tombés, on revient au caustique, puis encore aux décoctions émollientes, et l'on répète alternativement l'une et l'autre jusqu'à l'entière disparition de la tumeur squirrheuse, en observant, à chaque application du corrosif, si la tumeur ne commence pas à dégénérer en cancer. On a vu des squirres peu volumineux de la gorge guéris par cette méthode.

Angine sèche de Boerhaave.

Boerhaave parle d'une espèce d'angine qui n'est point inflammatoire, et qui n'est accompagnée d'aucune tumeur externe ni interne; elle est presque toujours mortelle. Dans cette maladie, dit Van Swieten, la gorge est pâle, sèche, exténuée, sans aucune marque d'inflammation interne. A la vérité, on aperçoit quelquefois dans la gorge un peu de chaleur, accompagnée d'une douleur légère; mais l'une et l'autre sont très éloignées de celles que l'on observe dans l'angine inflammatoire, et la dépression de la gorge est encore un caractère qui empêche de confondre ces deux maladies. Celle dont nous parlons succède généralement à d'autres, qui ont été de longue durée et suivies d'un épuisement qui est du surtout à des évacuations successives, par les saignées, les purgatifs, les vomitifs, le dévoiement ou par d'autres moyens quelconques. Il arrive aussi qu'elle survient tout à coup et sans aucune cause apparente; mais cette maladie est toujours très rare et particulièrement avec cette dernière circonstance. Sydenham

en rapporte quelques exemples, qu'il a observé après de longues fièvres, soient continues, soient intermittentes, et qu'il attribue aux causes dont nous venons de parler. On en trouve aussi des vestiges dans Arétée. L'extrême rareté de ce mal, et son incurabilité, doivent nous rendre court sur cet article.

Angine catarrhale.

Un catarrhe qui affecte la membrane de Schneider dans les endroits où elle revêt la luette, le pharynx, les amygdales, et les autres parties de la gorge, produit quelquefois une angine qu'on peut nommer catarrhale. Son traitement est le même que celui du catarrhe. Il consiste dans l'emploi des émollients, des incisifs, non seulement sous forme de potion, mais encore sous celle de gargarisme, d'injection et de fumigation.

PINEL

Angine.

L'angine peut être analogue à l'inflammation des membranes muqueuses, en affectant la membrane interne de l'arrière-bouche, du pharynx, du larynx, ou bien participer à la nature du phlegmon, en attaquant les amygdales et les glandes salivaires. Elle portera enfin plus ou moins les caractères de l'inflammation musculaire, suivant qu'elle affectera les muscles releveurs de l'os hyoïde, ceux du larynx, ceux du pharynx, ceux de la luette ou du voile du palais. Les connaissances profondes de Boerhaave sur l'anatomie, son esprit de méthode et son laconisme de rédaction, ne brillent nulle part mieux que dans ce qu'il a écrit sur l'angine inflammatoire ; mais ce serait une erreur de confondre avec ce qu'on appelle maux de gorge gangréneux, ce que Boerhaave désigne par le nom d'angine gangréneuse, qui n'est qu'une terminaison de l'inflammation. On doit même regretter que cette autre maladie ait échappé à sa sagacité, puisqu'elle a été indiquée par Arétée (lib. 1, cap. IX) et qu'après s'être montrée successivement dans différentes parties de l'Europe, avec le caractère d'épidémie, on en a donné plusieurs fois les descriptions les plus exactes. Pourquoi Stoll dans ses aphorismes n'a-t-il point suppléé à cette omission ? J'ai publié dans la *Gazette de Santé* en 1789, des notices sur une semblable épidémie, qui venait de régner dans une contrée de l'Angleterre, et qui avait été décrite avec exactitude dans le *Journal de Médecine* de Londres.

Genre XXXIII (p. 220) : *Angine*. — Les jeunes gens et le hommes d'un tempérament sanguin sont les plus exposés à la contracter par un exercice violent et pénible, la déclamation oratoire, le chant, les cris, l'équitation en sens contraire d'un vent froid et violent, etc. Si le siège de l'angine est principalement dans la trachée-artère : chaleur, douleur dans cette partie, fièvre aiguë, voix grêle et avec sifflement, respiration fréquente, etc. Si le larynx est plus particulièrement affecté, il se joint aux symp-

tômes précédents une douleur vive lors de l'élévation du pharynx, une voix très aigüe, un danger imminent de suffocation, etc., et c'est sans doute l'espèce la plus alarmante. Si l'affection porte plus directement sur le pharynx, déglutition très douloureuse ou même impossible, la matière alimentaire ou les boissons revenant par les narines. Enfin si le siège du mal est dans les amygdales, la respiration est très gênée, le passage de l'air à travers les narines est plus ou moins obstrué, l'excrétion des mucosités des amygdales fort augmenté, la douleur est aiguë et se propage jusqu'à l'oreille interne, etc. L'angine inflammatoire, en général, peut se terminer par une résolution bénigne de la maladie, par suppuration, par abcès, par gangrène, par l'exsudation de l'albumine et la formation de ce qu'on appelle une fausse membrane, propre à boucher les passages de la respiration et à suffoquer. L'angine inflammatoire est une maladie, qui, dès les premiers temps, demande les secours les plus actifs, soit en portant le relâchement dans les parties affectées par des fomentations à l'extérieur, des gargarismes tièdes, l'eau en vapeur, soit en agissant sur les voies alimentaires par des boissons abondantes et l'usage réitéré des clystères, soit enfin en déterminant une irritation vers les extrémités inférieures, par des pédiluves chauds et très prolongés.

LXVII. — Le mal de gorge gangréneux est décrit par plusieurs auteurs très distingués, tant anciens que modernes ; ses symptômes ordinaires sont : douleur de tête et de l'arrière-bouche, fièvre légère, toux, nul gonflement à l'extérieur, quelques légères traces d'inflammation dans quelque partie du pharynx. Vers le troisième jour, éruption chancreuse dans cette partie ou au voisinage, avec formation d'une pellicule blanche ; ensuite accroissement de la douleur et de la difficulté de respirer, voix rauque et comme par sifflement, quelquefois extinction de la voix. Vers le sixième ou septième jour, croûte gangréneuse, pâleur et lividité de la face, ingurgitation des boissons par le nez, respiration difficiles, voix éteinte, pouls petit et fréquent, etc.. On ne peut guère reconnaître les caractères de la fièvre, de l'ordre IV (classe 1), et c'est d'après ces principes que le traitement en doit être dirigé, en portant également ses vues sur l'affection locale. C'est dans des affections semblables, où la nature ne développe que des

efforts impuissants ou nuisibles, qu'il faut porter des secours prompts, prévenir ou modérer les progrès ultérieurs de la maladie, et montrer autant de lumière dans le choix des moyens, que d'habileté dans l'art de les diriger.

TRAITÉS DE CHIRURGIE

JEAN DE VIGO

Des apostèmes des mandibules et des deux amandes, et de la cure d'icelle (chapitre XVI, livre II ; traduction française du 16^e siècle).

Amygdales sont deux particules charneuses, qui sont situées aux deux côtés d'uvula, à la façon et figure de deux amandes, et par ce les anatomistes les ont appelés amandes. Et bien souvent reçoivent apostèmes, à cause de la matière catarrheuse qui descend du cerveau, et pour la purgation d'icelle (après la convenable purgation de la matière antécédante) tant par médecine laxative, que par phlébotomie de la veine céphalique, quand l'âge et la vertu (tempérament) y consent et avec l'application des ventouses sur les épaules et la scarification et ordonnant la diète comme est dit aux chapitres précédents (selon les humeurs peccantes), il est très utile d'user d'aucuns remèdes escripts ci-dessous. En premier, il convient au commencement d'user des choses qui ont familière répercussion, comme est la gargarisation, qui est composée d'une partie d'eau de rose et de deux parties de vin de grenade, et de la moitié de vinaigre rosat ; à cette intention est utile la décoction d'orge en laquelle aura bouilli un petit de sumach, un petit de diamoron ; cette décoction réperente merveilleusement la matière, reconforte le lieu et est bonne au commencement, en l'augmentation, en l'état, et en la déclination, quand l'apostème vient en voie de résolution. Le gargarisme qui s'ensuit, quant à la résolution, est principalement en l'état, et est la forme qui s'ensuit : hordei mundati p. m. dactyl. ana ; bulliantur cum sufficiente quantitate mellis et collentur ; cui colaturæ addentur mellis rosati IIII, syrupus de duobus radicibus II ; et iterum bulliantur unica ebullitione.

Pareillement sont utiles les choses dessous nommées en divertissant la matière ; puis lier les extrémités et puis les laver et les frotter pareillement, pour retenir le rhume (phlegme) de la tête. Est très convenable l'application des étoupes un petit (un peu) brûlées et fumiguées de la forme d'encens, et pareillement de prendre le patient en l'air par les cheveux suivant la doctrine de Mésué. Et quand l'apostémation par la voie préalléguée ne peut avoir lieu et qu'elle tend à maturation, on peut utilement appliquer par dedans et par dehors les remèdes qui s'ensuivent pour la maturation d'icelle. En premier faut appliquer cataplasme qui s'en suit :

pommorum seu prunorum decoctorum....	IIII lib
butyri.....	III lib
pinguedinis gallinæ... ..	III lib
lactis mulieris.....	III lib
farinæ hordei bene tritæ.....	V lib

ad ignem bulliatur usque ad spissitudinem, addentur in fine duo oniones.

Cet emplastre mis sur gorge fait facilement la maturation des deux amygdales et mitige la douleur. Et par dedans on fait décoction sous cette forme :

ficarum siccarum.....	II dactyl.
passularum.....	II —
radicum altheæ.....	II —
hordei et furfuris mundific....	II —

Concoquentur cum sufficiente quantitate brodii gallinæ, et bulliantur ad consumptionem duarum partium ex tribus ; deinde colletur fortiter et addentur zuccari II, mellis rosati III. Iterum bulliantur unica ebullitione. .

Il convient gargariser souvent de cette décoction, qui sera toujours chaude, quand on en usera. Elle est maturative et mitigative de douleur, et quand l'apostème est mûr, il faut l'ouvrir, avec la lancette et modifier l'ulcère avec la décoction d'orge, avec miel rosat, en gargarisant souvent. Ainsi faisons fin du présent chapitre duquel le nom de Dieu soit loué.

(Cap. XVI.)

De l'apostème du gosier nommé squinantia et de la cure d'icelle.

Au gosier s'engendre souvent de matière catarrheuse un aposthème lequel est communément nommé des docteurs squinantia, et Cornelius le nomme angina; il est maladie dangereuse et fait aucune fois mourir en deux jours, aucune fois en quatre et aucune fois en sept. Et ce témoigne Hippocrate au livre des Aphorismes disant : « Quibuscunque squinantia ad cannam pulmonis convertitur in vii diebus moriunt. Si vero has effugerunt empyrei fiunt. » Squinantia est un aposthème du gosier lequel défend l'air d'entrer dans la canule du poumon et défend viande de passer jusqu'en l'estomac, lesquelles choses sont très nécessaires à la vie humaine. Et selon Galien, lumière de médecine, il en est de quatre espèces, desquelles la première est avec grande douleur et dans laquelle n'apparaît point suffocation ni dedans ni dehors et est entre les lacertes (ligaments) du gosier et est connue par la difficulté de respiration et de déglutition, et le plus souvent elle suffoque le patient en l'espace de quatre jours, et quand le patient est vexé de cette espèce de squinantia, il tire la langue dehors la bouche et tirant l'haleine à la similitude d'un chien qui est las et fatigué de la chaleur du soleil. Et celle espèce est le plus souvent contenue en la partie intrinsèque de l'épiglotte. Et Avicenne l'appelle squinantia canina.

La deuxième espèce est contenue entre les lacertes et se manifeste entre les spondyles tellement que quand la langue est pressée avec quelque instrument, on la voit entre les deux amandes avec rougeur et inflation. Et au dehors on ne perçoit point l'inflation, et cette espèce n'est point tant dangereuse que la première espèce.

La tierce espèce est celle qui se manifeste par inflation tant dedans comme dehors, et est plus longue que les autres, c'est-à-dire qu'elle ne suffoque point si tôt que les autres.

La quarte et dernière est celle que démontre sa naissance, et est tant seulement en la partie extérieure, et est de plus sûre curation que les autres.

Squinantia se termine par l'un des trois moyens qui s'en suit :

1^o Le premier est par résolution insensible et la raison en est

que quand la matière est en petite quantité et qu'elle est subtile après la phlebothomie universelle et particulière, et après l'administration de quelques gargarismes utiles, le reste, qui est subtil et en petite quantité, se résout sans que s'y resente aucune douleur.

2° Secondement, elle se termine par une suppuration, et alors cet aposthème ne peut être terminé en quatre jours, et principalement quand la matière est grosse.

3° Tiercement elle se termine par une détermination en quelque autre partie du corps et aucune fois elle termine dans la poitrine, aucune fois en la tête et le plus souvent à l'estomac. Quand elle se termine à la poitrine et que la matière vient vers le cœur, il survient tremblement du cœur et grande toux, et si elle se termine au poumon, elle cause la difficulté de respiration, et si elle se termine à la tête, elle induit perturbation à l'usage de raison; et toute permutation d'apostèmes, qui sont suffocation, sont dangereux suivant Avicenne. Et le signe de permutation est que quand les signes apostèmes se sont démontrés, et incontinent après le départ, nuisance a quelque partie principale. Les signes dangereux en squinantie sont la non apparence de rougeur, ni de tuméfaction en partie intérieure, et pareillement difficulté de respiration et d'avaler la viande; et aucune fois quand la langue est enflée avec les mandibules.

Et quand la voix ne peut être formée et qu'on semble parler du nez, c'est mauvais signe; et quand la face est pâle et que le yeux sont mobiles, regardant souvent en divers lieux, et surtout quand il y a sanglot.

Les signes susnommés sont ceux qui suivent l'apostème, lequel est de dangereuse termination.

Item cette maladie s'engendre aucune fois de matière sanguine, aucune fois de matière cholérique (bile), peu souvent de phlegme et encore moins de mélancholie (atrabile).

Les signes de squinantie sanguine sont étudiés suffisamment au chapitre des phlegmons en général; et pareillement pour les apostèmes des autres humeurs, traités en leur chapitre propre.

Et pour venir à la cure de la squinantie, nous disons qu'elle requiert cinq intentions. 1° la première est de donner la vie;

2° la deuxième est de divertir la matière antécédante et en partie la purge par les parties inférieures; 3° la tierce est ôter la matière conjointe à la partie; 4° restaurer et conforter le lieu malade; 5° la quinte et dernière est corriger les accidents...

Et, après maturation de l'apostème, convient ouvrir par subtile moyen. Aucuns recommandent d'ouvrir l'apostème avec chandelle de cire, mise dans la bouche jusqu'à l'apostème, ou avec un tronc (tige) de poireau. Aucuns commandent de déglutir gros morceaux de chair de bœuf liés avec fil, et les retirer subitement et violemment au dehors. Et pareillement aucuns se sont *efforcés de voir l'apostème par certains instruments*, et d'ouvrir ensuite avec instruments bien tranchants semblables à l'ongle d'un oiseau de proie. Et, après l'ouverture, il faut mondifier, incarner et sigiller (agir avec l'alun) selon la doctrine escripte. Et premièrement, pour mondifier, on peut utilement administrer la décoction de figues sèches, de raisins et d'orge, avec miel rosat. Semblablement, pour l'incarnation, on peut ajouter un peu de sarcocelle (gélatine). Pour la sigillation, on peut se servir de décoction d'orge, de lentilles, de feuilles d'acacia, de pétales de roses, avec un petit d'alun et de miel rosat.

Souvente fois il advient que au nez il s'engendre des chairs superflues de matière catarreuse, flegmatique, ou mélancolique laquelle est nommée des docteurs Polipus. Il en est de deux espèces selon Avicenne et Rasis ad Almansoren, au chapitre.

Ulcères de la bouche, des gencives, des amygdales et de la cure d'icelles.

Les ulcères des gencives, de la bouche, et de ces parties doivent être curées selon la cure générale des autres ulcères, c'est assavoir si elles sont putrides ou virulentes elles doivent être curées de la cure d'icelles. Si elles sont corrosives, on les doit curer de la cure des ulcères corrosives et pareillement les autres.

De la chute de l'uvula (luette) et de la corruption et inflammation d'icelle.

Uvula, comment disent les anatomistes, est un membre spongieux lequel nature a produit pour deux causes, la première afin

qu'il puisse donner modulation à la voix, la seconde afin qu'il puisse recevoir les superfluités de la teste. Uvula souvent fois est relaxée et abaissée par matière phlegmatique, et souvent inflammée, et corromptue, et relachée de matières chaudes.

Pour la curation de la relaxation de uvula causée de matière phlegmatique présuppose purgation convenable, c'est à savoir par pilule de cera cum agarico. Il n'est rien de plus convenable que de la retenir avec poudre qui est composée d'une partie de poudre, de 2 parties de mirobolan lisse, en application 2 fois le jour. En après, est fort convenable, devant dîner et devant soupper, de laver les bras et les pieds en décoction de choses confortatives, avec eau et vin également. Pareillement est utile d'appliquer des ventouses dessus les épaules avec scarification. En après, est très utile de appliquer dessus la teste estoupes chaudes et fumigations d'encens.

Mais la relaxation d'uvula étant de matière catarrheuse chaude, incontinent après la purgation ou phlebotomie de la veine céphalique, en considérant l'âge et la vertu (tempérament) du patient, il faut épithimer le lieu et gargariser avec le gargarisme qui s'en suit :

℞ hordei mundi ℥ m. j.
 lentic ℥ m. s.
 myrtillorum granorum
 et foliorum olivarum
 sylvestrium an.

parum bullientur, simulque cum sufficienti quantitate. Puis ajouter aceti albi. ℥ IIII, syrupi rosæ ℥ III.

Ce gargarisme oste la mauvaise complexion chaude de uvula et la conforte. A cette intention est utile le vin des deux espèces de grenade avec eau de rose, de plantain et sirop rosat meslés ensemble. Si, après ce, on cognoit qu'elle ne puisse être restaurée et remise en estat et restaurée en son lieu par les remèdes dessus nommés et qu'elle vienne en voie de corruption, il est très convenable de la frotter souvent avec onguent égyptiaque de la description d'Avicennes, en continuant toujours le gargarisme préalégué, et si on connaît que par l'application dudit onguent on ne puisse oster la corruption, il faut couper jusqu'à la racine

ou tant que la corruption puisse être ostée, et puis appliquer un fer chaud sur le lieu où était la corruption, ou quelque autre cautère potentiel. Telle est la curation des anciens et des modernes, principalement d'Albucasis. Ajoutons que quand la matière est chaulde, pour la purgation est utile de user des pilules de assagareth et electuarium de succo rosæ cum thamarindo en quantité convenable. Pareillement est utile la casse avec les solutifs dessus nommés...

(Chapitre XV.)

AMBROISE PARÉ

De la squinancie.

Squinancie est une inflammation de la gorge ou du larynx, qui empêche souvent l'air d'entrer et sortir par la trachée artère, et la viande d'être avalée dans l'estomac, lesquelles choses sont nécessaires à la vie des animaux. Les Grecs l'appellent synanche.

Il y en a de trois espèces et différences.

La première est avec grande douleur sans apparence de tumeur au dehors, parce que l'humeur est contenue au derrière des deux amygdales, près les vertèbres du coi; et partant ne peut être aperçue, si on ne presse sur la langue avec une spatule, ou speculum oris, et alors on voit une rougeur et inflammation en cette partie. Aussi le malade a difficulté de respirer et d'avaller les viandes, tire la langue hors de la bouche (comme un chien qui a grandement couru), et la tient ouverte pour mieux attirer son haleine, et parle du nez étant contraint estre couché assis pour mieux avoir son vent; son boire monte et sort quelquefois par les naseaux, à cause que les voies de l'air, du boire et manger sont estouffées; il a les yeux flamboyants et fort enflés, se projetant hors de leur orbites; et à tels, souvent advient une subite suffocation, avec une écume sortant hors de la bouche.

La seconde espèce est celle en laquelle on voit une tumeur par dedans la gorge, et non, ou peu apparente au dehors, la langue aucunement enflée, les amygdales, et quelquefois les mandibules.

La troisième espèce est celle en laquelle on voit la tumeur aux parties extérieures, et peu aux intérieures, et cette est la moins périlleuse.

Les causes sont externes ou internes, comme quelque coup, ou une arête, ou autre chose étrange demeurée en la gorge, ou trop grande froideur, par bruines ou excessive chaleur. Les

causes internes, procèdent d'une multitude d'humeurs de tout le corps ou du cerveau, qui causent fluxion; quelquefois de matière sanguine, cholérique, ou de pituite, et bien peu souvent d'humeur mélancholique.

Les signes pour connaître chacune humeur particulière, ou lorsqu'elles sont mêlées ensemble, ont été ci-dessus parlant des apostèmes en général.

La squinancie est plus périlleuse de mort, quand la tumeur n'appert ni dehors ni dedans. Celle qui est au dehors et non au dedans est la moins périlleuse, et d'autant qu'elle n'empesche pas les voyes du manger et boire, ni celle de l'inspiration et expiration. Aucuns meurent de squinancie en douze heures, autres en deux jours ou en quatre, les autres en sept : ce qui est prouvé par Hippocrate « Qui anginam evadunt, iis ad pulmonem malum transit, et intra septem dies moriuntur : si vero hos dies evaserint, suppurantur ». Ainsi telle aposteme se termine quelquefois par delitescence c'est-à-dire par renvoi occulte en autre partie, comme en la poitrine par un empyème, ou aux poumons et autres parties principales, qui est cause de la mort du malade ; aussi par résolution ou suppuration. La meilleure voie est la résolution qui se fait quand il y a peu de matière, et qu'elle est subtile, et mesmement après la saignée, et avoir usé certains gargarismes à ce convenables. Quelquefois aussi se termine par suppuration, et lorsqu'elle vient par cette voie de crise, est souvent mortelle, pour la grande quantité d'humeurs qui tombent sur cette partie, et empeschent la respiration.

Pour son manger, il humera potage d'une poulaille et de veau cuits avec laitues, pourpiers, oseille, semences froides. S'il est débile, on lui fera prendre des œufs mollets cuits en l'eau, ou quelques pressis ou orge mondé, ou une décoction de pruneau, raisin bouillis en eau et sucre, et autres aliments semblables. Il évitera du tout le vin et en lieu d'iceluy boira hydromel et eau sucrée, en laquelle sera mis sirop rosat ou violat, aceteux, de limons, il évitera le long dormir. Cependant le chirurgien aura l'œil tant aux remèdes universels que particuliers, à cause que cette maladie ne donne grand loisir. Parquoi il faut saigner le malade de la basilique du costé de la fluxion, et le jour même des veines de dessous la langue, pour vacuer la matière con-

jointe. Aussi seront appliquées ventouses sur le col et épaules, sans et avec scarifications, avec frictions et ligatures douloureuses aux extrémités. D'avantage on lui donnera clystère, suppositoires, ou nouëts âcres et cuisants, afin de divertir et détourner l'humeur conjoint à la partie. Et, subito qu'on voit la fluxion se faire, il faut user de gargarismes répercussifs, afin de l'empêcher ; car elle pourrait suffoquer le malade, ce que j'ai vu advenir, quelque diligence que l'on y put faire.

Et partant on fera gargariser souvent le malade d'oxycrat, puis de cestuy :

℞ Pomorum silvest. ʒ iiij
Sumach rosar. rub. ana m. B
Berber. ʒ i j.

Bulliant omnia cum aq. sufficienti usque ad consumptionem medietatis, addendo :

Vini granat. acid. ʒ iiij.
Diamor. ʒ ij.

Et iterum bulliant modicum, et fiat gargarisma ut artis est.

On en pourra faire d'autres d'eau de plantain, morelle, verjus avec sirop rosat, et autres semblables.

Et si la fluxion était faite de matière pituiteuse ou plegmatique, il faut ajouter aux dits répercussifs alun, écorce de grenade, noix de cyprès, un peu de vinaigre ; et ne faut user aucunement des répercussifs aux parties extérieures, de peur de faire renvoy de l'humeur au dedans de la gorge, mais appliquer lénitifs, à fin de relascher et rarefier les parties, pour donner passage à quelque portion d'humeur qui se résoudrait.

Et si on voit que la tumeur uvulette tendre à la résolution, qui est lors que le malade est sans fièvre et avale mieux les viandes, et aussi qu'il respire et parle plus à son aise, qu'il dort bien, et a peu de douleur, qui sont signes de prompte guérison, lors on usera de remèdes résolutifs.

Au contraire si on connaît la tumeur se terminer par suppuration, seront appliqués des remèdes suppuratifs tant par devant que par dehors, comme gargarismes faits de racines de

althea, figues, jujubes, raisins de Damas, dattes bouillies en eau tant qu'elles soient parfaitement cuites, et d'icelles décoction en sera gargarisé et tenu en la bouche. Semblablement est bon de se gargariser de lait de vache ou de chèvre avec sucre et huile d'amandes douces, ou violat un peu tiède. Car tel remède suppure et appaise la douleur.

Aux parties externes de la gorge on appliquera cataplasmes suppuratifs ; aussi on enveloppera le col de laine noire avec le suif, imbue en huile de lis. Et lors, que l'on connaitra la tumeur être suppurée, la bouche du malade sera ouverte avec un speculum oris ci-dessus décrit, et la tumeur sera percée avec une longue bistorie ou lancette courbée.

Après l'ouverture faite, on usera de gargarismes mundicatifs comme :

℞ Aquæ hord : ℞ ℞.

Mellis rosat et syrup rosar.

Siccar ana ʒ. j.

Fiat gargarisma.

Ou bien de vin et miel meslés ensemble, desquels a toutes heures s'en gargarisera ; et après la mundification on fera cicatrice a l'ulcère, ajoutant aux susdits] gargarismes un peu d'alun de roche.

Des glandules et amygdales engrossies et tuméfiées.

A l'entrée du destroi de la gorge, vers la racine de la langue, nature a mis deux glandes vis-à-vis l'une de l'autre, de grandeur et figure d'une amande ; pour cette cause ces dites glandules sont dites amygdales. Leur office est de recevoir l'humeur salivaire distillant du cerveau, qui respand sur la langue pour l'enrouer, humecter et tenir fraîche, par deux conduits manifestes, afin qu'en parlant ne se dessèche pas trop, et n'interrompe la continuation de la parole. Qu'il soit ainsi, on voit les fébricitants par la chaleur étrange de la fièvre, qui aura consommé cette humidité saliveuse, ne pouvoir parler si premièrement n'ont lavé et humecté la bouche.

Or ces glandules, parce qu'elles sont en un lieu chaud et humide, sont fort sujettes à inflammation ; et souvent avec le sang

il y flue une grande portion d'humeur pituiteuse, crue et visqueuse, dont s'ensuit tumeur qui vient souvente fois par trop boire de vin pur et fumeux, mangeant trop gloutonnement les viandes, et s'être tenu au sérein. Les malades ont grand peine d'avaler leurs morceaux et sentent grande douleur à les engloûtir., et souvent ont fièvre. Quelquefois ces glandules sont si fort tuméfiées, ensemble les muscles du larynx et autres du col (ce qu'on voit aux squinances), qu'elles occupent la voie de l'air, dont le malade suffoque et étrangle.

Pour obvier à tel accident, faut purger et saigner le malade et lui appliquer ventouses derrière le col et sur les épaules, et faire frictions et ligatures, et user de gargarismes astringens ; et où elles s'apostemeraient, on fera apertion avec la lancette. Et posé le cas que l'on eût fait tout cela, néanmoins la fluxion fût augmentée, de façon que le pauvre malade fût en danger de mort, pour ne pouvoir respirer, afin d'éviter tel péril, faut faire incision à la *trachée artère*, appelée vulgairement la canne du poumon, au-dessous du nœud de la gorge. Or on peut faire hardiment l'incision en ce lieu, parce que les veines et artères jugulaires en sont esloignées, joint aussi qu'il y a peu de chair en ce lieu, et pour bien faire, on commandera au malade avoir la tête renversée en arrière, afin que ladite trachée soit plus apparente ; puis on fera l'incision transversalement avec une lancette courbée appelée bistorie, prenant justement entre les deux rameaux, en prenant garde de toucher la substance cartilagineuse, mais seulement la membrane qui les tient jointes ensemble. Or les signes que l'incision est bien faite, c'est que le vent sort par la plaie, qui sera tenue ouverte jusqu'à ce que le péril de suffocation soit passé, puis sera cousue sans toucher aux cartilagés ; et si les lèvres de la plaie étaient comme calleuses et endurcies faudrait les scarifier ou couper, afin de faire la plaie récente, pour mieux après la consolider, ainsi que nous disons aux lèvres fendues qu'on appelle bec de lièvre.

J'ai pansé quelques-uns, auxquels grande portion de la trachée artère était coupée et mesmement aucun de ces anneaux cartilagineux, qui ont été guéris comme j'écrirai en mon livre des plaies de la gorge.

De la tumeur, et inflammation et relaxation de uvule nommée des Latins columella.

L'uvule est un petit corps pointu et spongieux, de figure presque semblable à une pomme de pin, suspendue perpendiculairement à la fin du palais, afin de rompre l'impétuosité de l'air extérieur attiré et inspiré des poumons, comme nous avons dit en l'anatomie. Aussi est comme une touche ou archet qui touche les cordes d'une viole pour la faire résonner. Souvent elle reçoit abondance de rhume de cerveau, qui fait qu'elle croit outre sa magnitude ou grandeur, devenant grasse, longue et grêle, en sa pointe, qui fait qu'elle cause plusieurs accidents, comme la toux par une continuelle irritation, qui fait perdre le dormir et garde de bien proférer la parole, et parler du nez bien souvent. D'avantage le malade est contraint de dormir, la bouche ouverte, et lui semble toujours avoir un morceau dans la gorge, et souvent en vain s'efforce à l'avaler et quelquefois suffoque.

Il faut purger, saigner, ventouser, clystériser, ordonner le régime, user de gargarismes astringens et autres remèdes ; et si par ces remèdes ne peut être guérie, sera cautérisée avec eau-forte, ce que j'ai fait souvent avec heureux succès, et, si le malade ne peut être guéri par tels médicaments, faut venir à l'opération manuelle plutôt que laisser suffoquer le pauvre malade, pourvu que la tumeur ne soit de figure ronde. Aussi si elle est rouge et pleine de sang, et fort douloureuse, ou de couleur noirâtre comme les chancres, à telle n'y faut aucunement toucher par instrument, ni par cautère actuel, ni potentiel. Au contraire, si elle est longue et subtile, se terminant en pointe traînant sur la langue, et par le bout est lasche et molle, n'étant trop rouge ni trop pleine de sang, mais au contraire tirant sur la couleur blanche, et sans douleur, alors le chirurgien peut besogner assurément, qui est ôter ce qui excède sa longueur naturelle.

Et, pour la couper, on fera seoir le malade à la clarté, lui commandant ouvrir fort la bouche, et sera baillonné ; puis on prendra avec des pincettes l'extrémité de ladite uvule, et avec un ciseau sera coupé ce qui est contre nature.

Ou bien sera lié avec tel instrument, lequel a été innové par

M. Castellan, homme très docte et de bon jugement, médecin ordinaire du Roy, et premier de la reine-mère : lequel instrument peut pareillement servir à lier les polypes et verrues au col de la matrice.

Et alors qu'on voudra resserrer ledit filet, il sera repassé par la verge de fer marquée c. et serrée tant qu'on voudra, laissant ledit filet jusqu'au lendemain, dont son extrémité pendra hors la bouche; puis de rechef sera serré comme devant. Or par cette astriction on fait tomber une partie de ladite uvule et par ainsi le patient recouvre la santé.

Davantage si en ladite uvule était ulcère corrosif, outre qu'elle fut relaxée, accompagnée d'un flux de sang, alors la faudrait cautériser et consommer avec une telle cannule fenestrée et cautère actuel si dextrement, qu'on ne touchât aucune autre partie de la bouche.

Ligature ou section aux glandules prolongées et dures. — Si telles glandules sont fort prolongées et dures, sans espérance de se pouvoir remettre en leur naturel, il faudra user et employer la chirurgie, soit pour la ligature ou section. Si rien ne presse, la ligature sera fort propre, et principalement s'il y a danger de flux de sang ; ce qui sera commodément avec notre instrument, en la forme et manière que nous avons décrite la ligature de la luette, se donnant garde d'en lier ou couper trop, et se faut contenter de prendre et oster ce qui excède sa naturelle grandeur et grosseur, craignant que telle espace du gosier, ou détroit de la gorge demeurant vide, n'apportat semblable accident décrit ci-dessus que fait la luette trop coupée, ou quelque flux de sang dangereux, si on venait à couper jusques ou fond de la chair naturelle de la glande, pour les veines qui se disséminent en cette partie profonde.

GUILLEMEAU

**De la tumeur des amygdales et des apostèmes
qui y surviennent.**

Quelquefois la tumeur est si grande qu'elle vient à suppurer; ce qui se connaît quand elles sont ridées et comme blanchâtres, et qu'il y aura eu auparavant quelques élancements. Lors il faudra avec un instrument propre pour ce faire, les ouvrir, ou bien prendre une lancette entortillée de linge, hormis sa pointe. L'ouverture doit être assez grandelette, attendu qu'il n'y a en cet endroit aucun vaisseau assez notable, qui soit à craindre d'être piqué ou coupé, si ce n'est au fond ou base d'icelle, c'est-à-dire en sa racine. Souvent nous sommes contraints devant (avant) la parfaite maturation de les ouvrir, afin de décharger la partie; car le sang qui en sort, fait que la tumeur diminue, que la douleur s'apaise et pareillement l'inflammation; ce qui donne plus facilement passage au boire et au manger, et à l'haleine. Vrai est qu'il faut auparavant, si possible, apaiser la grande chaleur et inflammation par gargarismes rafraichissants.

FABRICE DE HILDEN

Ex ulcere circa fauces appetitus vitiosus, citra quem cibus deglutiri non poterat.

Mulierem quadragenariam sæpius visi Coloniae, quæ ulcere maligno circa fauces, ex pituita salita e capite distillante, per annos aliquot laboraverat, adeo ut partes quædam palati (uti sunt amygdalæ, uvula, epiglottis, et portio gulæ) excrescens essent. Vix loquebatur; cibum et potum non nisi maximo cum dolore poterat deglutire. Hæc autem imprimis notatum digna: quod quamvis minime gravis esset, interdum hæc vel illa prægnantis instar, appeteret, nempe haleces carnes et pisces salitos et infumaros, aliosque concoctus difficilis cibos, uti et fructus immaturos. Deinde (mirum majus) quod talia quantumvis dura sine dolore ullo deglutiret, si modo appeteret. Verum appetitum et deglutitionem illam plane supernaturalem illi. Dei beneficio accidisse, non dubito, alio vitio in tot annos protrahi et fovere non potuisset, quum nullo modo hordeatum aut amygdalatum vel carnitum jus, aut tale quippians sorbere posset, abhorrente stomacho, adeoque sæpissime totum tridutum à cibo et potu abstineret, donec appetitus ille vitiosus damnosus recurreret. Præterea quamvis quod appetebat, morbo contrarium esset, eo tamen sine posca vescebatur, quicquid autem respuebat, licet idoneum, nauseam, et nonnunquam paroxysmos febriles inducebat. Ex quibus intelligimus, non semper ægrotis severius dene-ganda, quæ natura summe appetit. Siquidem videmus et non-nullos haud prius ex quartana aliisque morbis chronicis conva-luisse, quam illorum quantumvis vitioso appetitui satisfaceret, sed ea curatio non usquequaque tuta est; immo neque ista mulier ullo modo sanitatem recuperavit.

(*Cent. 1, obs. XXXVII, liv. V, p. 384.*)

Modus eximendi ossicula, aliasque res gutturi infixas.

Quam periculosa sit mora hac in re, ex superioribus satis constat. Subita igitur diligentia adhibenda, ut quicquid gutturi

infixum est, quamprimum extrahatur. Ideoque statim oleum amygdalarum dulcium, aut olivarum (cave tamen ne substituas butyrum) in œsophagum infundendum. Deinde digito, penna, aut simili aliquo instrumento in os immisso, vomitus provocandus: his enim sæpius secum expellit, quicquid gutturi inhæret. Postea speculo oris lingua depressa, (si ossiculum sese visui præbeat) rostro corvino incurvato apprehendendum, atque extrahendum est. Si vero profundius fuerit, nec rostro apprehendi possit, nonnulli spongiam novam, avellanæ magnitudine, eamque compactam madent filum digitis tenente chirurgo fieri, enim sic potest, ut deglutita ab ægro spongia, secum simul in ventriculum depellat id, quod gutturi inhærebat, aut retracto filo, eadem simul nonnunquam extrahatur, vomituve rejiciatur. Aut potest globulus plumbeus filo alligari et deglutiri, atque denuo extrahi: ut de spongia jam dictum est.

Nihil vero præstantius, aut optius ad extrahendo ossicula, et spinas piscium e gutture, hoc sequenti instrumento, quo ego feliciter usus sum, tum alios, tum præcipue anno 1603. 16 Augusti in Ludovico Tissot Lustriacensi, qui intercænandum ossiculum, triangularis figuræ, sed crassum quale hic depictum est, deglutivit.

Hoc profundius œsophago, e regione scilicet inter ultimam vertebam colli, et primam metaphreni, se adeo insinuaret, ut id neque deglutire neque rejicere posset. Astantes statim porro profundius in ipsius gulam intromiserunt, et vomitum provocarunt, sed frustra: ita quidem, ut nocte magno dolore et suffocationis metu trasigeret, sequenti die, pene suffocatus ad me ducitur. Ego oleum amygdalarum dulcium, œsophago satis copiose infudi, et exterius collum eodem oleo inunxi. Postea jussi ut ei tenerentur manus et caput: interim ego, depressa prius, lingua speculo oris instrumentum inferius depictum, in gulam intromisi, usque ad ossiculum, et modia circumducta ex una in altera parte instrumento donec id paulatim ad latus ossiculi, profundius depulerim. Deinde retrahendo, ossiculum simul suo loco amotum et extractum fuit: Atque brevi convalescit: Hujus operationis et curationis testes sunt, Daniel Tavellus, et Samuel Galliardus, ambo Ludimagistri in Scholo Palerniacensi.

Est autem fistula argentea aut ænea incurvata, crassitie

pennæ, longitudine vero unius pedis cum dimidio, aut circiter. Est et undique perforata. In sua extremitate vero habet spongiolam novam, avellanæ magnitudine firmiter alligatam. Hæc fistula in œsophagum immissa et circumducta, quæmadmodum antea diximus, postea extracta, ossiculum aut quicquid simile fuerit, extrahimus; si enim accidit, ut foramen aliquod fistulæ, ossiculum aut spinam excipiat, tum simul, tum fistula extrahitur sin minus; asperitas ossis spongiæ adhærebit, et suo loco amovebitur: quod ego experimento comprobavi, antequam haberem fistulam perforatam.

Non tamen ossiculum aut spina prima vice, dum intromittimus fistulam, extrahitur, nec propterea ab incepto opere desistendum. Aliquoties enim quinquies aut sexies fistulam intromittere coactus fui, donec tandem ossiculum suo loco ammotum et extractum, vel (si aliter fieri non potuit) in ventriculum depulsum fuerit, quod et periculo vocat; præstat tamen per os extrahendum, si fieri possit.

In hac operatione autem circumspecte agendum ne instrumentum in asperam arteriam, loco œsophagi, immittatur, quod valde periculosum esset. Itaque ut chirurgus harum partium anatomiam sciat, necesse est. Incumbit autem œsophagus vertebriis colli: Aspera vero arteria anteriorem partem instrumenti vertet; et spongia (quæ oleo amygdalarum dulcium aut olivarem prius inungenda) allegata est, vertebriis imponatur, ac leviter leniterque deorsum immittatur. Sic enim ratione spongiatur instrumento alligata, epiglottis (hoc est operculum laryngis) deprimitur, et aspera arteria clauditur, usque dum instrumentum immissum sit profundius.

Quantum ad spongiam filo alligatam, de qua mentionem fecimus, non usque adeo illi est fidendum. Contrarium enim in enarrata operatione expertus sum. Et quomodo fieri possit, ut spongia levissima, vel simile quid transeat in os infixum in œsophago? Hujus monitum volui lectorem, ne rei inutili confidat, at interim æger periclitetur. Habeat igitur chirurgus semper in prompto instrumenta ad hanc operationem necessaria: cunctari enim hac in te non licet si in asperam arteriam quidpiam illapsum fuerit, sternutatorium admovendum esse naribus: veluti aliquid piperis aut euphorbiis vel ellebori albi. Ab acidis

et tussim provocantibus, contra opinionem quorundam, omnino abstinendum. Tussis in sua sponte satis accidit; acida vero et œsophagum et asperam arteriam, et quicquid attingunt coarctant, constringunt et augustiora efficiunt quapropter continuo ore teneat. Syrupum de liquiritia, de polytricho et violatium, aut (quod ego expertus sum) oleum amygdalarum dulcium, saccharo ad partes æquales commistum.

Post extractionem ossi, guttur sæpe abluendum est decocot hordeaceo; aut aqua plantaginis, cum melle rosaceo et diamoron. Si dolor adest, sumat ter aut quater interdum cochleare olei amygdalarum dulcium, vel rosacei, aut utatur sequente electuarii lambendo.

R Specierum tragacanti frigidi,
Diamoron ana 3 ij
Summitat. betonicæ et
Veronicæ subtili pulveris ana 3 j
Ol. amygdalarum dulcium 3 ℥

sirupi violarum sine spiritu vitrioli q. s. Misceantur; sit electuarium mediocris consistentiæ.

A vino, et ab eis omnibus quæ calefaciunt abstineat, ne inflammatio et dolor excitentur; utetur jusculis, panatelli. crematura hordei, lacte amygdalarum dulcium, emulsione seminum frigidorum majorum, jusque omnibus quæ deglutiri et concoqui facile possunt. Si æger juvenis fuerit, et inflammationis suspicio: electuario lenitivo, aut diacatholicon, aut syrupo rosato solutivo, et electuario de succo rosarum, evacuandus est. Et vena basilica brachii dextri incidenda. Exteriorius inungendum est collum oleo rosaceo, et myrtino, et unguentum de bolo applicandum. (Obs. XXXVI.)

Ex rebus extraneis, gutturi infixis, mors.

Inter comedendum sæpius accidit, aut ossicula, spinæ piscis aut simile quid gutturi inhæreat, inde compressa trachea arteria, quæ gutturi incumbit, protinus suffocatur animal: quod sequentibus confirmo exemplis.

Exemplum I.

Anno 1595, Coloniæ Agrippiniæ mercatori, cuidam frustum

cutis pernæ aflatæ ac mica panis sale et pipere aspersa, infixum est gutturi : unde protinus dolor vehemens, convulsio, rigor, tandem suffocatio, ortæ sunt.

Exemplum II.

Eodem anno Coloniæ mulier pertransiens pistoris officinam, ac manu ducens puellum, loganum emit quod puellus in manum eundo comedebat: hujus frustum quum adhærerint gutturi statim, suffocatus est puer, antequam mater ad ædes suas perveniret.

Exemplum III.

Hoc quoque auno puer erat Coloniæ auf dem Bull bey der Childergassen cui globulus plumbeus deglutitus, tracheæ arteriæ se insinuavit. Vocatus quidem fui, sed puer ante meum adventum suffocatus decessit.

FABRICE D'AQUAPENDENTE

(Traduction française du XVI^e siècle.)

Des amygdales.

Les amygdales sont appelées par Celse glandules, qui sont vis-à-vis l'une de l'autre, sur l'entrée du gosier; c'est pourquoi elles sont dites des Grecs *αμυγδαλές*, comme si vous disiez opposées l'une à l'autre; au milieu desquelles est la columelle, bien qu'elle soit plutôt au fond du palais, et les amygdales au commencement du gosier, deçà et delà, d'un côté et d'autre. Celse et Paul mettent en avant une opération lorsqu'elles sont venues dures par inflammation, et empêchent d'avaler la viande et de respirer. Moi qui n'estime pas qu'on les doivent arracher pour peu de fait, la croyant être une opération du tout difficile, voir tout à fait *dangereuse*, tant à cause de la difficulté qu'il y a de les couper en lieu droit et long, que de *l'effusion de sang*, qui est ordinaire aux petites glandes, qui se trouvent sur les divisions des vaisseaux comme des coins, que Paul aussi redoute ci-dessous, je laisse l'inflammation qui, en cet endroit, est fort dangereuse; je conseille selon Paul, de *s'abstenir* de l'opération, d'où vient que plusieurs ont toujours ces glandes enflées et trouées, en sorte que ni les patients, ni les chirurgiens ne veulent mettre la main. Qui me fait le plus émerveiller de ces auteurs, qui font la chose si facile, est que de le pouvoir faire avec le doigt.

De là, Celse a dit qu'il fallait râcler tout à l'entour et les arracher; puis après, avec le doigt, si elles ne se dissolvent encore, les prendre avec la pincette et les couper avec la scalpelle; ce que chacun voit être du tout difficile, quoique dit Paul qu'il faut mettre la main à ces glandes, principalement blanches, serrées, et sur une base étroite; mais si les glandes parfois sont pourries, les faut arracher, les ayant prises avec des pincettes, ce qui vient sans difficulté, si elles sont d'une part et d'autre, tant soit peu séparées.

Pour ce faire, Paul ordonne premièrement que le serviteur,

avec la spatule faite, pour abaisser la langue, la presse en bas; et après que le chirurgien tire à soi tant qu'il pourra la glande avec des pincettes aiguës, en sorte toutefois qu'il n'arrache les membranes. Puis après, le même auteur est d'avis de couper avec le scapel toute la glande dès sa base. Nous la couperons donc avec le scalpel propre à la tenir attachée, que les Grecs appellent ἀγγιστόμῳ, et décrivant que c'est dit que ce sont deux instruments ayant deux tranchants vis-à-vis l'un de l'autre. Car cela est un mot tiré de ἄγγω qui signifie serrer avec un laqs ou licol, τομῳ, qui signifie incision, ou coupure; comme si c'était un instrument qui, serrant comme un lac ou licol, peut aussi couper.

Ayant donc coupé la glande d'un côté, il faut aussi couper de l'autre côté l'autre. Paul, puis après, est d'avis de gargariser avec eau froide, ou eau et vinaigre, et si on craint l'effusion de sang tantôt de la décoction de ronces, de roses rouges et de meurte, tantôt du suc de plantain, et de consoude ou des trochisques de Karabe et plusieurs autres, que Paul met en avant.

D'où l'on peut recueillir ce qui nous disions au commencement, que cette opération n'est ni aisée, ni aussi en aucune façon assurée. Et c'est pourquoi nous, qui nous gardons le plus qu'il est possible, d'user en cette opération d'aucune violence, avons essayé premièrement de la séparer des parties qui sont dessous, étant dissoute et l'ayant prise avec des pincettes fort minces, et longues, la tirer en dehors; de façon que le chirurgien la tirant avec dextérité. et fort habilement, elle vienne quasi comme de son bon gré.

(Liv. II, cap. XXXVIII.)

Des tumeurs. Du polype, comme il le faut tirer.

Polypus selon Paul au liv. 6, chap. 25. est une tumeur autre nature qui vient au-dedans des narines, prenant son nom de la ressemblance du polypus marin, tant parce qu'il représente sa chair, que comme prenant ceux qui le prennent, il se venge, ainsi ce' mal prenant les narines les bouche faisant respirer et parler avec difficulté. Parfois la respiration en est du tout empêchée, et les patients sont contraints de respirer par la bouche jour et nuit avec grande peine et incommodité. Celse ajoute

que quand le polypus augmente tellement, qu'il vienne jusqu'au gosier, les malades en sont aussi suffoqués. Albucasis au livre 2, chap. 23 dit que ces chairs ressemblent à des scorpions qui ont plusieurs pieds; cette tumeur est comme une chair blanche molle remplissant les narines, non pas qu'elle soit uniforme, mais on y voit comme plusieurs caruncules jointes ensemble ou l'une pendant, de l'autre pendue quelquefois aux cartilages, quelquefois aux os du nez, ou des os spongieux qui sont plus haut Albucasis au livre 2. D'où vient qu'il se fait d'une matière pituiteuse principalement, à certaines veines, desquelles il tire nourriture, tellement qu'il est vraisemblable, qu'il se fait d'un sang fort pituiteux qui redonde, au cerveau, et découle sur le nez.

Il y en a plusieurs différences, comme dit Paul et Albucasis; car parfois le polypus est dur, adhérent, livide, avec douleur, et pour le dire en un mot, *chancreux*, qu'il ne faut point traiter avec instruments, parce qu'il s'effarouche par l'opération de chirurgie; mais il le faut traiter doucement, ou bien si, par prières, le malade nous contraint de le traiter, Paul est d'avis qu'il le faut cautériser avec un fer chaud, qu'il faut appliquer par une canule, enveloppant la canule d'un linge trempé en vin froid, afin de cautériser tant seulement la partie malade, et non autre: car la canule, par le fer qui est dedans, s'eschauffe fort avec douleur et dommage les narines et parties d'alentour.

(Liv. II, cap. XXIV.)

ESTIENNE GOURMELEN

Du Scirrhe.

Gourmelin n'a composé qu'une sorte de pathologie générale chirurgicale, dont nous tirons le passage qui suit; son œuvre est bien inférieure à celle d'Ambroise Paré, avec lequel il prétendit rivaliser.

Scirrhe est engendré d'humeur épais, et qui à raison de l'excès en sécheresse et froidure, retient la semblance et nature de l'humeur mélancholic. Or Scirrhe est tumeur dure, sans douleur, avec petit ou du tout nul sentiment. Et Galien dit qu'il est fait d'humeur mélancholic, ou pituiteux, ou de tous les deux ensemble. Aucune fois il se fait tout du commencement sans qu'il y ait eu paravant aucune tumeur contre nature, quand cet humeur glueux ou épais, c'est-à-dire, comme Galien l'expose en autre lieu, pituiteux ou mélancholic ou meslé de tous deux, s'est attaché aux petite porosités de la partie. D'autre fois le scirrhe ensuit les autres tumeurs comme flegmons, erysipeles ou cedemes, estant la plus subtile partie de leur matière digérée par transpiration, et la plus épaisse refroidie, et comme tournée en dureté pierreuse, ainsi qu'il advient souvent par l'ignorance des mauvais médecins. Les causes du scirrhe venu du commencement sont fluxion d'humeur glueux et espais en la partie, ou amas d'iceux mesmes en icelle partie, et ce ou à raison d'une mauvaise manière de vivre, produisante un humeur gros et visqueux, ou à raison des afflections du foye ou de la rate, ou à cause de l'arrest des Hemorrhoides ou Menstruës, avec l'imbecillité de la partie malade. Mais la principale cause du scirrhe consécutif est trop grand refroidissement des autres umeurs contre nature, ou induë et immodérée résolution d'icelles. Les scirrhes ont coutume d'estres ou les parties externes comme les chefs des muscles, et tendons qui procèdent iceux, où es internes, comme en la rate ou foye, et aux reins. Et le scirrhe sera connu par la dureté, froidure, insensibilité, et aucune fois par la couleur.

(Liv. I, p. 45.)

BARBETTE

De Angina.

Nous avons cru devoir insérer ici le passage sur l'angine de la célèbre chirurgie de Barbette. Il n'est remarquable, du reste, que par l'insistance avec laquelle il préconise la Trachéotomie.

Angina tumor est faucium, a sanguine originem trahens, deglutitionem et respirationem impediens.

Differentia. — Commodissimè in tres species dividitur : Harum 1^o cynanche est, cum laryngis musculi inflammati sunt, et gravissima excitat symptomata, etiamsi nec interius, nec exterius, tumor ullus appareat; æger anhelosus sæpenumero linguam exerit, instar canis defessi; 2^o synanche, cum tumor interius in faucium angustior se offert, ubi quidem etiam symptomata adsunt gravia, sed multo minora iis quæ in cynanche; 3^o parasynanche, cum tumor magis exterius, quam interius occurrit, et hoc in casu symptomata omnium levissima adsunt.

Signa. — Anginæ instantis sunt : motus colli impeditus; deglutitio et respiratio imminutæ; ardor insolitus, dolorque in faucibus, tempore imprimis eo quo *angina epidemica grassatur*.

Præsentis vera sunt : asthma ad suffocationem usque, deglutitio impedita (quæ sæpe adeo increscit, ut etiam potus adsumptus per nares iterum egrediatur) dolor, rubedo, tumor, et plerumque febris continua. Lingua quoque intumefacta, et vox læsa est.

Prognosis. — Angina perfecta nunquam periculo caret, nam aliquando primo die ægrum suffocat, sed ut plurimum ante quartum. Quod si materia haud cito coquatur et ejiciatur, res desperata est; vertebræ si luxentur, mors appropinquat. Si circa os spuma conspiciatur, ægrotantem inevitabilis manet mortis necessitas. Doloze capitis si corripiatur æger, delirium, mania, et deinde mors ipsa instant.

Curatio. — Venæ sectio admodum necessaria hic plurimum efficit, et inflammationem tollendo, et accretionem ejus inhibendo, in principio instituta. Mediana itaque aperiatur aut cephalica lateris illius, quod maxime afficitur, etiam in gravidis;

deinde ranina. Cucurbitulæ etiam possunt applicari scarificatæ cervici circa vertebram secundam, scapulis, et pectori. Hirudines, cauteria, vesicatoria valde prosunt, in illis imprimis, *quos angina frequenter vexat*. Interea æger, si deglutire queat, purgans exhibeatur, si non, clyster injiciatur; et venæ sectio, si res exigerit, aliquoties est itèranda.

Deinde gargarismata, aliaque externe adhibita remedia, curationem absolvent, quæ in principio magis sint *repellentia*, quam *resolventia*; nam experientia et scriptores præstantissimi nos docuerunt : 1^o Sola repellentia nunquam esse usurpanda, nisi in principio, et anginâ lævi; 2^o Resolventibus semper repellentia esse commiscenda. Ratio in partis debilitate et mollitie sita est; nam si medicamenta nimium sint repellentia, calorem extinguēs : Si nimium sint resolventia novæ affluxionis ansam præbes. Prudenter igitur hoc in casu hæc media adhibeantur.....

N. R. — Si angina respirationi viam omnino præcludat, pro suffocatione evitanda ad bronchotomiam, seu laryngotomiam deveniendum. Observandum vero ne hæc instituatur operatio, si inflammatio non tantum laryngem, sed etiam totam asperam arteriam, ipsosque prætereà pulmones occupet; sic enim inutilis prorsus foret.....

DIMERBROECK

Nous avons emprunté à l'ouvrage de Dimerbroeck, le passage suivant, qui résume assez bien les tendances des chirurgiens hollandais de l'époque. Il s'agit d'un cas supposé d'angine.

Vir tringinta annorum carnosus, robustus, plethoricus, cum a gravi labore admodum incaluisset, plurimumque sentiret, cerevesiam tenuem, e frigida cella depromptam, avidissimè magno haustû bibit; ita ut frigiditatem potûs in faucibus fere nequiens, poculum ab ore deponere cogeretur. Paulo post angustiam quandam cum ardore in faucibus, et respirandi, ac deglutiendi molestiam percepit, quæ continuo magis magisque adaucta est. Post septem aut octo horas febris valida accessit cum pulsû magno, crebro et inæquali, tantûmque adaucta est respirandi, deglutiendique difficultas, ut vix stans aut erectus sedens respirare posset; et assumptus potus illico per nares resiliret. Os siccum est, cum magnâ siti, quæ ob deglutiendi impedimentum, nullo potû leniri potest. Lingua obscurioris coloris evasit, eaque oris speculo depressâ, posterius in faucibus maximè intensa rubedo seu fuscus color apparet; tumor tamen insignior, quia humiliore loco consistit, conspici nequit. Venæ raninæ sub linguâ crassæ ac tumidæ sunt. Loquela etiam adèo impedita evasit, ut vox ægrè audiatur. Æger maximè anxius se quaquaversum summâ cum inquietudine movet, et frigidum patulumque aërem continuo captat. Foris nullus tumor sed insueta aliqua rubedo circâ faucium regionem apparet.

Gravissimus affectus, qui ægrum nostrum exagitat, vulgo ab *angenda* angina, appellatur; estque respirandi et deglutiendi difficultas, ab inflammatione et angustia partium summarum gulæ, laryngis, fauciumque procedens, ac brevi febrem continuam sibi comitem assumens.

Non est autem notha angina a tonsillarum ex catarrho tumore cum rubore conjuncto, sed est vera angina, ex merâ inflammatione genitâ. Cui cum pro variâ intentionis magnitudine a neotericis quatuor gradus constituentur, hæc ad gradum tertium

referenda videtur, quem paracynanchem appellant; quippe in nostro ægro inflammatio versus superiores faucium partes se extendit, et depressa lingua, quodammodo conspici potest, quæ alioquin in duobus prioribus gradibus cynanche et synanche tota occulta latet.

Sanguinis redundantia hujus mali antecedens fuit causa; hic autem sanguis a causis procatarticiis agitatus, ac in faucibus et laryngis musculis majore copiâ conservatus, ibidemque putrescens, causa continens evasit. Procatartici vero illum partim moventes, partim circa dictas partes detinentes, sui fuerunt, nempe gravis labor magnum calorem excitantes, et nimis frigida potio, subitam refrigerationem inducentes.

A gravi quippe labore excalefacto toto corpore. nec minus corde, sanguis per validas crebrasque cordis pulsationes rapide fuit agitatus, ac celeriter per vasa transiit, idque sine ullo incommodo, quousque in iis nullum dabatur impedimentum. Verum, cum ab actuali frigiditate assumpti nimis frigidi potus, qui in minimis venis, circâ fauces et laryngem hærebat sanguis nonnihil incrassaretur, ipsæque venularum radices, et orificia constringerentur, ac cor excalefactum tamen non desineret per crebos magnosque pulsus æque multum sanguinis, atque antea, eo per arterias propellere, non potuit tanta quantitas a venulis per frigus incrassatumque sanguinem angustatis, tam cito recipi et transmitti, sicque circulari, ac proinde cum singulis pulsibus aliquid transiret; aliquid etiam dictis locis detineretur, hinc per plurimos pulsus multum sanguinis in dictarum partium substantia detentum ac collectum fuit, unde tumor calidus respirandi deglutiendique vias angustans, paulatim magis magisque adauctus est; ipseque detentus ibi sanguis, cum a corde non amplius regeretur nec moveretur aut elaboraretur, paulatim majorem inflammationem et putredinem concepit; cujus pars, cordi per venas communicata febrem continuam accendit, non quidem prima hora, sed inter septimam et octavam. In ipso enim exordio copia sanguinis paulatim collecta, ejusque nimius calor continue adauctus fuit sed putredo cum magnâ inflammatione post aliquot horas primo invasit, scilicet cum tanta esset copia, quæ naturæ gravis foret, etiam effervescere inciperet. A quâ effervescentiâ pulsus major et crebrior, quam antea, evasit ac simul

etiam inæqualis, a putrescentibus particulis, reliquis anginæ inæqualiter permistis, in cor illabentibus.

A febris invasione multo difficilior fuit respiratio, tum quia effervescens sanguis majorem locum requirebat, atque hinc tumorem et viarum angustiam plurimum augebat; tum, quia ratione majoris caloris febrilis, majore opus fuit respiratione, cum per angustas vias procedere vix posset, si facilius evasit, et defectus quoque necessarii refrigerii maximam anxietatem et inquietudinem induxit, atque hinc est quod æger frigidum patulumque aërem cupiet.

Os siccum et sitis maxima est a calidis vaporibus, partem ex inflammato loco, ori proximo, partim per febrem, ex corde et inferiore corpore sursum in os exhalantibus, idque exsiccantibus. Potus tamen deglutiri nequit, sed in os resilit, quia ab inflammatorio tumore superior œsophagi pars tantopere comprimitur et angustatur, ut nihil amplius transmitti possit, hincque potus deglutitionis impetu versus œsophagum impulsus, cum non possit per eum transire, per superiores palati mox resilit in partes.

Intensa rubedo seu fuscus color, qui in faucibus depressâ linguâ conspicitur, fit a copiâ sanguinis eâ in parte, ob antedictas causas coacervata, qui color se inde aliquo modo versus linguam extendit. Et propter denegatum liberum sanguinis per venas transitum, venæ raninæ sub linguâ admodum tument.

Loquela impeditur, ut æger vix audiri possit, propter respirationis difficultatem et musculorum laryngis inflammationem.

Foris nullus conspicuus est tumor, quia inflammatio tota intus circa laryngem, œsophagum et fauces latet; rubedo tamen aliqua, propter viciniam, se versus exteriora protendit.

Acutus sanè ac periculosissimus est hic morbus, a quo æger cito liberari, aut cito mori debebit, quia si pauxillum adhuc increseat inflammatio et augeatur tumor, respirandi via omnino præcludetur; et æger suffocabitur. Periculum auget febris magnitudo, et quod æger nihil omnino deglutire.....

J. MANGET

Angina.

Angina nihil aliud est quam periculosissima illa musculorum faucibus ac gutturi servientium inflammatio, sic ab ango dicta, quod idem est fauces adstringo; Græcis dicitur *συναγγη* item *λυγάγγη*, quod canes et lupos frequenter afficiat; imo *συναγγη* ab *άγγόνη* laqueus, quod non secus ac laqueus præfocans enecet, vel a *όυμεζειν*, quod respirationem inhibeat, spiritum continendo.

Causa est eadem quæ omnibus aliis inflammationibus familiaris, scilicet sanguinis exagitatio nimia, per quam serum salibus fixioribus particulisque viscidioribus, circulationi minus accommodati prægnans, abundantius in parte corporis omnes delatum, hic aut illic, atque præcipue in faucibus per aërem frigidiusculum inspiratum, spissescit, obstructionemque facit, quæ sanguini ulterius promoti obicem ponens, ejusdem in viciniam effusioni non tantum occasionem præbet, sed etiam per propria spicula, loca quibus impactum est, et irritat et corrodit. Unde satis patet causam hujusce morbi antecedentem accenseri debere particulis crassioribus, salibusque acrioribus, et ad fermentandum promptis (nisi circuitus suos in vasis, carnibus et visceribus facile peragant), in sanguine aggestis; atque ea propter non mirum si hyberno tempore accumulatis ejusmodi materiis, illo postea tempore quo facillime exagitantur, seipso vere, juvenes præ cæteris et temperamento sanguineo præditos, immo rufos familiarius aggrediatur. Causa vero occasionalis, erit illud omne quod sanguinem sic dispositum exagitat seroque abundantius ad fauces promotum, per refrigerium inductum impingendo facit.

Anginam præterea producunt res variæ faucibus inhærentes, sic a spina piscis faucibus infixæ, earundem periculosam inflammationem adnotavit, Schenckius; et nos aliquando ab acicula, aliquando ab ossiculo pulli gallinacei, in easdem partes profundius adacto, aliquando a nucleo cerasi in tonsillæ cavum inducto, anginas enatas vidimus. Item res aliæ quæ guttur

exasperare et tumefacere valent, quales sunt fungi, ac præprijis qui orbicularis dicitur, lepus marinus, ac planta illa e solani genere quæ vulgo Italidis Belladonna vocatur, etc.

Angina vulgo distinguitur ratione scilicet musculorum affectorum, tum pharyngis, tum laryngis, eorundemque, tum internorum, tum externorum, in συνάγγη et παρασυνάγγη, κυνάγγη et παρακυνάγγη, quarum ex illis prima musculorum gulæ internorum, altera vero externorum inflammationem denotat; ex his autem prior internorum laryngis musculorum, posterior externorum affectionem designat. At missis hisce levioris momenti et ad praxim medicam minus facientibus, ad alias procedamus differentias; quarum prima erit inter anginas veras, musculos prædictos, tum aliquos, tum omnes affligentes; et anginas spurias, seu *nothas*, tum *tonsillas* tum *partes glandulosas* ad radicem linguæ et in extremo palato, atque imis faucibus sitas, tum ipsam *Uvulam* tumefacientes. Item alias in quibus tumor sive intus, sive extus, sive utrobique apparet; alias vero in quibus nullus tumor sensibilis adest, proptereaque ab Aretæo latentes non inepte dicuntur; ejusce sortis anginam vidit Riolanus a Thymo tumente, gangrænosumque quid redolente; atque etiam expertus est Clar. Lucas Tozzi in juvene ex Gallica Lue in maximam, spirandi et deglutiendi difficultatem subito sine tumore sensibili incidente. Aliæ præterea anginæ quamvis per se periculosæ, non sunt tamen malignæ, aliæ vero malignitatem summam, *arsenicalemque*, ac pestilentem virulentiam, adjunctam habent, hinc fauces non tantum crustosæ redduntur, sed etiam tumor, ad instar carbunculi atrocioris, partes quibus insidet longe lateque exurit; unde probabile cum Athanasio Kircherō credit Christian Langius *talem putredinem animatam esse, venenatissimisque vermiculis* abunde scatere, quorum erosionibus malum facilè serpat. Anginæ etiam aliæ sunt ab inflammatione, tumefactione, etc., de quibus supra; aliæ a vertebri cervicis ad anteriora, ut quidam credunt, luxatis, tum per vim externam, ictum, casum etc., tum internam, scil. humorum confluxum, quale quod Hippocrates, describit Epid. 2, sect. 2, cum tamen credat Etthmullerus impossibilem esse hanc vertebriarum, ad anteriora, luxationem; Hippocratisque locum potius explicet de convulsione emprostotono simili.

Incipit hic morbus cum rigore et horrore, eos sequitur febris, illaque sæpe accutissima, sed etiam paulo post dolor atque faucium inflammatio, et tumefactio, quibus tanquam concomitans necessarium continuo adjungitur deglutitionis et respirationis ea difficultas, quæ cum sensu strangulationis ad præfocationem cito deducit, ni morbo maturé occurratur.

Non immerito itaque morbus hic inter periculosissimos accensetur, cum sæpissime suos ægros ante quartum diem aut paulo post suffocatione perimat; præcipue vero si malignitas adfuerit; cum enim vitalibus locis sit proxime vicina, quidni illa prompte pervadat, sicque vitam extinguat. Gravior est cum difficilem anhelitum adfert, tumore in faucibus apparente, autem in collo, vel pectore erumpente salutare, nisi inflammatio intro recurrat, aut cum partibus exterioribus interiores simul occupet. Si vero malum è faucibus in pulmonem reptat, aut intra septimum interficit, aut ultra hanc diem in empyema commutabitur. Cæterum si cum spirandi difficultate jungatur oris fœtor, vel circa guttur et fauces livor, aut albor appareat, sphacelum arguit, et gangrænam, quam partium externarum refrigeratio, pulsus languor, et sensuum hebetudo, ac sôpor consequetur; ut fertur accidisse post annum 1618, per totamfere Italiam: quod adnotat Clarrissimus Lucas Tozzi. Cavendum autem, ut addit idem celebrer auctor, ne humor ex Angina suppurata id tracheam et pulmonem delabatur; is namque suffocationem affere posset, vel saltem empyema, et phthisim. Interdum per modum criseos terminatur; sic refert Forestus de cynanche vera quæ quarto die per fluxum mensium criticum fuit curata. Angina quæ subito et facilè evanescit, (cum eam ad interiora recurrere probabile sit) periculum suffocationis, vel alium gravem morbum, minatur. Si anginosus, sicut strangulatis spuma circa os appareat, vix ad vitam redeunt.

Curatio debet esse prompta, si enim in ullo alio morbo in hoc certe qui fauces veluti spongiolam constringendo citissime strangulat, occasio celeriter et opportune arrepta, feliciter medendi anima dici meretur. Ipso itaque statim morbi initio vena secanda, et sanguis satis larga manu educendus, idque non unâ tantum vice, sed pluribus, tum scilicet e brachio, tum e jugularibus, tum a raninis venis, etc. Post venæ sectionem largiorem celebratam

commode medicamentum purgans, illudque validius, admisto etiam paucō *emetico*, non semel pro occasione data propinabitur, non omissis interea *salibus volatilibus*, mistura simplici, spiritu nitri dulci, dente apri, diaphoretico, et bezoartico minerali, stercoribusque omnibus animalium quæ nitro turgent, quale est caninum, album græcum dictum. Valet præterea cinis cancrorum ustorum et hirundinum, imo et noctuæ, pariterque succus nasturtii, atque mel purum, ulularia, cervicaria, prunella, consolida, item fungus sambuceus elixus, decoctum radicis althææ, caricarum et zinziberis cum quadrante vini in quo agaricum fuerit maceratum, rob nucum juglandium, atque extractum et sal hyperici et papaveris rhæados cum diaphoretico minerali, ter aut quater exhibitum. Ea autem omnia, vel sub forma Eclegmatum vel alia, prout videbitur, commodiori methodo usurpari debent; imo ex his gargarismata confici poterunt quæ leviter adstringant, et discutiant; vel etiam sub finem et in casu necessitatis tumorem émolliant, atque ad suppurationem deducant, species aptas in sero lactis, vel ipso lacte recenti incoquendo.

Applicationes interim extus fiant ex unguentis, emplastris, cataplasmatibus, atque etiam in rebelliori morbo ex oleis stillatitiis. Inter unguenta usurpatur unguentum dialthæas, et martiatum cum oleo chamomillæ et amygdalarum dulcium. Inter emplastra, emplastrum de méliloto, et ceratum de spermate ceti. Inter cataplasmata è caricis, oleo chamæmelino incoctis, item ex pane triticeo cum radice althææ in lacte cum paucō croco usurpatis. Appropriata magis creduntur quæ ex nidis hirundinum, stercoribus animalium et præcipue albo græco, stercore ovillo, caprino, etc. cæpis sub cineribus coctis, nasturtio aquatico et similibus parantur. Inter olea stillatitia maxime prædicatur oleum succini, item oleum e gummi arabica, quæ potenter et validissime resolvunt ac discutiunt. Pro amuleto commendatur filum *sericeum* purpureum, quo *vipera fuerit strangulata*, collo circumductum; item *bufo*, seu *rubeta* cocta.

Victus fiat ex jusculis hordaceis, et avenaceis, aliisque id genus. Potus vero, tum decocto hordei solo, tum ex eodem cui nitrum depuratum sit immistum, tum etiam tinctura papaveris rhæad additis flor. nymph. et verbasci in parva quantitate et

adjuncto nitro cum pauco, si ita placet, saccharo vel melle deputato.

Enemata injiciantur illis omnibus diebus, quibus per intus assumptum medicamentum non expurgatur corpus, sintque emollientia et refrigerantia, tum etiam incoctis purgantibus, electuariisque admistis, paulo validius ad excrementorum expulsionem intestina sollicitantia, quorum formulas non opus est hic, adjiciamus.

Hisce omnibus non satis proficientibus, si æger evidens atque præsciens, suffocationis periculum incurrat, viresque et morbus ipse ferant, ad *Laryngotomiam*, remedium a suffocatione tutum, est deveniendum; quæ *inutilis* tamen foret si inflammatio, et tumor in eoque materia contenta totam *trachææ longitudinem* occuparet, ipsosque *pulmones*. Debet autem sic perfici: Chirurgus ægrum suum collocabit in sedili ad posteriora super pectus ministri in id adhibiti reclinato, ut sic caput sufficiatur; tum mentum quantum fieri poterit relevabitur, adnotatoque incisionis loco, transversum scil. pollicem infra ipsum laryngem, inter tertium ac quartum trachææ anulum, minister faucium cutem utraque apprehendet manu, eamque per transversum replicabit, illicque Chirurgus incisionem faciet transversum pollicem longam, per quam adactis digitis, dilatato vulnere emotisque musculis bronchicis et sternohyodeis, ipsa trachea, satis denudabitur, ut inter tertium et quartum ejusdem anulum stylus in id a fabro confectus ad ipsius usque cavum immitti possit, cum ea solertia quæ vasa, musculos aut membranam trachææ oppositam minime lædat, respirationemque libere educat; tum introducta *cannula argentea* paululum incurvata, et brevi, figuræ, in extremitate quæ est inducenda, depressæ alia vero extremitate aletæ, et duplici annulo armatæ, quibus per ligamina inducta circum collum sic alligari possit, ut immota perstet. Cannula hæc in trachææ cavum penetrabit quidem, ut jam invenimus, sed brevior erit, quam ut possit ejusdem parietem oppositum attingere, sic enim tussim intolerabilem provocaret. Operatione peracta, inducta cannula perstabit in inflicto vulnere donec remiserint, aut evanuerint symptomata, quo demum tempore ad se invicem readductis annulis trachææ cartilagineis, consuetur probe cutis vulnus nec aliquid amplius agendum restabit, nisi ut anodynis

dolor ex sutura ortus leniatur. cicatrixque prompte inducatur. De hac operatione plura vid. sub titulo Bronchotomia.

Angina maligna cū de pestilentium morborum sit genere remedia adhibenda, tum ex ipsa pestis cura, tum etiam ex parte e supra dictis petantur.

Angina *notha*, aliās *alba*, partim memoratis medicamentis, atque venæ sectione, partim etiam aliis curabitur. In specie ubi lentor viscidus linguam obsidet proderit, faucium abstersio ex linteo, aceto succo agrestæ, nasturtii aquatici, aut acetosellæ imbuto, postea gargarisma e floribus ligustri in aqua cum paucō aceto, aut nitro, incoctis, addita etiam salis armoniaci, vel si aphthæ simul adsint, aluminis particula. Succus præterea semper vivi majoris, cum sale armoniaco non parvæ erit efficaciam, ut et alia plura. Sub finem pro firmandis oris et faucium membranis, contra humorum affluxum inungetur rob nucum vel diamorum cum paucō melle rosato, etc.

De cura squinantiae.

Squinantia, tum omnes in gutture morbi, curari suo loco debent, et non in confinibus. Quum *Balsamus naturæ* deficit in gutture, fit in eo putrefactio sursum tendens, quæ uvulam et folium inficit. Ejus curatio fieri debet per gargarismum incarnativum ad hunc modum :

℞. Mellis rasacei ℥ iiij aristolochiæ rotundæ. Pirolæ ana ℥ ℥ aquarum de Prunis, de Prunella ana ℥ septem. Fiat inde gargarismus, quo patiens gargarizet sæpins quum apostema fuerit apertum. Si tumor adesset extrinsecus, applicari debet optimum defensivum ad mitigandos dolores, et setandum ipsum tumorem. Defensivum hoc esto. ℞. mucilaginis de fænugræco ℥ x. Cerussæ camphoræ vitæ ℥ ℥ Misce, fiat inde cataplasma, quod apponatur. Bene poteris capiti mitigationes præstare, miscentur in aqua rosarum rubearum bursæ pastoris solatri, barbæ jovis herbæ, et capiti superpositis atque ligatis.

COURTIN

Courtin n'a traité les affections chirurgicales que d'une façon générale. Il ne s'appesantit nullement par exemple sur les inflammations en particulier et se borne à dire ce que sont un phlegmon, une gangrène, un érysipèle, etc. Nous lui empruntons sa définition du sphacele. Ses considérations purement théoriques sont un fidèle écho des doctrines de l'école.

De l'esthiomène, gangrène, sphacele, phagedène et noma.

Au traité du phlegmon, il a été dit que le phlegmon se pouvait terminer et changer en deux sortes : naturellement et contre nature. Naturellement en deux façons, ou par évaporation, ou par suppuration. Contre nature en deux façons, ou par scirrhe, ou par gangrène. Ces transmutations et changements du phlegmon adviennent par la vertu ou faiblesse de la chaleur naturelle, et force de la chaleur contre nature et par la qualité de l'humeur; car en toute inflammation, il y a double chaleur : chaleur naturelle, qui est cause de toutes les opérations vitales et naturelles; chaleur contre nature qui provient de la pourriture et de l'obstruction. Quand la chaleur surmonte la partie, celle-ci se mortifie et pourrit..... Maintenant qu'il a été parlé des tumeurs faites d'humeurs non naturelles et corrompues, il est commode de parler de la gangrène, que Guy de Chauliac appelle esthiomène, contre l'opinion toutetois des Grecs et d'Avicenne. Car les Grecs les ont appelés tout ulcères malins, qui toutefois sont bornés et terminés, cacotoethe, c'est-à-dire mal morigénés, comme dit Gallien au cinquième chapitre du quatrième livre de la méthode, et au quatorzième chapitre du livre de tumoribus. Les mêmes ulcères ont été appelés chironœux, à raison que Chiron a été le premier à trouver le moyen de les panser, quelquefois telephires, à raison que Telephus en a été persécuté comme il est au deuxième chapitre du deuxième livre de la méthode. Quand tels ulcères sont ambulatifs, râpent et glissent, les Grecs les appellent esthiomènes, quand ils ne prennent que la peau, et phagedènes quand ils sont jusqu'à la chair, comme dit Galien sur le quarante-cinquième aphorisme

du sixième livre..... Quant à la gangrène, Galien au neuvième chapitre du deuxième livre à Glaucon et au huitième livre du traité de tumoribus, a dit que la gangrène était une mortification et corruption qui commençait, et le sphacèle une mortification et corruption complète et entière, où il n'y a point de remède, sinon de couper..... Quand le sphacèle se propage et se multiplie, lors c'est noma.....

DIONIS

Des opérations amygdales.

Aux deux côtés de la luvette, il y a deux grosses glandes englobées, que les uns appellent tonsilles et les autres amygdales, parce qu'elles ressemblent à des amandes pelées; il se fait souvent un dépôt d'humeur sur ces glandes qui en sont gonflées, de telles sortes qu'on a beaucoup de difficultés à avaler. On n'épargne point la saignée dans ces maladies pour prévenir l'obstruction qui arriverait aux vaisseaux sanguins; si ces glandes se tuméfiaient excessivement. Quand elles sont abreuvées de sang, elles ne manquent pas de venir à suppuration; d'autant que la chaleur de la bouche les mûrit promptement. Aussitôt que l'on y sent de la fluctuation, il ne faut point différer de les ouvrir avec la lancette k, qu'on aura entortillée d'une petite bande comme vous le voyez, et dont la pointe se dirige vers la tumeur où on fera une ouverture de la grandeur de deux saignées (a). A l'instant que la matière en est sortie, le malade est soulagé; mais la tumeur est quelquefois remplie d'une espèce de sang brûlé qui se fait jour lui-même, et qui laisse une escarre considérable qu'on doit faire tomber. On met en usage les gargarismes detergifs avec orge, aigremoine, ronces, roses rouges. et grande consoude bouillies dans le vin blanc. Le miel rosat mêlé avec quelques gouttes d'*esprit de vitriol*, nettoie parfaitement ces parties. On trempe dans cette mixtion un linge attaché au bout d'un petit brin de balai, et on en frotte un peu rudement l'escarre qui ne tient pas longtemps contre ce remède.

Quelques-uns de nos anciens proposent de séparer et d'arracher ces glandes; ils en font l'opération très aisée, et nous assurent qu'elles n'incommoderont plus dans la suite; je vous renvoie aux moyens qu'ils nous donnent pour la faire, et que je trouve très cruels, et je voudrais une autre caution de succès que leur parole; car la fonction de ces glandes étant de séparer et de filtrer les sérosités qui servent à humecter la langue, le larynx, et l'œsophage, ces parties se trouveraient privées de cette rosée

qui leur est d'un grand secours pour tempérer l'air qui entre dans les poumons, et faire glisser l'aliment qui tombe dans l'estomac.

GLANDORP

Nous avons cru devoir faire quelques extraits à la compilation un peu confuse de Glandorp, très riche du reste en renseignements historiques.

Polypi descriptio.

Polypus itaque caro est tumida inæqualis, membranula tecta in narium partibus, contra naturam, a causa vel interna vel externa orta, earum porum nunc unum nunc ambos simul obstruens, polypi piscis carni haud dissimilis, modo alba, modo subrubra, vel mollis vel dura, dolens et non dolens, interdum cum hæmorrhagia, non raro etiam sine ea, in principio exigua, paulatim vero ita accrescens, ut nunc per foramina palati ad fauces descendens, nunc extra nares propendens, nunc in cavitate duntaxat permanens, externas quoque nasi partes tumidas reddens, respirationem impediens in tantum, quo ægri hianti ore cogantur dormire, aeremque per ipsum os cum maxima difficultate attrahere : insuper et mortem inferens.

Hæc est descriptio congruens omnibus polypi speciebus, ab authoribus variis citatis ; ex sequentibus autem studiosus lector facile discernet, quænam carnis excrescentia in naribus polypus sit dicenda.

(Cap. II, De Polypo.)

De polypi speciebus, differentiis ac signis.

Hippocrat. medicorum princeps affectus hujus *quunque* his verbis lib. 2 de morbis enarrat *species*. Si polypus fiat in naso ex medio cartilaginum, dependet velut gurgulio, et ubi expirationem facit, progreditur foras, et est mollis ; ubi vero inspirationem facit, retrocedit, et loquitur obscure, et cum dormit, stertit. Alius polypus : Impletur nasus carnibus, et ad contactum caro *dura* apparet, et per nasum spirare non potest. Alius : Intrinsecus ex cartilagine caro rotunda prominet, quæ ad contactum mollis est. Alius polypus : Intrinsecus circa cartilaginem paulisper durum quid nascitur, et videtur quidem esse caro, si vero ipsum attigeris, strepitum edit velut lapis. Alius polypus : Nas-

cuntur ex obliquo cartilaginis in summo velut cancelli. Vigo polypum statuit duplicem, cancerosum et non cancerosum *Cancerosus* polypus *durus* est, adhærens parietibus narium, latæ figuræ in sua sede, *fusci coloris*, sine humiditate, ut plurimum *dolorosus*, *fætidus*, et ex eo maxime, si fuerit ulceratus, faciens nasum aliquantulum tumefactum, in summitate sua, tumefactione tendente ad aliqualem lividitatem, etiam cum aliquali indignatione nasi ex parte exteriori. Non cancerosus est rubei vel albi coloris, tractabilis, gracilis in sua radice, absque dolore, absque fœtore; cum humiditate non parva. Forestus secundum corporis nostri humores, quatuor statuit polyporum differentias, inquit. Polypus ex sola fit pituita, et quidem magna ex parte, licet etiam ex atro humore fiat, quanquam rarissime, cum ex eo aliquando cancer generetur. Sic albi polypi pituitam; rubri sanguinem; citrini, si adsit dolor et punctio bilem; fusci melancholicum humorem arguunt. Paracelsus. « Auch ulcerirt es sich und gehet in tentiginem parvam, id est, noli me tangere. » Etiam exulceratur, et vertitur in tentiginem parvam, etc. De signis sic habet Guido. Significantur istæ passiones aperiendo nares cum instrumento dicto speculum. Piso notis vero quibus dignoscatur, ejusmodi tumor nullis opus habet, cum sensui pateat. Forestus : et quia ad sensum patet, non est multum laborandum, ut ejus notas repetamus. Paracelsus : So einem in der Nasen wachst ein Fleisch, und dringt hindurch mit viel Blüten, so sag das die Nasen bonda sey. id est, si cui in naribus excrescit caro, et penetrat cum hæmorrhagia dic adesse polypum. Et hæc de his sufficiant.

Cura polypi (in gutture).

..... *Mesue* : polypum qui habet radicem gracilem, et egreditur extra, post apprehensionem cum forcibus abscindit; cum vero qui *palatum versus* descendit, tenaculis anteriora versus trahit. et incidit secus radicem cum forcibus ignitis. Si et his extirpari nequit, ex duobus trisbuve pilis caudæ equinæ contortis, et nodis tribus quatuorve factis, *serratura* instituatur, ita ut finis unus per palatum extra os producat, alter e naribus propendet.

Valescus de Taranta ait : si autem fuerit cancerosus polypus

melius est palliare et dolorem mitigare cum anodynis, quam incipere curam.

Celsus dixit : Quæ carkinodes sunt, attingere non debentur.

Lanfrancus : Incurabilis polypum nasum reddit *durum*, lividum seu nigrum, et *magnum profunditatem* tenet, et quando plus eum, curare niferis, tanto plus videbis ejus maliciam augmentari.

Paulus (Ægenita) : Malignos et pervivaces polypos *candentibus ferramentis* adurere consilium est inde remediis ustionis dictis.

Jacchinus : Si vero cancer fit integer, attingi non debet, et si exulcerans continue aliud succo solano densato in vase plumbeo, eum plumbeo pistillo, aut ex succo foliorum salicis.....

VERDUC

De l'Esquinancie.

L'angine ou l'esquinancie est une inflammation des muscles et des autres parties de la gorge ; on en fait plusieurs espèces ; il y en a une où les parties extérieures ne sont pas tuméfiées, et qui n'est qu'une inflammation des muscles internes du cou et du larynx. Il y a une autre esquinancie plus ordinaire qui occupe les muscles extérieurs du cou ; elle est accompagnée d'une tumeur considérable. La luxation en dedans des vertèbres du cou cause une espèce d'esquinancie, dont nous avons parlé ailleurs.

On distingue l'esquinancie en vraie ou en fausse ; la vraie est accompagnée de la fièvre et d'une grande difficulté de respirer ; la fausse au contraire est sans fièvre, ce n'est qu'une inflammation de la gorge. Toutes ces distinctions d'esquinancie faites par les anciens médecins, et par quelques modernes sont inutiles ; il vaut mieux pour ne pas embarrasser la mémoire, n'en faire qu'une espèce qui ne différera que selon le plus et le moins.

Les signes qui marquent une esquinancie prête à se former sont, lorsque le malade commence d'avoir de la peine à avaler et à respirer ; il sent de la douleur au gosier avec une chaleur et une ardeur de la gorge insupportable ; il ne peut remuer le cou que difficilement ; ses crachats sont épais et gluants, il sent une grande douleur de tête.

Lorsque l'esquinancie est formée, on a une grande difficulté de respirer et d'avalier, le malade rejette les bouillons et tout ce qu'il boit par le nez. Si vous baissez la langue, vous l'apprez flasque, molle et sans inflammation ; le fond de la gorge est tout rempli de salive ; la respiration est presque abolie ; on ne peut cracher ni demeurer couché, qu'on ne soit en danger d'être suffoqué. Dans cette occasion les veines du visage sont grosses et enflées, la langue est livide, et couverte d'une matière épaisse, salée ou amère ; le visage est enflé ou enflammé, on a une fièvre aiguë, qui ne vient que de la trop grande effe-

vescence du sang ; on a une soif insupportable, avec une grande amertume de bouche, et quelquefois l'on est en délire : les yeux sortent souvent de la tête, comme il arrive dans ceux qu'on étrangle ; on ne voit les objets qu'imparfaitement ; le poulx est, comme dans les péricneumoniques, ondoyant et petit.

Les causes de l'esquinancie sont internes ou externes. Les internes sont comme une lymphe âcre et acide, qui fait des obstructions dans les petits tuyaux des muscles des glandes et des membranes ; de sorte que la circulation du sang étant arrêtée dans tous ces tuyaux, c'est une nécessité que ces parties s'enflamment et se tuméfient, comme je vous l'ay dit plusieurs fois.

Les causes externes de l'esquinancie peuvent venir d'un air trop humide ou pluvieux, comme le remarque Hippocrate dans ses aphorismes, ou des alimens trop âcres et acides, ou enfin des corps étrangers avalés par mégarde, lesquels par la compression ou par l'irritation qu'ils causent aux fibres du pharynx et des autres parties voisines, occasionnent l'inflammation.

L'esquinancie peut encore arriver après avoir bu des liqueurs corrosives, comme de l'eau forte, ou pour avoir fait des frictions de mercure mal à propos, parce que toutes ces choses par leur acrimonie caustique, non seulement excorient le gosier, mais aussi elles y mettent la gangrène et le sphacèle ; la tumeur des glandes du cou est causée par une grande abondance de lymphe qui s'arrête dans les glandes, à cause des obstructions qui empêchent son retour dans les vaisseaux lymphatiques. Nous avons dit que les enfants sont plus sujets à ces tumeurs que les autres personnes plus avancées en âge, ce qui vient sans doute à cause que les enfants ont beaucoup de lymphe épaisse et visqueuse très propre à faire des obstructions dans les glandes.

Nous dirons pour le pronostic, que l'esquinancie qui survient à la fièvre sans que la tumeur de la gorge ait précédé, ne marque rien de bon.

L'esquinancie où il n'y a point d'enflure au cou, et où néanmoins l'on ressent une grande douleur avec une difficulté de respirer est fort dangereuse, parce que les muscles du larynx bouchent tout à fait le passage de l'air ; c'est pourquoi l'on meurt quelquefois le même jour, ou bien le deuxième ou le troisième. Si dans l'esquinancie les poumons s'enflamment, les malades

meurent ordinairement le septième jour, ou s'ils passent le septième, ils deviennent empyriques, dit Hippocrate : car cette matière âcre qui fait l'esquinancie ayant passé dans les poumons, il arrive une péripneumonie, et si les poumons suppurent, il se fera un empyème.

L'esquinancie que l'on appelle vraie, est plus fâcheuse que la fausse, parce qu'elle occupe les muscles du larynx et du pharynx, comme je vous l'ay dit ; c'est un méchant signe lorsque la fièvre continue toujours. Si l'on écume de la bouche, et que l'on ne respire qu'avec peine, avertissez les assistants que le malade va mourir, parce que c'est une marque assurée que la trachée artère est fortement serrée. Au reste si la tumeur suppure en dedans et que le malade ne puisse cracher, le pus le suffoquera peut-être en tombant dans la canne des poumons. C'est un bon signe, lorsque dans l'esquinancie l'inflammation des parties internes se manifeste aux parties externes, et qu'il survient une tumeur et une rougeur à la poitrine : cela marque souvent la crise de la maladie.

Dans l'esquinancie, tantôt on ne peut avaler les aliments solides, mais seulement les liquides ; quelquefois au contraire, on avale facilement les aliments solides, et l'on a beaucoup de peine d'avalier les liquides.

On avale facilement les aliments liquides, lorsque la circonférence du palais est enflammée ; c'est-à-dire les parties qui sont dans cet endroit, comme la luette, et surtout la racine de la langue ; car la langue ne pouvant se plier, ni se courber en haut vers la base, comme il est nécessaire, pour embrasser les aliments solides, et pour les pousser jusque dans l'œsophage, c'est ce qui fait la difficulté d'avalier les aliments solides, et qui sont un peu durs ; au contraire on avale facilement les liquides parce que ceux-ci n'ont pas besoin d'être embrassé ni poussé par la langue, car leur mouvement de liquide suffit pour les faire couler, pourvu qu'ils trouvent l'œsophage ouvert.

On pourrait encore dire, que cela arrive lorsque les muscles du pharynx et de l'œsophage sont paralytiques ; car ces muscles étant relâchés, le pharynx ne s'ouvre pas assez ; de sorte qu'alors les liqueurs par leur fluidité entrent facilement, quoique l'embouchure de l'œsophage soit fort petite.

Au contraire les aliments solides n'ayant point de mouvement, et d'ailleurs étant composés de particules raboteuses et inégales, ils s'attachent à l'entrée de l'œsophage, et s'y arrêtent ; c'est pourquoi ils ne passent pas plus avant.

Enfin on avale les aliments solides, et l'on ne peut avaler les liquides, lorsque les muscles du pharynx sont enflammé, parce que l'inflammation rétrécissant l'œsophage, les aliments solides ont peine à passer ; ils passent pourtant, parce que la langue par ses mouvements les presse, et qu'elle surmonte la résistance des muscles étranglés de l'œsophage : au contraire les aliments liquides ne pouvant estre embrassés ni pressés par la langue, pour les faire couler vers le pharynx ; ils se répandent de tous côtés et remontent vers le nez, c'est ce qui fait la difficulté qu'il y a d'avaler les aliments liquides, lorsqu'il y a une inflammation aux muscles du pharynx.

Les inflammations de la gorge se terminent pour l'ordinaire en trois manières, ou en disparaissant d'abord, ou par la résolution, ou par la suppuration. Lorsqu'elles suppurent, il en arrive quelquefois des *ulcères malins* très difficiles à guérir. L'esquinancie se termine souvent en *pleurésie*, et quelquefois elle se termine par une hémorragie du nez, ou de quelque autre partie. On doit toujours regarder cela comme une crise favorable.

L'esquinancie étant une très fâcheuse maladie, il faut y apporter un prompt secours si l'on veut la guérir. Que l'on observe une diète convenable à la maladie, que l'air soit tempéré, qu'il ne soit ni trop chaud, ni trop froid de crainte d'augmenter l'obstruction. Le malade doit se tenir droit pour respirer ; cette situation luy est avantageuse, il en est moins incommodé, le retour des liqueurs se fait plus facilement. Il prendra des aliments liquides, comme de bons bouillons si le malade ne peut avaler, on se servira de cet artifice ; on remplira de bouillon une vessie de porc, ou de ce qu'on voudra faire prendre au malade, on y attachera un petit tuyau comme le canon d'une seryngue, pour introduire dans le fonds de la bouche ; on pressera la vessie pour faire entrer la liqueur dans l'œsophage. Si cela ne réussit pas, il y a des praticiens qui disent qu'il faut nourrir le malade avec la seule vapeur des viandes : mais on

peut se passer de tout cela; car il ne faut pas croire qu'un malade ne puisse être quelques jours sans manger, puisqu'on en a vu dans cette maladie qui ont été neuf jours entiers sans prendre rien, et qui n'ont pas laissé de recouvrer leur première santé.

Si le malade ne peut dormir, on lui fera prendre des émulsions faites avec les quatre semences froides et la graine de pavot blanc dans l'eau de fleurs de sureau; que l'on demeure tranquille, que les évacuations se fassent comme à l'ordinaire, que, l'on bannisse les passions.

Comme l'esquinancie est une tumeur causée par l'acidité du suc nourricier dans les muscles de la gorge, il faut, s'il est possible, tâcher de débarrasser les *obstructions* par des médicaments *volatils*; mais si la tumeur est considérable, et que le malade soit en danger d'être étouffé, il le faut saigner au bras, ou plutôt sous la langue. Lorsque le malade ne peut souffrir la saignée, ou parce qu'il est trop faible ou parce qu'il est trop vieux, on lui appliquera des ventouses sur les cuisses et un cautère à la nuque. Cependant on ne peut disconvenir que la saignée répétée en peu de temps jusqu'à quatre et cinq fois selon la violence de la maladie, ne soit le plus sûr et le plus prompt moyen que l'on puisse d'abord employer pour modérer les principaux accidents de l'esquinancie, procurer en peu de temps sa résolution, et parvenir à l'augmentation du dépôt, en cas que la tumeur tende à se terminer par suppuration; car quelque prévention que l'on ait contre ce remède, l'expérience justifie tous les jours combien il est efficace pour procurer la prompte guérison de toutes les inflammations de quelque nature qu'elles soient, et en quelque endroit du corps qu'elles arrivent.

Il faut éviter les *purgatifs*, comme des choses nuisibles et pernicieuses. Si le ventre est dur, on prendra des lavements faits avec la mauve, la branche ursine et la camomille; on mettra dans la décoction une once de miel mercurial, un jaune d'œuf et une once d'huile de lys, un scrupule de nitre préparé avec l'antimoine. On prendra dans les bouillons une once d'huile d'amandes douces avec un dragme de crème de tartre.

Il faut prendre garde de prendre l'esquinancie pour une tumeur des amygdales, car ces deux maladies demandent des remèdes différents pour leur guérison. Dans l'esquinancie on

donnera des diaphorétiques, et dans l'autre maladie, on donnera les diurétiques.

Pour une esquinancie épidémique et maligne, on commencera d'abord par les doux diaphorétiques, pour absorber l'acide, et pour pousser par les sueurs les sucres âcres arrêtés dans la partie. Les meilleurs sont le sel volatil de corne de cerf, le sel de chardon béni, l'antihectic de Peterius, la décoction de bois, avec un peu de miel rosat et le cristal minéral. Les remèdes externes seront comme les gargarismes, les linimens, les emplâtres résolutifs, etc.

Voici un gargarisme fort bon pour l'esquinancie : Prenez deux onces d'eau de fleurs de sureau, une once d'eau de plantain, six drachmes d'esprit de vin, et vingt gouttes d'esprit de sel ammoniac. Le malade en lavera souvent sa bouche. Ou bien : prenez huit onces de décoction de fleurs de sureau, deux drachmes d'esprit de vin tartarisé, avec une demie once de miel rosat. Bien souvent le malade ne peut remuer la bouche pour se gargariser la gorge, c'est pourquoi il tiendra seulement le gargarisme dans sa bouche, sans faire aucun mouvement de la gorge, et il rejettera ensuite la liqueur. Il faut recommencer souvent, si l'on veut avoir l'effet du gargarisme.

Pour résoudre la tumeur, les liqueurs spiritueuses remplies de sel volatil valent mieux que les emplâtres, comme l'esprit de vin *camphré*, les liniments, avec deux drachmes de sel volatil d'urine, que vous ferez dissoudre dans un peu d'eau de fleurs de sureau ; vous y ajouterez une once de beurre frais.

Pour les astringents que l'on appelle défensifs, on doit les bannir, puisqu'ils ne font qu'augmenter les obstructions comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Si la tumeur ne se dissipe pas, vous appliquerez sur la partie des cataplasmes émolliens, pour tâcher de faire suppurer cette tumeur. En voici un très propre à cet effet : Prenez une poignée de fleurs de scabieuse, de mauve, de camomille et de melilot, une demie poignée de figues, une once de réglisse et une drachme de blanc de Grèce ; on fera bouillir le tout dans du lait.

En voici un autre très bon : Prenez une poignée de mie de pain, une once de racine d'althea et d'oignons de lys, six drachmes de graines de lin, et une demie once de fenugrec ; on fait bouillir

le tout dans du lait. Après l'avoir passé, on y ajoute six drachmes huile d'amandes douces, autant d'huile de lys, une demie once de beurre frais, une drachme de safran, avec deux jaunes d'œufs.

Abcès en général.

Lorsque dans les inflammations les particules les plus subtiles des liqueurs, qui se trouvent arrêtées, se sont évaporées et qu'il n'y a plus d'*esprits*, ni de *sels volatils* (théorie iatrochimique), les autres particules grossières se joignant ensuite de plus près, composent une masse que l'on appelle du pus. D'abord il étend la partie où il est renfermé, ce qui forme une tumeur, à laquelle on donne le nom d'abcès.

L'on distingue deux sortes d'abcès; il y en a, où la matière est renfermée dans un kyste, et il y en a d'autres, qui n'en ont point. Les abcès, où la matière est renfermée dans un sac, sont de trois sortes : ceux où la matière ressemble à de la bouillie sont appelés *athéromes*; il y en a d'autres où la matière ressemble à du miel, et on les nomme *melliceris* ; enfin il y en a d'autres où la matière ressemble à du suif, et on les appelle *stéatomes*.

Il y a encore des abcès, où l'on trouve des choses extraordinaires, comme ceux dans lesquels on voit des poils, des matières osseuses ou des matières endurcies comme du charbon, des coquilles, des pierres, etc. Il y en a d'autres où la matière ressemble quelquefois à de la saumure, et où quelquefois elle est comme de la boue toute fourmillante de *vers*, d'*araignées*, de *lézards*, de *grenouilles*, de *crapauds* ; ce sont toutes choses de fait, que l'on peut voir dans les journaux de France et d'Allemagne. Nous trouverons peut-être l'occasion de vous expliquer la génération de tous ces insectes.

Au reste, ne vous persuadez pas que les abcès n'arrivent qu'aux parties molles; il s'en forme aussi dans les os mêmes, dans lesquels on voit la substance des os et la moelle suppurer avec abondance.....

Pour les signes des abcès, il y en a qui marquent que le pus se fait, et il y en a d'autres qui montrent qu'il est fait. On connaît qu'il se fait du pus à la chaleur, à la douleur et à la pulsation extraordinaire que l'on sent à la partie. D'abord que le

pus est fait, tous ces accidents cessent, la tumeur diminue de grosseur, elle devient molle, et cède aux doigts lorsqu'on la comprime, la tumeur finit en pointe.....

Il y a des abcès où le pus est profond; à ceux-ci la tumeur ne se termine pas en pointe, et en les touchant on ne sent pas la matière (le pus) sous les doigts.

Lorsque dans une inflammation toutes les fibres de la partie viennent à se désunir et à se rompre par le torrent impétueux de la matière subtile, les liqueurs qu'elles renferment s'extravaient et se changent en pus, ce qui forme un abcès. Ce pus n'est pas toujours le même; il est plus ou moins corrosif, livide, vert clair, blanc, ou un peu épais; ce qui dépend de la nature du phlegmon, de la partie enflammée (ex. : abcès du tube digestif et surtout de l'intestin, abcès des voies urinaires, etc.) et du séjour que le pus a fait dans cette partie, et aussi du différent arrangement des particules du sang. S'il y a, par exemple, dans le sang beaucoup de sels âcres et corrosifs, il est certains que le pus qui s'en formera sera âcre et corrosif.

Le pronostic des abcès se considère par rapport aux causes et par rapport à la partie malade.....

MANNE

Observation de chirurgie au sujet d'un polype
extraordinaire, etc.

Feu M. le marquis d'Aulan m'avait déposé entre les mains un de ses vassaux appelé Jacques Grenon, âgé de vingt et un ans près de succomber et de périr misérablement suffoqué, et étranglé par un polype à demi cartilagineux, qui occupait la narine droite, lequel s'étendant à travers la fente nasale, se terminait enfin dans la gorge par une masse plus grosse qu'un œuf de poule d'Inde; polype qui avait été jugé incurable, proscrit et privé de tous les secours de l'art, par toutes les personnes de la profession, qui l'avaient examiné, en quoi elles s'étaient conformées à la doctrine erronée, et aux préjugés qui favorisaient alors et justifiaient leurs sentiments...

Je fus assez hardi pour avoir des idées différentes sur ce sujet, et en secouant des préjugés, qui me semblaient porter à faux, j'entrepris cette opération à l'hôpital, suivant le plan que je m'en étais formé, sous les yeux de messieurs les médecins et messieurs les recteurs de cette maison.

A peine eus-je détruit la plus grande partie du polype qui occupait la narine droite, qu'interrogé par ces messieurs, qui souhaitaient d'être informés, quelle serait ma manière de procéder, pour enlever la masse qui restait dans la gorge; sur ce, je leur répondis, que j'étais tout déterminé de faire des incisions sur cette partie de la voûte du palais, où se trouve suspendue la luette, afin qu'après m'être délivré de ce rideau, je pusse aller attaquer tout de suite la masse, que je me proposais de couper à son tour.

Ils furent si prodigieusement effrayés de ma proposition, que feu M. Patrely, ce médecin si sage, si éclairé et si attentif à ses malades, si exact et si appliqué aux devoirs de son état, persuadé d'une part que j'allais immoler ce malade par un coup d'essai téméraire, et jaloux d'autre part de conserver le peu de

réputation qu'il avait si fort contribué à me faire acquérir par la confiance dont il m'honorait, engagea par ce double motif messieurs les recteurs de l'hôpital, pour m'épargner à moi la honte de le voir expirer entre mes mains, en m'opiniâtrant de vouloir tenter une chose impossible et inouïe, à chasser le malade la nuit même...

Il n'en fallut pas davantage pour déconcerter tout mon système, et pour renverser tous mes arrangements. Le malade demi opéré, fut renvoyé la nuit du même jour, et je ne fus occupé le lendemain qu'à me donner des soins et des mouvements infinis pour le retrouver, afin qu'en lui donnant moi-même l'hospitalité dans ma maison, je pusse en toute liberté poursuivre à mes frais et dépens, et achever pour mon instruction, et pour le bien public, cette opération déjà commencée.

Je le trouvai, en effet, ce malade, après bien des recherches, et je le reçus chez moi où je l'opérai, et je le guéris non seulement radicalement, mais je le présentai en bon état, à la face de toute cette ville, en le soumettant à l'examen rigoureux de toutes les personnes prévenues que je courrais après une chimère, et ce fut précisément de ces mêmes personnes que j'obtins les attestations les plus solennelles pour constater le fait....

Jacques Grenon a donc été le premier homme sur lequel on ait fait la première expérience d'une opération inconnue. Cette guérison, qui éclata d'abord et fit grand bruit dans le royaume, et donna quelques mois après occasion au fameux M. Petit de répéter à Paris cette même expérience sur un jeune garçon de 12 à 13 ans, de la gorge duquel il extirpa une masse charnue de la grosseur du poing. Ce grand chirurgien ne dédaigna pas de suivre ma méthode, puisqu'il s'y conforma en coupant la cloison du palais, et qu'il se comporta pour tout le reste de cette opération, suivant les mêmes préceptes que j'avais établis, dans ma dissertation. L'observation de ce jeune garçon se trouve dans l'excellent traité des opérations de M. de Garengéot.... Cette description ne prouve pas que l'opération fut connue depuis plus de 700 ans, ainsi que le prétend insinuer artificieusement quelqu'un.... Même entreprise et même succès de ma part et sur le même sujet, à l'égard d'une jeune fille âgée de 15 ans, appelée Françoise Biscarol, que j'opérai, en l'année 1740,

sous les yeux de M. Allemand, mon collègue, et en présence de M. le marquis de Brantès, et de M. Bonnet, docteur, tous deux recteurs de l'hôpital, et qui ont bien voulu permettre que je m'appuyasse de leurs témoignages. Même incision fut faite sur la cloison membraneuse du palais, à la faveur de laquelle je coupai une masse charnue à la gorge; et passant tout de suite à la narine droite, occupée par l'extension du même polype, je saisis au moyen de la tenette inventée par Fabricius d'Aquapendente, et j'embrassai ce corps si avant qu'il me fut possible, et par des demi-tours de main, et quelques secousses, je l'amenai en entier avec ses branches si facilement, que ce ne fut qu'une affaire momentanée. Cette guérison a été si solide, qu'outre que cette maladie n'a eu aucun retour, la personne jouit d'une parfaite santé, et qu'ayant passé dans l'état du mariage, elle est devenue mère de plusieurs enfants. Il est vrai que ce polype n'était pas ancien, il est vrai aussi qu'il n'était ni trop gros, ni trop dur, inconvénients qui sont ordinairement les suites d'avoir négligé dans les commencements ces excroissances, dont le propre est de végéter et de s'accroître, de contracter par le laps du temps un volume prodigieux, accompagné souvent de dureté, quelquefois skirrheuse, et d'autres fois enfin à demi cartilagineuse; inconvénient qu'on ne peut prévenir qu'en recourant promptement au seul, et unique remède, qui consiste dans l'extirpation.

Tels, et plus grands encore ont été les symptômes du polype monstrueux, qui est l'objet de cet ouvrage, et que j'annonce au public. Le nommé Etienne Ducrès, vassal de M. le duc de Gagne, âgé de 17 ans, et originaire de Saint-Saturnin dans le Comtat, fut attaqué en l'année 1745 d'une hémorrhagie très considérable par la gorge et par le nez, dans le temps qu'il travaillait aux moissons. La chaleur excessive qu'il éprouva sur la tête par l'impression du soleil le plus ardent, occasionna cet accident. Hémorrhagie qui se répéta souvent pendant l'espace de quatre mois, qui suivirent cette époque. L'enchiffrenement, qui survint après ce premier accident, suppose les obstructions, et les embarras les plus grands, qui s'étaient déjà formés dans les vaisseaux, et dans les glandes qui composent le tissu de la membrane pituitaire. Bientôt après, le malade commença à na-

ziller ; cette incommodité, qui augmentait de jour en jour avec celle de ne pouvoir respirer de la narine gauche, qu'avec une peine extrême, annonça dans cette partie la présence d'un corps étranger, qui empêchait le libre passage de l'air, et la modification de cet élément dans cet organe.

.....

Ainsi sans recourir au bâillon, je fis asseoir le malade au grand jour, je lui fis assujettir la tête un peu penchée en arrière, je l'invitai de bien ouvrir la bouche; il le fit, et je puis assurer qu'il le fit de tout son cœur sans secours étranger. Alors avec un bistouri courbe armé, et environné d'une bandette, je coulai à plat cet instrument à côté de la lnette, et le faisant glisser entre la cloison membraneuse, et la masse polipeuse, je fis une incision que je prolongeai jusqu'à la naissance des os du palais; après quoi je poursuivis à attaquer ce corps qui était enclavé dans la gorge; il était d'une si grande dureté qu'il résistait à l'instrument; j'en appelle au témoignage des assistants, qui furent encore les témoins des hémorrhagies effrayantes, qui survinrent à chaque coup de bistouri; je n'en donnais aucun que l'effusion du sang prêt à étouffer le malade ne me forçât d'interrompre l'opération, à laquelle, lorsque cet accident cessait, je revenais, pour la suspendre le moment d'après au retour de ce même accident.....

On avait soin cependant de lui donner de temps en temps des spiritueux, et de lui faire prendre des petites prises de bouillon pour le soutenir, et pour réparer ses forces abattues : ainsi à parties brisées, d'incision à incision, d'hémorrhagie à hémorrhagie, et de défaillance à défaillance, j'arrivai enfin au moment si désiré de séparer, et de détacher absolument en entier de la gorge cette masse, qui passant à l'instant dans les mains de tous les spectateurs, les convainquit dans l'examen qu'ils en firent de sa dureté extrême, et de sa qualité à demi cartilagineuse....

GARENGEOT

Ouverture des abcès amygdaliens, etc.

.... Parmi les maux qui attaquent la bouche et les parties voisines, il survient quelquefois des inflammations et des gonflements considérables aux amygdales, et souvent des abcès qui ont beaucoup d'étendue, parce que ces glandes sont par paquets comme des grappes de raisin. On a coutume de saigner copieusement dans la première maladie; mais lors qu'après plusieurs saignées des bras, du pied et de la jugulaire, l'engorgement subsiste encore, on est obligé de faire des scarifications sur ces glandes. Pour les abcès, le meilleur remède et le plus prompt est de les ouvrir; mais comme il est assez malaisé d'opérer dans ces endroits, soit pour l'un ou pour l'autre cas, M. Petit a inventé un instrument très commode qui a été nommé *pharyngotome*.

Le pharyngotome est une lancette cachée dans une canule, qu'on fait sortir en poussant un ressort en spirale, avec laquelle on peut commodément scarifier les amygdales, et ouvrir les abcès qui sont dans son intérieur.

De l'opération du polype. — On détruit le polype en deux manières : par l'opération, et par le consommif.

M. Petit veut qu'on consume ceux qui sont courts et larges, et ceux que nous avons dit, qui pouvant souffrir l'extirpation, peuvent aussi être consommé.

M. Thibaut se sert d'un caustique, qui fait son effet sur le champ. Il prend deux petits emplâtres et les applique intérieurement entre le polype et la paroi intérieure du nez, afin de préserver les cartilages du nez de l'approche du caustique; il fait ensuite un petit goupillon avec lequel il prend du beurre d'antimoine, qu'il porte sur le polype, prenant garde d'intéresser les parties voisines. Il faut sur le champ laver le polype avec de l'eau, parce que le caustique causerait du désordre; ce remède agit dans le moment.

Si nous jugeons de l'extirpation du polype, selon ce que nous

en dit Fabrice d'Aquapendente, nous concluons qu'elle peut réussir, puisque cet auteur, qui a donné les premières figures des pincettes, pour la faire et la manière de l'exécuter, nous assure l'avoir faite plusieurs fois, sans qu'il en soit arrivé le moindre accident; il ne faut pas cependant suivre aveuglement ce que nous apprend ce grand homme, et nous devons faire attention aux sages conseils de M. Arnaud, qui dit qu'après l'extirpation du polype il est quelquefois arrivé une hémorrhagie si considérable, qu'il a été impossible de l'arrêter, et les malades ont péri sans qu'on ait pu leur donner de secours; c'est pourquoi le chirurgien doit prendre toutes les précautions possibles, pour éviter cet inconvénient.

Avant d'entreprendre cette opération, il est bon d'y préparer le malade; et comme nous appréhendons l'hémorrhagie, les saignées diminuant la quantité du sang, préviennent puissamment cet accident.

On usera aussi de doux purgatifs, afin de nettoyer les premières voies et de les disposer à recevoir des apéritifs, qui diviseront la lymphe grossière et épaisse qui a fait gonfler la glande, et d'absorber les acides qui y prédominent.

Pour avoir un heureux succès de l'action de ces remèdes, on consultera un médecin prudent et expérimenté, qui, de concert avec le chirurgien, ordonnera les remèdes par degrés, commençant par les plus modérés.

Pour bien faire l'opération suivant le conseil de M. Arnaud, on fait asseoir le malade sur une chaise un peu penchée en arrière, et on la tourne de façon que la lumière et le jour permettant de voir autant de la narine et du polype qu'il est possible. Un serviteur chirurgien tient le malade dans cette situation, en posant ses mains croisées dessus son front, et d'autres lui tiennent les bras.

L'opérateur prend ensuite les pinces mousse par le bout, ou bien les pinces de M. Petit, dont nous donnerons la description en parlant des instruments.

SHARP

Extirpation des amygdales.

Les amygdales deviennent parfois si grosses et si dures, qu'elles sont incurables par les moyens ordinaires, et menacent même de suffoquer les malades. Autrefois on les extirpait à l'aide de l'instrument tranchant ; mais il en résultait presque toujours des hémorrhagies très-abondantes, et parfois mortelles ; aussi préfère-t-on actuellement la ligature, qui non seulement ne fait courir aucun danger sérieux, mais encore assure la guérison. Si le pédicule est plus étroit que le reste de la glande, on peut le faire passer dans l'anse de la ligature qu'on fait d'abord dépasser en arrière l'amygdale, pour la ramener ensuite vers elle. Ceci fait, l'opération est aisée à effectuer avec l'instrument inventé par Cheselden. On le glisse vers la tonsille, puis on tire les deux bouts de l'anse, comme il est montré sur la figure ci-dessous. Si le pédicule est gros et la glande en quelque sorte conique, de telle sorte que la ligature soit exposée forcément à glisser, on perce le pédicule, comme l'a recommandé Cheselden, à l'aide d'une aiguille recourbée, tenue à l'aide d'une pince. L'œil en est placé près de la pointe. On y passe un double fil, à l'aide duquel on pratique au-dessus et au-dessous de l'endroit où a passé l'aiguille, une ligature. Les nœuds doivent toujours être doubles, et on doit couper les fils toujours très-près de ces nœuds. Si la mortification n'est pas complète au bout de quatre à cinq jours, on refait une autre ligature, bien que je n'aie jamais eu besoin jusqu'ici de répéter cette opération. (*Treatise on the operations of surgery*, cap. XXXII, traduction personnelle.)

L. HEISTER

Quomodo deprimi lingua debeat.

Possunt equidem varia incidere palati sive oris vitia, tonsillarum nempe atque uvulæ inflammationes sive exulcerationes, polypus item atque abcessus oris, ossicula denique vel piscium spinæ intus forte in faucibus defixæ, quæ providam omnino atque aptam linguæ depressionem postulant; siquidem accurate ipsa cognoscere volueris. Adhiberi ad hunc usum peculiare quoddam instrumentis genus solet, *glossospatha*, sive specillum linguæ Medicis vocatum (Vid. Tab. 1, litt. P). Nobiliores autem iidemque delicatiores quia specillum istiusmodi, utpote quorumvis aliorum hominum ori applicatum, insigniter fastidiunt, elegantius longe est atque simul commodissimum, cochlear quoddam mundum, ansaque planiori instructum applicare. Utrobique vero id prospiciendum imprimis est ut quam lenissime instrumentum admoveatur, ne qua forte partium ægrarum inflammatio cum doloribus concitetur vel adaugeatur. Sicubi injectionibus simul opus est, super spathæ oris sive cochlearis ansam syringam in os immittere atque liquorem convenientem injicere oportet. Si quæ autem oris ulcera, tonsillarum vitia, narium polypi, atque id genus alia incommoda, sed absque inflammatione tamen et convulsionibus incidunt, quæ, quo minus aperiri os valeat, impediunt, speculum oris quoddam prudenter adhibendum est.

(Part. II, sect. II, cap. LXXXII.)

Quomodo foramina ex naribus in palatum hiantia curari debeant.

Si quibus forte palatum, ut modo diximus, graviter exesum atque ad ipsas usque nares ita perforatum est, ut et distincte loquendi facultas impediatur, atque potiones, aliaque liquida, quæ assumere volunt, per nares rursum profundantur, horum equidem salus in eo posita est, ut, quam exactissime licet, fora-

men istud occludatur. Quod vero quia per novam carnem atque ossa, ut capite præcedenti jam docuimus, obtineri nequit, fieri proprio instrumento quodam debet. Itaque *lamina* quædam *aurea* vel *argentea* foramini ita adaptanda, tubuloque hinc atque inde perforato vel ansa quadam sic instruenda, ut non ipsum modo foramen quam arctissime claudi, sed spongiæ quoque frustulum aliquot ad supremam tubuli seu ansæ partem firmari valeant. Spongia etenim per palati foramen istud in nares inserta firmiter laminam, ne decidat, continet, atque ita efficit, ut non distincte tantum loquendi quoque facultatem naturalem ægri homines recuperent, quasi palatum haberent integrum. Oportet autem bina saltem instrumenta hujusmodi in promptu habere alternis semper diebus applicanda; spongiam autem quotidie ex aqua pura diligenter exprimere, ne, quos in naribus eadem attraxit, humores sensim putrescant, odoremque pessimum producant. Vidi ejusmodi quoque foramen magnum palati in militum quodam Præfecto, a glande plumbea inflictum: quod vero eodem modo emendandum erat.

(*Cap. XCII, part. II, sect. II.*)

De uva sive uvula nimium producta.

I. Uva equidem haud raro varias propter causas ita intumescit, ac producitur, ut multum, imo quandoque in ipsam fere laryngem sive asperam arteriam descendat, ideoque non spirandi solum, sed deglutiendi quoque et loquendi negotium difficile admodum reddat. Si recens adhuc atque ab inflammatione concitatum malum est, prout quidem ex doloribus, calore item ac colore rubicundo cognoscitur, gargarizationibus atque injectionibus, temperandi ac resolvendi vim habentibus, ut aqua simplice cum paucis spiritu vini permixto, vel decocto fungor. sambuci, hordei, florum ligustri, aut malvæ cum nitri alumini-vel salis ammoniaci portiuncula permixto, imprimis utile est. Adhibere autem simul medicamenta interna eademque temperantia, cujusmodi noster pulvis temperans est, alique similes, oportet; quin etiam ubi gravior inflammatio subest, sanguinem mox per venas vel brachii vel pedis detrahare, alvum ducere atque clysteria applicare convenit, ne scilicet angina sive fau-

cium inflammatio perniciosissima superveniat. Quanquam nec scarificationes hic alienæ sunt; dudum enim experientia, cum in proprio, tum in aliorum corporibus instituta me docuit, non deliniri modo uvæ inflammationes, sed præcaveri etiam utiliter per easdem quam efficacissime posse. Quoties a pituita ultra justum modo diducitur, alba plerumque ipsa existit, absque omni et calore et inflammatione. Itaque longe optimum hic est, vel spiritu vini calido, pauca aqua temperato, vel decoctis adstringentibus, qualia ex rosis, ligustri floribus, granatorum corticibus atque rebus id genus aliis præparantur, cum admixta spiritus vini vel spiritus salis ammoniaci portiuncula, diligenter gargarizare. Si nihilominus malum remanet, alia via ad curationem seu pituitæ digestionem aggrediendum est. Nempe zingiberis vel piperis contriti cum adjecta granatorum corticum æquali portione uvæ nimium diductæ vel forma pulveris, vel et cum melle subacta, minuti cochlearis cujusdam beneficio (tab. I, fig. IV) diligenter admoveri debet, non neglectis interim medicamentis internis, iisdemque purgantibus atque digerentibus.

II. Quandoque autem hæc omnia parum sunt, sed propter pituitam afflicta uva sic tandem quandoque intumescit atque prolongatur, ut in ipsam *arteriam asperam dependeat*, graviterque spiritum, deglutitionem atque sermonem impediat. Quo equidem in casu, quando inanis esse medicamentorum usus adsolet, protinus id tollendum, quo longior uva est, quam naturaliter debet. Tolli autem variis modis uvæ pars supervacanea potest. Primus modus est per *vincturam*. Huic perficiendæ quia manus haud sufficiunt, proprium instrumentum aliquod extat destinatum: quale quidem ex Hildano et Sculteto (Tab. XXI, fig. 6) repræsentavimus. Nempe filum quoddam crassum A. acus longioris (fig. 7) adjumento sic per instrumentum illud cavum ducitur, ut vinculum aliquod intra annulum B. fiat. Per vinculum istud lineum tanta uvæ pars demittitur, quanta inutilis esse cognoscitur, adstrictoque filo C. graviter constringitur. Tum instrumento ipso remoto, vinculum in uva relinquitur, firmitusque subinde per dies singulos adstringitur, donec uvæ pars inferior decidat. Sed ista quidem curandi ratio quantumvis satis ingeniosa sit, *tarda* nimis est, neque homini ægro tantum, sed chirurgus etiam molesta. Paulo promptior ea curandi ratio videtur,

si, lingua per specillum planum sive spathulam (Tab. I, P. vel R), prius depressa, tantum ex uva per *forficem longiorem* exciditur. quantum supervacaneum esse manifestum est. In quo equidem negotio illud imprimis videndum est, ne justo vel major vel minor pars, quam naturaliter decet, remaneat. Justo major etenim si remanet, ægro molesta et parum utilis operatio est; justo minor autem si relinquitur, sermo plerumque corrumpitur. Quando vero quis manu tam strenua instructus non esset, ut oris spathulam cum forcice quam exactissime simul continere valeat, nonnullis optima atque commodissima curandi ratio est, quæ fit per illud instrumenti genus, quod a rustico quodam Norrvagico (siquidem in his regionibus frequentissimum istud mali gelus est) adinventum Bartholinus ut et Scultetus accurate satis descripserunt. Nimirum cultellus aliquis proprius ad ferramentum quoddam latum idemque in anteriori parte perforatum ita firmatur, ut post emissam, quæ ferramento juncta est, lamellam elasticam, quam celerrime prorumpat, uvæque partem inutilem præcidat. Tametsi clarissimus Ravius ni fallor, instrumentum illud sic immutavit (vid Tab. XXI, fig. 8), ut lamina elastica prorsus absit, cultellus autem C. per bacillum BB. sortiter depressum uvam productam atque per foramen A. quantum satis est, demissam uno ictu resecet sive decerpat. Instrumentum ipsum per ansas D. D. D. manu sinistra sic in ore continetur, ut lingua simul quam aptissime deprimatur, atque tunc oris specillo opus non sit.

III. Uvæ parte supervacua hunc in modum præcisa, haud alienum est sanguinem paulisper fluere pati; dehinc autem cum ad cohibendum sanguinem, tum ad partem ægram fovendam, ex vino calido eodemque præsertim rubicundo, si haberi potest, vel aceto etiam aut oxycrato calido, diligenter gargarizare. Si nihilominus fluere sanguis pergit, pulvere aluminis per admotum cochlear (Tab. I, fig. M) cohibendus; vel et priscorum chirurgorum more, ferramento quodam calente, sed nondum tamen candente, dum sanguis conquiescat, contingenda. Quoties autem, prout fieri haud raro suevit, affectus aliquis venereus uvam simul infestat, id sibi datum chirurgus existimet, ut non a manu solum, sed a medicamentis quoque convenientibus sanitatis præsidia petat, alias optatum finem non obtinebit.

De tonsillarum ab inflammatione atque angina vexatarum scarificatione.

Tonsillarum inflammationem vehementiorem, præsertim si propter anginam incidit, in malis gravissimis maximeque periculosis numerandam esse, ipse rerum usus loquitur. Ne qua igitur gangræna cum aliis id genus malis pessimis superveniat, cogitandum protinus de medicina efficacissima est, cujus beneficio inflammatio ista leniatur. Si quid autem aliud, præter jam proposita, adversus uvæ inflammationem remedia, nobile hic sanitatis præsidium est, nobilissimum profecto in iterata sanguinis per venas brachii, pedis, juguli, imò et ipsius linguae detractio, ipsarumque tonsillarum diligenti *scarificatione* positum est : sic enim quam aptissime educi sanguis abundans et inspissatus potest. Quemadmodum autem veteres Chirurghi externam tonsillisque proximam colli partem scarificarunt, sanguinem nimium per impositas cucurbitulas extraxerunt, id quod adhuc ipse utilissimum usu deprehendi ; sic recentiorum nonnulli, prout egomet relatum in *Anglia* quondam accepi, tonsillas ipsas, lingua solerter depressa, per immissum in os scalpellum sive ferramentum longum atque acuminatum crebro incidunt. Quam equidem curandi viam longe promptissimam atque commodissimam esse, dummodo medicamenta convenientia interna, potus aqueus multus et clysteres refrigerantes, simul adhibeantur. Medicus aliquis expertissimus mihi retulit. Quare mirum haud est, si, prout ex Garengéotii Chirurgia editionis primæ Tom. II, p. 456 patescit, Galli etiam id medicinæ genus hodie exerceant. Quo autem commodius atque tutius fieri scarificatio ista possit, tale instrumentum solet adhiberi, quo et lingua deprimi et phlebotomus aliquis abscondi queat. Vid. Tab. XXI, fig. 9, quod *paristhmiotomus*, quia tonsillæ Græcis *paristhia* vocantur, dici potest, atque aliquando longior, quam hic exhibetur, esse debet. Loco hujus instrumenti, quod dudum in Ephem Nat. curiosor. Cent. IV, obs. 191, una cum uvæ et tonsillarum situ et figura descripsi. Petitus fere simile, sed curvum pro hoc usu invenit, quod Garengéotius in lib. suo de instrumentis Chirurgicis delineavit, ubi vero perhibet, ac si Valentinus in sua Chirurgia illud primus descripsisset, quamvis Valentinus in lib.

citato p. 102, perspicue scribat, me illud primum declineasse et descripsisse.

(*Cap. XCIV, pars II, sect. II.*)

Quomodo aperiri tonsillæ exulceratæ debeant.

Nonnunquam inflammatio tonsillarum vel negligi, vel resolveri, quicquid in tonsillis tumentibus coit, nulla ratione potest sed in abcessum vel scirrhum quoque degenerat. Quod ipsum simulatque advertitur, commodissimum utique fuerit, gargarizationibus interne, atque malagmatibus externe ad emolliendum accommodatis, suppurationem istam, quoad fieri potest, accelerare; quo nempe facilius et a molestiis gravissimis, et ab ipsa quod in exulceratione graviore imminet, suffocationis periculo miseri homines liberentur, deglutiendi loquendique facultate restituta. Easdem propter causas alienum atque adeo periculosum quandoque foret, tamdiu expectare, donec sua sponte pus erumpat; quin potius ægra pars mature incidenda, simulatque nimirum materiæ quicquam intus esse advertitur. Id quod vero sæpius haud adeo facile observari potest, sed visu et tactu omnia accurate exploranda.

II. Quando vero abscessum in tonsillis factum esse cognoscimus, aperiri eæ hunc fere in modum debent. Nempe phlebotomus aliquis longior linamento vel emplastro eo usque contegitur, ut non nisi cuspis ad digiti dimidi transversi amplitudinem promineat. Tum lingua per spathulam Tab. I, P. aut cochleare manubrio plano instructum depressa, phlebotomus in tonsillas exulceratas, qua parte commodissimum videtur, demittitur. Namque hoc facto et materia erumpit, et cruciatus qui antea aderant, insignes mox remittunt. Quanquam commodior in hoc ipso negotio illius instrumenti sive paristhmio-tomi usus est, quod superiori capite ad tonsillas scarificandas commendavimus. (Tab. XXI, fig. 9.) Id ipsum enim quia phlebotomum A quasi in spathula sive theca quadam cava tectum continet, non ad linguam modo deprimendam adhiberi sed et sine hominum ægrorum terrore in os atque tonsillam, promotum per digitos globulo B, immitti potest, quare apud infantes præcipue aliosque homines paulo timidiore, qui scalpellum vix vel prorsus non admittunt, longe aptissimus instrumenti hujus esse potest usus.

III. Tonsillis exulceratis hac ratione deopertis, vel ex herbarum vulneriarum decoctis, cum rosarum melle permixtis, vel et ex vino cum admixta aquæ, vel infusi theæ et rosarum mellis portiuncula, sed calidis tamen gargarizandum, idemque per singulos dies quam sæpissime atque tamdiu faciendum, donec œgra pars penitus fuerit restituta. Interim quam maxime necessarium est, ægris præcipere, ut a rebus quibuscunque acribus ac salsis, quin et a medicamentis etiam acrioribus quam solertissime sibi caveant; namque hic periculum est, ne quid forte ex rebus istiusmodi noxiis in novo vulnere adhærescat, vellicet, pungat, irriter, novasque proinde molestias atque inflammationes, ut ipse vidi, cum vitæ periculo concitet.

(Cap. XCV, t. I.)

De tonsillis induratis.

Interdum tonsillæ post inflammationem ita graviter indurescunt, atque *intumescunt*, ut fauces ipsas fere *claudant*, adeoque omnem fere et deglutiendi et spirandi facultatem impediant: præsertim si utramque tonsillam vitium istud invaserit. Quandoque enim non nisi alterutra hoc vitio laborat. Difficulus autem quandoque emolliri atque digeri durities ista solet, ita ut aliquando extirpare potius ipsas oporteat: nisi in gravissimorum cruciatuum atque adeo ipsius suffocationis periculum conjicere hominem ægrum voluerimus. Extirpari autem ipsæ vel medicamentis rodentibus, vel ferro, vel vinctura etiam interdum possunt.

Atque ad medicamenta quidem *rodentia* quod attinet, providendum quam solertissime est, ne quid forte istiusmodi vehementioris, sive venenati medicamenti hic adhibeatur, quod, sicubi ad ventriculum forte devenerit, majorem ægris calamitatem adducat. Imprimis igitur huc faciunt oleum tartari per deliq. vel et ubi illud parum est, aqua rodens fortior, ex aqua forti atque argenti vivi ea portione, quæ resolvi super igne in eadem potest, præparata. His vel id genus medicamentis aliis semel aut bis quotidie pessima tonsillarum induratarum pars per penicillum inungenda, donec paulatim, quantum satis est, diminuta sit. Duplex autem in hoc ipso negotio necessaria cura est:

tum ne aliæ simul eædemque sanæ partes inungantur tum etiam ; ne paulo post adhibitum ultimum medicamentum rodens, cibi vel potus quicquam æger assumat, vel salivam etiam deglutiat, ne simul deglutiatur, et ob rodentem facultatem in stomacho noxam inducat. Oportet igitur ipsi præcipere, ut per dimidiam a facta inunctione horam prono capite sedeat, salivamque una cum medicamento rodenti effluere ex ore patiatur ; dehinc etiam ubi cibus vel potus capiendus est, aqua egelida ipsum os diligenter prius colluat atque gargarizet. Atque id quidem fieri tamdiu debet, donec tantum e tonsillis erosum advertitur, quantum ad restituendam spirandi deglutiendique facultatem sufficit. Neque enim opus est, ut tonsillæ penitus exedantur, ne scilicet nimis diuturna curatio fiat, deinde, ne quam forte noxam æger inde sentiat.

III. Altera eademque jam priscis Medicis usitatis tonsillas induratas curandi ratio in eo consistit, ut aperto ore hamulo (Tab. VIII, fig. 2 vel 3) excipiantur, admotoque *scalpello* apto provide excidantur. At vero quia non crudelis tantum valde videtur, et, propter abditum tonsillarum situm minus commoda esse operatio ista solet, rarius hodie adhiberi eadem consuevit.

IV. Tertia denique curandi ratio a quibusdam commendata, per *vincturam* aliquando instituitur, atque tunc imprimis adhibetur, quando tonsillæ ex *parte tenui*, quasi ex *petiolo* quodam, pendent : quamquam et tunc sectio ope scalpelli vel forcicis commodior videtur. Quo autem commodius injici vinculum queat, istud etiam instrumentum laudant, quod in tollenda uva superius commendavimus (vid. Tab. XXI, fig. 7). Vinculum ipsum tamdiu quotidie innovandum est, dum tonsillæ corruptæ decidant. Decidere autem ipsæ, prout Medici quidam scribunt, post alterum tertiumve diem consueverunt, si bene ligatæ fuerint. Filum tonsillis injectum extrinsecus in gena semper firmari per impositum emplastrum aliquod debet, ne forte in fauces indicat Cheseldenus ligaturam in ejusmodi malo ope specilli injecit, eaque illud sustulit. Aliam eamque ampliorem tonsillam peculiari ferramento sive acu perforavit, utriusque ligavit, atque hac ratione extirpavit. Conf. Anat. ejus edit. III, p. 154.

(Cap. XCVI.)

**De tuberculis juxta fauces vel tonsillas
provenientibus.**

De tuberculis aut carunculis sive excrescentiis, ut vulgo dicunt, juxta fauces vel tonsillas pronascentibus non est, quod seorsim hic præcipiamus. Curari etenim ipsa iisdem prorsus viis possunt atque solent, quas supra in polypo atque modo tonsillis curandis jam proposuimus.

(*Cap. XCVII.*)

DESAULT

Maladies de la bouche.

Les amygdales deviennent, comme tous les autres organes voisins de l'arrière-bouche, le siège de fréquens engorgemens variables dans leur nature comme dans leurs résultats; les uns rapides dans leur marche, spécialement observés chez les personnes d'un tempérament sanguin, chez les jeunes gens, chez ceux qui s'adonnent à de pénibles travaux, portent essentiellement le caractère inflammatoire; plus tardifs dans leur progrès d'autres se manifestent dans les temps humides et froids, etc.

Là *rescision* de l'amygdale engorgée était pratiquée par les anciens de différentes manières : tantôt ils déchiraient avec les doigts la membrane qui la recouvre, l'arrachaient ensuite de la place qu'elle occupe entre les piliers du voile du palais, tantôt lorsque trop de résistance se rencontrait, ils allaient la saisir avec un instrument recourbé en crochet, etc.

..... Enfin aujourd'hui la manière ordinaire de la pratiquer, est celle-ci. Le malade étant assis convenablement, le chirurgien lui fait ouvrir grandement la bouche, abaisse la langue avec une plaque quelconque qu'il confie ensuite à un aide, prend une érigne, saisit avec elle l'amygdale, porte sur elle un bistouri ordinairement fixé sur son manche, au moyen d'une bandelette qui ne laisse à découvert que la moitié de la lame, coupe la quantité qui doit être retranchée (ordinairement c'est au niveau des piliers du voile du palais), reporte de nouveau l'instrument si tout n'a pas été enlevé, et quand l'opération est achevée, il prescrit au malade de se gargariser fréquemment la bouche avec une boisson appropriée.

Ce procédé est simple, facile; il fut longtemps le procédé de choix, mais un reproche lui est applicable; portée profondément dans la bouche, l'extrémité des instruments peut blesser quelques parties, non, comme on l'a dit, la *carotide interne* que sa situation reculée met à l'abri, mais la *membrane palatine* dans un lieu autre que celui où elle rejoint l'amygdale, crainte d'autant

mieux fondée, surtout quand l'instrument est tenu de la main gauche, comme quand on opère à droite, qu'à l'instant où avec l'érigne on saisit la glande, tout le gosier se soulève; un spasme général semble affecter toutes les parties de la bouche. C'est pour éviter cet inconvénient que j'ai imaginé d'appliquer à la rescision des glandes un instrument inventé pour couper des kystes de la vessie. C'est une lame tranchante renfermée dans une gaine d'argent, qui, échancrée à son extrémité, y *reçoit* et *fixe* la glande à extirper. Les instruments ajoutés à celui-ci sont pour l'opération, les mêmes que dans les cas précédents.

1° Le malade étant assis sur une chaise haute, la tête appuyée sur la poitrine d'un aide, le chirurgien lui fait grandement ouvrir la bouche et place un corps solide entre ses dents; 2° la langue est abaissée avec une plaque de métal qu'un autre aide retient.

3° Le chirurgien saisit, avec une erigne double, la glande qu'il tire à lui en la soulevant un peu, prend le *kyotome*, engage l'indicateur et le doigt du milieu dans les anneaux, le pouce dans l'anneau, le fait glisser sous elle, cherche à l'engager dans l'échancrure arrondie au niveau de l'endroit où doit répondre la section.

Lorsque la portion à exciser est engagée, il la tire davantage à lui pour la tendre, presse contre elle de bas en haut l'instrument, pousse la lame qui, en traversant l'échancrure, opère la section. Si elle n'est pas complète, ce qui arrive surtout quand le volume de la tumeur est considérable, la lame est retirée, et le *kyotome* reporté dans la plaie même qu'il vient de faire, finit la section. N'est-elle pas encore achevée, une *troisième tentative* est réitérée.

On fait laver la bouche du malade et on lui prescrit un gargarisme quelconque. Ainsi pratiquée, l'opération est aussi simple, aussi facile et plus sûre que dans le cas précédent. Telle est la disposition du *kyotome*, que lorsque la lame traverse l'échancrure, elle pousse et *fixe solidement* les parties à diviser, avantage que n'ont ni les ciseaux, ni le bistouri.

(Chap. III, p. 202.)

OBSERVATIONES, CONSILIA EPISTOLÆ PRAXIS MEDICÆ, ETC.

BENIVIENI

Angina.

Angina laborabat Nicolaus Rota, sed nullus tamen rubor aut tumor vel intus in gula, vel extra videbatur. Et ipse nihilominus vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per os statim et nares rejiciebat. Quare cum arescente corpore, palente jam facie, ac vertentibus oculis spes omnis sublata esset et medici, quibus cura data fuerat, ægrum amplius non adirent; me licet juniorem convocant, ægrum ostendunt, et quæcumque acta fuerant exponunt. At ego cum et ægrum ipsum ad mortem tendere, et Medicos, quæcumque opportuna fuerent præsidia, adhibuisse intelligerem, cæpi ipse mecum cogitare, quod bonum non erat ægrum Deo et naturæ, ut cæteri medici, incuratum dimittere, an aliquod, licet insolitum, utile tamen auxilium experiri: verum adhortantibus his qui ægro assistebant, consilium capio, et locum altioribus plagio sub ipsis maxillis, ac etiam supra collum incido, ex quo cum sanies multa prorumperet, adeo morbus levatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul et cibum capientibus, facilis dein ad bonam valetudinem ægro ipsi daretur regressio.

Ex abscessu gulæ homo pene jugulatus.

Aliud quoque morbi genus circa fauces oriri consuevit, et id interdum pestiferum acutumque, quale in Alexandro Serralio nuper vidimus, cui neque rubor neque tumor ullus intus in gula aut extra ostendebat, sed aridum corpus erat et squalidum. Cumque nihil omnino alimenti, dmitteret, sed quicquid absumeret statim rejectans vix spiritum traheret, et vox adeo fauci-

bus hæreretur, ut ne mutire quidem 'posset, jugulari prorsus hominem putares ; nos tamen et urgentis morbi et ægri vitæ ratione habita, utile et præsentaneum remedium duximus sanguinem mittere : tum et cucurbitulis natibus affixis deducere humorem conati, frictionibus simul aliis que præsiidiis quæcumque extrinsecus hominem juvare poterant, tantisper utendum censuimus, donec ægri fauces detumescerent. Verum ubi malum his omnibus auxiliis non modo non cedere aut levare, sed in horas vehementius ac contumacius fieri advertimus, omni abjecta spe ægrum tanquam proxima nocte moriturum, Deo et naturæ reliquimus. Hunc autem cum assistentes velut jamjam spiritum exhalaturum, signo érucis ex more in auroram usque singulis momentis consignarent ac munirent ecce statim a summis ægris faucibus tam ingens ex adaperto intus abscessu purulentæ materiæ vis effertur, ut homine pene jugulato, catinulum, in quo recepta est, ad summum repletet labrum. Qua expulsa, statim resumptus est spiritus, et æger qui jam pro mortuo lugebatur, veluti ab inferis remeans, paulatim convalescere cæpit, donec integram consecutus est sanitatem.

BALLONIUS (BAILLON)

Nous reproduisons ici la longue et fastidieuse discussion de Baillon, sur l'angine sèche, où il invoque si copieusement le témoignage des anciens. Elle indique bien le goût de l'époque.

De Angina.

Constitutio aquilonia impense frigida et sicca sævierat, quum in hominum genus magna morborum vis invasit, ac præsertim febres, cum magna perfrigeratione ; calescendi, frigescendique erat vicissitudo, et crudor quidam, ut Aristoteles I. Problematon 9 et 10. problemate annotavit : Ille autem crudor, Græcis σφακελος. Sphacelus, maxime ob frigidam, siccam, aquiloniamque constitutionem solet contingere. Pleuritides grassatæ sunt, peripneumoniæ, pulmonumque variæ affectiones, atque inter cætera tusses et raucedines, præsertim quum desæviente hieme, quæ in summo squallore et rigore frigoris congelata, congelatiataque fuerat, fundi liquarique cœperunt. Inter cetera ophtalmiæ multis ρωοδες. Fluxionales multis ξηραι (siccae) ut quæ in siccitatibus αυχμς (squalores) Græci vocant, contingere solent : I item deglutiendi quædam difficultas cum febre, linguæ scabritie, totius oris squalore quodam, juncta virium infirmitate. Atque de hoc tertio agere institutum est ; nam et quum nil appareret in faucibus, et tamen deglutire apte non possent ægri, nec solemnis remedium usus quicquam conducere, id ipsum nobis medicinam facientibus plurimum negotii dedit. *Tres nobis videre* contingit in quibus *nil apparebat* internum in faucibus, nil extra : non erigendi capitis ulla necessitas, et tamen per quindecim dies sine ulla tussi, sine excreatione manserunt, cum linguæ et totius oris ad mediam fere asperam arteriam squalore, siccitate, non calore ullo effatu digno, sine tumor ullo, et tamen nil allevabantur. Hipp. quidam part 20, lib 3 Prognosticon, meminit cujusdam synanches quæ ægrum in periculum non conjicit, non laborat guttur, sed in fauces, aut in cervicem, aut in utramque fluxio fit ; maximaque ex parte cervix et pectus ruborem contrahunt,

At talis fluxio sacer ignis ab Hippocrate vocatur, quod erysipelatodes sit: dolent vehementer, nec difficulter spirant, quum guttur non perpetiatur. At in nostris ægris nullus rubor in cervice, aut pectore, sed tantum nescio quid superficiei tenus in faucibus et circum ualvam apparebat; dumque saliva deglutiebatur, difficultas quædam erat. Item part. 17, lib. 3. Prognost, meminit faucium exulceratarum in febribus, quod nos aliquando observavimus, quum et a capite rodens humor defertur exulcerans, et postea vi febris rursus summittitur humor, qui ob calorem febrilem acrimoniam acquirens malum continuat atque protrahat. Sed nil in ægris nostris tale apparuit. Quid ergo fuit quod ille tantam molestiam pareret? Illa difficultas, quæ aliquid *θώρακη* (Anginosum) in se habebat, et forte ad synanchen referri potest (generali enim nomine quicquid nonnullam difficultatem spirandi affert, aut circa guttur, aut fauces, illud synanche nominatur Galeno comm. in lib. de diæta acut.) Sed unde illa difficultas, quum nec magnus dolor, nec phlogosis apparens, immo nec tumor, aut phlegmonodes aut pituitosus, nil erysipelatodes apparebat; et tamen maxima est siccitas, nil residante, nil excreto, squallor est, et languent admodum ægri. An hic morbus *angina sicca*, aut biliosa, aut *morbis siccus* vocabitur?

Reperio apud Hippocratem nomen *ξσπος* (sicci) multis rebus attribui, et magnam vim habere, immo majorem forte quam quis existimet. Si liceret orationis vela pandere, multa ea de re disputari a nobis possent. In aphorismis multis in locis invenio. Ophtalmias siccas et ophtalmias tabisicas quæ eædem et siccæ dicuntur in squaloribus. Item apud Hippocratem, anginam reperio cholicam et biliosam (ita enim eas voces admittit Galenus clarioris doctrinæ gratia) ut distinguatur ab ea angina, quamquam pituitosam appellati volunt. Et illa angina a *nitroso humore* fit, qui non fauces obsidet tantum, sed musculos a tergo, ut paullo post explicabimus, orthopnoeam parit. Et siccitatem multam, ita tamen ut nil appareat. Notanda hæc vox, nam et in 4 aphorismorum, periculosissimam quamdam anginam video, per superexcedentem siccitatem, unde strangulatio, accedente quoque sebre quæ eam siccitatem adangeat. Præterea in I. de Diæta. acutor siccum reperio. Quonam

vero in sensu omnes hæ sententiæ, in quibus jam advenientis signum dat, in jam perniciosis morbis, ait, parvi tremores, vomitus æruginosus, qui in potibus substrepunt, id est, in siccis submurmurant, et deglutiunt difficulter. Duretus illud... refert ad murmur hypochondriorum, ut murmur illud sit ob inflammationem diaphragmatis in sympathiam cerebri tracti; ego vero non ad murmur ob inflammationem diaphragmatis refero; quamquam scio borborygmum inde nasci posse, sed quum et strepitus in bibendo, et difficilis deglutio meminerit, ego illud murmur ἐν ξηρῷ, in sicco, refero ad id quod apparet sæpe in delirantibus, in quibus laryngi muscoli siccati sunt, ut non amplius motum facilem præstent nec obediant. Nam quum bibunt illi, et delirant, pars aquæ quæ descendit quodammodo it præceps cum sonitu, in vacuo et inani descendere videtur; obauditurque murmur et borborygmus circum præcordia, siccatis musculis. Sic illa vox ξηροῖσι (siccitatibus, siccis), ad difficilem illam deglutionem potest referri, quum tanta siccitas sit, ut muscoli inertes sint, et propterea auditur sonus et murmur, ac si in cavum aliquid aquæ conjiceretur.

Nunc sigillatim explicemus vocis illius ξηρὸν significatione, ut tandem de angina, aut potius de dispositione anginosa oratio nostra terminetur. Ita enim medicis debet constare, quibus incumbit ex officio morbi ideam causamque animadvertere, qua ex causa difficultas deglutionis pendeat. Nec enim audito anginæ aut difficultatis deglutiendi nomine statim ad secandas venas annulares, ac gibberi accedendum: quum alias a materia hac aut illa, alias et nescio qua intemperie illa difficultas deglutiendi oriatur. Unde auctor lib. 4 de diæta acut. duas anginæ species facit a materiæ diversitate desumptas: ut cognitis ideis morborum in remediorum delectu aliquanto exactiores simus, ne male, temereque unum pro altero usuveniat.

Ophtalmiæ siccæ et ophtalmiæ, quum ab Hippocrate dicuntur, aut quum humidæ ita eas dici accipiendum est, ut in siccis lippitudinibus nil humoris manet in humidis, non crassus humor, sed tenuis; quamquam quibusdam placet, eas siccas dici posse, in quibus aliquid acre, mordax, pungens, et lancinans, non quantitate, sed qualitate peccans, excernitur. Et hoc fortassis probabilitate non caret. Humidas ophtalmias Hippocrates

describit in Epidem. In constitutione calida, humida, austri-
naque, multis fiebant (ait) opthalmiæ: humidæ, longæ, diurnæ,
laboriosæ: palpebrarum foris et intus επιρροαίς, id est progermina-
tiones, quas sicos, Græcis συκτα, vocabant. Humiditatis copia et
opthalmiam attulit, et tubercula in palpebris; sed qua id ratione
factum est, quum a duplici humore hoc duplex vitium natum vi-
deatur? Etenim humiditas opthalmiæ ab humore est tenui, Galenus
dicit, ex theumate præhumido, at siccus, five progerminatio, five
eruptio verrucosa, callosa (omnibus enim his nominibus unum et
idem significatur) a crassiore, lentioreque humore esse videtur:
hoc ipsum et Galenus fatetur: ait enim in commentario, humoris
redundantis superfluitatem duplicem speciem in tenuitatis et
crassitiei differentia habere, tametsi idem esse humor videatur, et
in eodem loco consistat. Quod hac ratione in corpore succrescere
confirmat: quum ait, corpus exercitationibus solitis concitetur,
moveatur, diffluetur, ac lustretur, copiam, crassorum et tenuium
aquosorum ob vacationis prohibitionem. Ac si in quolibet humore
sit quippiam quod limi et fæcis rationem habeat, quippiam vero
quod seri, liquidiorisve partis. Qui autem discernas varios effec-
tus utriusque humoris? tenuiorem partem excerni testabantur
dejectiones liquidæ, urinæ, aquæ: crassiorem partem, vel gra-
vitas capitis, vel coma, vel quia moram trahit cunctaturque in
corpore. Et clarioris doctrinæ causa affectus quosdam nasci di-
cemus ab humore crassiore per congestionis modum: alios a te-
nuioris humoris copia per suppressionem; id est, qui supressus
est in constitutione aquilonia; deinde via aperta in partes in-
fluxit. Id quod tenue et aquosum, opthalmias humidas fecit, id
quod crassum ac deses, progerminationes quasquam in palpebris
foris et intus. Quod enim crassum est, quia pigro gressu insistit,
partibus inhærens alium morbum producit quam id quod tenue
est et præhumidum et aquosum progerminatio dicitur, siccus seu,
quod nomen apud Medicos potest sumi pro eruptione, apud
Aristophanem, bullam, papulam et phlyctænam significat: et
quod dicitur, illud significat in palpebrarum extremo protuberan-
tiam, eruptionemque apparere; hoc enim verbum progerminare
significat. Galenus in commentario interpretatur nomen Epi-
physin, eruptionem callosam: Interpretes, tuberculum collium
modo, vertit: et male; hoc enim grammaticoteron. Etsi enim

αχθῆ præruptum ripæ locum significet et eminentiorem paullo, et αχθῆς colliculum prominentem; tamen debuit scire αχθῆς apud Medicos pro verrucis, sive verrucosis extuberantiis sumi: Ita enim Marcellinus lib. 2 dioscoridis. Ergο τῆνοχθῶδες α-ἐπανάξασιν verti oportet, eruptionem, extuberantionemque verrucosam; quamquam interpretis lectio plausibilis est, quia Grammaticum agit.

Ut ad institutum redeamus, humida ophtalmia dicitur in qua aliquid aqueum et tenue manat; sicca autem est quum aquilonia tempestas calidam humidamque excepit; hæc enim frigida constitutio ut manus spongiam, sic cerebrum comprimit; hinc humor in has illasve partes exprimetur, ut in oculos; quia autem extremo frigore cutis densatur, hinc ophtalmia sicca nascitur; idque maxime in siccis ac biliosis: quod notandum est ex Hippocrate. Neque enim in omnibus sicca ophtalmia præsentē constitutione aquilonia fit. Et aliō loco in lib. de aëre, locis et aquis probabilem affert rationem aut in siccitatibus, et squaloribus ophtalmiæ siccæ nascentur. Bilis, inquit (loquitur autem de hominibus biliosis) pars humidissima, atque aquossima exsiccat atque absumitur crassissima vero et acerrima linquitur, supple, et siccas ophtalmias febres acutas faciens. Itaque ex eo Hippocrati et Galeni loco colligi potest, verisimilem eorum opinionem qui siccam ophtalmiam interpretantur, in qua aliquid nitrosum, paucam, siccum, acreque apparet mordicans oculos, non autem in qua supprimitur omnino humor, ut prius dictum est de aquilonia constitutione humores supprimente. Hinc effici potest siccas ophtalmias; bifariam intelligi posse, et eam in qua multus quidem humor, ob calidam humidamque constitutionem, est, sed supprimitur ob ambiens frigidum, eaque ophtalmia cruda dici potest, eo modo quō in libris de Diæta, morbus siccus dicitur, id est crudus, in quo excrementum nondum apparet; et eam in qua non tam quantitate quam qualitate humor in vitio est; ut quum acer, mordax, in bilioso humore succrescit, tempore squalido, arente, aquilonio si vis: et species quædam erit ophtalmiæ, eaque præhumidæ ophtalmiæ opponetur. Et hæc posterior de genere earum ophtalmiarum est, quæ a Galeno et Hippocrate vocantur tabificæ ophtalmiæ nomine composito. Aridam lippitudinem definiunt, in qua subaridi oculi

nec tument, nec fluunt, sed cum levit prurigine ingravescent : et palpebræ citra duritiem prægravi pituita inhærescunt. Huic similem faciunt *υποφθάλμιαν*, asperitudinem oculorum ac scabram lippitudinem interpretantur, rubor est oculi, pruritus a nitroso salsoque humore : ac credo in his apparent quibus corpus biliosum est, aut putri salsaque pituita plenum. Ergo ophthalmiæ tabificæ quædam sunt, *φθινάδεας* vocant, ut sine distinctione sit legendum in aphorismo 16 lib. 3. Aphorismor. In squaloribus tabificæ ophthalmiæ non autem cum distinctione, lippitudine in squaloribus, et item tabes, ut contendit Galenus in Commentar. Siquidem negat in siccitatibus, quatenus tales sunt, tabem contingere : at nec articulorum dolores, nec dysenterię ipsæ, nec stranguriæ in squaloribus contingunt. Quis dicat sine humore aut arthritim, aut dysenteriam, aut stranguriam nasci? Ideoque perplexus est admodum Galenus in exquirendis hujus aphorismi demonstrationibus. At mihi parum consultus videtur Galenus, quasi vero non noverit in squaloribus ferinas destillationes et dysenterias ab acri, squalidoque (ut sic dicam) humore, qui sensim atque sensim sese exerit. Nec enim adeo rudis Hippocrates, ut squalorem intellexerit sine aliquo humore, et in medio omnis recessus ; quasi vero squalor temporisque arida et squalens tempestas non vim aliquam humoribus imprimat, et non in tali constitutione squalida ichorum dominatus non sit satis malignorum. Itaque accuratior fuit hic Galenus et frustra. Porro tabificas ophthalmias videtur et Galenus referre. Quamquam ophthalmiarum tabificarum hoc sit proprium, ut ab tabem, consumptionemque oculorum pertrahant, et tamen in squaloribus grassantur ; an vi squaloris, an ratione humoris sicci, nitrosi, mali. Si humor est, quare non est tabes ab humore? Si vi squaloris si oculus tabescit ac consumitur, cur non et reliquum corpus? ut nomen *της φθίσεως*, non pro tabe, quæ proprie ulcus, aut aliud pulmonis vitium sequitur, sumatur, sed qualibet consumptione, ut posse sumi Galenus suspicatur in aphorism.

Item morbus siccus reperitur apud Hippocratem part. 22, comment. 1, in lib. de diætâ acut. quum diætæ instituendæ rationes docet. Nam quamdiu morbus siccus manet, tamdiu et pleniore cibo abstinendum, nec naturæ negotium facessamus ;

nec tantum ad morbos thoracis nomen sicci, referri vult, sed ad omnes partes laborantes, in quarum affectionibus nihil excernitur eorum quæ redundant. In sicca ophthalmia, ait, quum nil resudat; in cerebri affectibus, quum nec per nares, nec per palatum rei cujusque excretio fit; in affectibus partium in ventre inferiore contentarum, quum alvus resiccata admodum est; et idem in ceteris. Quum autem excernitur aliquid, vocat morbum *υγραιν*, humefieri.

Sed quæstio hic magna horiri possit, an sit idem morbus siccus, et crudus: an idem, morbum humescere et coctum esse, ut omnia per synecdochen capiantur, 3. Videtur idem esse morbum crudum et siccum, item coctum maturumve, et humidum dicere. Nam, exempli gratia, in pleuritide oris mador, sputi expectoratique facilitas tamquam superveniens jam initium morbi præteruisse, et brevi finitum iri demonstrat in aphorismi. Si ergo siccus, id est, crudus est quum nil excernitur a parte, sed materia coercita conclusaque in parte est; ergo in cujus ophthalmiæ initio fluor et lacrymæ multæ sunt, ut in humida, proindeque cocta consequens autem falsum est. Item quum cerebrum plethoricis auctum est symptomatis, et per oculos, nares et palatum multæ pituitæ liquidæ crudæque excretio sit, ista excretio significaret morbum humidum, id est coctum; hoc autem falsum est. Itaque tametsi quum madet os in thoracis affectibus, brevitatis morbi indicium est, non tamen idem est siccum ac crudum; nec coctum, et humidum. Liquidior enim ptisana ad humectandum propinatur, non autem ad coquendum dari dicitur. Quocirca ut in omnibus admirabilis est Hippocrates, ita hujus quæstionis nodum quodammodo dissolvit; scribit enim; Si autem os madefiat, qualia oportet a pulmone excernantur, sorbitionis quantitatem augebis. Nam quæ citius madent, Græce madescentia celerioris criseos notam præ se ferunt: si coctum et humidum, idem significarent, et siccum et crudum seu, incoctile dixisset simpliciter, si os madescat; nec adjecisset, et qualia oportet educantur. Nam hæc particula, qualia oportet educantur, non jam amplius contrarium siccitatis declarat, sed jam ad coctionem nos insinuant: id est, coctionis tacitam mentionem injiciunt. Et illud est quod acute Galenus in comm. in partic. illam, annotaverit, verba

illa; si qualia oportet, excernantur coctionis argumenta, signaque, Græcis exhibent. Et si humidum esse ac coctum esse idem significarent, catharrosæ dispositiones, qualescumque forent, de coctorum morborum numero essent. Nec dubium quin in quibus morbis excretio esse debet materiæ, si illa materia supprimitur, et siccus morbus dicitur et crudus; et quum excerni incipit cocta, tum morbus humescere dicitur; et in quibus ante tempus excretio fit, nimirum materiæ crudæ, tametsi tunc morbus siccus dici non possit, quia effluxio fit, tamen crudus vocabitur. Sed hæc subtiliora.

Præterea choleram siccam et humidam apud Hippocratem reperio in 4 de Diæta acutor. Humida cholera dicitur in quo magna contentione et virium jactura sursum deorsum excretio fit putrium, incoctorumque. Galenus in comment. vult oriri ab acribus humoribus generatis a corruptione assumptorum; arida fit a spiritu flatulento acri. Videtur ex sententia Galeni his nasci sicca cholera qui cibos coctu difficiles sumpserunt, transire nequeunt, quibus adjecti sunt cibi acriores ac calidiores, et tunc flatulenta copia impedit quominus quicquam excernatur. Unde quomodo magna, an non illa cholera in quo calida assumpta sunt cum difficilibus coctu, potius humida dicenda sit quam sicca? Hippocrates ait quidem laserpitii radicem choleram siccam efficere, sed postea jungit, si cum multo caseo et carne bubulo sumatur. Sic enim quidam vorax esu carnium porcinarum, haustu vini generosissimi et placentarum, in choleram incidit siccam, ut ex priore Hippocratis demonstratione colligi est. Quid ergo erit humida? Quantum ex collatione locorum colligo, in humida cholera plus est materiæ corruptæ, facultatem expellentem irritantis ad excretionis omnes genus, ut in hoc dicatur humida, quia excretio fiat; qua nominis significatione sumi Præhumidum diximus ante. In sicca plus est crudæ, crassæ, impactæ, et flatus eam materiam subigente, agenteque; unde membranarum dilvisio eruptioque aliquando et gravissimi dolores. In eoque sicca dicitur, quod nil fere excernatur, sed convolutio fit quædam intestinorum, et inflatio ventris; qua in significatione præsiccum sumi dictum est paullo ante. Atque adstrictionem esse flatuumque magnam iliadem collige ex Hippocrate eodem loci « Ab arida cholera vero inflatur, strepitus

fiunt, dolor laterum lumborum, nihilque alvus dejicit, sed astringitur. » Ergo siccitatis ipsius in cholera sicca vis est in eo, quod cohibitio retentioque est materiæ. Quamquam Galenus *comment. in partic.* illam non vult naturamque cholerae siccae, quod tamen a ratione alienum est. Verba ejus sunt « Quum flatus interdum exire possint, interdum retineri, aridam choleram ob retentos flatus generari asserere nequeo, nam probabilius est eos vocare (suppl. cholera sicca laborantes) in quibus potius flatus erumpunt, quam retinentur. » At contra: etenim nonnullos summis cum cruciatibus cholera sicca laborantes mori videmus, in quibus nil fere excernitur, nec materiæ, nec flatus. Membrarum enim offensæ, et divulsiones ex eo maxime sequuntur quod spirituum magna sit vis materiam veluti subigens, diripiensque, et dum penitus, subitur, solutione unionis partium præsertim nervosarum implacabiles dolores excitantur. Atque idem in ventriculo contingit et partibus vicinis præsertim membranosis, quod in affectum, qui Græcis peculiari nomine Nervorum tractus, divulsio dicitur, Gallice gouttes crampes; inclusus est enim spiritus divellens. et exitum sibi quærens. De cholera sicca dictum sit hactenus.

Accedamus nos ad id cujus gratia instituta est disputatio. Institutum erat dicere de angina, et anginoso quodam affectu (ita enim loquor) id est, de difficili deglutitione; quæ difficultas in faucibus et gutture synanchiæ aut anginosi morbi essentiam constituit. Animadvertimus enim in quibusdam, ut initio dictum est, ariditatem summam linguæ (talem autem linguam Hippocrates *epidemiorum*, vocat linguam peripneumonicam, quod iis qui inflammatione pulmonis laborant familiaris esse soleat, dolorem occultum et latentem colli musculorumque omnium qui ad humeros usque protenduntur; *faucium est squallor, siccitas*, nil tamen apparet quod arguat id de quo tanquam de difficilis deglutitionis causa quæri possit. Quærendum itaque quis sit affectus, quo nomine donandus, cujus speciei, quæ idea, qui mos et ingenium. Potest generaliter affectus angina dici, ut Galenus *Comment. in partic.* 30, lib. 4 de *diæta acut.* sumi posse ostendit. Duplex autem omnis est συγγη ut auctor lib 4 de *diæta acutorum* vult: aut est a materia crassa, viscosaque quæ in majoribus vasis continetur, aut a tenui, acri, biliosa, quæ

sua tenuitate majores amplioresque venas pervadit, sed in tenuiores sese insinuat; in synanche a crassa materia tumor est brevi strangulans; alter συναγγη qui a tenui fit, non ita sese tumore effert, sed intemperie potius quadam, et erysipelatodes dicitur; Galenus dicit vocari posse χλωδεx seu carbonculus. Biliosam aut cholicam hanc autem ita describit « Quum a capite tenuis fluxio est, nitrosa, quasi ab anni tempore talis sit, mordet, ulcerat, orthopnæam parit et siccitatem multam: Quæ intuentibus nobis apparent igitur, minime tumentia apparent ». Ita enim non pro gracili χρον sumitur, sed pro humili, non tumente. Quo loco mihi videtur anginam nostram, de qua laboramus, describere; nam et siccitas multa erat, quam Hippocrates πολλω ξηρασιω vocat; verbo antiquissimo: et difficilis deglutitio; nihil autem in faucibus aut gutture apparebat; nec alius color fere a proprio erat, nisi quod siccitas esset. Magnum enim est observare an dissimilis sui sit color. Propterea Veteres vocem gracilia interpretabantur decolorata, id est, non habentia colorem qui adesse deberet si inflammatio esset. Sed tamen hanc interpretationem ridet Galenus in commentario. Galenus autem rationem reddit cur non tumeant partes laryngis et faucium: non quin biliosus humor multus collectus non possit tamen efficere, ac præsertim humor qui a capite descendit: omnis enim pituitosæ naturæ propinquus est, ut propterea pituitæ naturalis fontem cerebrum asseveraret auctor lib. de morbis et lib. 4 de glandulis, sed, ut ait Galenus, sit ut fluxionis partem recipiant faucibus vicini muscoli; item qui a tergo siti sunt; ubi et stomachus qui sepe simul afficitur. Sic rationem reddit et cur siccitas, cur tumor non adsit, diffusa, liquataque materia; item cur a tergo et circum collum dolores adsint: atque talem affectum, et symptomata qualia hic describuntur, mihi visus sum videre in istis ægris quorum superius paulo memini, nisi quod talis synanche per eundem Hippocratem vel æstate, vel autumno fiat. At hæc affectiones synanchicæ, quarum meminimus, in hiemem inciderunt, eamque acerbissimam. At quid obstat quin dicamus, id quod ante observatum est, per hiemem coacervari crassos humores, et eorumdem ichores sive serositates, quæ quum diu suppressæ fuerint, acrimoniam et quoddam nitrosum acquirant desævienteque hieme, tenue illud

subit tacite, et morbos sui generis committit. Atque eo modo fiet angina sicca, ita enim loquar doctrinæ causa, quo et ophthalmia $\epsilon\pi\alpha\chi$: non quin sit humor aliquis, sed potius qualitate quam quantitate peccat; et facit squallorem, nescio quam intemperiem aridam; quod explicavit Hippocrates, quum ait « istum humorem nitrosum efficere ut siccitas multa generatur; hinc fit ut subdiderit, et tendines cervicis posteriores intenduntur, apparentque intenti ac si tetanus esset ». Hinc vocis amissio. Quod indicat scribens, quibus vox amittitur et perit, ait Galenus, per laryngis passionem. Vocis autem generatio in ea maxime parte fit, quæ larynx vocatur, Galeno teste. Huc maxime pertinet locus de Angina lethalissima, quam describit Hippocrate in aphorism. « Si a febre habito collum pervertitur, vix potest devorare, sine ullo tumore, lethale. » Paulo ante alium scripserat aphorismum de angina quoque. « Si a febre habita, tumore non existente in faucibus, strangulatio repente supervenerit, lethale ». Aliud esse scribit Galenus vix potest devorare, et cum strangulatur. Quum autem dixit, tumore non existente in faucibus, tacite indicat affectum esse solum guttur, quod $\lambda\acute{\alpha}\rho\upsilon\gamma\epsilon$ dicitur, quum repentina strangulatio necessario laryngis affectionem significat, undelibet hoc contingat, sive ab inflammatione, sive aliter, ut paulo post dicemus, quum inquireretur an sola intemperies sicca hoc efficiat. Mirum quomodo in aphorismo illo prædicto, in quo scriptum: tumore non existente in faucibus, quum nomen $\phi\alpha\rho\upsilon\gamma\gamma\omicron\varsigma$ per fauces interpretentur, nam illud animadverterunt auctores Græci, nomen $\phi\alpha\rho\upsilon\gamma\epsilon$ in masculino genere, guttur significare, et cum nomine $\lambda\acute{\alpha}\rho\upsilon\gamma\epsilon$ intelligi in feminino $\phi\alpha\rho\upsilon\gamma\epsilon$ fauces: et Hippocrates in masculino genere accepit. Sciendum non necessario semper laryngem significare cum masculei generis est; promiscue enim $\phi\alpha\rho\upsilon\gamma\epsilon$ fauces et guttur designat sed η $\phi\alpha\rho\upsilon\gamma\epsilon$ fauces semper denotat. Proptereaque Galenus in Commentario utriusque aphorismi a nobis citati, quum verba Hippocratis adducit, non amplius usurpat articulum masculine \acute{o} , $\acute{\tau}\acute{o}$ $\tau\acute{\eta}$, sed η , $\tau\acute{\eta}\varsigma$, $\tau\acute{\eta}$ quod diligenter notandum est, ut omnis amphibologia declinetur: Quod Galeni ingenium vix deprehendent linguæ græcæ ignari. Propterea parum legendo proficiet, qui versionibus tantum latinis impolitis et rudibus, nec ulla ex parte attingentibus Asiaticam sermonis venustatem, operam accommodabit.

Ergo quum non apparet tumor in faucibus et repente suffocatio incidit, præsertim dominante febre, mortis metus est maximus. Quærit Galenus duo : cur dum in illo aphorismo angina funestissimæ meminit, non mentionem facit de dolore, ut fecit in Prorrhethico, dicens, fauces dolentes, item an angina absque dolore esse possit. De priore ita statuit : Tametsi non meminit doloris, potest tamen intelligi. De posteriore ita : si angina sit cum inflammatione, non potest non adesse dolor. Potest autem strangulatio fieri sine dolore tribus modis, vel oborto tumore frigido quod Œdema dicetur : 2º vel resolutione musculorum laryngem aperientium, unde angustior redditur meatus 3º vel ab utroque simul ; tertio summa siccitas et squallor musculorum internorum laryngis hoc efficere potest ; ita enim supra modum extenti, meatus angustiam afferent. Sed quæstio oriatur difficillima : Si indolens angina et strangulatio repente contingere potest ? ut hic docet Galenus, an a siccitate immodica id fieri potest. Videtur non posse fieri ; nam intemperiem siccam anginae auctorem, si ita fors frat, necesse est longo admodum tempore acquiri, ut ex locis infinitis Galeni colligi potest ; quomodo ergo ab ista immodica siccitate repentina strangulatio contingere potest ? Ista videntur assistata. Nisi quis dicat siccitatem quidem tempore acquiri, sed illam non sufficere ad necandum nisi febris concurrat maxima, quæ febris (nulla adhuc præsentē alia siccitate) brevī tempore omnium instrumentorum tensionem atque ariditatem afferre potest, præsertim si sit e genere febrium ardentium. Ac propterea quum in alio aphorismo scribit « si cui a febre occupato collum invertitur, vix potest devorare, sine nullo tumore, lethale ». Galenus in Commentario miratur Hippocratem non meninisse loci, quum ait, tumore non existente, ut feci talio in aphorismo ; sed subaudiri intelligit, vel in faucibus, vel in collo ipso. Ait autem istam strangulationem, aut potius deglutiendi difficultatem ab inflammatione musculorum gulæ præjacentium, aut gulæ ipsius oriri posse ; et ab ista inflammatione contorqueret vertebra ; vel enim a tuberculis invertitur, vel ab inflammatione ob tensionem partium inflammatarum, et ad sese retrahentium ; est enim affectus cervicis in quo vertebræ ad anteriora luxantur ; vel nato tuberculo, ut placet Galeno ; vel extensis ob inflammationem partium nervis ac ligamentis, ut notat Galenus

Commentario in aphor. 35 lib. 4. aphorism. Atque ut explicet rationem illius anginae de qua sermo est, affert locum ex Hippocrate, quo in loco vult eandem anginam describi quæ hoc in loco. Textus autem est: « Anginam patientium tales erant affectus: Colli vertebræ intro vergebant, extraque apparebat collum habere cavitatem, et hoc tactum dolebat ». Notandum autem illo loco mentionem fieri de angina in pestilenti constitutione. Quærit rursus cur Hippocrates, dum loquitur de angina a contorsione colli in febre ingente, non meminit doloris ut et in *Epidemiis*? Si enim inflammatio est, necesse adesse dolorem; an non inflammatio est, præsentē tanta febre, et facto contorsione colli? unde ista contorsio? Concludit istam anginam ab excedente fieri siccitate, a qua tensio, hinc tractus, a tractu eversio vertebrarum. Quum enim adest ista siccitas, a qua tensio, tractus eversio, angustia meatus, difficilis deglutitio, malum hoc; pejus vero si febris adsit. Nam et febris auget usum respirationis, cui non potest satisfieri ob meatus angustiam; item auget siccitatem; sic malum malo cumulat quæstio: si est excedens siccitas quæ anginam quodammodo pestilentem facit, unde illa siccitas? an repente incidit, an non? an humor est? Dicam quod sentio, le accommodabo ad ægrum nostrum, cujus ergo instituta est hæc disputatio.

In summis squalloribus, præsertim dum æstus adsunt, vei etiam in sicca et aquilonia constitutione in qua supprimuntur humores, sed tenue tantum serum exprimitur vi ambientis, ut exemplo spongiolæ fieri contingere scribit Galenus in Commentar. in. 3. *Aphorismorum*, sæpe circum fauces, collum, oculos, siccitates oriuntur, quarum ratio nulla reddi potest. Et difficultas deglutiendi est, nullo apparente tumore vel in gula, vel in pharynge, vel in larynge; et squallet atque ægrotis guttur; lingua scabra, exigua febris et latens, quasi ab ambiente calido evocato foras calore, aut ab ambiente frigido nimium (nam in squalloribus hæc fieri diximus, dictum autem velim quum vel excessus est caloris, vel frigoris) retruso in centrum calore; unde quemadmodum in oculis sicca ophthalmia nascitur ita angina sicca, si verbum confingere liceret, aut ἐρεοθηλαίη orietur. Quod admodum notare oportet, et medici decipiuntur admodum. Vidimus ita affectos per 20 aut 30 dies laborare

cum squallore magno, infirmitate summa, ariditate, nulla siti, difficultate deglutiendi, oculorum quadam cavitate, fuliginoso spiritu arente atque æstuante, ac si in hecticam laberentur. Et ex nostratibus Medicis nulli hoc observaverunt, præter unum dominum magnum, omnium, quos ætas nostra habet, acutissimum et sollertissimum qui vocat istum morbum Anginam συγγενησιν, seu colliquativam anginam, et catarrhosam colliquationem; nam partes omnes ad guttur, collum, et fauces attinentes liquefieri quodammodo videntur; et in exiguis venis ichor tenuis contineri videtur, qui superficialium dolorem excitat.

Omnium morborum quos mihi videre contigit, hic mihi difficillimus, et ad cognoscendum, et ad curendum visus est. Atque obiter qua ratione ei sit occurrendum, si quando incidat, aperiam.

Quum ergo ea difficultas deglutiendi (sive quis anginam vocet, seu rheumatismum siccum, seu morbum siccum, seu anginam siccam, seu pestilentem fluxionem, sive squallorem quemdam malignum sive colliquationem, sive catarrhosam colliquationem hoc loco non interest, tametsi longe hæc vocabula inter sese differant, aliasque morborum ideas indicent) quum, inquam, ea difficultas deglutiendi cum siccitate, squallorequæ sit conjuncta, nullo etiamnum nec foris, nec intus tumore apparente, dolore quodam occulto partium omnium ad guttur et collum pertinentium, non est dubium quin illa intemperies sicca corrigenda sit: eamque ob causam plurimum conferet in quod sequitur.

℞ Passularum mundatarum, ficuum, ana, ʒ j. glycyrrhizæ non rasæ, ʒ iij. pruna num XX, radicis althææ, ʒ j: fiat decoctio in æquis partibus aquæ rosarum plantaginis: in colatura dissolve oxycrati, ʒ ij. mellis violarum ʒ iij. fiat gargarismus: vim habebit humectandi, detergendi squallorem tollendi. Deinde circum partes thoracicas fiet litus sequens:

℞ Butyr. recentissimi, lib. j. cum qua misce olei amygdalarum dulcium sine igne extracti, ʒ ij. olei de Kenri et violati non veteris, an: ʒ j. misce: fiat litus.....

(T. II, Li. b. II, consil. LIV.)

AMATUS LUSITANUS

Curatio septuagesimatertia, in qua agitur de angina sæva delitescente, et hominem postea interficiente a pleuritide.

Laurentius de Gentilibus, publicus notarius Pisaurensis, vir annos natus quinquaginta, natura biliosus, compositione vero sive habitu gracilis, et qui ut audio, et ejus attestatur facies, *morbum gallicum* passus, in anginam lapsus est, et eam quidem gravissimam sævissimamque. Quæ ita hominem lancinavit, ut intra quinque horas, linguam crassam admodum habuerit, ut nedum loqui, sed nec vocem formare, imo vero ne aquam deglutire posset, ad eum igitur accessitus, hora noctis, hoc est, decima post morbi initium, illico injecto clysterio degravato ventre, sanguinem ex cephalica sinistri lateris, ad uncias sex, demittere non nisi per intervalla, admoto digito vulneri, jussi; erat autem humor inflammationem faciens, sanguis pituitæ mistus. Cæterum, ex sinistro brachio sanguis extractus est, quia in colli parte sinistra, tumoris non nihil apparebat, et eo in loco æger magis dolebat; constabant autem vires, tunc vero affecto loco, topicum remedium hoc applicitum fuit... Sed in medio colli dolorem dixit, et inspecto loco tumor visa est. Effluerat namque humor a superiori parte ad inferiorem, admoto tandem supra novum tumorem emplastro prædicto. Sed tumor delituit... quanto dolore ægrotantis, ipsi, et adstantes novimus, ut qui eum totam noctem gemere, morique velle, dicere audiremus, difficulter namque tunc respirabat, imo ea nocte, septies, vel octies egressit, omnia pauca, liquida, purulenta, ingentem præ se ferentia corruptionem; inde enim male de ægrotante suspicare cœpimus, tunc vero supra latus dextrum octo cucurbitulas apponendas curavimus, post quas, non ita dolere dixit... sed [sequenti nocte, pessime habuit, et vires, labefactari cæperunt, et spuere desiit, et tamen recte loquebatur, ratiocinabatur, et auxilia exponebat, quia intensissime dolebat,

demum facta omnino naturæ prostratione, suum obiit diem, *sexti die*, ab anginæ ortu, a *pleuritidis* vero infestante, secundo, demum obiit in pleuritidis augmento.

Angina periculosissima

Mulier Græca, quæ ad Portum habitebat angina laborabat, cui llico sinistri bracchii cephalica vena secta fuit. Nam dextri noni apparuit ex qua multo effluxo sanguine, statim bene valere se dixit. Utcunque tamen ad sectionem venarum, quæ sub lingua sunt tertio die pervenimus, et melius se habere dixit. Cæterum, primo gargarismo isto usa est, qui ita habet, ꝛ rob, mororum ꝛ. j. et sem. syrapi acetosi ꝛ. j. aquarum capitum rosarum, plantagininis an ꝛ iii j. misce. fiat gargarismus, ut vero bilius admoveatur, ne prescriptum fuit. ꝛ. olei rosacei ꝛ ii camomillini ꝛ misce, et cum lana succida excipiat, et loco admoveatur: sed et postea hoc altero gargarismo usa fuit qui habet rob mororum ꝛ ji myrrhæ croci nitri, sulphuris an ij aquarum hyssopi, origani an ꝛ iii j. misce, fiat gargarismus, quo universa clausa fuit curatio. (LXXXVII obs.)

Curatio de angina occupente laryngem et œsophagum simulque quæ per clysteris injecta jacula convalescere potuit.

Mulier nobilis angina vexabatur ita ut nec loqui nec cibum deglutire esset possibile, unde laryngem bronchi sive trachæ arteræ caput dictum afflictum esse simul ac œsophagi orificium certe quum res illa permaneret per octo diem, eam injectis per anum jusculis et ptisana servavimus. Nec enim bonus medicus in hac re dubium committere debeat an in alvum per anum injecta nutrimenta in corporis substantiam verti possint: novimus enim hoc non ex sophismatibus propositis aut argumentis pro hac re adductis: sed ex ipsa corporis dissectione, quod nutrimenta clysimatibus per anum injecta optime nutrire possunt, ut in hac percepimus muliere; quia ex ipso jecinore ad crassiora intestina venulæ quæ propagantur: per quo indigentia tempore jecur ipsum ad se nutrimentum per anum injectum ex ipsis crassioribus intestinis

attrahere potest, quod noscens Cornelius Celsus libro tertio suæ medicinæ capite decimonona minime de hac re dubitavit, veluti post eum Aveuzoar.

Angina stupenda.

Riverius castrensis chirurgus vir sanguineæ et biliosæ naturæ multoties angina detentus fuit tanta ut pro mortuo remanserit, attamen phlebotomicis frequentibus tum brachii tum ranularum sub lingua semper curatus fuit, cumque hæc sæpe recurrerint, toties phlebotomatus, fuit, ut non amplius tangi possent ejus vénæ, nisi in præcedentium vulneribus.

(*Obs. LX, c. IV.*)

Ad tonsillarum et uvulæ Inflammationes.

Optimum ad eas remedium est si terra sigillata tangentur, uel in jusculeto sensim deglutiantur.

Non inutilis est etiam ad uvulam a sede mutatam piperis contactus.

Ad mala vero hæc aliaque omnia faucium optima sunt mora vel eorum syrupus, aut paronychia planta apposita contrita.

(*Obs. LXXXIV, c. III.*)

Curatio, quinquagesimaquinta in qua agitur de Angina.

Pistor, qui ad sacellum Divi Marci habitat, angina laborabat, febrieat, tussiebat, difficulter respirabat, os non aperiebat, ad latus sinistrum phlegmon magis declinabat, quibus animadvertens, illico cephalicam sinistri brachii locum læsum respicientem, secare jussi, et sanguinis uncias decem per intervalla demere, vires constabant, et emplastrum extra admoveere jussi, nam et gargarismo utebatur. Cujus usu, et emplastri beneficio, disrupto phlegmone ægrotus ab orci faucibus revocatus est tunc vero, aqua mellis gargarizabat, et paucis postea diebus pancratice habuit. Erat autem emplastrum ex nido hirundinis apparatus, ut sæpe jam me fecisse vidistis.

(*Curat. med., c. V.*)

De angina et nido hirundinis.

Juvenis doctissimi Ambrosii Cratandri Spoletani, nomine Domitius Veronensis septemdecim annorum angina correptus fuit, adeo ut nec cibum, nec potum recte deglutire poterat, febricitabat, spiritu difficulter trahebat, in loco dolore msentiebat: cum quibus faciei ingentem ruborem, et colli apparentem tumorem patiebatur, ut merito... Angina hæc dici mereatur, non vero Synanchia, aut ut barbari schinantia. A illum igitur hora tertia noctis accessitus depositis per clysterem fæcibus cephalicam tumorem respicientem, illico in brachii curvatura tundere feci, sanguinisque uncias quinque fluere: novistis enim morbum istum ut plurimum a sanguine copioso ac plus justo calido ad colli partes fluente fieri: qua de causa nihil melius in hoc morbo, hac sanguinis extractione excogitari poterit; in qua animadvertendum est, quod pluribus interpositis vicibus fieri debet, quum si semel magna fieret sanguinis missio, timor, esset quod anima deficeret, et consequenter æger suffocatus obiret: jubemus quoque in tundenda vena, ut ampla et non angusta fiet incisio, ne sanguis tanquam percolatus, manente ipsius crassiori parte, exeat; facta igitur hac evacuatione, tumore apparente, oleum rosaceum paucis chamomillino mixtum, ut lana succida excepta, admoveere feci; gargarismo quoque hoc uteretur, suasi, qui habet rob mororum uncias duas, vini granatorum uncia unam, misce; quo sæpe gargarizabat, cum iis quoque ut parum dormiret consului. Nam in omnibus inflammationibus internis, somnus fugiendus est, præcipue in angina, quia sanguis in sommo intro magis repit; mane vero quum illum de solito vidissem fere morbo liberatum inveni: expedite enim jam loquebatur, tunc vero solo chamomillino minore jam facto tumore, ille, intra quatuor dies pristinae restitutus fuit sanitati: nec enim opus fuit ad discutientem pervenire gargarismum, ex myrrha, scilicet, croco, et aliis confectum rebus similibus: veluti nec ad emplastrum ex nido hirundinis, qui dubio procul magnam in hoc casu habet prærogativam: nec sunt audiendi qui ex nido integro tanquam ex terra frigida emplastrum fieri formidant, quum vera terra nidi hirundinis cum paleis, et cæteris in eo contentis, discutiendi vires habeat:

quanquam prisci Græci, nunquam, quod legerim nido isto in hoc affectu usi fuerint : sed potius cinere hirundinum, ut latius Commentariis nostris ad Dioscoridem diximus. Aëtius tamen inter Græcos, sermone decimoquarto suæ medicinæ, capite quadragesimonono, in quo de erysipelate agit, ac melle, exceptum contra erysipelata faciei maxime commendat: cito enim ea discutere trahit.

CRATON

In casu columellæ, seu uvulæ, pro quadam illustri persona.

Interdum columella plena humoribus elongatur, et ita delabitur, ut transmissionem cibi in stomachum impediat. Accipiat in hoc casu ovum recens assatum et per medium scindatur, unaque medietas calida imponatur vertici, vel suturæ coronali, vel fiat hoc quod fortius exciccat; contundatur medulla nucis juglandis cum spiritu vini, et suturæ coronali imponatur. Gargarismata non conveniunt, quia materiam attrahunt, sed si adest inflammatio collutio ex decocto radicis sonchi seu taraxaci, item aqua prunellæ laudantur. Si nulla est inflammatio, decoctum myrtillorum, rosarum, in ore detineat, vel hoc quod sequitur.

℥ decoctionis salviæ

Hyssopi an ℥ ℥

Alumm succharin ʒ j.

Diamor. ʒ j.

Mellis rosat ʒ ℥ Misc.

ARCULANUS

Nous avons emprunté à cet auteur son chapitre sur l'angine. Il est remarquable sinon par son originalité, du moins par sa clarté et un véritable talent d'exposition.

Synanchia.

Circa rubricam hujus capituli, sciendum quod reperiuntur isti termini, synanche sive cynanche significantes hanc dispositionem, de qua hic agit Rhazis, quæ definitiva est apostema in gutture anhelitum impediens, vel deglutitionem aut utramque. Parasyanche et paracynanche sunt termini synonymi significantes parvam synanchem, et propterea appropriantur synanchiæ, quæ est in musculis extrinsecis et non intrinsecis ipsius meri et epiglottis, licet apud Salernitanos. Cynanchia dicatur quando est intus, et non apparet extra. Synanchia vero, quando est solum foris. Squinantia quando est intus et foris juxta versum suum. Dicitur in definitione quod est apostema; nam licet possit accidere impedimentum in deglutitione et anhelitu ex aliis causis existentibus in gutture; illud tamen non dicitur synanchia. Sicut si præfocaretur homo *ex comestione fungorum* aut aliorum *venenorum*, aut ex congelatione sanguinis in aliquibus visceribus, aut si istæ operationes impediuntur propter dislocationem alicujus spondylii colli, maxime primæ et secundæ ad interiora, quæ dislocatio potest esse a causa extrinseca, vel intrinseca proprie in pueris propter debilitatem ligamentorum. Similiter et si *spasmarentur* aut paralyticarentur musculi meri, aut epiglottis propter quæ istæ operationes impedirentur sicut est possibile nullo existente apostemate, tunc non diceretur synanchia; imo est possibile quod fiat præfocatio et impediatur anhelitus propter nocumentum *lacerti*, quod et in *interiore parte epiglottis*, quamvis meatus non sit oppilatus, et plurimæ sunt aliæ causæ, quæ possunt impedire deglutitionem et anhelitum, quæ tamen non faciunt synanchiam, quia non apostemant.

Species synanchiæ, quandoque sumuntur ab humoribus,

quandoque a *locis* in quibus fiunt. Est enim quadruplex scilicet sanguinea, phlegmatica, cholericæ, melancholica, quæ tamen rarissime accidit, cujus causa est, quia ista passio fit valde cito, et secundum plurimum per viam *defluxus*. Raro autem humor melancholicus propter suam crassitiem et paucitatem cito permuat de loco ad locum, neque hujusmodi apostema melancholicum posset, nisi in longo tempore congeri. Attamen vult Avicenna hanc synanchiam melancholicam tam incipiendo, quam permutando maxime ex apostemate sanguineo aliquando posse generari! Sunt etiam quatuor species distinctæ secundum loca. Nam aliquando fit in musculis extrinsecis ipsius epiglottis versus partem anteriorem gulæ; et aliquando fit in musculis extrinsecis ipsius meri, sive versus epiglottim, sive versus spondyles colli, et similiter etiam aliquando fit in *musculis spondylium colli* (nuchæ). Tertio aliqua fit in parte intrinseca ipsius meri, quarto fit in parte intrinseca epiglottis et cannæ pulmonis. Et quandoque fit in *pluribus partibus simul*....

Causæ antecedentes sunt repletio aut totius, aut capitis, aut partium circa guttur, similiter *debilitas* illorum membrarum. *Causæ primitivæ* sunt indebitum regimen sex rerum non naturalium, et propterea multiplicantur in *vere* frigido et humido, et aliqui cibi a proprietate eam generant, sicut *andacocha*, id est trifolium. Item balneum, exercitium forte et insuetum corpore repleto, et similia.

Terminantur autem sextupliciter quia aut *resolvitur*, aut *suppuratur*, aut induratur, aut permutatur, vel ad *cutim* exterioris, vel ad *pulmonem*, vel ad *cor*, vel ad *stomachum*, vel ad *cerebrum*, aut *putrescit*, aut interficit maxime suffocando.

Signa communia : omnes synanchiæ sunt impedimentum deglutitionis aut anhelitus, et secundum plurimum utriusque et aliquando tantum, ut potus, cum non potest degluti, per nares egrediatur. Signa autem *sanguineæ* si sensui subjacet color rubeus, purpureus, tensio, durities, dolor fortis, extensivus, gravativus et quandoque *pulsativus*, sapor rei dulcis attestantis dulcedinem sanguinis aut similis sapor vini, et constrictio anhelitus vehemens, et reliqua signa sumpta ex complexione et habitudine sanguinea, et tensione venarum faciei, et colli, et similia. In *cholericæ*, color est rubeus tendens in citrinum, dolor

pungitivus, aut mordicativus, pauca tensio et durities, sitis linguæ, citrinitas, et ariditas parva, anhelitus constrictio et vigiliæ, et apparet quod sit in loco aliquid acutum mordicativum; dolor tamen cholericæ minor est dolore sanguineæ *Phlegmaticæ* dolor est parvus *obtusus*, sapor phlegmatis salsus cum caliditate et *viscositate*, quoniam hoc phlegma est corruptum et putrefactum, *albedo* linguæ et faciei, paucitas sitis, et *parvitas* inflammationis, multa humiditas, ex ore profluens, et cætera signa phlegmatica. Et quandoque prosternitur lingua cum mollificatione, et raro accidit cum ex apostemate in glandulis et sæpissime non adest febris et prolongatur spatium morbi ultra quatuor dies. *Melancholiæ* vero, color fuscus, parvus dolor, siccitas linguæ, durities, tardus eventus, ejus sapor ponticus, et cætera signa melancholiæ. Et quandoque fit *incipiendo*, et quandoque in *permutando* ex apostemate *sanguineo*...

Signa vero apostematum quæ fiunt in *amygdalis* ex loco sumuntur; facile enim subjacent *visui*, et etiam *cum digito*, tangi possunt.

Signa *terminationis* ipsius sunt, quia si *resolvatur* febris et cætera accidentia complete remittuntur, neque apparet alterius membri nocumentum. Si vero *suppuretur*, intenditur febris et dolor, et proprie pulsativus et cætera accidentia, deinde parum quiescunt circa quartum diem, doloribus pulsativis insomnia orta, et item sequentibus diebus, donec rumpatur, sive a natura, sive a arte. Si vero *induratur*, resolutis partibus subtilibus crassis remanentibus, in primis fit alleviatio, decrescit febris, et cætera accidentia, et remanet tantum gravitas, et dolor, et impedimentum leve deglutionis aut anhelitus longo tempore, et forte per annum. Et quandoque materia *lapidatur*. Et quando res dura *sicut lapis* egreditur. Si vero *permutetur*, illius apostematis delitescunt omnia accidentia gutturis, præter febrem, et cum hoc sequitur nocumentum in alio membro, ad quod materia permutatur. Unde si permutatur ad pulmonem, sequitur tussis, et pulsus fit undulosus, anhelitus postea constringitur, cum in principio permutationis fuerit dilatatus, et sequuntur cætera accidentia peripneumonix. Si vero pulsus fit spasmodicus permutatur ad nervos.....

VALERIOLA

Angina.

Anginam periculosissimum esse affectum, et strangulatur, cito interimat, præsertim si nec in cervice, nec in faucibus conspici-
 cum quid appareat, ab vetustissimo auctore Hippocrate prodi-
 tum est. Fit autem (ut Paulus et Avicenna inquirunt) aut
 interioribus faucium musculis inflammatis, aut interioribus etiam
 musculis in superiore gutturis parte sitis (quam partem λαρυγξ
 Græci nominant) inflammatis. Hujusmodi affectum venerandus
 hic senex passus est, distillatione gravi et affatim a cerebro in
 faucium summa ruente, ibique consistente, et phlegmonem fa-
 ciente. Sunt enim fauces, auctore Galeno, præjacens gulæ ac
 gutturis sedes quo in loco si inflammatio oriatur, synanche
 Græcis, Latinis angina talis affectus dicitur : sicut ubi externi
 harum partium muscoli inflammantur, paracynanchen appellant.
 Senem hunc sic affectum, gravis spirandi difficultas comitaba-
 tur, ut non nisi recta cervice spirare posset, quotiesque aërem
 attrahere vellet, collum vehementer protendere cogeretur; dolor
 in faucibus extensivus et pulsatorius aderat, febris pro ætatis
 ratione sat magna; faciei rubor et quasi tumefactio quædam,
 nedum vero gravis spirandi difficultas hominem premebat, sed
 et devorandi cibi multo maxima, ita ut quum sorbitionem liqui-
 dam sumere vellet, magnam illius partem per nares rejiceret,
 indicium in gulæ musculis inflammationem consistere. Nam etsi
 ægre spiritum duceret, multo tamen levius spirabat quam ingesta
 devoraret. Lædebatur autem utraque in eo et devorandi et spi-
 randi actio, quoniam tumore in gulæ musculis consistente,
 necessario laryngis musculis propter viciniam et consensum
 coafficiebantur, quod ab Avicenna recte dictum est. Et tu qui-
 dem scis (ait) quod apostema oppilat meatus vicini sui, et quod
 coarctatio membri vicini oppilat meatus vicini. » Unde evidentis-
 sime constare potest inflammatis alterutrius partis musculis,

laryngis inquam aut gulæ, facile reliquos qui vicini sunt in consensum trahi: ac proinde fieri, ut in ejusmodi anginæ specie perpetuo et spirandi et devorandi atque deglutiendi difficultas sese comitentur, ut capite de suffocationibus albala conceptis verbis notavit Avicenna. Quin præter hæc symptomata, impedita loquela erat, et ita loquebatur ac si è naribus loqueretur, ob, meatus obstructionem; lingua in eo crassa, tumefacta, limo sordido et pituitoso plena conspiciebatur. Pituita multa per os excernebatur sponte fluens, aquea ac diluta, interdum viscidior et crassior. Capitis dolore et gravitate maxima vexabatur, ita ut se in lecto continere mimime posset, nec caput pulvino applicare, cogebaturque in sedili quasi erectus sedere, pulvinis mollibus substratis: sic enim facilius et spirabat, et minus, dolore angebatur. Hæc præcipua quæ hominem tenebant symptomata fuere, quæ ad anginam omnia consequiebantur, et ejus germina erant.

Curatio. — Ego vero ad hunc senem vocatus mox, primo die, quum et ægritudinis naturam assidentibus, ejusque præsens periculum significassem, quo me calumniæ eximerem, dixi necessarium fore si senem salvum vellent, ut illi sanguis è cubito mitteretur: nec ob ætatem jam gravem cunctandum esse, quod validissima virtute instante seni et muscoloso et bene habito corpore; senex esset nec verendum ut sanguinis missione vires in eo deicerentur: tantum enim sanguinis exhaurire nobis in animo erat, quantum enim vires citra jacturam ferre possent. Atque quum omnes facile in meam sententiam pertraxissem, dato prius molli clysteri (quod adstricta alvo esset) mox e cubito vena mediana vocata sanguinem detraho (cephalica namque nusquam inveniri in eo potuit, quæ tunsæ, in hoc affectu commodior fuisset) aufero autem sanguinis, ad uncias tantum sex, ætati parcens, idque non confertim nec una vice feci, sed duabus eodem die: quod et Avicenna jubet, partiendam inquam esse sanguinis detractionem, nec semel auferendam. In crastinum vero e venis sub lingua iterum sanguinem detraho, a qua de tractione mirifice se levatum sensit: tanta siquidem virtute senex hic erat, ut præsentī animo plus cibi detrahi sanguinis cuperet.

Observationis Explanatio.

Angina periculosissimum esse affectum, citoque interimentem rectissime ab Hippocratem, dictum est. Angina, inquit, periculosissima est, celeriterque enecat, si neque in faucibus neque in cervice quicquam apparet, si dolor vehemens est, si vix spiritus trahitur, etenim eodem die jugulat. Itaque quum interni faucium muscoli inflammantur (Paulo auctore). Angina accidit, quam *συνάγχη* Græci nominant: externis vero inflammatis, *παρασυνάγχη* vocata gignitur, quasi juxtanginam dicas. Si in superiore gutturis parte, quam *λαρυγξ* Græci nominant, inflammatio subsederit, idque in internis musculis, *κυνάγχη*, hoc est, cynanchem vocitant: uti externi si inflammatione tententur muscoli, *παρακυνάγχη* esse dicunt. Hic itaque vir quo de sermo nobis in præsens est, quum bono corporis habitu esset, plethorico ac succi pleno corpore, seseque media hyeme, aquilonius vehementer flantibus, ob eam quam exercet piscatoriam artem, exposuisset, diu multumque in aëre frigido profundisque paludibus constitisset, defluxio a cerebro in fauces derepente procubuit. Angina namque, vel Hippocratis testimonio (si modo Hippocratis est liber quartus de ratione victus in morbis acutis) fit inquam, angina quum hyeme aut vere multa eademque fluxio/viscosa ad jugulares venas descenderit, quæ quidem utpote, amplæ existentes plurimum ad sese et humorem et spiritum contrahunt. Quæ sane, fluxio faucium implens partes, meatus spiritus et gulæ obstruit, fixo in partibus illis humore crasso ut plurimum, viscoso ac lento, unde et ægri fere suffocantur, et eorum lingua intumescens ori cavitatem implet. Unde nec loqui nisi summa cum difficultate, nec maxillas diducere, nec aperire os, nec deglutire nisi maximo labore possunt. Hæc omnia gravissime ægrum hunc conflictarunt; ingens namque tumor internus in faucium radicibus subsederat. summa ac difficillima spirandi ratio, ut nonnisi recta cervice ducere spiritum posset, dolor pulsatorius, et inflammationis summa cum gravitate sensum inferens, ab ægro in faucium radicibus percipiebatur, ingens et æstuosa febris, inguæ in vastam molem tumefactio, loquela difficillima, ut e naribus magis quam e lingua profluere sermo videretur, quod iis qui angina corripuntur familiare ac proprium esse solet, ob

vocis et sermonis impeditas partes. Unde fit ut non bene intus refractus aër, ob linguæ tumentis immobilitatem, et vocalium partium a defluxione obstructionem, in nares per meatum communem recurrens, inarticulatum et quasi de naribus manantem sermonem creet. Febris ingens suberat, summus in genus totiusque faciei, sed præsertim in oculis, rubor, ob vaporum a sanguine manantium sursum in caput elationem. Capitis et totius corporis gravitas ac confractio quasi quædam, spiratio crebra, difficilis, et cum stertore apparebat, vigilia omnimoda, etiam levi delirio conjuncta. His symptomatis noster ægrotus vehementissime premebatur: unde angina eum eaque gravissima laborare perfectissimum nobis fuit.

Quid enim perspicuum magis dici censerique potest, quam quod sensibus expositum, ipsum de se fidem facit, tum quoad ea quæ morbi essentiam explicant, et sedem affectam demonstrant, tum etiam quoad ea quæ ad accidentium rationem pertinent? Accidentia namque, auctore Aristotele, magnam partem conferunt ad cognoscendum quod quid est. Itaque conjectura artificiosa deprehendimus, angina premi ægrotum hunc; quod et sedes affecta, fauces, inquam, et quæ diximus symptomata abunde monstrabant. Dignoscuntur nempe affectus ipsi, auctore Galeno tum ab actione læsa, excrementis, positu, doloris proprietate et propriis accidentibus et loci natura. Perspecta igitur affectus hujus natura ac causis, per ea quæ recensuimus signa atque symptomata, superest ut curationis modum quo in hoc ægro curando usi sumus, subjiciamus.

Curatio. — Ad hunc igitur vocatus, quum in principio rem ægrotantis esse præ affectus magnitudine deprehendissem, assidentibus id prænuntiandum optimum factu judicavi: siquidem (quod Celsus monet) prudentis hominis fuerit, eum qui servari non potest, non attingere: nec subire speciem ejus ut occisi, quem sors ipsius peremit. Sed ubi gravis, metus sine certa tamen desperatione est indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse: ne se victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse si videri possit. Quod et ipse in hoc casu fide bona præstiti: moxque ad curam summa diligentia intentus (neque enim morbus inducias dabat, procrastinatoremque medicum poscebat; morbo utique et periculoso et acutissimo existente, in

quo eodem die medicari jussit Hippocrates, quod dilatio in hujusmodi perniosa sit) hominem curandum suspicio, in hunc qui sequitur modum. Clysterem primum paulo acriorem præscribo, quod adstricto alvo esset mox sanguinem detraho, idque non semel aut confertim, ut jubet Paulus, sed repetitis vicibus, ne cumolata semelque facta vacuatione, anima ægro deficiente, suffocationis periculum superveniat. Eodem itaque die bis e cubito sanguinem detraho pro virium tenore, in crastinum eas quæ linguæ subditæ sunt venas aperio cervici cum scarificatu, sub vesperum ejus diei cucurbitulas admoveo: gargarisatu crebro ægrum uti jubeo, ex adstringentibus, repellentibus ac refrigerantibus ab initio, mox discussoriis admixtis, in omni-modâ abstinencia ægrum contineo.

Nec nisi per tres primodies quicquam aliud præter aquam mulsam sumere jussi, neque enim solidiora alimenta sumere potuisset, ut qui etiam mulsam ore sumptam per nares rejiceret: quod synanchicis frequens esse solet: infernas partes vinculis deligo. Medicamentum purgans, sed frustra tamen, propino collumatque cervicem mollibus lanis oleo imbutis contego. Hi in curando hoc ægro, perspicui a me observati scopi atque propositi fuere, atque horum omnium hæc fuit particularis ratio. Clyster. ʒ Quatuor remollituorum, foliorum caulium rubeorum, hyssopi, centaurii minoris, ana M. j. Polypodii quercus conquassati ʒ j. granarum carthami, grosso modo contusorum ʒ, agarici in petia rara ligati ʒ iij seminum molenum cum cortice contusorum ʒ j seminum anisi et anethi, ana ʒ iij, florum chamæmeli et meliloti, furfuris macri, ana P. j. Fiat omnium decoctio ad ℥. Incolatura dissolve catholici ʒ ʒ j. hieræ Galeni ex xv j. rebus ʒ v) olei violacei et de lilio, ana ʒ iij. mellis rosatis colati ʒ ij. Fiat clyster ingentem excrementorum copiam dejecit æger, aqua allevationem sensit. Ejecto clysteri, sanguinem bis e media dextri brachii vena detraho: humerariam maluissem, sed ea præ carnis superante mole inveniri nusquam potui. Quin et penidia in ore et saccharum candidum vocatum, et tragacanthæ confectionem continere assidue jubebam. Postero die è venis sub lingua sanguinem detraho, et cucurbitulas cum scarificatu sub vesperum admoveri scapulis jubeo, a quibus mirifice se levatum sensit, et paulo tum facilius respirare cæpit. Collo et cervici hæc impono: ʒ Olei

chamæmeli, violacei, liliorum et cheirini vocati, ana $\frac{3}{4}$ ij olei amygdalarum dulcium recenter facti $\frac{3}{4}$ iij axungiae gallinae recentis $\frac{3}{4}$ j butyri recentissime sale $\frac{3}{4}$ j. croci $\frac{3}{4}$ j. Misce : Fiat linimentum, quod calidum collo et cervici mollibus lanis pinguibus intectum admoveri jubebam. Interdum ex oleis folis id præstabam. Ubi vero ad tertium diem ventum esset, mox propinare medicamentum solvens satago, et hiera cum agarico ac electario. Inde vocato, ex decocto pectorali exceptis : sed frustra id tentatum est. Nam devorare medicamentum paulo acriores, ut supra scriptum est, putavi : quod et optime contulit..... Cataplasmatibus admotis, suppurandi et evocandi vires habentibus : tum vero et gargarismatis incidentibus et attenuantibus sum fœliciter usus, ut sequitur : $\frac{1}{2}$ foliorum plantaginis et hyssopi foliorum caulium rubeorum ana M. B. caricarum pinguium munero xij, uvarum passarum exacinarum munero viginti, glycyrrhizæ contusæ, rosarum rubentium P. j. hordei cum cortice P β fiat omnium decoctio in aqua hordei recenter facta. In colatura adde diamorum et dianucum ana $\frac{3}{4}$ j. B oxymellis simplicis, syrupi violacei, ana $\frac{3}{4}$ ij mellis rosati $\frac{3}{4}$ j. Misce, fiat gargarismus, quo sæpe uti ægrum jubebam. Foris vero ad tumorem prominentem tali sum cataplasmate usus $\frac{1}{2}$ foliorum malvarum, althææ cum suis radicibus, ana M. ij. foliorum caulium rubeorum, matrum violarum, hyssopi ana M. j. caricarum pinguium florum chamæmeli et meliloti, ana. P j. seminum lini et fœnugræci, ana $\frac{3}{4}$ j capitum liliorum alborum $\frac{3}{4}$ ij furfuris P. j. fiat omnium decoctio in aqua, pistentur et cribrentur. Cribraturæ adde nidi hirundinis in oleo liliorum præbulliti, et cum toto probe in mortario macerati, et postea cribati, farinæ seminis lini et fœnugræci farini frumenti decoquantur, farinæ cum oxymellite ad convenientem glutinosatem, posteo adde axungiae gallinae recentis, butyri recentis sine sale, ana $\frac{3}{4}$ j croci $\frac{3}{4}$ j olei liliorum $\frac{3}{4}$ iij : fiat cataplasma. Mirifice profectum humorem foras evocavit, atque ad suppurationem deduxit intra biduum ; namque suppuratus fere qui foras subsederat tumor fuit : cui tamen tertio post die canini stercoris sicci drachmas tres adjunxi, quod si quid aliud, vel Pauli et Avicennæ testimonio, huic affectui maxime prodest, occulta quadam vic ac proprietate.

Suppurato tumore ad septimum diem candenti ferro aperire

jussi : quod id ulceribus et abscessibus plurimum conferat, exsiccando, et virus malum ignis potentia corrigendo. Pus fætidissimum, virulentum et copiosum, prodiit. Ulcus mundificare unguento ex melle rosato, succo apii et absinthii, farina hordei, myrrha et aristolochia curavimus : carunculæ carneæ putres multæ cum sanie intermistæ avulsæ sunt. Postea probe deterseo ulcere, quod intra vigesimum diem contigit, ad sarco-tica, et cavum ulcus implentia nos contulimus, unguento ex thuris polline, myrrha, iride, aloëque confecto, addito chalciteos emplastro : sicque Dei nutu intra vigesimum diem aut paulo amplius curatus integre fuit, magna omnium admiratione. Nec vero interea dum hæc perficio, reliquorum præsidiorum quæ juvare posse sum arbitratus obliviscor. Nam et quum devorare potuit æger purgans medicamentum, tum et catapotia dedi quæ deducere humorem possent, nempe præscriptum supra medicamentum post syrupos concoctorios dedi, tum catapotia coccia, sine quibus, et aurea, adjectis diacridii granis duobus, et feliciter operabantur cuncta. Intus vero dedi etiam rasuræ dentis apri drachmam integram ex oleo amygdalarum dulcium et saccharo cando, quod in hoc affectu, prout et in pleuritide, præsentaneum est remedium atque arcanum. Hæc in hoc viro per me administrata curatio ad laudem Dei opt. max. in cujus manu cuncta posita sunt, et a quo omne bonum.

MARCELLUS DONATUS

Verrucæ in gutture.

Joannes jacobus Fugacina civis Mantuanus habitu corporis melancholico præditus, verrucis quam pluribus, gutture, faucibus, et radice linguæ occupantibus diu vexatus fuit, quæ preventim maxime deglutationi officiebant, res sane non frequenter observata et raro admodum; nam in toto vitæ nostræ curriculo semel tantum et alteri Attilio Malegnano dicto ejusmodi verrucis, sed longe minoribus universam linguam disperse videre licuit. Erant autem ex illis, quas Myrinecias appellant, vulgo Porri dicuntur hujusmodi tubercula et perroruni capillamentis radicalibus persimiles; Latini vero verrucas appellant, eoque montium eminentiis consimiles sunt... Rasis ex humore melancholico crasso verrucas ortum habere affirmat, quod pariter Avicennes confirmat.

(*Lib. III, cap. V.*)

BERTINUS

De morbis et symptomatibus oris et faucium.

(Medicina methodice absoluta)

Os et fauces exercent aphtæ, ranunculus, gurgulionis relaxatio. et inflammatio, tonsillarum inflammatio, linguæ paralysis, tumor, sermonis amissio, blesitas, halitus graveolens, ptyalismus, gustus imminutus atque depravatus et angina.

Aphtæ. — Aphtæ sunt oris ulcera nonnihil caliditatis igneæ præ se ferentia, quæ teste Avicenna pueris sunt familiaria a vitio lactis, aut depravata ventriculi concoctione, et acri vaporum putridorum expiratione, aliquando in florenti ætate, a vitiosorum humorum influxu oriuntur. Galenus (lib. 3 épid.) duplex genus statuit, unum mite, alterum malignum, aliquando cum febre et inflammatione. *Ranunculus* est tumor, ut docet Avicenna, sub lingua erumpens, et forma ranæ similitudinem exhibens, ab humoreque crasso et viscoso gignitur. Aphtæ cum ac pituita oriuntur, apparent albæ; a sanguine productæ rubicondiores: biliosæ flavæ, et melancholicæ nigræ. Ranunculus vero tactu et oculis internoscitur.

Gurgulio. — Gurgulio conflictatur relaxatione, cum a distillatione irrigatur et perfunditur, sicque longior propendit columella; si rotunda et uvæ similitudinem ementitur uva nuncupatur. Arabes sentiunt gurgulionem quatuor morborum generibus labefactari, ut tumore a quovis humore genito. Deinde ulcere aut humore diu continui inferente, aut erosione ab humore multo et acri exedente; postrema relaxione a sanguine et pituita emolliente sic, vexatus est gurgulio. Inflammationem columellæ, quam peperit sanguinis decubitus, insimulant dolor, tumor, rubor, deglutiendi difficultas et febris, laxatio vero columella satis visui est obvia.

Amygdalitis. — Tonsillarum inflammationes sunt eorum locorum, quæ sunt juxta isthmum, aut aliquando solius tunicæ ut placuit Galeno (comment. 26 lib. 3 aphorism. ven.

triculo, gulæ et faucibus, totique ori communes); nonnunquam et subjectorum ipsi musculorum oriunturque ab acribus vel salsis humoribus in tonsillas decumbentibus, præcipue his, qui textura rara sunt præditi. *Ulceræ*, affectumque tonsillarum denuntiant dolor, deglutiendi difficultas tumor, aliquando febris. In ulcere quædam apparent crustis haud dissimilia, quæ ferro inuri solent.

Paralysis linguæ. — Lingua paralyti, stupore et tumore convellitur, aut propter cerebrum frigidius et humidius jugemque et continuum humoris influxum; aut ob nervos obstructos, qui a septima cerebri conjugatione propagantur. Lingua autem inficitur aut propter tunicam ventriculæ et pulmonibus communem, aut ob venas linguæ subjectas, aut ob uterum affectum; in hacque affectione lingua nec est aspera nec carbunculata...

Angina. — Angina Græcis cynanche aut synanche docta est, præceps et atrox partium, quæ sunt in gutture et musculis laryngis inflammatio; cujus duplex censetur differentia, una vera, altera notha. Veræ quatuor genera numerantur, et periculosissimum; in eo neque in faucibus quicquam se depremit. Aliud est, quo faucium larygisque muscoli inflammatione perspicua infestantur, alioque præcedente mitius est, tertium cervicem et fauces interiores obsidet in partibusque externis tumor et rubor caloris et doloris participes apparent, quartum omnium indicatur levissimum, in quo non fauces sed sola cervix ejusque muscoli inflammatione et tumore torquentur. Celsus ob hac veteri opinione discedere videtur, qui tria tantum anginae genera constituit. Additur etiam a nonnullis quintum genus, cum ad interiores partes colli luxantur vertebræ. Angina notha, auctore Galeno (comment. 4. in lib. de ration. victus in morbis acutis cap. 30) ab humore frigido et glutinoso in fauces, cervisque musculos decumbente contrahitur, febrisque est expers. Anginae indicia existunt, rubor faciei, et colli spirandi, transglutiendi, et pronunciandi difficultas; dolor partis ob musculos gutturis inflammatione affectos, æger aperto ore hians et erecto cervice vix spiritum trahens, tumor aliquando intrinsecus ob internos musculos et partes interiores; extrinsecus ob externos musculos oblæsos aliquando apparens, color ruber; dolor

musculos et partes interiores; extrinsecus ob externos pulsatis et tensivus, sanguinem redundantem; flavus et dolor punctorius, bilem; color albus et obtusus, pituitam dilucide commonstrant. Si cervicis vertebræ intra luxentur, casus, aut ictus, aut humor, qui vincula vertebrarum relaxavit, præcesserunt, cervixque excavatur et cum dolore flectitur.

JOUBERT

De angina.

Quadam anginae extrema desperatione audendum sit, ex optimis quibusque auctoribus novimus. Celsus ultimum remedium esse ait, incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis, supra colum, et in palato circa uvam; vel eas venas quæ sub lingua sunt, ut per ea vulnera morbis erumpat. His si non fuerit æger adjutus, scire licet morbo victum esse. Audacior Paulus Ægypteta laryngotomiam ex chirurgorum præstantissimorum auctoritate commendat, maxime vero Anthylli, cujus sententiam affert. Ea in cordia Græco est depravata, sed a Delechampio nostro fideliter restitutam quivis legere potest. Cælius Aurelianus recitat, Asclepiadem etiam ejusmodi Chirurgiam, a veteribus probatam, comprobasse: at ipse fabulosam esse, et a nullo antiquorum troditam, sed caducam et temerariam Asclepiadis inventionem affirmat Aretæus vero omnium antiquissimus autor, quicumque strangulationem ab angina verentes (inquit) arteriam secuerunt ad respirationem, non mihi videntur experientiâ rei fidem fecisse. Etenim calidus inflammatio major ex vulnere gignitur et magis crucia suffocatione et tussi. Quod si alioquin periculum istud effugerint non evalescunt vulneris labra: utroque enim cartilaginea sunt et inglutinabilia. Recentiores tamen ut Avicennes libr 3 fen. 9. tractat. 1 cap, II. remediis genus hoc in deplorato affectu non detrahunt. At si unquam est aggre-tiendum, id constantibus ægri viribus, et solâ strangulatione aperturis fiat. Neque enim insanabile est trachea vulnus ut Aretæus sine experimento (quod ipse aliis objicit) existimat, Albu-casis enim in ancilla, et Avenzoar in capra ejusmodi vulnus curatum se vidisse, testantur ut doceant id prorsus lethale non esse; quinimo, in angina alioqui deplorata, institui, posse nempe extremi morbi extremum remedium. Ego etiam vidi persanatum vulnus ingens tracheæ.

DODONÆUS

De latente ac difficili angina.

Nulla inter anginæ species æque periculosa est, ac ea, in qua nullus tumor in faucibus ac collo apparet; quam latentem hac de causa non inepte dixerimus. Talis autem quandoque, hominem paucis diebus conficit, ac e vita tollit, mente et sensibus integris. Quod et Hippocrates prædictionum lib. III cap. 8 scriptum reliquit. Angina, inquit, gravissima est et celerrima interimit, quæ neque in cervice, neque in faucibus conspicuum quid efficit. Hac enim eodem die, et secundo, et tertio, et quarto strangulat. Plurimum vero hanc quoque dolorem inferre et spirandi difficultatem: Adsunt vero non modo hæc, sed vehemens copiosaque humorum e capite distillatio, dolor autem circa laryngem et asperam arteriam talis, ut nec contingi quantumque leniter, citra gravissimum dolorem queant, sed nec moveri sursumque attoli. Qua, mobrem non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed et cibus et potus ægerrime, au non demittuntur. Cum etenim per æsophagum descendunt, cedit et sursum ascendit larynx. Inflammari per hujusmodi anginam, interiores ac latentes laryngis muscoli existimantur. Verum nos nullam juxta laryngem aut ejus musculos, vel circa asperam arteriam, inflammationem aut abcessum cognovimus, sed *pulmonem male affectum* observavimus.

Lanio quidam meridie circa laryngem et fauces dolorem sensit, et quandam in deglutiendo cibum ac potum difficultatem. Adiit sub vesperam pharmacopæcum. Datur ex aquis plantaginis, lactuæ, et diamoron, addito aceto, gargarismus, quo cum subinde uteretur, doloribus intensis, subito nocte mente constans, strangulatus interiit.

Hujus corpore aperto, reperta est pulmonis substantia in pus conversa et ad unum ejus latus abcessus pure quoque impletus. Nullatussis huic antea fuerat molesta; neque sanguinis ulla sputatio præcesserat; sano validoque corpore usque visus, eoque non gracili, sed obeso.

Eadem et superioribus similia æstate anni 1565 diligenter annotavimus. Quando multi angina ac simul molesta ex capite distillatione correpti fuere; præsertim ex his, qui præcedente hieme, vel tussi, vel raucedine laborassent, aut a peripneumonia.

(*Cap. XVIII.*)

LANGIUS

De calculo in tonsillis.

Haud vero dissimilis adeo calculi historia nobili viro Sparnegker, ecclesiæ Ratisponensis canonico, accidit; qui ob lapidem quoque in tonsillarum faucium abcessu concreto, continua affligebatur tussi. Ejus fauces quum medici quidem ex balaustiarosis, lauro Alexandrino, ac aluminis decocto. et aliis siccantibus colluere jussissent, quibus humore abcessus tenuiori assumpto, ex grossiori derelicto lapis magis accreverat, adeo ut laryngis musculos tumor fere occupasset; alii vero medici bechica, tussis remedia, ad nauseam usque diu frustra exhibuissent; ego tandem accessitus, suasi, ut non exsiccantibus, sed mollificantibus et maturantibus fauces affectas crebro collueret, nempe tepido ex malvis, ficubus, radicis althææ decocto elueret, in quo momentum diamori maturi dissolueret. A colluvione vero de electuario stomatico, quod est melle despumato, butyro recente, pulvere creos factum est: quo tumore emollito, oborta ex distillatione valida tussi, *calculus gypsum* excreavit, similem tophis, qui intra digitorum articulos chiragra laborantibus accrescere ex pituita solent. Neque vero olim hic morbus adeo rarus fuit.....

(*Epistola 4, VII, lib. II.*)

RHODION

Deglutitio difficilis a caruncula uvulæ (XLVI).

Œsophagi ulcere ex lue venerea sanato, caruncula suborta solidorum ac liquidorum deglutitionem cum dolore difficilem reddidit. Æger diu vitam trahens, tandem ad plures penetravit.

Deglutitio difficilis a tumore scirrhuso (XLVII).

Anno MDXXVII, Pativii nobilis virgo Deo sacrata jam septem ac decem annis vix aliquot guttulas liquoris demittit. Œsophago nempe ab ossiculo aviculæ olim saucio scirrhusus tumor affluente materia genitus.

Murani quoque alia ab intempestivo refrigerentium ad inflammationem usu contracto, gulæ scirrhuso assumpta ægerrime deglutiebat.

Deglutitio abolita (XLXII).

Adolescentulo octenni per febrem ardentem abolita deglutitio ab Œsophagi angustiâ, quæ tanta, præsentè Joanne Prevotio, ut gula, cadavere aperto, aquam non admitteret.

A pyro cocto devorato mors (XLIX).

Anno MDXXVI servus quidam patavinus, pyro cocto avidè vorato, cum gravissimis symptomatibus confestim interiit, adustis nervis, qui ventriculi orificio junguntur.

A pyro crudo improvide deglutito suffocatio.

Anno MDLIII adolescens pyrum crudum temere in ore agitavit: rupto petiolo in fauces invito delabatur: quibus dum eximi nequit, spiritum intercipit.

Inedia plurimorum dierum (LIV)

Libro de principiis, qui vulgo de carnibus inter Hippocraticos refertur : « plerique, qui septem diebus nihil edere aut bibere, in his moriuntur : quod si qui eos superaverint, nihil ominis tamen moriuntur. » Etsi vero ipsius mihi fides cum Vallesio semper suspecta fuerit, nec is Hieronymi Mercurialis iudicio Hippocratis (Coï germanus censeatur, huic tamen placito etiam refragatur magistra nobis experientia. Nam Joannes Dominicus Sala cibi abstinentioniam ad undecim diem sine detrimento notavit. Mulierem quoque dies virgenti sine alimento suspertitem vidit Horatius Augenius. Quales etiam suæ commissos curæ memorat Antonius Musa Brassavalus (commentar in Hipp. de rat. vict. in acut. lib. 1). Patrem suum a nono ante obitum die prorsus cibo abstinuisse memorat Hieron) Cardanus — (de vitâ propria cap IV). Rarum inediæ exemplum (centur II obs. XLII) edidit Fabricius Hildanus, mihi dum fuit de optima fide notus ; pariter Josephus Quercetanus (Diet. et polyhist. sect. II. cap. IV). Diuturnæ mediæ causas eruditissimo commentario enucleavit Fortunius Licetus ingens ævi et necessitudinis nostræ decus.

RIEDLIN

Anginæ a tumore linguæ radicem occupante.

Matrona quædam nobilissima, Dei gratia sanissima quidem prædita constitutione, at per bene longum temporis spatium variis iisque gravissimis ærurnis torta, tandem quantum vel sanitati quoque insidientur experta fuit, cum enim lactante ipsa, natu minor filiolarum a morbo vehementissimo prostata fuisset, jam inde tristata quod sic calamitates semper calamitatibus addantur, am vehementia paroxysmorum valde perterrita, dolorem in humero dextro percepit, cui tamen ea quæ commendata fuerant remedia, non opposuit, quia præsertim aliquoties sponte remisit, et cœtera sic sat bene se habuit; verum enim vero paulo post, nihilque minus cogitans ad fauces translatum fuisse dolorem persensit, unde primo quidem difficilius quævis ingesta deglutiit, paulo post vero adeo nil plane deglutire potuit ut, si vel guttam per gulam detrudere quasi conabatur, suffocationis periculum imminnerit, cumque tinctura bezoardica sumpta sudorem movisset, malumque post ejus usum non tamm imminutum quam auctum videretur, me propterea vocavit; et ego inspectis faucibus nil quicquam fere deprænhedere potui, unde commode tanta mala derivare potuissem, cum nec uvula, nec tonsillæ tumuerint, nec hæ, nec vicinæ partes multum inflammatæ fuerint, ut adeo non nisi de partibus oculis non expositis læsis cogitare potuerim, quia vero nil quicquam deglutire poterat, non tam in internis quam externis medicamentis auxilium quærendum fuit, siphone ergo gargarismis sæpius de die injecti, tum collo applicata emplastra et cataplasmata convenientia, clyster quoque injectus, et venæsectione mediante sanguis substractus fuere, hisque primo nil conferentibus, ipsaque testante, *se tumorem in faucibus molestum digito fere tangere posse, iterum inspectis iisdem in linguæ ipsius radice tumorem inveni digitum pollicem magnitudine ferme æquantem, duriusculum, nec colore a relinqua lingua differentem, unde jam*

et de venæsectione sub lingua instituenda cogitavi, quam quippe pluribus olim me summo cum fructu commendasse, memineram; at diligenter continualis interea supra memoratis remediis aliquantum melius se habere cœpit, hincque ut difficillime jacula deglutiit, unde nunc et quædam sanguinis motum corrigentia et pituitam viscidam incidentia medicamenta sumpsit, quibus eomagis opus habuit, quoniam die fere tertio febris etiam accessit, cui opposita nunc aliis etiam euixatm e; fusicuti vero indies quidem faucium dolor magis mitigabatur, *tumorque in lingua* observatus subsidebat; ita hæc febris tamen integros septem dies instabat; eaque depulsa de nausea adhuc instante conquerebatur convalescens, unde jam purgans liene eidem exhibui, quod non parum pituitæ evacuavit, restitit autem difficilior quædam respiratio, cui elixirum apperitivum opposui, quo aliquamdiu continuato et interposito usu Rhabarbari, Dei gratiâ paulatim convaluit, sicuti vero hæc nec pus nec sanguinem unquam sputo rejecit, unde nullum hic subfuisse abcessum, patuit; ita in linguæ radice præsertim mali causam latitasse, tumor ibi deprehensus docuit cujus causæ cum apud paucissimos, quin quantum ego novi apud nullum fiat mentio, si hæc observatio nonnullos memores reddiderit, jam usu suo non caret.

Anginæ cura fortuita.

Anginæ forte fortuna apud honestam quandam matronam mentio fiebat, et hæc referebat, quod olim maritus suus jam ante aliquot annos vita functus, sæpius hoc malo tortus fuerit, sic quidem, ut aliquoties per aliquos dies nec verbum proferre, nec vel guttam deglutire potuerit, et hinc animi sui sensa litteris scriptis exprimere famemque et sitim pati, subinde opus habuerit; accidisse aliquando, quod, ut et per noctum gargarismus injici possit, chirurgus instrumenta huic injectiori dicata post se reliquerit, ipsaque hoc munere fringi voluerit, sic vero forte fortuna siphone abscessum in faucibus tragædiam excitantem tetigerit, ut is in eruptus primo quidem dolorem non ita exiguum exciteravit, ut et a clamore se continere non potuerit ægrotus, at inde simul reliqua mala sic cessasse, ut non solum loqui iterum cuperit, verum et, ut cibus

potusque afferatur, peterit jamque sic sat commode ipsi tam molesti mali tam frequentem redditionem et hinc medicum suum tum odinatum rogasse, ut remedium suggerat, quod deglutire ingesta potuerit; molestiam vero fuisse ipsi tam in posterum illam avertat, et hunc ut fonticulum in brachio excitari curet, suasisse, quod et Dei gratia tam feliciter cesserit, ut ab illo tempore ab angina immunis vixerit. Quo ipso, sicut fortuita cura docemur, interdum, si fieri potest, ejusmodi abcessus ferro quoque aperiendos esse, ita fonticulorum geminus usus denuo non parum defenditur; in hisce enim præsertim malis et in aliis jam sæpe præstiterunt, quod ab aliis remediis dici frustra expectatum fuerat.

Faucium inflammationem sequentia mala febris malignæ metum injicientia.

Senatoris ejusdam ancilla, subito in faucium inflammationem talem incidit, ut non nisi difficillime quævis ingesta deglutierit, cujus tamen curam, quia cætera sic sat bene se habebat, non tam internis quam externis medicamentis, injectoque per chirurgum gargarisma perfecit, qui quidem tantum profuit, ut brevi iterum sicut prius deglutire quævis ingesta potuerit; sed resistans lassitudo huicque accedens quædam cordis anxietas eisdem nunc metum injicere, ne febris maligna subsit; unde jam domina ejusdem me in consilium vocavit, ubi ut nec pulsus nec urina vel minimum febrilis effervescentiæ signum suggererint, minime tum fidendum ratus, potiunculam ex tinctura bezoardica et antimonii diaphoretici constantem terque sumendam præscripsi; quæ et tantum Dei gratia profuit, ut sequenti die vix superfuerit, de quo queri opus habuisset.

CAMERARIUS

Angina gravissima.

Patavii meis temporibus quidam scholasticus Græcus oriundus, ex præcipua familia, sanguineus, unica nocte in anginam acutissimam incidit, una cum tumore linguæ maximo, ut statim loquendi facultas illi adimeretur. Cumque tam celeriter medicorum et chirurgorum opera uti non posset, ipse præsentem animo linguam acuto cutello decussatim incidit, ac satis multum sanguinis effluere permisit, quo facto, rursum loqui cæpit. Medicus postea accessit, pauca universalia et totum corpus respicientia adhibuit, præscripta recta victus ratione linguæ vero vulneratæ, pulveres ex Thure, Bolo ac similibus siccantibus, inspergi iussit, et ita intra paucos dies convaluit. Sic interdum fortuita remedia, aliis sunt efficaciora.

Paracelsi jactantia.

Theophrastus Paracelsus, cum vulgo in medicorum scholis, tum temporis *fere silentium esset de chymia*, et multa in præparatione pharmacorum melius fieri posse animadverteret, ad reformandam medicinam animam adjecit. Verum quam reformare voluit, pene cum aliis omnibus scientiis evertit. Primo enim, ut Thessalus ille se iatronicum nominavit; ita hic, ad se pervenisse monarchiam, omnium artium (in præfat. lib. de tinct. physic.) scribere ausus est, se arcanorum monarchiam, quem omnes, qui philosophiæ naturalis cognitionem appetant, Itali, Galli, Poloni, Germani, Philosophi, Spagyri, Astronomi, ut ducem sequi necesse habeant (ejudem lib. c. 1 et 4) haberi voluit; et (in præfat. paragraph. Avicennam, Galenum, Rhasen, Montagnagnam, Mesuen, Parisienses, Monspelienses, Suevos, Misnios, Colonienses, Viennenses, et quotquot Danubium et Rhenum incolunt, insulas maris, Italiam, Dalmatiam, Athenas, Græcos, Arabes, Israelites, se monarchiam sapientiæ constitutum sequi jubet.

SOLENER

De affectu oris et faucium sicco.

« Superioribus annis laborabat Abbatissa apud divam Ursulam hic vere generosa et heroica matrona, maximâ ventri imbecillitate, et de continua orificii et gulæ præsertim ardore ac faucium et linguæ siccitate, conquerebatur; quæ tamen nec tactu nec visu deprehendebatur, quod ob catarrhum continuo defluentem, et fauces ac linguam humectantem accidere suspicabamur, et quoties vomitu cibum reddebat, quod sæpe accidebat, pituitosa insipida reddebat. Malum hoc, medici collegæ mihi adhibiti, una mecum a pharmaco ab agyrta exhibito, contractum indicabant. Oppugnâvimus hoc malum multis modis frustra, tandem cum vigiliæ sequerentur, et si quando eam dormire (quod tamen raro accidebat) contingeret, statim terrores et angustia, regionem cordis præcipue infestantes supervenientes somnum singulis momentis fere excuterint; venimus ego et Birkmannus in eam suspicionem, humorem melancholicum aliquem in stomacho contineri, vel ex splene ad stomachum transmitti, et ista symptomata causare, propterea quod interior stomachi membrana et gulam fauces ac linguam vestiret. Et ob id melanogogum pharmacum, meticulosi tamen illo exhibuimus. Nam intemperie sicca stomachi ex caustico sumpta pharmaco eam laborare ante indicaveramus. Evacuavit pharmacum fusca melancholica et paululum contulit, unde animati, interpositis aliquot diebus, et viribus refocillatis, ad idem pharmacum reddimus, idque, tertio et quarto factum, et ita præter nostram expectationem restituimus eam sanitati.

(III sect; cap. XVII.)

CAPPIVACIUS

De angina.

Agemus in hoc capite de *exquisita* angina, de qua etiam Galenus loquitur (c. 3 lib. 4 de loc. affect.) Ideoque considerabimus anginam, tanquam affectum inflammatorium. Ac proinde, si vel ad asperam arteriam, vel ad œsophagum descendat catarrhus, seu materia pituitosa : angina illud vitium statui non debet. Verumtamen de exquisita angina ita loquemur, ut, quid notha, seu spuria sit, inde quoque elucescat.

Ad generationem exquisitæ anginae, necessarium est, ut sanguis in fauces confluat, et ita suspiciatur, ut meatus ad fauces pertinentes comprimantur, adeo ut hinc difficilis fiat tum respiratio, tum deglutitio. Quare angina exquisita, est compressio faucium, procedens ab inflammatione.

Forma est compressio, quæ est species angustiae; nam angustia prædicatur de subsidentia, de coalescentia, de constipatione, de obstructione, et de compressione, quæ differentia hic explicanda non est, sed supponenda.....

Subjectum : sunt fauces, per quas intelligimus illam capitis partem quæ constituta est de gula et larynge, id est de principio tracheæ arteriæ; siquidem in angina ut plurimum utraque pars afficitur, licet modo hæc magis, modo illa.....

A forma non sumuntur differentiae, nisi secundum magis et minus; quia omnis angina exquisita est compressio. *A subjecto* sumuntur differentiae, notatu dignæ, quæ maxime conferunt ad prognosticum et curationem, de quibus Galenus loquitur (voir T. I textes).....

..., Vitium hoc in genere facile *cognoscitur*, quia ægrotantes evidenter conqueruntur de angustia circa fauces, unde impeditur et deglutitio et respiratio. Præterea hæc angustia non est sine dolore. In œdemate, et proinde in angina notha, est angustia, sed sine dolore; quia hæc materia non habet illum impedimentum, ut solvat continuum. Sed in exquisita angina, quomodo-

cunque sanguis fluat, sive per attractionem, sive per transmissionem, eo fluit impetu, ut solvat continuum, et dolorem excitet; quia sanguinea materia est calida. Præterea in angina exquisita necessario est febris, et quidem eontinuâ. Si autem sit notha non necessario est febris. Formales differentiæ facile cognoscuntur, num compressio sit insignis, vel remissa.....

Indicationes desumendæ ab his quæ sunt ex usu; quare pro vario sanguinis peccato, variæ hauriendæ sunt indicationes; verbi gratia biliosus sanguis et calidus indicat refrigerentia. Præterea in phrenitide diximus de reprimentibus et aliis. Nec hic repetenda sunt frustra.....

Quoad *victim*: Cum ægri deglutire nequeunt, *cannula* immit-tenda intra gulam, ut fiat ciborum deglutitio. Sed quando adest inflammatio in illa parte, nimis irritatur. Propterea consules, ut non nisi maxima necessitas urgeat, ad canulam hanc confugiandum. Probo magis, ut paretur aliquod instrumentum ad modum fistulæ, quod imponatur prope œsophagum; et præterea detur vesica munda, repleta portione nutriente et hæc vesica sit apposita fistulæ, ut in clysmis fieris fiet. Post impetu quodam vesica comprimatur ut etiam cum impetu potio illa deducatur ad œsophagum. Quoniam desperatos, ob famem deglutitione ablata, fistulæ hujus beneficio restitutos vidi.

ALEXANDRE BENEDICTUS

Benedictus est un des meilleurs chirurgiens de la Renaissance. Il imite librement les anciens, sans témoigner envers eux d'un servilisme exagéré. C'est pourquoi nous lui empruntons son chapitre sur l'angine.

Ad Paristhmia (hoc est tonsillæ).

Si cum febricula inflammantur tonsillæ, quæ ab utraque faucium parte sitæ sunt, quæ ab aliis mala dicuntur, Antiades a Græcis seu paristhmia nominantur, tum supra naturalem suum modum augmentur, et difficiles haustus anhelitusque efficiunt. Si non inflammantur vix augescunt, nec colorem mutant, alioquin rubescentia mala apparent, maximo dolore strangulant hominem. Galenus ex sanguinis calidioris influxu inflammari tradit, quoniam spongiosæ naturæ existunt, quæ cum plurimum discutientibus juvantur, nisi materia ad principale retrocedat membrum. Mittere sanguinem, ac ventrem perpurigare protinus necesse est, et infusionibus alvi subinde examinare, abstinentiam vini præsertim imperare opus est, si corpus sanguine, aut pravis humoribus morbidum fuerit. Si neutrum horum affuerit, ipsius duntaxat morbi rationem habebimus, veluti gargarismatis atque necesse est, quoniam rheumatismi eo modo discutiuntur, inclinante impetu morbi dissolventibus opus est. Interea tempore cum morbus consistit utrumque facere jubet ratio. At si inflammatio durior videatur, nequaquam diaphoretica ac styptica pariter commiscenda sunt, nisi corpus exanimatum fuerit, sicut neque initio stypticis diaphoretica jure miscenda non sunt, quoniam ea intempestiva adjudicantur. Tument præterea vel pituita sola, vel admixta sanguine, aut alterutra tantum pars tumet, utriusque partis tumor hominem strangulat, gargarismata prodesse scribit Paulus (Ægineta) succo mali punici, ac rosarum decocto in earum phlegmone, aut palmarum succo, aut myxorum, aut lenticulæ cremore, inclinante ipsa tonsillarum inflammatione, vel si in statu fuerit mel adjiciendum

esse demonstrat, quod initio morbi damnari debet. At si suppurata materia fuerit, ac pus jam exire incœperit, mulso gargarisandum est, aut lenticulæ decocto, aut rosarum foliorum gargarismate absolutorio veluti remedio. At si paristhmia aëris vitio exulcerata fuerint, eadem quæ dicta sunt auxilia conferre dicuntur. Sed peculiare est diamoron ex aqua calefacta, aut mulsa in qua rosa decocta fuerit, et costus et rhus, aut glaucium, vel ejus arida folia decocta, aut dianucum ex mulsa.....

De notis anginæ.

In synanche omni spiritus subducitur, dolet guttur ex materia præsertim cholericâ, tumescit collum ac facies, interdum lingua procedit, aut nimio humore contrahitur ac hiat os, potus dolorem ingerit, ac per nares regurgitat, quoniam gutturis musculi tumentes dum attrahunt cibum et potum sursum bronchum tunc dolent (eam vim Græci kathoetes vocant); reliquæ notæ sicuti vox exilis ac inexplanata verba naribus resonantia, oculi proeminentes, veluti qui fune strangulantur, arteriarum pulsus, ut Galenus docet, initio rarus, ac exilis est, postremo citatior redditur, si synanchē vehementer strangulat ægrum. Vomitus vero si aliquando acciderit gulæ, abcessum denunciat, aut nausæ similis affectus. Subita præterea synanche strangulat, si in faucibus, et in *epiglottide* (larynge) sedem habet; si tardius infestat sub broncho, malum est in tota *trachea arteria*. Earumque quoque aliæ differentiæ sunt, devorandi ac bibendi difficultatem habet gulæ et faucium synanche, respirationem vero paulo liberiores. In *epiglottide* vero spirandi angustiae majores subeunt, et bibendi facilius modus? utrumque tamen accidere potest, ubi eas partes synanche major occupaverit. At inflammatio sive tumor *lacertorum* gulæ interiorum ab iis qui extrinsecus sunt, magnam differentiam habent, quoniam ex interiorum tumore anhelandi facultas liberior est, sed cibus ac potus difficilior redditur, nec abcessus apparet, aut vix cernitur. At exteriorum lacertorum abcessus, cum lingua spatula deprimitur, videtur, ac respiratio non prohibetur nisi bibendo aut devorando. At *epiglottidis quoque lacerti* tumentes inter se different, quoniam interiores si tument ocissime interimunt, nuncque fere

sanabiles, nec tumoris nota ulla intus extraque apparet. Exteriores cum tument versus gulæ partem, quæ hærent, non conspiciunt intra fauces, extrinsecus tamen aliquam tumoris notam præ se ferunt, vel digito summo deprehendimus interdum.....

FORESTUS

De angina biliosa.

Angina biliosa seu ex sanguine bilioso, sævissima laborabat Johannes Zygerus apud Alcmarianos sacerdos, annos 45 excedens, vir gracilis et procerus, raræ texturæ et coloris citrini, temperatura admodum biliosa, cui et febris continua aderat; sed nullus tamen rubor aut tumor intus in gula aut faucibus, vel extra apparebat. Erat autem ver cum hoc malo corripereetur; ad quem illico correptum accessitus fui. Verum cum alvum non deposuisset illo die, nec præcedente, libenter clysterem emollientem et nonnihil refrigerantem injecissem; sed cum nollet admittere, glande acuta cum alvum deposuisset, paulo post ex vena cephalica cubiti dextri sanguis non ita copiosus extractus est, gutture vero exterius inuncto cum oleo viol. et amygd. dulc. Interea et hunc gargarismum præscribimus aquæ plantaginis, solatri et diamor. At hic gargarisare non noverat, ita ut subito in guttur dilaberatur, et suffocari videretur; neque linctum sumere poterat, potu quoque regurgitante per nares. Quem hortabamur ut gargarisaret, alio qui illum suffocatum iri. Et sic in pedes stando, et duo viri illum sustinentes, capite paululum in colli partem posteriorem inclinato, malo quoque id suadente et urgente, tandem gargarisationem edoctus. Secundo die gargarismo adjecimus aliquid mellis rosacei, et olei aliquid chamæmelini, lana succida post inunctionem gutturi imposita. Tertio die venæ sub lingua sectæ sunt, et alvus glande iterum irritata, et gargarisma tale præscriptum: ꝥ aquæ plantaginis, violæ, scabiosæ, mellis rosacei etc. Quarto die nihil adhuc deglutire potuit; iterum glande alvo irritata, rursus venæ sub lingua apertæ sunt; cum prima vice parum sanguinis ab iis fluxerat, novo gargarismate usus sum cum foliis malvæ, rosæ, scabiosæ, melitoti ficuum pinguium, diamor. et dianuc. Cum neque quinto die adhuc deglutire posset, mane cucurbitulæ scapulis cum

scarificatione appositæ sunt, et tandem præter spem amicorum cum admiratione adstantium sanitatem adeptus est.

(*Obs. XVII, lib. VI.*)

De paracynanche.

Jacoba Juonis, monacha Alcmeriana, in monasterio, quod inter Franciscanos et aliud cænobium monacharum situm erat, anno 1548, mense Febuario, ex Paracynanche decumbebat; nempe musculis exterioribus laryngis inflammatis, parum tumentibus, cum febre continua, quæ cum strangulari videretur, multis tentatis remediis, cum aqua aceti, zaccharo immixto ex muliercularum (matronarum) consilio gargarisasset, ita ut secundo die ab habito malo sub nocte periculum suffocationis metueret, de medico accersendo tunc primum cogitavit, cum et adstantes illam pro deplorata haberent. Cum ore aperto gulam et fauces inspicerem, nullum tumorem reperi, nisi levem in parte sinistra, licet se intus laqueo strangulari diceret. Alvo statim per glandem acutam irritata, mox venam cephalicam tendere jussi e directo loci dolentis, sanguine utcumque extracto, cum bene ferret. Deinde pro gargarismo usa ex decoctione plantaginis, diamoron et melle immixtis, sex deinde horis a sectione venæ cephalicæ, aliæ quoque venæ sub lingua sectæ sunt sanguine admodum viscoso effluente; ita ut visa sit melius habere. Interea et gutturi cataplasma quod sequitur admovi: ꝥ farinæ hordei p. j. mucilag. semen. lin. fœnugræci, althææ extract. cum aqua malvæ et chamomillæ ana ꝥ ℥, j. olei liliorum, chamomill. ana q. s.; fiat cataplasma. Rursus glande alvum solvimus; cum clysterem admittere nollet. Deinde inclinante malo, et cum materia resolveretur, ac dolor sedaretur, et phlegmata ab ore copiose educerentur, ad illud magis juvandum etiam hoc gargarisma præscriptum est: ꝥ hordei mundati m. j. flor. chamom. melliloti ana p. j., caricarum pinguium num. VII, passularum enucleat. p. j. seminis malvæ ꝥ i j. sem. lini, fœnugræci, cotoneor, ana ꝥ j. glycyrr. rasæ ꝥ ℥.; coquantur in aqua communi pro lib. i j.; colat. adde diamor. ꝥ j. mellis ros. colati ꝥ i j.; misce pro gargarismo. Guttore inuncto

exterius cum oleo liliaceo et emplastro seu cataplasmate imposito, egregie sanitati intra quatuor dies restituta est.

(lib. VI. obs. XIX.)

De tonsillis inflammatis et induratis.

Adriani Arnoldi prætoris Alcmariani filia, decimum octavum agens annum, cui menses nunquam fluxerant; in tonsillas inflammatas, induratasque inducit, quod sæpe *virginibus* accidere scribit Aëtius lib. 8, cap. 46, quibus maxime et tonsillæ aliquando ulcerantur, ut postea alio exemplo docebimus. Verum huic tonsillæ ad suppurationem atque ad ulcerationem devenerunt. Verum cum huic pene suffocatio impenderet, ac guttur præ nimio tumore præoccluderetur, post octo dies cum hoc malo detineretur, et usque in octavum diem usa fuisset gargarismis valde repellentibus et infrigidantibus ex aqua nucum, plantaginis consilio tonsoris, neque sanguinis missione neque purgationibus præcedentibus, adeo malum increvit, ut et tonsillæ inflatæ et supra modum duræ existentes tum rubicundæ, gulam præoccluderent, eumque suffocatio impenderet, nocte me vocarunt. Ego autem sanguinem esse mittendum (cum intellexissem menstrua huic juveniculæ nunquam fluxisse) ex talo proposui interea ut et hoc gargarismate etiam uteretur, quod tonsillas nimium ex præcedentibus gargarismis induratas et partim emolliret, resolveret, et inflammationem minueret. Tale autem erat : $\frac{1}{4}$ rad. althææ mund., rad. lilior alb. ana $\frac{3}{4}$ β . folior. viol. malvæ an. m. j. scabiosæ, bellidis minoris an. m. β . ros. rub. p. j. auricularum sambuci 3 ij. hordei, mundati p. j. ficuum pinguium numero iij. sem. malvæ, fænugrec. ana 3 j. medietatem nidi hirundinis optime insici; fiat omnium decoctio in aqua com. muni, et in fine addendo seminis cydonsem lini an $\frac{3}{4}$ β . et in fine etiam addendo aquæ scabiosæ caprifolii an $\frac{3}{4}$ j et tota decoctio fiat pro lib. ij. colaturæ addendo mellis ros. colati (cum enim diu duraverat malum, mel ros. adjecimus, quamquam illud neque mel in principio conveniat) $\frac{3}{4}$ iij. diamori $\frac{3}{4}$ j. Cum autem per totam noctem gargarissasset, mane cum redirem, durities mollior evaserat, ac melius spirare poterat, licet nondum quid deglutiret, nisi valde liquida cum maxima difficultate. Tunc

etiam venam in talo, nempe saphenam incidere jussimus, sanguine ad uncias quatuor aut plures effluente; idque ad diversionem et evacuationem. Sed cum malum non sedaretur, licet phlegmata melius per gargarisma supradictum quam prius exirent, licet mollificantibus et resolventibus opus esset, ne ex iis inflammatio augetur, subinde quoque gargarissabat cum lacte tepido; cum ex acrioribus gargarismis inflammatio exasperetur et mordacitas deinde accideret, ideo ex Aetii decreto levioribus gargarismis colluendi sunt; qualis est succus ptisanæ tepidus, aut lac etiam tepidum. Post meridiem vero, cum eodem in statu virginem invenissem, ad evacuandam materiam conjunctam mandavi quoque ut venæ sub lingua mitterentur; e quibus nigerrimus sanguis et corruptus fluxit, verum tam copiose, ut venæ neque aceto cum aqua in ore retento occludi possent, neque ex panno lineo combusto sub venis retento, quo pæsidio sæpe sanguinem effluentem inhibuimus: tandem panno lineo triplicato et aceto ros. inculcato sub lingua detento sanguis commode restrictus est, et harum venarum incisione haud exiguum juvamen consequitum est; tonsillis etiam subsidentibus inflammatione maxima ex parte quoque sedata: quamvis sub nocte tonsillæ (ut plerumque fieri solet quod eo tempore ex fluxione magis infestentur) rursus nonnihil intumescere; alvo etiam tunc per glandem irritata, mane autem sequenti bis in die ex apozemate subsequente sumebat, cum jam melius potionem sumere posset, quæ simul ad uteri purgationem faceret, et materiam tam per alvum quam urinam simul diverteret et expurgaret: ꝛ corticum rad. fœnic. petros. glycyrrh. rosæ ana ʒß melissæ artemisæ scabiosæ, scolopendre, malvæ, ana m. j. betoniceæ, hyssopi, fumaris ana mß. flor. cord. pj. sem. anisi 3 ij ß malvæ 3 j. uvarum pass. ab arill. repurg. p. j. ficuum ping. numero iij folior. sene a stipitib. repurg. j. fiat omnium decoctio in sero lactis ad lib. j. zacch pro lib. j. ß. cola. adde mellis rosat colati ij diamori j. misce: guttur exterius inunximus oleo amygd. dulc. lilior. simul mixtis. quib. optime habuit, ut illam amplius non jusserent. Post quinque tamen dies optime valens, in animi deliquium indicit, credo ex uteri suffocatione; ideo frictionibus vinculisque injectis cruribus et coxis, ad se rediit. Deinde pedibus quoque lotiones cum decocto flor. chamomill. me-

liloti, artemisæ, majoranæ verbenæ matricariæ. Bene deinde se habuit, ita ut tabellis devoratis ex zeodaria, agni casti sem., cinamomi, et speciebus aromat. ros. sine musco, et diarob. abb. sana evaserit, et in Hagham. Comitibus accessit. Verum diutius ibi manens, reversa rursus in gutture conquesta est. ore aperto et inspecto cum levis inflammatio ex catarrho salso in tonsillis appareret, modo lacte tepido, modo hoc gargarismo utens, et alvo leniente medicamento, et cucurbitulis scapulis cum scarificatione affixis, intra tres dies denuo sanitati restituta est. Talis erat gargarismus : ꝥ plantaginis utriusque portulacæ flor. ros. bellid min., viol. an m. j. hord. communis p. j. gallam unam contritam sem. coton. 3j. bulliant in aqua comm. ad lib. j. ꝥ dianucum iijj ; fiat gargarisma. (*Obs. VIII, lib. XVI.*)

Scholia.

Aetius ex auctoritate Archigenis multa, inquit, virgines circa vigoris et totam mensium purgationem appetentes hac afflictione apprehenduntur (nempe quod tonsillæ frequenter iisdem ulcerentur, et in malignas tonsillarum ulcerationes dilabantur) quæ præcipue venæ sectione opus habent. Incidendæ autem sunt in eis tali venæ, et unica sanguinis detractio facta evacuandæ non autem usque ad animi defectionem, quamquam hæc in ulceribus tonsillarum, quæ virginibus eveniunt, commendantur; eadem quoque venæ sectio commoda est in virginibus si inflammationes ac tumores tonsillis obveniant, et eandem causam habeant ex qua tonsillæ ulcerantur quemadmodum domicella juveniculæ in campo regio evenit, cui menses quoque nunquam fluxerant : etiam hac inflammatione tonsillarum correpta fuit : verum cum neque hæc huic malo tempori consuleret, nunc cum suffocatio immineret, tonsillas inspexi, valde tumidas et subrubri coloris esse animadverti, quod ad suppurationem tenderent. Si enim inflammatio ab initio reprimentibus, deinde et reprimentibus — discutientibus, postea in declinatione magis discutientibus, resolventibus non curetur, permanente ac immorante inflammatione diutius, tonsillæ ipsæ subrubri coloris fuerint, ut in hac domicella virgine religiosa spectabantur, permutationem in pus expectare oportet. Cito enim tonsillæ abscedunt non solum in talibus, verum in aliis quamplurimis, ut quotidiana experien-

tia in Praxi observavimus, quod Aetius quoque testatur. Idque facile cognoscimus ex quibusdam signis, quæ Aetius ex Philumeno medico antiquissimo sumpsit, quoniam inflammationis signa augescunt, exacerbationes ad vesperam fiunt fortiores cum horrore, inæqualite, aliquando etiam cum febre, quare hoc tempore facere oportet, ut quam citissime suppuratio fiat. Ideo in hac domicella ex gargarismate decocti ficuum pinguium, uvarum pass. enucleat, viol. malvæ cataplasmate maturante exterius adhibito, abcessus ruptus est : eoque absterso cum hydromelite, deinde adjecto decocto ex ros. rubeis. plantag. ulcus consolidatum est, brevi admodum convaluit ad citissimam suppurationem. Aetius calidiores gargarismos, velut ex aqua mulsa calida, adhibet, et decoctum caricarum ac hyssopi cum radice dulci. Extrinsecus : vero cataplasma imponatur ex ejusdem Aetii sententia ex hordei farina, fœnugræco, cum decocto caricarum althææ ac melle, aut vapor aquæ calidæ intrinsecus : sed aliquando diutius admonendus erit donec ea suppurentur. Per se aperiantur, ut Celso visum est; confecto autem pure dolores imminuuntur, et inflammationis tumor mollior redditus digito cedit. Quare tunc (ut Aëtius quoque præcipit) acriores collutiones exhibendæ sunt, ut abcessus rumpantur, cujus generis sunt; pulegium, hyssopum, thymum, calamintha, thymbra in sapa, aut aqua mulsæ decocta et gargarizata. Si vero pure substantia non rumpuntur, hi tumores ex Celsi decreto incidendi sunt (nos aliquando per chirurgum commode scapello aperiri fecimus, ubi timor suffocationis imminabat) deinde ex mulso calido ad gargarisandum per se ; postea etiam admisto lenticulæ vel rosarum decocto : atque in faciendum donec in totum solvantur ac penitus ad cicatricem perducantur, ex Aetii. et Pauli mente. Modico autem tumore existente, ac exulceratione, furfuri, cremori, ad gargarisandum paulum mellis adjiciendum ubi plurima ulcerata sint, eodem furfuri cremore, vel lacte gargarisandum est, Celsi decreto. Modus autem sectionis, si non per se aperiantur, ac situationis ægris, tum ante, tum post dissectionem ac patrato opere, quæ conducant auxilia, ab Aetio (quo, a Leonida medico antiquissimo accepit) cap. 45. cap. 48 lib. 8 a Paulo cap. 30 lib. 6 describuntur : quem locum unusquisque legere poterit. Refert Dodonæus cap. 16 de inflammatione utriusque tonsillæ in filiola quadam

duorum annorum, in qua idonea remedia propter ætatem non admitterentur, natura viam sibi ad salutem quærens, morbum ad exteriora convertit. Nati sunt itaque utrinque in collo infra aures singuli tumores : quibus scalpello apertis, pus effluxit : itaque ab abcessu tonsillarum liberata sanitati restituta est. Facit Hip. aph. 37 sect. 6, de angina loquens, si tumor fiat in collo, bonum. Tonsillarum siquidem inflammatio anginæ quædam etiam est species, quamvis non vera angina. (*Lib. VI, obs. VII.*)

De utrisque glandulis, quas *αμυγδαλæ* vocant, longo tempore induratis.

Vidimus filium Francisci Duiistii viri consularis cum annum 13. ageret, quod per integrum annum glandula vulgo amygdalas vocant) intus induratas adeoque tumidas haberet, ut loquelam impedirent, et per nasum loqueretur, erantque vix inflammatæ ; imo citra inflammationem valde duræ et inflatæ cum catarrho quoque ex fluxione pituitæ etiam laborare viderentur, hoc leniens medicamentum et nonnihil purgans præscripsi ; & Syrup. ex infus. ros. pallidarum cum foliis senæ (in unaquaque uncia 3 ij senæ infundebantur dum infusio parabatur) 3 j ʒ diaphœnici 3 j ʒ aquæ betonicæ salviæ ana 3 misce, ac ea potio alvum quinquies deposivit ; mox et hoc gargarismo utebatur : ʒ foliarum viol. scabiosæ, hord. mundati ana in j. flor. ros. rub. pj sem. cydon. 3 j ʒ rad. althæ 3 ij. fiat decoct. in aqua comuni pro lib j. colaturæ adde mellis ros. collati, diamori ana 3 j syrup. granat. 3 ʒ misce pro gargarismate. Inflammatio quæ levis erat facile sedabatur ; sed duritie atque tumore æque permanente, ut magis emolliret, postea garo adjecimus ficus num^o V et exterius inunximus oleo amygd. dulc., chamomil., liliorum, lana succida admota cum glandulæ æque duræ permanerent, exterius apposuimus emplastrum de muccilag. Et ne fieret major fluxio, apozema sequens præscripsimus : & corticum rad. cichor. dentis leonis, fœniculi ana 3 ʒ rad. althæa mundat 3 iij flor. cord. p. j capill. ven, polytr. scabiosæ, betonicæ ana m. j. sem. anisi 3 iij sem. malvæ 3 j folior. senæ 3 polypod. querc. 3 vj sem carthami contusi 3 ʒ verar. poss. enucleat 3 j ficuum ping. num iij jubar. sebesten recent. ana num. v. prun. damasc num xij ; fiat

decoctio in aqua communi pro $\frac{3}{4}$ ix colat. adde syrup. ex infus. ros. pallid $\frac{3}{4}$ iij; misce pro iij. dosibus matutinis. Sperabam autem quod mollescerent et ad maturationem tenderent; sed postea parum subsidebant tamquam resolverentur licet æque duræ permanerent. Gargarismum ultimo præscriptum reiteratum est: hoc cataplasma appositum: $\frac{1}{2}$ rad. althea mund. $\frac{3}{4}$ ij. liliorum alborum num. v. ficuum ping. numero vij meliloti p j coquantur in aqua communi ad mollitudinem pistentur, adde farinæ seminis lini $\frac{3}{4}$ j. olei amygd. dulc. butyri recentis ana q. s. fiat cataplasma molle. Non pervenit malum ad suppurationem; videbatur potius minui atque resolvi, quamquam duriores manebant: ideo cataplasmate adhuc appposito, minorabantur quidem et minus duræ erant ut nunc mollia deglutire posset; tamen ad perfectam mollitiem subsidentiam non pervenerunt: quare ab ulteriori curatione etiam mater tunc abstinuit, puerumque rursus ad scholam dimisit.

Scholia.

Antiades licet sint inflammationes glandularum, quæ sunt post linguam in ejus radice; tamen citra inflammationem aliquando inflantur, ut huic puero evenit, defluctione pituitæ intumescunt, ita ut cibi transglutitionem impendant. Rustici in Gallia (ut refert Rondeletius) vocant Furouls: quia curant longa frictione facta in carpo, existimantes tumores quosdam factos apertos frictione illa dura in carpo prædictum affectum tollere: prodest autem, inquit ille, res vera ob diversionem. Nos curamus ut idem refert, vacuando pituitam. Humiditates capitis sunt enim positæ non longe a foraminibus, quibus pituita mota palatum expurgatur. Post evacuationem illam universalem factam medicamentis pituita educantibus, derivatio per errhina multum confert. Si non sit copiosa materia, etiam levia masticatoria putamus conferre ex zinzib. cubebis cum ficubus, interea conferunt gargarismata leviter adstringentia aliquantulum detergentia, ut de angina dicetur, inunctiones in principio in parte externa ex resiccantibus; in declinatione, cum consistit defluxio, digerendum cum aliquibus emollientibus, cum glandulæ istæ facile indurentur in scirrhum degenerent; quod in puero isto metuabam, qui morbus nunquam aut raro curatur in his. Sunt autem illa medi-

camēta apponenda in lateribus arteriæ, sub maxilla inferiore. Et quia hoc videtur pugnare cum consuetudine, Rondeletius rationem subingit ex Diox. loco, qui ait nucibus cupressi strumas curari posse. Hæc videntur pugnare cum praticis, qui omnes utuntur astringentibus in parte interna, relaxantibus in externa. Sed quia partes laxæ sunt cum defluit materia, non sunt laxandæ sed cum consistit defluxio, ut materia ad dextra trahatur. Quare in omnibus illis affectibus esse utilissimum in principio, si medicus vocaretur, medicamenta utcumque dessicantia cum levi quadam adstrictione intus extra ponere. Quod in me ipso inquit Rondeletius) expertus sum. Anginam defluxiones ad fauces prohibivi multas a scrophulis incipientibus vindicavi, nucibus illi cupressi supra partem appositis. Potest fieri tale cataplasma ꝑ nidi hirund. ꝓ iij pul. nucum cupressi ꝓ j olei ros ꝓ ꝑ excipiantur oxymelite, fiat ad formam cataplasomatis; applicentur in lateribus colli. Hoc medicamentum leviter astringit partes laxas, pituitamque illam tenuem jam defluxionem exsiccat. Si induratæ fuerint glandulæ illæ internæ, curandæ sunt ut scrophulæ: nam scrophulæ adenæ sunt induratæ. (*Obs. IX, lib. XVI.*)

De ulceribus malignis tonsillarum.

Petri Gualtheri cerevisiari Delfensis uxor Sophia nomine, mulier Dordracæna, anno 1558 cum per multos annos ulcera tonsillarum serpentia habuisset ex acri et salsa fluxione, et cum nullis remediis curari posset tandem cum frequenter ulcera linimento attingerentur quod ex cinere centaurii minoris constaret et stercore canino pulverisato et melle ad crassamentum ut melius adheret, magno cum nostro honore per me curata fuit ab ulceribus serpentibus.

Scholia.

Eo tempore in mentem mihi venit historia Galeni de stercore canino, quæ ita habet: disseram (inquit) nunc de stercore canino, quo uti assidue convenit præceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani edenda exhibens duobus continuo diebus: ex quibus durum, candidum ac minime fœtosum stercus proveniebat. Hoc igitur acceptum, desiccabat, ut cum postea usus postularet, facile ad levorem posset redigi. Utebatur eo ad anginam, dyssente-

riam summe inveterata ulcera : ad anginam quidem iis admiscens, quæ alioqui huic effecto congruebant : ad dyssenteriam, lacti illi immiscens, cui decocto calculos vocatos et ignitos injici ante posuimus ; aut, ut ego postea ob parabilitatem, ad ferrum confugi, id solum generosissimos quosque discipulos docebat. In his ergo duobus multum expertus sum stercus caninum esse medicamentum mirabiile, sicut in ulceribus extreme malignis. De stercore autem humano valente ad gutturis phlegmonem, in qua timetur gutturis suffocatio vide eodem loco præcitato. Sic nobilem quemdam generosum virum aluimus, qui cum diuturna inflammatione gutturis laborasset neque ullis remediis a medicis etiam doctissimis curari posset, ecligma confecimur ex stercore canino (pharmacopæi nostri album Græcum appellant) saccharo penidio et syrupo viol. et diamoro, pulvere ireos ad \mathfrak{D} \mathfrak{B} injecto, ad stercoris odorem refrenandum ; quo quidem remedio cum usus esset convaluit. Cæterum post abcessum tonsillarum aliquando sequitur ulcus sordidum modo malignum, quo et graveolens fit malum in tonsillis : modo erit citra phlegmonem ex humore salso et acri, qui molles humiditas calidæque tonsillas prorsus exedit, nonnumquam ex contagionis labe incipienti lui veneræ familiare est : ut nosquam sæpissime observavimus innuneros sæpe curavimus, ut de morbo Gallico dicemus. Jam quoque in prædictis partibus crustosa pestilentia ac serpentia ulcera oboriuntur, fine ex præcedente influxu, sine ex quavis alia causa, nulla fluxione præcedente, modo a consuetis inflammationibus suppuratis maxime efferatis perficiuntur. Frequentissime quoque in pueris aphthis præcedentibus etiam in ætate jam perfectis et his qui vitiosis humoribus abundant : qualia quoque illa sunt ulcera quæ vere contingere solent pestilentibus constitutionibus. Succedit ægris difficultas transglutendi, suffocatio coarcervatim insidit maxime, cum rubor subeat mentum ; aut ubi hæc acrimonia præterierit nomenque depascitur, locos excipit, succeditque una putrefactio. Virginibus quoque (ut diximus) circa vigoris ætatem mensium purgationem appetentibus evenit. Curantur totius corporis curatione præmissa at reliquis diversionibus. Paulus adhibet diamoron rosis inspersis, vel rhus siccum, vel decoctum, vel succum mali, vel punici cum cortice jusculum expressum. Reliqua vide apud Aetium, sum-

matim tonsillarum. Columellæ ulcera eodem modo curantur; quoad aphthas in quibus hoc observandum, quod cum omnia ulcera interna oris serpentina sunt, idque ob partis mollitiem laxitatem (quod non accidit partibus externis) vehementius exsiccantibus adstringentibus gaudent, quam externa ulcera, tum ne amplius serpent, tum quia semper a saliva (ut dictum est) fiunt humidiora; unde medicamentorum vis refringitur; interea conandum in universum ne digitum quidem locis admoveamus, aut levi tactu manum admoliamur, sic magis irritantur si crusta admoveatur; sed pinnula illinenda dictis; quorum copiam apud Aetium, Paulum, Galenum invenies. Crustas egregie tollit (Aëtio teste) caninum crementum melle illinitum, ustarum hirundinum cinis, centaureæ minoris ustæ cinis, quibus nostram mulierem a serpentibus, crustosis ulceribus curavimus, vel crocodili tritum inspersum, vel cum melle illinitum; etiam lac gargarisatur, ne longius serpæt crustis solutis, anthera remedia seu florida adhibenda. De his vide Aetium, Benedictum Veronensem, qui, refert excrementorum hominis cinerem maderi tonsillis, Pantherarum exemplo quæ cum aconito devorato strangulantur, excrementis humanis liberari traduntur. Hirundinum cinis cum melle egregie valet, et emplastrum est nid hirundinum, quo nos sæpissime felicissimeque usi sumus.

(*Obs. X, lib. VI.*)

De puella nubili sæpe inflammatione tonsillarum, columellæ ac earundem ulceratione correpta, quæ anginam periculossimam incurrebat.

Puella nubilis annos viginti trës nata, cui menstruæ evacuationes nunquam apparuerant, frequentissime inflammationem tonsillarum et columellæ ac earundem ulcerationem incurrebat Tandem vero et anginam passa adeo vehementem, ut suffocata videretur. Ad quam vocati, anno 1561 mense Augusto, columellam non solum quoque inflammata, verum etiam ulceratam invenimus, ut de eadem præcidenda cum chirurgo consilium teneretur. Tonsillæ adeo cum ulceratione excreverant, ut de subitanea suffocatione metus esset. Puella (ut fieri solet) consilio medicastri sequita, gargarismo ex salviæ decocto cum-

lacte ad quatuor dies adhibito, cum eandem suffocationi vicinam inveniremus, spiritum ægre trahentem, de vena malleoli incidenda deliberavimus, ut menses simul evocarentur: sed quia jam quartus dies esset et ex angina suffocatio immineret, a loco magis proximo, nempe cephalicam venam in brachio incidere jussimus, cum alvum ex acuta glande prius deposuisset, sanguine ad uncias quinque extracto, idque sub nocte Mane. in diluculo redeunte, cum paulo melius spirare posset, utrasque tamen venas sub lingua aperire jussimus, adhibitis quoque gargarismis moderate repellentibus et quibus vis quoque discutiendi inerat, cum in principio vocati non essemus ex ros. malva, sem. cydonior. sic. postea adjicientes, sed quia ex ficubus columella laxior fieret, a ficubus abstinuimus, uva relaxata bolo arm. elevata. Sed quia columella postea videbatur ulcerata, lacte cui ros et folia plantag. incocta erat, gargarisato, chirurgus rhodomelite cum stercore canino tonsillas ulceratas penicillo attingebat panno lineo circumvoluto. Extrinseus cataplasma appositum fuit ex hordei farina et fœnugræci polline, foliis malvæ et chamomillæ prius coctis et adjunctis. Cæterum cum his remediis adhuc parum proficeremus, febrisque incresceret alvo, tum satis fluxa, et ipsa ægra intra septem dies parum cibi cepit, cum tamen vires adhuc satis valerent, saphenam incidere instituimus usque ad uncias fere sex, qua sectione non solum a febre liberata est, sed et ulcera tonsillarum solo gargarismo et lacte cum melle adjuncto recte curata sunt.

Scholia.

Tantum hic profuit sanguinis missio ex talo, ut, reliquis medicamentis non satis juvantibus, a strangulatione imminente tonsillis ulceratis curata fuerit, quibus virginibus ex Aetio diximus obnoxias esse ante tempus mensium vel eo tempore cum erupere debeant. In fine nos commode lacte, vel melle pro gargarismo usi sumus, Aetius cohibito jam ulcere pascente lacte samia terra permixta gargarisare jubet. Oportet autem in ulceribus repurgandi explanandique. Valde sollicitum esse non tantum in adultis sed etiam in faucibus, qui aliquando sunt passi convulsionem, in ulcerum repugatione: aliqui via transglutienti exsiccata, deglutire non possunt. Aetius puellam monet post

quadragesimum diem consumptam esse, quum se jam a morbo recolligeret; aliquiusque ad septimum diem, plurimi periclitantur. At nostro tempore ex *lue Gallica* hæc ulcera multo maligniora evadunt, de quibus suo loco scribitur.

De ingenti gutturis apostemate interno.

Vir qui portas conficiebat Alcmariæ, annos 36, complens hyeme, cum fluxionem ad guttur experiretur, non magni faciens, intus apostema ad magnitudinem ovi auctum circa fauces et epiglottidem obortum, ut, ne minimum quid transglutire posset; et cervisiam si biberet, rursus elatam in palatum per nares fundebat. Octavo autem die a mali initio cum glande acuta alvum exonerasset, cephalica vena secta fuit in cubito; deinde post quatuor horas etiam ex venis linguæ cataplasmas sequens exterius apposita est etiam gargarismo sequenti utens, die subsequenti mane ruptum est apostema, ingenti copia saniei effluente: ꝛ florum meliloti, folior. malvæ, viol. ana m. j. flor. chamomill. p. j. rad. althea mund. ꝛ j. ꝑ nidum unum hirundinum pistentur; adde farinæ hordei, fœnugræci ana p. B. olei amygd. dulc.; butyri recentis, olei liliorum, chamæmelini an. q. s. fiat cataplasma, loco affecto exterius apponatur. Gargarismum vero tale erat: ꝛ rad. althææ ꝛ j. folior. viol. malvæ, plantag. an. m. j. florum meliloti m, ꝑ flor. ros. rub. p. j. seminis lini, fœnug, althææ malvæ ana 3 iij, seminis cydon. 3 j. nidum hirundinis cum plumis incisum. ficuum pinguium numº. 5. j. uvarum, pass. ab. arill. mund p. j. hordei mundati m. j. fiat decoct in aqua communi pro lib. i j. et, exprimantur et colat excipiantur, addendo mellis ros. colati ꝛ ii j. diamori ꝛ ij. misce pro garg. Interea continuo capiebat follicula cassiæ recentis, supra linguam ponendo ac sugendo, donec materia liquescens paulatim sine deglutitione in gulam descenderet. Hoc enim modo habebam et maturationem et levitationem suavemque resolutionem et doloris sedationem et erat quasi nutrimentum loco cibi et potus cum neque bibere aut deglutire æger aliud posset antequam apostema ruptum esset, et sanies copiose effluxa, pro ulceris abstertione aqua mellis gargarisata; deinde pro mitigatione lacte tepido, ultimo vero ad conglutinationem cum decocto plantaginis majore

ris et arnoglossæ, consolidæ minoris, et tandem cum nostro honore, nutu Dei probe convaluit.

(*Lib. XV, obs. XII.*)

De synanche cum erysipellate phlegmonoso in facie.

Pistor quidam AleMariæ anno 1552, in hyeme, mense Februario, subito inflammatione faucium interna (quam synanchem vocamus) correptus, strangulationem fere incurrebat; simul cum erysipellate phlegmonoso totam faciem occupante. Hic autem in via butyracea cum decumberet et pæne suffocationi vicinus esset, neque in principio medicum admisisset, cum strangulationem præsentiret, me vocat, statim secta vena cephalica et eodem die etiam venis sub lingua; et cum jam initium præteriiisset, et status morbi immineret, gargarisma magis resolvens quam repellens prescripsimus; et gutturi cataplasma admovimus ex farina hordei mucilag. alth., lini et oleo lilior. et amygd. dulc. factum, foliisque viol. et malvæ. Topica erysipelati phlegmonoso in facie existenti non apposuimus, neque quicquam quod intro repellere posset; imo, naturæ id reliquimus, cum recte dixerit Hippocrates, ab angina habita rubor in pectore, bonum: ita et in facie non minus bonum fuit. Quarto die potuit deglutire; exhibitum est serum lactis cum cassiæ 3 v. j. et catholici 3 ij. alvo satis soluta sed quia facies adhuc phlegmonosa permanebat, quinto die concurbitulæ cum scarificatione affixæ sunt: et sexto diacatholici 3 j. diag. gr. j. cum sero lactis imbibita: et septimo die gutta rosacea sedari cæpit ac minui; et sanitati restitutus fuit.

(*Obs. XX, lib. XV.*)

De parasynanche.

Colonus in pago Poeldikio dicto, annum quinquagesimum agens, parasynanche, id est, faucium inflammatione externa laborabat. Ad quem cum secundo die prius accessitus essem, non sine febre erat, doloremque ingentem patiebatur cum colli tumore externo versus maxillam procedente cum ingenti faciei rubore, adeo ut nec cibum nec potum deglutire posset. Ut enim cum eodem die alvum deposuisset, neque os ob tumorem bene

aperire posset, vena cephalica illi secta fuit in brachio dextro, cum in dextra parte tumor eundem affligebat. Loquela quoque erat impedita. Hoc gargarismo etiam usus est ꝛ aquæ plantag. lib. j. S. y. i. granat., diamori ana, ꝛ j, mellis ros. ß misce : altero die, cum non bene loqueretur; quamquam os nunc aperire poterat, ita ut venæ sub lingua sectæ fuerint. Deinde gargarismo dicto addito hyssopo et glycyrr. et melle ros. solo, et exterius cataplasmate imposito ex rad. altheæ, flor, meliloti, chamomillo folior. malvæ cum farina lini et butyro, per modum resolutionis et ita curatus est.

Scholia.

Arabum sectatores et qui supra Rhazem commentati sunt, anginam quamcunque, quæ per resolutionem terminatur, quinque intentionibus curant : optima victus ratione, tum vitæ institutione. Deinde divertunt humorem fluentem ad locum apostematis vel inflammatum. Tertio leniter reperiunt. Quarto digerunt, si possunt. Quinto eradicative evacuant. Quibus nonnulli sextam addunt nempe resolutionem. Alii ad duo tantum fundamenta hæc referunt, ut augmentum fluxum inhibeant, et quod fluxum est remoneant. Quod si angina terminetur per viam collectionis, ad saniem scilicet vel suppurationem quatuor alias intentiones adjiciunt : maturationem, ruptionem, abstertionem, consolidationem : ut postea exemplis docebitur. Rursus quidam communem curationem (ut antea ostendimus) ad tres partes inducunt, nempe victus rationem, materiæ evacuationem diversionemque, fluxus inhibitionem : particularem vero, ut diximus ad topica remedia tam intra quam extra adhibita. Rursus non desunt qui ad triplicem scopum hæc referunt ; in evacuationem, fluxus inhibitionem, diversionem. Secundo debetur causæ conjunctæ hæc particularis curatio dicta. Atque hæc denuo tres intentiones in re complectitur : primo reperiuntia, discutientia; secundo, tertio resolventia si per resolutionem terminetur. Alioqui succedit maturatio, quæ, quatuor intentiones in se complectebatur, ut paulo ante meminimus. Tertius autem scopus utriusque, causæ antecedenti conjuncta communis est. Atque hæc iterum duas intentiones habet, ut accidentium correctionem, regimen vitæ. De his vide

Gatenariam, Gradum, Arculanum quamvis, hæc ipsa ex iis quæ dudum diximus, per se nota sint.

(Obs. XXI.)

De angina admodum periculosa in prægnante, in qua musculi gutturis interiores et exteriores simul inflammati erant.

Scribit Hippocrates mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale esse, lib. 5. aph. 30, præcipue vero, teste Galeno in Commento, si cum febre sit morbus, necesse est ut et ipsa sit continua. Idem Hippocrates refert lib. eodem aph. 31, mulierem, utero gerente, sanguine misso ex vena, abortiri, et magis si foetus sit major. Experientia tamen quotidiana experti sumus, utrumque non semper veritatem habere, quod neque talis morbus acutus in prægnantibus semper sit lethalis, et quod non semper abortiat grvida sanguine misso; ut exemplis etiam, cum de febribus ageremus, ostendimus. Ita et nunc novimus mulierem, quæ annum trigesimum sextum agebat, in sexto mense prægnantem; ad quam anno 1562, in pago cui Sylva nomen erat, prope Delphos, decumbentem gravissima angina, in qua musculi gutturis interiores et exteriores inflammati erant, adeo ut pæne suffocaretur, accessiti fuimus cum jam secundus dies ageretur, quo fauces præoccluderentur ob insignem tumorem, qui in parte dextra colli durus hærebat, superius etiam fauces occupans, et intus tum guttur, tum fauces simul comprehendens, cum febre continua et capitis insigni dolore vix spiritum trahens, gulamque præoccludens, ut neque potum neque cibum quantumvis mollissimum deglutire posset. Cum nocte præcedente alvum per se dejecisset, et vena secta esset, quatuor unciiis sanguinis emissis, ne animi deliquium sequeretur in prægnante, deinde gargarismis aptis, sicut tempus morbi suadebat, adhibitis; et inunctionibus in collo peractis, tum emplastris commode impositis, et cataplasmate conveniente collo admoto, et venis etiam sub lingua sectis, tertio die tumor qui intus latebat parum detumuit, ut deglutire potum potuerit. Rursus cataplasmate discutiente et parum emolliente etiam adjuncto nido hircundinis, post meridiem spectavimus tumorem magis ad exteriora

vergere et cum iterum admoto emplastro conveniente (cum melius transglutire posset) mane j ℥. cum aquæ scabios. ʒ ij. in nocte sumpsisset, ter alvum deposuit; et quarto die post alvi subductionem melius alimenta liquidiora sumere poterat et cum aliquo modo tussiret. syrup. viol etliquiritiæ, adjecto zacch. penid. lambebat; etiam cataplasmate adhibito, per resolutionem curata fuit in septimo; febre quoque eam relinquente, cum ab adstantibus pro depiorata habita fuisset, sanitati reddita est.

Scholia.

... Id evenit Benivenio in quodam Alexandro Serraiio; cui neque rubor neque tumor ullus intus in gula aut extra ostendebatur..... Memini ego similiter cum in Italia studii causa agerem, viros doctissimos in consultationem vocatos, qui de nobili juvene angina laborante penitus desperarent, cum abcessus intus in gutture lateret (qui nequaquam scalpello attingi poterat) prius æger succumberet, quam intus maturus rumpi posset; quod se vero per se rumperetur, spem curandi superesse, quod æger quidem jam audierat usque discedentibus, famulum ad se vocat et laqueum trahi in lecto sedens injici jubet, atque manu per funem se lenans, altera vero manu, digito in guttur immisso, abcessum vi perrupit, et revocatis medicis, qui adhuc in vicinia erant, dicebat ruptum esse abcessum, si quid consilii superesset ad curationem, eandem statim adhiberent, quare adhibitis detergentibus et deinde consolidantibus, ex inspirato ad cupitam sanitatem hoc modo pervenit. Non solum gutturis seu laryngis et faucium atque laryngis inflammationes sed et tonsillarum quandoque adeo magnæ sunt, ut gutture occluso (utraque videlicet tonsilla affecta vel gutture ipso aut faucibus) nec potus nec cibus transmitti queat vel non absquæ summa difficultate, ut et Dodonæus supra illud exemplum observationis Benevinii annotat. Tumores vero quandoque ita augentur, præsertim ad suppurationem vergentibus inflammationibus, ut ore hiare nequente dentes coherent, ac strangulationis passionum immineat. Abcessus vero rupto, copiosioreque erumpente pure (ut et sequens exemplum ostendet) solutio sit, et ore patulo, et gutturis quoque meatus patet.

(Obs. XXII.)

De angina periculosa per suppurationem finiente.

Dictum est prius, quod angina sit periculosa, si post febrem fiat uti aliquando evenit mulieri cuidam Delphensi quinquagenariæ, quæ in domo, insigne malum habente, decumbebat. Ad quam cum ingressi essemus, atque inflammationem ingentem intus in gutture haberet, quæ et tonsillas ac uvulam occuparet, facta venæ sectione ex cephalica in brachio et lingua, et electuario lenitivo cum decocto communi sumpto, gargarismata apta nihil juvarunt, cum ad suppurationem malum tenderet quod ex signis præsentibus animadvertimus (nam post quartum diem dolor, qui plurimum ægram afflixerat, sedabatur) cum enim ex toto maturatur, fervor mitigatur ac dolor mollitur; cum enim remissiora sunt symptomata et perstant ultra quartum diem, tunc maturatio plerumque est expectanda, (hoc in materia admista pituitæ sæpe evenit, præcipue si in externis communicet); nam et hæc tumorem quoque exteriorem experiebatur, etiam intus ad abcessum tendentem. Et tunc amplius cum dissolventibus contendere non oportet, sed cum concoquentibus et mitigantibus; quæ tamen ab astringente aliquo prorsus non absolvantur et sic gargarismate usi sumus ex decocto ficuum, cum spica, croco et melle, et fœnugræci et althææ, rosisque in exigua quantitate admistis. Similiter emplastrum sequens maturativum nonnihil et rumpens extrinsecus admovimus: \mathcal{R} rad. althææ mundatæ \mathfrak{z} ij. rad. lilior. \mathfrak{z} j. ficuum pinguium num. V. folior malvæ m. ij. flor. meliloti, chamomill. ana p. j. coctis et contusis adde nidum hirundinis, farinæ hordei m \mathfrak{ss} . olei chamomill. amygd. dule., butyri recentis ana q. s. fiat ad modum emplastri. Eo vix ad horam collo imposito et maxillæ usque ad aurem, intus ruptum est apostema: deinde solo abstersorio gargarismo utens convaluit.

Scholia.

Si angina ad suppurationem tendat, tunc quatuor intentiones curandi (ut paulo antea diximus) resultant: nempe maturatio, ruptio, abstersio, et consolidatio. In calida angina, concoquit, maturat, et in pus vertit gargarisma ex decocto seminis malvæ, passular. myxis, viol. rad. dul. hordei mund. addita sapa. Em-

plastrum ex rad. althææ, lilior. alborum aqua coctorum, addita axungia et butyro; etiam succus fructus siliquæ Ægyptiæ illinitus. In frigida decoct. hyssopi, ficuum, mucilag., sem. malvæ, caulium, ficuum et butyri recentis cum decocto glycyrr, ad formam lambitivi vel gargarismi. Alii extrinsecus applicant emplastrum ex cæpa alba vel porro cum sæpa vel butyro, ex rad. ireos, althææ, caricis pinguibus, cum farina frumenti, lini, fœnugræci et axungia porcina, oleo liliorum, et similibus. Aliud maturans et aperiens: ficus aridas, cum aqua discoquitas, et conteritas; addendo farinam fœnugræci et fermentum molle: vel cæpam sub cinere tostam et tritam cum melle admisto emollit, maturat ac dissolvit. Dolorem sedant, maturant et aperiunt decoctum fœnugræci cum palmulis et fœnugræco vel cum mulsa. Facta maturatione, secunda succedit intentio, scilicet apostematis, ruptio: quæ modo cum medicamentis, modo aliis ingeniis, modo manu chirurgica perficitur. Maturantibus itaque addimus aliqua acria, ut hircinis excrementa, vel cinerem, aut lupinum stercus vel caninum. Radix lili. galbanum, pix liquida, abcessus rumpunt et facile maturant: fermentum quoque foris rumpit cum sale et oleo. Jam quoque plurimum ad ruptionem, vociferatio et fortis motus gutturis in transglutiendo, dura masticando, ac ea ipsa violenter transglutiendo, ut crustam panis: hæc enim sæpe contulisse compertum est. Quidam, ut empirici, si neque hæc innerint, candela cerea impingunt et rumpunt: oportet autem eam in gutture demittere et abcessum dirumpere. Uti fecit Amatus in Græco. quodam angina laborante tentandi causa: cum ceream candelam immisisset per os, repente pus effluere cœpit per os, et æger a tam sævo morbo liberatus est, cum medici eundem pro deplorato et strangulato reliquerint. Alii hiant ore linguam deprimunt, cultrum ligneum acutum ingerunt (si abscessum attingere possunt) in guttur, et tumorem dirumpunt, vel scalpello aperiunt: deinde prono capite saniem expurgant. Non desunt, qui ubi tumorem in faucibus conspiciunt cum unguibus, aut ferro aperiunt. Quidam etiam si in tonsillis sint, unguibus propriis dilacerant tuniculam; et pus effluit. Alii spongiæ partem ad magnitudinem avellanæ suspendunt filo, et ita ab ægro devorari jubent. Intumescit spongia atque dum vi

retrahitur, tumorem rumpit. Hoc alii bolo carnis salsæ semi coctæ ita suspenso et devorato, tum vi retracto, moliuntur. Hæc tamen omnia cum cautione facienda : memini enim quendam tonsorem sed temerarium, cui specillum (tentam vocant) immissum in guttur mulieris e manu sua elapsum per gulam in stomachum decidit; quæ postea multis annis tabida facta obiit : de qua aliquando dicemus, cum de ventriculi malis loquemur. Avenzoar antiquissimus medicus lib. I. suo Theisir cap. 13 et 14 ferro quomodo incidantur, se in capra experimentum fecisse commemorat. Sed hoc opus in desperatis anginis ex Antyllo docet Paulus cap. 33. Et Alexander Veronensis inquit : quidam in conclamata strangulatione, arduo remedio usus est; nam trachææ inter annulum et annulum sub epiglottide dissecuit membranam, et respirandi modum invenit ægrotanti; donec sedata synanche, consuto vulnere, arteria persanaretur. Talis arteriæ incisio postremum in desperatis remedium est, quod etiam veterum inventum fuit; ætate nostra, quod sciam, factum non est; Jacchinus tamen citra periculum fieri ait : alii vero temerariam eam curationem prædicant. Aperto vulnere caput ægrum inclinandum est, ne sanguis in pulmones demissus coaguletur. Ora vulneris aceto et aqua colluenda; at exinde chalcantho profluvio sanguinis occurimus : demum ulcus percurandum est, sicut reliqua oris ulcera mulsæ et cadmiæ ut, Galenus placet : quoniam ad cicatricem perducit; sicut et lapis Phrygius ustus et lotus et tritus imponitur cum melle. Sic Nicolaus Rota à Benivenio, cum ad mortem tenderet ex angina curatus fuit « Cum inquit intellexissem medicos quæcumque oportuna fuerant præsidia adhibuisse, cœpi ipse mecum cogitare satiusne esset ægrum ipsum Deo et Naturæ, ut cæteri medici incuratum dimittere, an aliquod licet insolitum, utile tamen auxilium experiri. Verum adhortantibus his qui ægro assistebant, consilium capio, et locum altius sub ipsis maxillis, ac etiam supra collum incido : ex quo cum sanies multa pro rumperet, adeo morbus levatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul et cibum capientibus, facilis dein ad bonam valetudinem ægro ipsi daretur regressio. Si autem per se rumpatur apostema vel abcessus, commodius scalpello aperiatur; æger capite pronus etiam situandus est, ut aperto ore et capite deorsum inclinato pus commode, tum sanies egredi possit; imo subinde et æger ipse

aut medicus digito vel instrumento obtuso comprimat locum abcessus, ut sanies effluat per os, nec in gulam aut pectus dilabitur. Deinde succedit tertia intentio, repurgandi et ulcus detergendi cum aqua mellis vel zacchari; veteres mulsa detergebant, alii hordei decocto cum melle. Quæ et sequitur ultima intentio consolidandi cum linctu ex bolo armeno et syrupo ros, vel melle gargarism & aquæ decoct. ros rubear. gallar., myrtill lib. j. thuris. sanguinis draconis, sarcocollæ ana 3 ℥ syrup. ros. ex ros. siccis 3 j. misce, fiat levis-gargarisatio; pulverem nonnulli addunt pilorum leporis combustorum et pulverisatorum 3 j. misce.

(Obs. XXXIII.)

Num in omni angina vena sit secanda.

Explicanda sese offert celebris controversia: num in omni angina vena sit secanda. *Avicenna* enim (9. 3. tract. I C II) in quadam specie anginæ orta ex pituita a cerebro descendente supra amygdalas, et ad partes faucium, et colatorii, evitandam docet venæ sectionem ante declinationem, quoniam (ut ipse inquit) plus de pituita influit, et hominem suffocat. Et licet *Gentilis* et *Joannus Costæus* ad hunc locum, *Avicennam* explanare conentur, afferentes; ipsum intelligendum esse, quum non ex sanguine calido, aut tenui humore ortum ducit, vel cum virtus invalida est, vel pituitosi, crassique sanguinis copia redundat; quo casu vena non est secanda, nisi postquam ægritudo principium, statumque præterierit, et humor experitur coctionem; tamen non est bona solutio hæc. Nam in hac acuta inflammatione, licet sit suborta ab alio humore alieno a natura sanguinis; sanguinem mittendum esse illico, monuit *Hippocrates* (lib. 4 acut. 30), quam vacationem, virtute non ita constante, partientdam esse docuere prisci, quæ in hoc morbo magis est optanda. Coctio autem in sanguine expectanda, quando morbus venosum genus affligit non tamen in acuta inflammatione, quæ celerem expostulat vacationem. Nam, ut scite, docuit *Haly Abbas* (6 pract c. 12) in hoc morbo illico ad cephalicæ sectionem accedere oportet, licet is a quacunque causa fuerit subortus; quoniam auctores inceperunt ab evacuatione, non expectantes digestionem, ut affirmat *Nicolaus* (sermo 4 tract. 1 C 2 de cura apostematum

gutturis). Quam sententiam amplectuntur *Valleriola* (2. obs. 14) *Dionysius Daza* (lib. 3 de apostem. cap. 120), *Massaria* et *Joa-chinus* (cap. angina). Si tamen in pituitosa, aut biliosa angina, eam *Mesue*, et *Rufus*, *Gattinariaque* non exercent, quod hi humores seligenti pharmaco sint educendi, de multa, et iterata venæ sectione sunt intelligendi.

In omni ergo angina mox est detrahendus sanguis, quum sit inflammatio urgens, cui ni succuras, subitum suffocationis periculum imminet, neque morbi expectanda declinatio est. *Avicennæ* sententia suspecta est et vere mendax, sic notante inter omnes Nicolo (serm. 4 tract. 1. cap. 7) quem sequitur *Ludovicus Mercatus* (lib. de morb. intern. cap. 2). Sic enim ait *Avicenna* : « Et decollationis quidem est species quædam existens supra galsamach. Quum ergo fit phlebotomia ante declinationem ægritudinis, descendit ad locum præfocatum. ».

(*Lib. XI, obs. XV, p. 370.*)

Num jugularium venarum sectio sit celebranda.

Jugulares venas a Celso (lib. V cap. 1) phagitidas dictas, ab aliis apoplecticis, pensiles, spermaticas, somniferas, juveniles, organicas, atque carotidas noncupatas, in suffocante angina esse secandas, antiquorum peritissimi docuerunt. *Galenus* enim (lib. de anat. vivorum. tit. de anatom. venar. in principio fortis anginae secandas esse sibi persuasit. Firmant *Rhazis* (ad Almanzorem 5), *Avicenna* (4. I. cap. 20). At hoc data urgentissima necessitate exequendum esse auxilium, quum strangulationis periculum imminet. Tantus enim ex his venis evenire solet sanguinis fluxus, ut vix sisti possit. Quare *Albucasis* (lib. 2 cap. 43) *laryngotomiam* minime esse periculosam ancillæ testimonio ostendit, modo venis pareatur jugularibus, in quarum sectione adeo cauti, et timorosi Medici fuerunt, ut vix reperias ullum, qui ad earum sectionem nisi summa necessitate impulsus accedat.

Cur autem ex harum sectione inseparabilis sequatur sanguinis fluxus, ea est causa, quod hæ venæ, auctore Galeno (lib. 2. de natur. humor. 6) maximæ sint, et non ita possint conglutinari, labia invicem a se distantia, et sic harum venarum vulnera

difficilem coctionem admittunt. Quapropter *Avicenna* (cap. 20.4.1) omnes venas jubet phlebotomare transverse, exceptis his, quarum sectio secundum rectitudinem fieri debet; sic enim melius consolidantur. Nam alias, ut advertunt *Dinus*, et *Antonius Maria Bettus* in *comment.* non coëunt, quoniam ob motum colli coitionem impediens, difficulter consolidantur; et sic largus sequitur, qui vix conspici potest, sanguinis fluxus, et maxime cum vulnus apte ligari non possit, et si ligatur, suffocationis periculum ex tempore imminet. Hæc sunt quæ harum venarum sectionem impediunt. Addit *Petrus Vascus Castellus* (tract. 1 de affect. thorac. cap. 7. de anginarum difficultate 9) plura alia, quæ hujus auxilii usum omnino renuere videntur. Primo, quoniam *Hippocrates* de hoc præsidio nec verbum quidem protulerit, et quod non inveniatur chirurgus, qui has venas ob ignorantiam scindere ausit, et maxime quum non celebretur nisi in casu desperato, in quo nihil medico moliri decet, cum ægersolis præsagiis sit relinquendus.

Verum futilia sunt hæc, et plane nulla, cum secandi has venas, timorem arguant solum, quo ducti veteres non nisi necessitate extrema coacti, ad earum sectionem accedebant, quod difficulter coire posse arbitrarentur, quare in gravissimis ægitudinibus earum scissionem summopere approbarunt....

Hæc vero venæ si secentur angusta plaga, neque multum alte penetrante, et desuper medicamentum, fluxum sanguinis reprimens imponatur, *tuto secari possunt*, ut scite, advertit *Rondeletius* (in meth. curand. morb. obs. ad cap. de apoplexia)....

Hispanus quidam cum angina canina in horas strangulari videretur, et omnia universalialia, et localia ad venam sectam, scarificatas in collo cucurbitulas, aëria clysteria, essent celebrata auxilia, et ipse nigricante facie velut emortuus jaceret, peritissimi medici, jugulares secandas imperarunt. Aduit chirurgus secandi arte dextrissimus. Illas, sanguine ad caput ruente, vaporibusque multis impletas, turgentes et conspicuas resecurit; irreparabili sequito sanguinis fluxu, ægroque lapso in omnimodam virium jacturam, spes salutis obest, nullusque videtur remedio locus, quum de eo, ob violentem sanguinis fluxum, jam desparent omnes. Neque pro hoc sistendo inventum fuit quod opitularetur auxilium. Vocatus emplastrum galenicum

superimpono, colloque commode ligato, ægrum jam exhaustum refocillo, qui post horas respirare, et loqui cæpit aperto ore, et immunis ab angina deinceps sanissime vixit.

(*Lib. XV.*)

ZACUTUS LUSITANUS

De angina.

Angina canina cucurbitula sub mento scarificata curatur.

Præfocativum malum faciens necessarium, ut sit assiduatio apertionis oris, et projectionis linguæ et nominatur caninum..... Dicebat *Avicenna* (9. 3. tract. I, cap. 8) quoniam ægri suffocati, et veluti strangulati, ut aërem attrahant, exertam habent linguam, canum instar, qui, ardente Sirio, ad captandum frigidiusculum aërem, eam extra os prominentem habent. Hæc licet apud Hip. lib. 3. prog. 8 celerrime interimat, ut proprio exemplo firmavit expertissimus *Dodonæus* lib. exemplor. medicinal. 18. Ab hoc tamen raro evasio fit. Illa cum fœmina quædam nullo apparente tumore graviter corripereetur, claviculatos ex intervallis dentes habens, et magna cum violentia respirans, ita ut in horas strangulari videretur, et neque cephalicæ, aut venarum sub lingua sectio, in occipite scarificatæ cucurbitæ, acria clysteria illi opem ferre possent, tandem eodem die quo omnia ob procrastinationis periculum acta sunt, sub mento scarificata cucurbita summo fuit auxilio, et assumptis deinde syrupis, excretaque per sputum pituita crassa, et multa altero die melius habuit.

(De praxi medic., lib. I, obs. XCIV.)

Angina præfocativa intra quatuor horas interficiens.

Præfocationem caninam quandoque interficere, intra primum diem, et quartum, tradidit *Avicenna* (9. 3. tract. 1. cap. 3). Attamen cito suffocatione prehenses occumbere, auctorum testimoniis rarum est, firmatque *Trallianus* (lib. 4. cap. tit. de sanguin. mis.): Æger circa meridiem de gutturi inflammatione conqueri cæpit. Nullus tumor in faucibus apparuit. Dolor aderat internus et respirandi difficultas summa. Cibus, ac potus assumptus illico per os, et nares rejectus. Præcesserat vehemens, copiosaque humorum e capite distillatio. Nulla pro temporis angus-

tiis remedia celebrata profuere, immo sana mente, integrisque sensibus intra quatuor horas febre validissima pressus occubuit.

(*De praxi medica, lib. I, obs. XCVI.*)

Ab angina annua quidam aperto fonticulo sub lingua, præservatur.

Quantam utilitatem præstat sectio venarum sub lingua a veteribus tantopere celebrata, hoc exemplo fuit manifestum. Adolescens frigido et humido totius et capitis temperamento præditus, ex distillatione capitis, a multis annis adventante vere, liquata forte pituita, et fluxione reddita, in anginam fortissimam incidebat, a qua, pluribus celebratis auxiliis, difficulter evadebat. Cum autem nec vacuantibus auxiliis, sudorificis præsidiis, cerebrum roborantibus, et fontanellis brachiis affixis, a tanto malo præservari non posset, natura, quæ de utilitate animantis semper est sollicita, eum ab illo malo liberavit, aperto foramine sub radice linguæ in parte sinistra, per quod cum singulis annis rivuli perennes aquosi humoris, quatuor diebus in fine mensis, tempore statuto effluerent, ab angina omnino in posterum est præservatus.

(*Obs. XCVII, praxis.*)

PLATTER

Suffocationis a catarrho ad fauces labente periculum.

Quod subitam illam difficultatem spirandi et angustiam circa fauces et suffocationis periculum attinet, quem catharrum suffocantem vocare solent non ad pulmonem sed fauces delabentem, suasi cuidam. an. 1594. nov. ut venam semel in anno aperiret, veris tempore et ut scarificatione uteretur in scapulis ter vel quater in anno pedes item frequenter noctu cubitum iturus, calido hoc decocto foveret, vel in illud imponeret. Quod ex lixivio in quo salvia et chamomilla decocta sunt, paratur.

Purgabat corpus, bis in anno, pilulis *sine quibus esse volo* appellatis, ad 9 ij sumendo, circa mediam noctem, et si bene et citra molestiam operantur, possunt singulis mensibus sumi.

In ipso paroxysmo, utile est aqua quæ fit ex aqua vitæ bene preparata, cui saccharum candidum tanta quantitate, ut parum dulcescat additum sit, et parum aquæ cinamomi, cum pauca aqua rosarum. Et cochleare unum vel duo mox sumat ac postea lac caprinum tepidum, in quo Aizoon majus (*grosse hauszwurtz*) decoctum sit, et radix althææ in ore et faucibus contineret.

Extrinsecus collo commode circumdaretur lana nigra succida, oleo liliorum inuncta, calefacta, panno cannabeo involuta; vel si perseveret malum, poterit tale emplastrum collo circumdari:

℞ Nidi hirund ʒ VI. pulverisetur et coquatur in vino albo, addendo pulveris baccarum lauri ʒ j mellis ʒ j, liliorum ʒ iij fiat instar emplastri. Quod supra parvum extensum, tepide collo circumdetur. Hæc plurimum profitentur is factis Deo juvante, me sperare dixi. (*In respirationis defectus lib. I, p. 172.*)

In transitu per gulam defectus.

Figulus meus, jam per quinquenium hac deglutitionis difficultate laboravit, cibos solidiores, vel liquidiores, aut potum deglutiturus, quæ nisi paulatim et parva quantitate assumpta, in ventriculum minime descenderunt, sed supra illum, circa cordis

regionem, ut vocant, substiterunt, illicque angorem et compressionis sensum pepererunt, tamdiu donec supinus dorso incubit, tunc enim cum sono quodam, ea quæ illi hærebant, in ventriculum illapsa sunt. Hic tandem sperans se aquarum acidarum naturalium usu sanari posse, eo profectus iisque usus, illic vitam finivit. (Id.)

In alio.

Scriniarius quidam, vir robustus, a mensibus aliquot, quotiescunque carnem aut panem deglutire vult, mox sentit in ventriculi elatiore regione, magnam compressionem, quæ eum ad vomitu assumpta, iterum rejicienda adigit, si vero quandoque in ventriculum hæc illabantur, statim levamen sentit, flatusque; tunc per rectum erumpunt. Idem illi si affatim bibat, accidit, ut et potus subsistat in œsophago, donec per vomitum rursum ejiciatur maximeque hoc si prius aliquid solidi deglutierit et superbibat, evenit ut simul retenta, magnam illi molestiam pariant, donec omnia evomuerit.

In me ipso.

Aliquoties hoc mihi in hac mea senectudine accidit, carnem tenaciorem, aut duriorem, vel minus incisam, aut masticatam deglutienti, ut illa in œsophagi ingressu in ventriculum subsistens, angustiam summam et compressionem eo in loco mihi pariat, quæ augetur, si superbibendo, bolum hærentem promovere velim, adeo ut lipothymia superveniat, nisi tussis quæ tunc maxime urget, concutiendo, ut in ventriculum labatur efficiat, neque enim vomitus hactenus, sed ructus tantum subsequuti sunt, tunc maxime quando bolus cedens, flatibus a ventriculo erumpentibus locum facit. Hæc semel aut bis, terve in anno, mihi, et tantum quando incogitanter crassiora devoro, a sex vel septem annis, acciderunt.

In muliere.

Capitanei cujusdam uxor, a multis annis, non nisi minuta et liquida, eaque non sine magno labore, deglutire potuit. Melancholica alioquin, quæ sibi a veneno assumpto, hoc uti et alia

multa, de quibus ad mortem usque conquesta est, accidisse persuasit.

In gravida.

Gravida quædam aurificis uxor, multos menses, simile in deglutiendo impedimentum passa fuit, ut fere nihil deglutire posset, sicque tandem expiravit.

Deglutitionis impedimentum cum assami loquela.

Mulier vetula in hospitali subito loquelam amisit, adeo ut verba nulla proferre posset; accedebat in deglutiendo summa difficultas, sic ut non nisi juscula, vel lac eaque minima quantitate et guttatim, cum labore deglutiret quæ quandoque in asperam arteriam prolapsa, tussim movebant, sicque; per septimanas aliquot fuit sustentata. Nervorum sextæ et septimæ conjug. vitio hoc accedissee verisimile. Ad se reddiit, colluendo os frequenter, decocto salviæ in vino, et continendo in ore aquam vitæ infus. thymi.

Transglutiendi difficultas in alio.

Toto anni spatio, et amplius, cuidam Lucernæ an. 1599 cibos paulo solidiores deglutienti; in media via uti dicebat, hi subsistebant, eumque tamdiu angebant, donec superbibendo, eos deorsum propelleret, alioquin sonus, et nullum alium affectum sentiens.

Perquirendo singula, an callus œsophago ex inflammatione abcessu, ulcereve prægressis, accrevisset, vel alias ob causas, gula humiliore sede strictior facta esset, postremam hanc causam esse dubitans, cum similem casum sæpe viderim, sequentia illi ordinavi linctum hunc.

℥ olei. amygd. dulc. rec.
butyri iij.
mucil. seminis lini ij.
extract. cum. aq. violæ ij.
medul. sem. cucurbitæ j.
sem. Melonium ana ʒj.

Misceantur, fiat instar looch, cap. cochl. j. cubitum iturus et mane alterum sensim deglutiendo sæpe repetendo medicamentum ne rancidum fiat.

: Bibat item frequenter lac caprinum, cui butyri recentis et penid. portio aliqua permixta sit. Jungat latera colli, ol. amygd. butyro rec. et axungia gallinæ.

Dentium dolor, cum tumore aquoso, sub lingua et in faucibus.

Illustris quidam Dominus, qui ante biennium atheroma sub mento passus erat, et a me curatus, obnoxius ejusmodi oris, faucium et colli affectibus, quibus et jam sæpe, et ante hyemen anni præcedentis, quoque vexatus fuit, nunc denuo hoc anno in canicularibus, eosdem affectus per duos continuos menses patiebatur, delorem scilicet dentium molarium, et maxillæ, ita ut os vix aperire posset, difficultatem itam deglutiendi, tumorem in faucibus et dolorem, præsertim exsecraturus, urgentem. Vesica etiam sub lingua suborta erat, sicuti prius quoque illi acciderat et metuebatur tumor sub mento, ne denuo rediret. Multum autem pituitæ insipidæ expuebat inde sinenter, nunc tenuis nunc viscidæ; accedebat calor aliquis totius corporis præternaturalis, nondum tamen febris. Urinæ subroseæ non nihî non tam horum affectuum causa quam quod ad obstructions hepatis et icterum, cujus principia hoc pullulabant, pronus erat....
(*Lib. II, p. 375.*)

Faucium ulcus palatum exedens collumellamque absumens.

Cuidam in palati tunica crassa posteriore, narium amplitudinem respiciente, juxta uvulam, ulcus obortum, ex defluxione uti aiebat, spatio temporis adeo invaluit, ut magna illius portione absumpta, uvula simul penderetur unde vocem nonnihil raucam edebat, potusque quandoque in deglutitione per narium amplitudinem ascendens, effundebatur.

Licet multa tentasse remedia topica et generales purgationes sæpe repetitas, et sudores, usu decocti gaiaci, nihilominus tamen exulceratio hæc persistens alterius serpebat, durave-

ratque; tunc eum ad me venit mense April. 1513 per biennium.

Difficilem fore curationem prædicens, nec collumellam amisam reparari posse, curam sic aggressus sum :

: Ut potionem vulnenariam, ex pirolæ, consolidæ, cæterarumque in *Praxi mea* notatarum plantarum decoctarum in vino paratam, per mensis spatium biberet, edocui.

: Liquoreque sequenti, seu aqua viridi exulcerato loco in faucibus cum penicello in ea madefacto, tangeret semel indies; cautione adhibita, ne quid deglutiret et proinde statim postea lacte caprino ustulato cum chalybe os collueret expueretque. In cujus lactis poc. j. mellis e j. alum. isti 3 j. admixta essent.

: Aqua viridis sic parabatur æruginois æris 3 j. alum. 3 b. vitreol. minii. decoquantur in vino albo. 3 iij. aquæ vitæ reponatur ad usum.

: Post illud per dies aliquot usum, colluat sæpe os vino in quo folia ligustri cocta sint.

: Mastiche thus, myrrham, carbonibus ardentibus inspergat, fumumque interdum per acetabulum in os intromittat.

Reversus mense Julio, cum fauces inspicerem, exulceratio nulla amplius conspiciebatur, sed omnia sana, præterquam, quod portio palati, ut et uvula deerant, quæ reparari minime poterat. Ipseque optime contentus.

Ulcus exedens carnem in faucibus.

In faucibus dolorem et ardorem mulier quædam sentiebat et præsertim inter deglutiendum et cum bibebat copiose, pars potus e naribus reddebatur, quod satis diu passa fuit.

Cum fauces inspicerem 20 Aprilis anno 1598, vidi amplo foramine, in latere sinistro juxta gurgulionem, palatum apertum, ulcusque illuc diuturnum exedens ad narium amplitudinem pertingens, per quod inter deglutiendum pars potionis, constrictis faucibus, sursum in nares propellebatur.

Ægre coalescere, sanari tamen ulcus posse prædixi, gargarismo sequente jussi uti.

Agr. plantag. et rosæ 3 iij.

Aceti hydromell. 3 3.

rob mororum cocti 3 iij.

sachar ʒ. iiij
 alum. ij
 vitriol. albi ʒ.

Misceantur, illiusque portionem sumat, eamque cum lacte ovillo, in quo filices igniti extincti fuerint, permisceat, et gargariset in fauces bis in die.

Reversa 30 Aprilis, dicebat se ardorem non amplius sentire, sed adhuc potum interdum per nares erumpere; respondi difficile esse foramen carne implere, contentam esse debere si sanetur ulcus. Denuo itaque hujus rei causa gargarismum hunc præscripsi.

℞ Aquæ fabrorum extinct. ferri nerv. ʒ
 Aqua rosæ ʒ m
 acet hydromel
 rob. morosum ʒ ij
 cera ʒ iiij.
 alum veubel alb 5 āā ʒʒ.

Et ut successive lacte ovillo in quo consolida cocta fuisset etiam fauces abluere jussi.

Sicque, ulceris labiis sanatis in circumferentia, foramenque apertum remansit, incommodum hoc tantum adferens, quod inter bibendum aliquando, uti dictum, portionem illius e naribus effunderet, quod tamen obturando, hoc foramen linteo laneo bibere volens, cavere potuit. Vox quoque rauca aliquique impedita et cava ut vocant permansit.

Eadem hæc sutori cuidam accedissee, aliisque multis, a lue præsertim *venerea*, sicque; curatis impedimenta hæc remansisse observavi.

Angina cum tumore faucium extrinsecus apparente, difficili respiratione et loquela.

Cuidam quadragenario viro crapulæ dedito et a teneris multis morbis inde natis subjecto (inter quos et paralysis cum puer adhuc esset, lateris dextri passus esset) statim a secundis nuptiis defluxus in humeros decidit, quam ut deverteret, suo ipsius consilio stupham ingressus, scarificatione usus est, moxque ad crapulam reversus, die festo quodam bene potus, noctu domum reversus, subito in suffocationis incidit periculum adeo ut non

nisi magno labore et erectus spiritum duceret, deglutire nihil posset, nec vocem nisi submisce profere.

Summa mane 25 junii anno. 1598 vocatus anginam esse cognovi, sed quæ a defluxione potius a capite delapsa, quam sanguinis influxu procederet. In faucibus nihil apparebat, collum affectum et veluti obstructum esse, manu ostendebat; pulsus exiguus, nec febrilis. Et quia admodumangebatur, cucurbitulas utrinque tres scapulis et humero apponere cum flamma jussi et circa meridiem repetere.

Præscripsi dein gargarismum hunc: plant. hysop. prunel. mel. lis rosat. diamoron. dianucum misce pro gargarismata et ut lamberet hunc, syrup. diamoron, syrup. dianucum, syrup. de hysopo et liquiritia. 31 misce.

Sub vespera vena aperta brachium, collumque inunctum cum linimento: ol, Irini et cheiranthi. misce lana succida super applicata.

Et nox valde inquieta fuit et insomnia et mane cum verba melius proferret, dicebat se angustian in colli humiliore sede et pectore sentire, quare et collum et pectus inungere jussi hoc ungento dialtheæ.

Tumere latus dextrum colli cœpit, quod etsi adstantes valde terreret, ego bonum esse signum pronuntiavi; quando os aperiabatur illi, vel linguam deprimebatur statim vomitus urgebat, tenacemque pituitam reddebat. Jussi eum lambere, oxymel squil. de hysop. misce et ut hoc gargarismo uteretur.

Fœces omnino suppressæ ernt, ob quam causam suppositorium introire jussi. Deglutire enim medicamentum non poterat, vixque et nonnisi maximo labore interdum cochl. lactis amygdalini sumebat, quod alioquin tamen reddebat et ex deglutitione admodum postea eructabat, adeo quoque spiritus illi erat interclusus, ut flatus ventris ex conatu illo vehementi propelleretur.

Sub noctem summe debilis erat, ita ut epithem. pulli prescriberem: aqua viol, mellissæ fungi aceti rosa. succi limon.

Tertio die mane pedes manusque frigeant, ita ut plerisque illum animam agere putarent, pulsus tamen constabat, urina rubra nihil loquebatur: nidi hirund. fabarum fœnugræci butyr fiat cataplasma et gargarismum ordinar. dactylorum fiat lin. fœnugr. cass. mellis rosæ et nidi hirundin. colentur. aliquoties utatur....

Melius spirare cœpit, sed deglutitio magna cum molestia procedebat. Tumor in collo augebatur, emplastro semper illic relicto; conquerebatur de capitis quoque dolore et vigiliis: Tempore itaque somni, dedi parvam hanc portionem: syrup pappav. et buglos misce 3 ½ ij.

Quievit illa nocte, aliquoties excitatus et inquietus fuit; mane de dolore capitis et gravedine admodum conquerebatur, spiritum placidius ducebat, angustiam in deglutitione statim supra stomachum sentiebat et ardorem in ventriculo quem a *rupto abcessu* fieri conficiebat, cum jam inter deglutiendum vehementem lancinationem sentiret.

Sub nocte cœpit vehementer inquietus esse, et de cardalgia conqueri, sudore, animo interdum delinquere, in lecto agitari.

Post mediam noctem dormire cœpit, adeo profunde, ut licet adstantes loquerentur, non excitaretur. Mane cum adhuc dormiret, pedes fricare jussi et quia ventriculus laborare cum materia purulenta eo descendente videbatur, jussi eum ungere cum absynth. et mastic. adjunctis.

Sequenti die qui octavus morbi erat deglutiebat melius, iterum sponte binas sedes. Ut ad cibos solidiores transiret, jussi et vinum dilutum bibere.

Quod nec stare incedere posset, mirabatur, et clysteribus acceptum ferebat, ut nostri solent, ego stultam ipsius opinionem reprehendens, ob ebrietatem in hunc morbum eum incidisse dixi, luxurioseque statim, post nuptias vivendo, totoque octiduo nihil cibi solidioris admittendo, morbum hunc lethalem et membrorum debilitatem sibi attraxisse.

Cœpit inde sensim convalescere, purgato ad huc semel corpore, unde copiosissimas sedes habuit, et si diebus aliquot postea adhuc impedimentum inter deglutiendum, sed in dies levius, sentiret, nec dum avide cibos appeteret, quod sibi familiare esse dicebat, nec mirum, cum ex consueta vini continua ingurgitatione, naturam suam mutasset, unde et sanus cum adhuc esset, colorem non vividum habebat.

Angina cum tumore in faucibus, et periculo suffocationis.

Vocatus ad quemdam anno 1596, Junio mens. cui gutturis regio adeo intumuerat, ut ne verbum loqui posset, et fere

sufflocaretur, tumore in faucibus manifeste apparente, cum adhærente tenacissima pituita et lentore.

Statim cucurbitulas cum scarificatione scapulis adhibui.

Gargarismum sequentem suasi: ꝥ syrup. viol, mellis viol. ana. ʒ ℥ diamoron ʒ j. aquarum solani. plantag. an ʒ iiij. aceti, flor. papav. rheas ʒ ij. fiat gargarismum.

Applicui collo sequens cataplasma, in illius ambitu sub mento: ꝥ farinæ hordei, fabarum ana iiij. nidi hirundin. ʒ ij. stercoris canis sicci ʒ j. ℥. mellis ʒ ij, ol. ros. q. s, fiat cataplasma.

Hisce recte factis, melius habere cœpit, et e summo periculo evasit.

In gula dolor ob ossiculo illic hærente.

Scriba quidam, cum in pestillo seu artocrate pullos columbinos, confractis, ut solent prius ipsorum ossibus, coctos comedens. ossiculum simul ex parte deglutiret, illic ubi abruptum fuit acutum œsophago infixum hæsit, unde tantus dolor subortus, ut misere cruciaretur, mox sequente inflammatione, et tumore, qui etiam foris in collo apparebat. Cum variis instrumentis illud detrahere chirurgus studeret, apprehendere tamen cum non esset conspicuum, minime potuit, deorsum propellere longe minus, cum tunc dolor multo exarcebatur. Vocatus jussi eum jusculo et lacte nutrire, crassiora enim deglutire minime poterat; tumori extrinsecus, cum mollis esset, cataplasma maturans apposui, ex quo exactis diebus aliquot maturari et in abcessum converti, quo aperto unam cum pure ossiculum prodidit. Postea sanato ulcere, nihil mali amplius passus est. Accidit hoc annum 1563.

(385.)

In gula dolor, ob numisma deglutitum inhærens.

Infans quem nutrix ulnis gestabat, cum aureum florenum quem manibus versatum, ori incidisset, eum mox, antequam nutrix rursum illum eripere posset, deglutivit, qui in œsophago subsistens, cum nulla ratione inde avelli aut propelli potuerit, cum magno cruciatu eum tandem jugulavit.

Pleuritis cum Angina lethalis.

Senex quidam potationibus assuetus, Jurisconsultus, subrufus, mense Junio anno 1592, cœlo sereno, in pomœrio, juxta arcem suam dormiens capite nudo radiis solaribus exposito, expergesactus, horrore correptus, subsequente calore de dolore punctoriolateris et ardore colli conquerebatur.

Sequenti die, missa urina, cum ex ea et relatis febrem cognoscerem, et pleuritidis et anginae principium metuerem, jussi venam secare, quod ille tamen magno suo malo, quia veris tempore prius jam aperuerat, omisit.

De dolore punctorio præsertim conquestus est; ordinavi julepum: viol. $\frac{3}{4}$ j. β . Rosacei, syr. Ros, simpl. an. $\frac{3}{4}$ j. aquarum buglos. $\frac{3}{4}$ Cardui bened Ceresolii an. $\frac{3}{4}$. Bibat duabus vicibus mane et vesperi. Dein sacculum ex furfure et rosis madefactum in aceto ros. lateri dolenti tepide applicet.

Postea vocatus, cognovi collum inflammatum intrinsecus vehementi ardore peruri, aliaque; anginae indicia, et periculum mox significavi. atque, gargarismum præscripsi: $\frac{1}{2}$ rad. liquiritiæ fol. Lactuæ an, m. j. fl malvæ autumnalis P, j. fiat decoctio diss. syr. viol $\frac{3}{4}$ j. B. syr. de rosis rub. sic. diamoron ana B misce; gargarizet. Item teneat ore tragacanthum.

Unguent. resumptivo collum et thoracem inungat. Cucurbitulas et scarificationem consului, sed renuit et vires protrastæ, pulsus debilis, urina confusa, et principium delirii, mortem præsagiebat, urgere nolui, sed periculum prædixi.

Sequenti die cum vires deficerent: $\frac{1}{2}$ aquam bugloss. $\frac{3}{4}$ j. B. aquæ cinam $\frac{3}{4}$ B. manus Christi $\frac{3}{4}$ ij. julep. viol 3 j. misce. Capiat frequenter.

Epithema cordiale applicetur: $\frac{1}{2}$ aquæ ros. 3 ij aq. bugl. meliss an $\frac{3}{4}$ j. aceti ros. $\frac{3}{4}$ β pul. diamori frig. $\frac{3}{4}$ j misce.

Sed mox agone mortis subsequente, 22 junii die extinctus est.

TULPIUS

Ulcera palati.

Ulcera palati occupant, vel os, vel carnem; priora ut sunt insanabilia; sic curantur ægerrime posteriora. Vidimus id evidentissime, in pistore Alberto : cui amplissimum carnis ulcus, in palato ubi sanasset chirurgus : credidit illico, homo gloriosus, quæcunque palati ulcera etiam cum ossis carie, feliciter sibi cessura. Sed observata, minus distincte, dispari horum ulcerum natura, excidit non semel spe sua; neque tetigit perpetuo ad quem collimabat, scopum.

Quod enim ulcus, in musculis palati sanatur, id manet unmedicabile, in osse.

Nequit tamen, vel carnem inducere, dissitis, ulceris, oris; vel ex vitiato osse, tantum colli, elicere, ut obturaret commode amplum foraminis hiatum. Sed necesse habuit, tandem confugere ad argenteam illam laminam; quam ejuscemodi ulceribus cum adnexa spongia, jubent imponi, quotquot de re chirurgica scripsere auctores. (*Observ. medicæ. Cap. XXXIIV, lib. I.*)

Prolapsus palati.

Hactenus quidem, vel omnino præteribus, vel levi saltem brachio, descriptus fuit, a medicis, prolapsus palati. Vitium tamen non minus grave quam rarum. Cujus origo est, a distillatione humoris, deprimente usque eo, musculos sub finem palati sitos : ut præ pondere prolapsi præcludent viam spiritui, tum per os, tum per nares eruptione.

Quæ angustia, necessario, permanet, nisi dictum, ac factum scalpello humorem pertuderis, vacuatoque humore illic concluso, aperueris confestim viam, accedente ac recedente spiritui necessariam. Vidi equidem tumorem hunc, in palato, adeo celeri, ac pernicioso cursu, aliquando exortum; ut vix licuerit

cogitare, de gargarismate: nedum de aliis auxiliis, præterquam de sola scalPELLI incisione, qua dextre et festinanter, in tempore instituta, vidimus non modo effluxisse inde plurimum aquæ, sed detumescente palato, protinus ad se rediisse, hominem extinctioni jam proximum. (*Lib. I, cap. XXXVI.*)

Gula resoluta.

Post vomitum, vertiginem, ac spasnum cynicum resolvebantur, sub autumnî finem, mulieris quinquagenariæ tam pertinaciter musculi deglutitionis, ut gula propterea flaccescente ne guttulam quidem deinceps potuerit transmittere, licet nec dolor, nec tumor nedum ulla ipsam urgeret angustiam.

Quod resolutæ gulæ impedimentum levare voluerint medici, intromiserunt faucibus plumam acribus medicamentis imbutam, ex sententia Aetii. Sed illa non elicuit adeo pituitam musculis impactam, ut potius conjecerit ægram, in præsens, suffocationis periculum. Integra enim deglutitio, quantum depremat gulam, quando elevat invicem caput asperæ arteriæ : et dilatando ipsius rimam, efficit ut ob adsumptum cibum, non angustius, sed liberius trahatur spiritus. In resoluta autem gula, contra quum mirum profecto non est, ægram hanc propemodum fuisse suffocatam a pluma obturante, non minus laryngem, quam gulam.

Quarum profecta partium angustia, in causa fuit, quo minus deinceps voluerit admittere salutarem illum tubulum, quem in simili necessitate describit Hieronymus Capivaccius, lib. 1, cap. LIV. Cujus ope licuisset fortassis, per os, jacula ventriculo infundere : eaque ratione vitam si non integrè, aliquandiu saltem ipsi prorogare.

Quo auxilio obstinate repudatio, statuimus tamen, qua licuit, vires ipsius tueri : et cum non posset id convenienter fieri per os, infundimus tandem idem illud jus per alvum, beneficio clysteris. Quod remedii genus, quantumvis plurimi fiat, Avenzoari Oribasii, imo ipsi Celsi consilium tamen haud profuit huic mulieri : ut propterea, licet infunderetur intestinis detergis, extenderit vitam, ultra diem septimum : in quo diem suum obiit.

(*Cap. XLVII, p. 82.*)

Angina interna.

Varia sunt anginae genera, sed nullum perniciosius illo, quod produxit, vel vertebra introrsum luxata; vel inflammatio musculorum interioris laryngis. Quorum profundus tumor, siquidem coarctet angustum asperae arteriae caput et ligulam illi insculptam (quae sunt proxima vocis instrumenta); supprimitur non tantum vox, sed praecluditur quoque via spiritui, vel potius ipsius vitae, quae sine spiritu nulli diu, durabilis. Ac proinde non inconsiderante (Hippocrates lib. III prog.) latens angina vel primo, vel secundo die lethalis.

Nota pleni habitus, correpta interdum peste nocte, ab urgente faucium angustia, traxit ilico spiritus adeo difficulter, ut excitata febre, et accenso gutture, inciderit protinus in grave suspirium, spiritum turbidum, imo ipsam mortem. Cujus periculo, quo subtraheretur, nihil non molitum: sed urgentior fuit necessitas, et vehementior, ab incluso spiritu, strangulatus: quam ut juvarint ipsum, vel sanguis mature ex utroque brachio deductus, vel incisa ranula, vel cucurbitulae, gargarisationes, clysteres, cataplasmata, aliaque satis celeriter adhibita.

Anginam autem hanc, sine ullo tumore, in ore conspicuo, tam parum, cum juvarint salubria haec remedia ecquid igitur sperandum? si quis praeteritis improvide remediis universalibus, ferierit confestim ranulas. Quibus praepropere exsolutis, elicitur quidem frequens sanguis, sed non tam ex parte affecta, quam a corpore universo. Per truncum videlicet venae jugularis, cujus sanguis, attractus uberius, versus locum, per se, satis angustum, suffocat facile hominem, uti ejus infortunii exempla aliquando nobis visa.

Sed ne quem lateat diutius natura spiritus turbidi, seu πλερξ et πνευμξ conspecti evidenter in hoc ægro, sciendum Hippocrati nihil familiarius esse, quam certam alicujus morbi desperationem designare, cum per πνευμξ αμυρόν, id est obscurum, tum per πνευμξ δολερόν, sive spiritum turbidum.

Obscurum autem, ut vocat, spiritum extinctioni proximum: sic turbidum, qui ab admixtis, vel vaporibus, vel etiam humoribus, adeo crassus, ac tenebrosus evasit; ut amissa vero spiritus natura, quae consistit in æthereo splendore, ac invisibili

habitu ; non exhilaret amplius cor ; multo minus digerat convenientem aerem inspiratum ; nec dat debitas fuligines : sed conspiciatur efferri turbulente impetu ; et foras prodire ad instar alicujus fumi, elati vehementiores turbine, sive ab udis, atrisque cespitibus, sive a suffocatis carbonibus.

Fatiscit quippe sub tali spiritu cor : et debiliatur eatenus calor vitalis ; ut fuligines sive retentæ, sive spiritui perperam permixtæ, vel opprimant, vel interimant hominem ; quod adspectu dixit forte Hippocrates. lib. I. prædict. :

« In acutis, ténues sudores, circa caput, malum ; sed præcipue, cum urinis nigris ac spiritu turbido ».

Quasi diceret, siquidem vires ita sint debiles, ut non moveant sudores præterquam in capite ; et accedat præterea urina, quæ nigredinem contraxit, vel ab extinctione calidi innati, vel ab atra bile illi uberius immixta, periculum est, ne pereat æger. Sed si præter commemorata, adversæ valetudinis, vitia, videris utique in ipso spiritum turbidum, actum est, et ne salus quidem ipsa talem servaverit hominem. Fit enim spiritus turbidus, non nisi in extrema lucta, in qua dum satagit anima impedire, qua potest, sui dissolutionem, concitat violento impetu, quicquid in corpore, mobile est.

Et permixtus limpido spiritui, vel crassis fuliginibus, vel atra bile, aut sanguine qualicunque reddit cum summe turbidum ; excitando præter crassiorem aliquem halitum, inæqualem, ac sonorum illam agitati spiritus difficultatem : quam in moribundis, interdum confundit cum stertore, medicorum vulgus.

A quo tamen siquidem lubet, distinguere turbidum hunc spiritum ; observa cum judicio sonitum vel hominis ab apoplexia, vel bovis a lamione morientis. Quorum pectora post obitum si reseres, videbis asperam arteriam spumoso sanguine ubique obsitam, seu veras turbati spiritus reliquias. Quas procul dubio quoque intellexit Poëta, ubi dicit :

Ecce autem duro fumans sub vomere taurus,
Concidit, et mixtum spumis vomit ore cruorem.

(*Caput LII.*)

RIVIÈRE

Angina.

Quidam angina laborans trahebat inflammationem juxta superius osculum œsophagi ita ut nil deglutire posset; sed cum canna in œsophagum intromissa esset, jacula in stomachum accepit, et mox liberatus est. (*Obs. LXXII, l. III.*)

Tonsillarum inflammatio.

Die 21 mensis mai anni 1653 uxor domini E. tonsillarum inflammatione laborans, morbo gravissimo correpta est, cum paulo post secuta est ulceratio cum dolore maximo, et celebrata venasectione, et gargarismo cum oxycrato in pharynge injecto quod sequitur.

syrup. acet. et rosarum siccarum III once.

sachari albi

II once.

aqua fontis q. s.

Brevi tempore sanata fuit.

(*Obs. LXXIII, l. III.*)

Angina.

28 octobro anni 1650 vir C. Nemausensis 30 an. natus gravi anginalaborabat, quæ deglutitionis libertatem omnino abstulerat ita ut ne guttulam jusculi haurire posset et a 24 hor. nihil asumpserat præter aquam, quæ difficiliter in stomachum veniebat. Sed cum aqua benedicta æger multam pituitam rejecit et brevi tempore sanatus fuit.

FONSECA**Angina citissime mortalis.**

Mulier fortis, in ætate 30 annorum, et boni habitus hora diei decima dolorem persensit circa guttur et fauces; suffocabatur, nec nisi sedens stare poterat, nec cibum, ac potum deglutire; vox obscura, oculi eminentes; nihil ruboris, aut tumoris apparebat in faucibus. Ex his colligere certe potuimus affectum esse anginam primæ speciei ob inflammationem erysipelatodem musculorum internorum laryngis, qui et tumore et contractione viam spiritus claudunt. Causa vero sanguis est tenuissimus et biliosus. Erat autem gravissima angina et acutissima, ut ex symptomatibus colligebatur, et quamvis et prognostico Hip. tertio lib. prognosticorum hæc angina mortalis est, non tamen relinquendam ægram putavimus, sed illico de cephalica brachii dextri libra una sanguinis extracta est. Non cedente malo venæ sub lingua sectæ fuere, cucurbitulæ collo post aures, sub collo positæ et mento adhibitæ et per universum corpus a pedibus usque ad humeros; fomenta collo et faucibus ex oleo amygdalino tepido adhibita, et omne genus revulsionis. Nihilominus intra decem horas mulier e vita discessit.

Illud dubitationem habet in illo casu si morbus erat lethalis, ex sententia Hippocratis, et non curandus; erat enim signis prognosticis relinquendus. Sed nec omnis angina primæ speciei est necessario mortalis, ut ipse Hippocrates scripsit....

HARTMANN

Hartmann a puisé beaucoup dans Paracelse, c'est à ce titre que nous le reproduisons.

Cura anginæ.

Anginam vel incipientem vel etiam confirmatam, præsertim si febris urgeat, subito vomitoria, imprimis aqua benedicta tollunt. Sic nimirum inflammatio cedit, et ulcera vel apostemata rumpuntur. In omnibus vero hisce respiciendum ad naturam patientis et virium robur.

Quod si ergo vomitoria locum habere nequeunt, recurrendum statim est ad *specificæ*, quæ nihilominus etiam post vomitoria locum habere possunt talia sunt. 1 Quod est apud *Paracelsum* in tractatu de pestilentia ad Sterzingenses. quod ꝛ vj vel viij caneros vivos (canceri insigniter refrigerant) sedi majoris M iij, vel iiij, qui invicem contusi in mortario, et postmodum expressi succum reddunt, quo lingua et fauces sunt fovendæ, vel ipsa lingua radenda, imo ejus (sed parum valde : gutt. videlicet aliquot) in liquore conveniente aliquid intro concedendum.

2 Est experimentum Anton. Kutzmapis civis Augustani, quod ꝛ sedi majoris B j. Contunde in mortario et exprimatur succus. Hujus ꝛ Bj. adde 3 ß relinque in loco humido usque solvatur et postea destilla per alemb. Hac aqua sæpius ablue linguam calide et tepide. Est probatissimum. Vide Conradinum.

Nota.

In hoc casu aliquid addendum est ad plantas illius de sede majori.

Quod si gargarizare nequeat, sipunculis injiciendus est gargarismus. Post singulas gargarisationes. ꝛ corium de lardo (speckschwarten) duos digitos latum et assulatim incide, ex ea parte, qua adhuc lardum est, et pone ad linguam, ut aliquandiu detineatur. Sic nigerrima cuticula linguæ resolvitur, et tandem discedit et curatio sequitur celerior.

Externe ad collum ipsum applicetur emplastrum ex nidis hirundinum (integris et albo græco ana) cum aqua ferrariorum coctum calide.

Pro potu dissolve 3 vel prunell. (vinum non detur) ij in aq. fontanæ II mensura.

Anginæ conferunt ea in quibus sal nitrosum Ammoniacum delitescit, ut stercus canis albi ossa rodentis, in aqua probe coctum et cum melle exhibitum.

Rasuræ dentis Apri iij cum oleo amygdalarum [dulcium et saccharo.

Cinis cancrorum ustorum.

Cinis hirundinum.

Consolida medic. prunella, uvularia, cervicaria, mentha crispa, rubus idæus.

Angina notha.

Angina notha puerorum curatur emplastro modo dicto.

Caput viperæ exsiccatum et collo appensum commendatur, pro *amuleto*.

ꝯ noctuam unam, cum pennis combure et F. pulvis, cujus postea modicum in guttur immittatur; aperit et rumpit apostema mirabiliter, quod tum in extinctione inflammationum tum in resolutione apostematis plurimum valet.

Exibetur ejusdem in haustu aq. fontanæ calido 3 ii aquam misce cum sp. vini et sp. an 3 (vide Crollium).

ꝯ aq. semper vivi ij

prunella a lbj.

salis armoniaci j.

M F. Gargarisma et perutile quoque

crystallum vel anodynum minerale, ut vocant, seu lapis prunellæ. (P. 78.)

Tonsillarum inflammatio.

In tonsillarum inflammatione valet gargarismus prædictus (de quo in gustu abolito) 2. Externæ inunctiones cum oleo amygdalarum dulcium simplici (sine additione olei vel ceræ).

3. cataplasma ex mica panis tritici cum melle, cito inflammationes sistit.

His omnibus prævalet menstruum [in acet. dissolutum et applicatum. Id. folia raphani sylvestris foris applicata.

Abcessus tonsillarum.

In abcessu seu putredine et ulcerationibus tonsillarum gargarismus, supra de gustu depravato et abolito traditus; multum potest. Mundificat nimirum et consolidat, si præsertim cum reliquis adjiciantur folia plantaginis. Itaque ipsius usus in ulceribus internis maxime utilis est.

In sordidis vero recurrendum est ad mundificationes fortiores, qualis exspectanda est aqua illa viridis secunda, de qua supra de ozæna dictum.

Postea decoctum veronicæ et melle eadem ulcera facile consolidat.

VAN DER WIEL

Abcessus in faucibus cum cibi potusque per novem dies continuos abstinentia.

Gubernatrix Nosocomi Scheveringani corpore tenuis admodum, at sanguine abundans violenta vexabatur febris, non sine magna gulæ inflammatione, ac tumore, quem synanchen dicunt. Quamvis ipsi vena scissa, aliaque remedia uti decebat, admota essent, muscoli tamen œsophagi ita ipsi obsidebantur, ut per 9. dies nec cibum, nec potum intromittere posset; nihil etiam liquoris (ita ipsa retulit) per fauces descenderet, at omnia in os immissa per nasum emitterentur; ita ut vita ejus periclitaretur, accedente etiam vocis defectu. Verum nono die liberata fuit, ruptusque una faucium parte fuit abscessus, dieque sequenti pariter altera parte, ita ut temporis tractu ad priorem redditur valetudinem.

(Obs. XXV, p. 103.)

Pulvis pyrius e tubo ferreo (musquettam nostrates vocant) in gulam explosus.

Joh. Goblyn, gallinas, ac id genus avium vendere solitus, hic Hagæ habitans 6. Mai. an. 1649 nundinarum tempore, quo cives in armis esse solent, ex ejusmodi tubo explodere pulverem gestiebat incensum, cum vero dubitaret (ab alio enim cive acceperat) num gravidus esset tubus, eum altera sui parte in terram demissam orique admotum inflavit, quod cum faceret, contigit, ut adstans aliquis casu instrumentum illud, quo ignitus fomes pulveri admovetur, ita pede tangeret, ut incensus in os prosiliret pulvis.

Hinc ejus palatum, gula gingivæ, nec non lingua ustulabantur, atque adurebantur leviter. Cumque ipse cum chirurgo Cornelio de Jong ad hunc vocatus essem, post venæ sectionem illi mox oris collutionem præscripsi ex aqua plantag. *sperm. ranar.* et muccilag. sem psyilly. ac cydonior. præparatam, nec non idoneos linctus lactisque cremorem dulcem, etc.

Quamvis autem ille optime respirebat nullum tamen potum, adeoque minus cibum deglutire valebat, via iis occlusa omnino, atque siccata ac ita partibus illis ad deglutitionem minus aptis redditis. Quæ alimenti refectionisque abstinencia per octo, vel novem (quod magnopere admirabamur) dies continuos durabat; post quos tamen separatio quædam facta fuit, cæpitque ille aliquantum in gutture posse immittere ope canthari, cui tubulus affixus erat sed cum sese jam omnino sanatum credebat maloque liberatum, majore inter deglutiendum, quam unquam antea, dolore afficiebatur, separatis scilicet particulis ustulatis, mortuisque a vivis et integris, omnibusque circumquaque plane excoriatis. Ipse tamen, post diuturnam veluti cum morte colluctationem, tandem plene convaluit : quamquam post sex, octavos ab hoc incommodo hebdomadas, ossea quædam a palato illius fragmenta repararentur. (*Obs. XXIV, p. 100.*)

Annulus gemma insignis ab infante in fauces ingestus, eique mortis causa.

Hoc ipsum, quod proponam, ac secutura aliquot exempla, abunde evincunt periculis plurimis infantes objici ab illis, qui ipsis, contenti ut sint, aliquid durioris materiæ, quodque fauces intrare possit, porrigunt. Viginti jam, et qui excedunt, anni sunt, cum conspicui cujusdam domini infans 20 circiter menses natus, matris annulo aureo, cui gemma inhærebat, luderet, eumque, nescia, cui infantis demandata erat cura, famula, per os in fauces ingereret : matre vero paulo post annulum repente, nullo loco apparuit, ipsa suspecta famula. Interea infans nihil absque summa molestia deglutire, ac maximo angore corripui, parentes autem omnem movere lapidem si forte infantis dilatari possent fauces. Omnibus autem nequicquam tentatis, ille post sex hebdomadas interiit. Ipse autem inquirendæ mortis causa ergo dissectus tam diu amissum annulum reddidi, famulamque suspicione liberavi. (*Obs. XXII, p. 95.*)

Frustum fistulæ, qua Tabaci Amatores fumum imbibunt, faucibus inhærens, causa mortis.

Ipse inter alia rariora dicam frustum anterioris, tenuiorisque partis fistulæ qua Tabaci fumus in os transmittitur, longitudine

digiti articulum æquans, quod post mortem viri cujusdam intus e collo excidi. Hic cum multo sese delectaret fumo, fistulam dentibus tenens versa in terram facie procubuit ita, ut illa fauces intraret, ibidemque rupto exiguum sui partem in colli musculis hærentem linqueret, quæ ipsi vehementis doloris, inflammationis, tumoris, nec non angoris, febrisque causa fuit, quoniam autem illa non conspici, nec ulla ratione tolli poterat, ipse tertio die occubuit.

Simillimi huic nostro casus nisi quod, de quo narrat, mortem evaserit, meminit etiam D. Joh Muys (*Prax. chirurg. rationalis decad. 3, obs. 6, fol. 28*). Ubi refert de viro 50 annos habente, et vexato abcessu infra aurem, quo aperto, prodiit cum pure albicante frustum fistulæ, per quam ante 6 menses, dum per plateas obambulabat, tabacum suxerat, quod in fauces intrusum post casum in terram, easdem intus valde læserat, e quibus sæpius magna sanguinis copia effluxit, unde tandem inflammatio suborta est, et abscessus hic originem suam habuit.

(*Obs. XXI.*)

MARCHETTIS

Obstructio utriusque naris, altera quidem integra, a polypo spurio, carne scilicet callosa ulceri ex contusione externa accrescente ; alia vero imperfecta feliciter sanata.

Curavi Germanum in ædibus Joannis Rhodii, laborantem obstructione integra alterius meatuum nasi, adeo ut altero quinetiam medio obstructo, ægre duceret spiritum. Hæc autem obstructio causam habuit contusionem insignem nasi, dum puer esset, prout in hujusmodi casibus observavi, læsis scilicet externis partibus, lædi quinetiam plurimum internas, in quibus propterea ulcus progressu temporis suboritur, ex quo caro succrescit. Quæ longo annorum spatio indurexit, et aliquando polypus spurius evadit, educendus postea, modo ab Aquapendente proposito, quandoque in osseam fere duritiem occalescit ; prout contigit nobili huic Germano, in parte potissimum, quæ omnino obstructa erat. Facta itaque totius corporis purgatione, deveni ad chirurgicam operationem, præsentibus multis Germanis studiosis, et ipsum collum durissimum, ac partem obstructam, per cannulam, ferramento acuto ignito, spatio viginti dierum perforavi, ut commodius respiraret, idque multis diebus, cum patiens non posset tolerare continuam inustionem : peracta operatione, apposui globulum ex filamentis aridis, inductis post inustionem, butyro, illito quotidie naso oleo vel unguento rosato arcendæ inflammationi; quamvis operatio valde molesta esset, quod cum caro illa callosa admodum superficietenus, et dura esset, hac attrita, ab inustionibus nobilis patiens sævos pateretur dolores. Tacta itaque perforatione, ut dictum est, et dolore sublato medicamentis anodynis, imposui turundam imbutam unguento ex tuthia, qua sensim induxi cicatricem, quæ ut firmior evaderet, inspersi turundæ pulveres ex bolo armena orientali, et cornu cervi usto, cum portiuncula thuris; quibus adeo cicatrix occaluit, ut nunquam pars amplius coaluerit, patente naturali meatu.

Sanata vero obstructione alterius meatus nasi. deveni ad aliam partem non omnino obstructam, per quam nonnihil spiritus ducebat æger; ut propterea eodem tempore utrumque meatum curare abstinuerim, quo commodius respiraret. Hanc vero partem citius sanavi, utpote non admodum callosam, duabus scilicet vel tribus inustionibus, per cannulam ampliato meatu ad figuram naturalem, omnibus alioquin peractis ut in prima curatione; quibus quinquaginto dierum spatio æger omnino fuit liberatus.

(*Observationum medico-chirurgicarum rariorum sylloge*, p. 65, obs. XXVI.)

Cancer exulceratus labri inferioris maxillæ in sene octoginta quatuor annorum, sectione sanatus, tribus post annis in faucibus sobolescent, cum morte ægri.

Senem Salodiensem, octoginta quatuor annorum, laborantem cancro exulcerato in labro inferiori oris, magnitudine medii ovi gallinacei, curavi; quem licet præmonuisssem, morbum fore insanabilem, admisit tamen, imo rogavit, ut ipsum secarem; Præmissa itaque totius corporis purgatione, tunc novacula incidente radicibus resecuri, sanguine cum impetu erumpente, quem ad decem circiter uncias data opera effusum, absque ulla postmodum inustione, verum gossypio tantummodo usto, pulveribusque adstringentibus firmavi. Digerentibus vero prius medicamentis aliquot dies usus, ex ipso vulnere optimum pus emanavit, indicium totam substantiam canceri esse sublatam; atque unguento postmodum ex cerusa camphorato, ducto in plumbeo mortario, spatio viginti dierum cicatricem induxi, incolumi ægro tres annos, absque ulla molestia; a quibus novus cancer subortus in faucibus, ex quo brevi spatio temporis obiit, præter omnem meam opinionem, qui existimabam ex ætate humorem melancholicum adustum iterum succrescere non posse, novi canceri in alio loco causam; prout fere semper contingere solet; omnium auctorum sententia quod scilicet cancer in aliqua parte avulsus in altera progressu temporis suboritur, firmabatque meam opinionem quod in praxi viderim mulierem septuaginta annorum,

famulam collegii Divæ Catharinæ, cancro exulcerato nasi laborantem, cui præscripsi idem unguentum ex cerusa, potius ad dolorem sedandum, quam curationis causa, quæ tamen præter spem, mensis spatio, nullo alio remedio adhibito, fuit perfectissime sanata, vixitque multos annos eadem firma valetudine; quod censui contingisse ratione ætatis, prout in sene illo futurum rationi consentaneum erat. Et quamvis hæc curatio non solum a me sit in usum revocato, sed a plerisque, ut dixi, auctoribus, quia tamen raro contingit, cancros exulceratos omnino sanari, nec amplius subolescere, ut in femina illa; ideo hanc observationem aliis adscribendam censui, quamvis in sene illo cancer in faucibus triennio post pullulaverit, quod forte non contigisset, si quolibet sexto mense remedia adhibita fuissent, humorem melancholicum purgantia. (Obs. XXIX, p. 69.)

Tumor meliceris, ex parte sub lingua, ranula dictus, sensim per partem dextram colli juxta jugulares venas, carotides arterias ad fauces exporrectus, respirationem intercipiens, sectione perfecte sanatus.

Lingua pluribus morbis tentatur, soluta scilicet continuitate, ac variis tumoribus, in quibus quemdam curavi observatione dignum, meliceridis nomine, in Reverendo Patre theatino, Hieronymo capite Bovis mutinensi, cui, sub lingua, ubi venæ raninæ et tumores ranulæ dicti succrescunt, abortus fuit tumor de genere quidem ranularum non legitimus tamen, qui ex continuo affluxu materiæ paulatim crevit, ad magnitudinem ovi sensim exporrectus, per latus dextrum colli, juxta jugulares venas, et carotides arterias, ad fauces usque infra tonsillas, et œsophagum, qui asperam arteriam adeo graviter comprimebat mole sua, ut nec chirurgus quolibet mense, eo patefacto, materiam contentam eduxisset; periclitaretur æger intercepta respiratione, et impedita deglutitione, ad vitam plane necessariis. Multi vero tentarunt curationem sectione sola ipsius tumoris, cum patientis quidam aliquo levamine, non perfecta tamen valetudine; cum mense post circiter tumor in eandem magnitudinem excreverit, cujus causa Reverendus æger metu suffocationis in Patavium venit et meæ curæ se commisit; cui præscripto primum omni

revulsionum genere, per totius corporis purgationem, et sanguinis missionem, statim deveni ad partem affectam, tumoremque cultro longa satis sectione, in inferiori parte patefaci, multis venarum ramulis data opera disruptis, a ranulis diffusis, quo folliculus contabesceret, intercepto nutrimento, in quam postmodum immisi crassam, et longam turundam, imbutam ovi albumine conquassato, ad tumoris usque fundum : sequenti die alia facta sectione, et quidem amplo in collo exterius, parte qua desinebat tumor, illæsis interim vasis majoribus, turundam pariter immisi vulneri æqualem, intinctam ovi albumine, superaddito gossypio usto, cum pulveribus ex sanguine dragonis, et bolo armeno sanguinem copiose satis fluentem sistendo. Sexto vero post die, nullo amplius periculo inflammationis imminente, intra os et exterius in collo totum folliculum ferramento candente inuri ; atque removendæ, ac detergendæ escharæ in parte externa digestivo usus sum ex terebinthina, et butyro lotis aqua rosacea vitello ovi, et oleo sambucino ; parte vero interna, globulis melle rosaceo imbutis. Laudabili vero pure apparente, turundas inunxi unguento ex betonica, iisdem in dies decurtatis ; interius vero applicui filamenta inspersa pulveribus ex tuthia, cornu cervi usto, et terra sigillata, quibus spatio quadraginto dierum æger omnino sanatus est, nunquam amplius recurrente morbo.

(*Obs. XXXI, p. 75.*)

Tumor colli inflammatorius in puero, cum læsa deglutitione, quatuor cucurbitulis cum scarificatione scapulis, et infra easdem adhibitis, sanatus.

Præter alios tumores colli ab omnibus auctoribus prædictos vidi in infantulo mensem nato, nunc canonico patavino, tumorem inflammatorium externum, ad glandulas bronchiales ; qui progressu duorum dierum ita aductus fuerat ut nobilis infans non posset lac deglutire, cum adhibitæ frictiones, et lotiones pedum leviores forent pro magnitudine morbi, præscripsi statim quatuor cucurbitulas parvas, vulgo cornetti dictas, duas scapulis, duas vero infra easdem applicandas, tribus tantum, et quatuor scarificationibus adhibitis, et educto sanguine ad uncias duas,

quarum usu tumor paucas post horas imminutus, ac sensim et sensim sublatus, et feliciter sanatus est, lethalis alioquin.

Neque metuendum hoc genus præsidii in tenera adeo ætate, præsentē potissimum morbi magnitudine, cum sæpius ego, secta quinetiam vena, sanguinis missionem præscripserim. Et quidem primo ex salvatella ejusdem lateris, nobili Patavino ex familia Tergolina, decem annorum, pleuritide gravissima laboranti, qui hoc præsidio sub vesperam sequenti die fuit liberatus, et omnino convaluit; quod contigit et alteri nobili Patavino ex familia Ridi annorum septem, laboranti itidem pleuritide, cum vehementissimo dolore pungitivo; cui educto pariter sanguine ex salvatella, ad sex uncias circiter cessavit dolor cum febris remissione, qui assumpto postmodum syrupo rosaceo, cum manna, quarto integre sanitati fuit restitutus: quo præsidio quinetiam usus num in aliis pueris angina laborantibus, hac ratione adductus, et propria experientia, quod quam pluribus pueris trium, quatuor, vel quinque annorum, vulneratis, aut saxo, aut cultello, vel aliquo alio instrumento, sanguinis libra effluerit aliquando, atque illi potissimum, cui ex secta arteria muscoli temporalis magna vis sanguinis erupit; quem tamen juxta cum aliis sanavi citra ullum in facultate auctrice detrimentum: quinimo ipsorum aliquos novi adhuc num superstites, robustos, pingues, et carnosos; ut propterea in morbis cum vitæ discrimine, præsentē indicatione venæ sectionis, hoc præsidium non sit reformidandum.

(Obs. XXXVI.)

HABICOT

Preuves suffisantes par lesquelles le chirurgien doit faire la bronchotomie.

Par l'analogie des histoires sus-dites, il y a apparence que le chirurgien fera hardiment l'espèce de diérèse, nommée bronchotomie. Or il la doit entreprendre ; l'autorité, la raison, et l'expérience le veulent.

Quant aux auteurs, ils sont infinis, qui approuvent une telle opération.

Touchant les raisons, elles y sont formelles. La première est que là où il n'y a pour la curation d'une maladie extrême, qu'un grand remède il le faut employer. Or en la synanche où le malade suffoque, et court au tombeau faute d'air, est une maladie extrême, lequel air ne lui saurait être délégué sans la bronchotomie.

La 2^e, c'est qu'un remède expérimenté vaut mieux qu'un désespoir assuré. Or si on ne baille de l'air au patient par les voies ordinaires, sans doute il étouffera et mourra : lequel air ne lui saurait être baillé que par cette opération.

La 3^e, c'est que ce qui pourrait empêcher le chirurgien de faire une telle opération, serait la crainte en opérant, d'offenser quelque partie qui apporterait un plus grand mal que le premier. Mais au lieu où se doit faire une telle opération, il n'y a aucune partie de conséquence.

La 4^e, ce qui pourrait divertir d'entreprendre cette opération, ce serait, l'inflammation et la crainte de l'air froid, lequel en frappant le poumon, sans préparation, le pourrait altérer, et par conséquent causer quelque grand symptôme. Or l'inflammation peut être combattue, l'air adouci et les accidents divertis.

La 5^e et dernière preuve consiste en l'expérience qui est la maîtresse de toutes choses. D'où vient comme il a été dit, que les uns ont voulu éprouver cette opération sur les bêtes et après cette confirmation à la nécessité, les autres l'ont faite sur les

hommes, et nommément sur une chambrière. Que si aux histoires par moy alléguée, le larynx et la trachée artère ont été fortuitement et grandement blessés, et que pour la grande tumeur de la gorge, la voie de l'air était empêchée, dont ils fussent mort sans la respiration, ne sensuit il pas, qu'une grande et subite synanche, faisant artistement une plaie en la trachée artère, au dessous du mal, pour bailler de l'air au malade, est une chose très raisonnable de la faire, puisque cela est fait aux choses survenues par accident.

Finalement, c'est qu'en une dysurie où l'urine est du tout supprimée on fait une section pour introduire dedans la vessie une tante canulée, pour donner passage à l'urine jusqu'à tant que l'inflammation de l'urette soit passée. Et au bubonocèle, c'est-à-dire quand le boyau est tombé et arrêté en l'aine, on incise les parties contenant tant communes que propres de l'hypogastre pour le dégager quand il est étranglé, afin de rendre la voie de l'excrément de la chylose libre, qui autrement sortirait par la bouche. Or si la cystotomie se fait pour donner passage à l'urine, et la bubonotomie en l'enterocèle pour donner passage à la fœcale, pourquoi ne se fera aussi la bronchotomie en grande synanche pour bailler passage à l'air, vu qu'elle est plus faisable et moins dangereuse que les opérations susdites? Partant pour telle autorité, raisons et expériences le chirurgien, en extrême synanche doit entreprendre la bronchotomie, pour éviter la mort subite du malade. (C. IV, LX.)

Moyens pour improuver la bronchotomie

Après telles preuves, il ne sera hors de propos d'alléguer les raisons contraires et qui répugnent à une telle opération, afin de prévenir les esprits desliez, et qui se plaisent à s'opposer contre la vérité. Donc les moyens pour improuver sont tels :

C'est une chose véritable que l'on ne doit contrevenir à ce qui s'oppose à l'autorité, à la raison et à l'expérience. Or le chirurgien faisant une telle opération s'oppose à ces choses, donc il ne la doit faire.

Quant aux autorités, Aurélien et Arétée conseillent de ne point entreprendre une telle opération. D'autant qu'advenant

faute du malade on dira qu'on lui a coupé la gorge, qui est tout à fait méprisé des œuvres de l'art.

Entre les raisons : la première est qu'une partie affligée doit être soulagée. Or faisant la bronchotomie, on ne soulage nullement le larynx, d'autant que cette opération ne se peut faire sans douleur, qui apporte nouvelle fluxion et de là infinis autres accidents.

Plus, blessant les veines, les artères et les nerfs qui sont situés en cette partie, on cause hémorrhagie, flux de sang, convulsion, et la mort, ou au moins perte de la voix.

D'avantage, le cartilage étant ouvert, comme partie froide et sèche, ne reprend point, d'où provient une fistule qui est un mal pire que le premier.

Outre l'intention pourquoi on fait cette opération, est pour faciliter la respiration, de laquelle on n'a que faire en une extrême synanche, d'autant que le patient étant faible et débile, il a peu de chaleur naturelle, et par conséquent moins de besoin d'éventilation pour la respiration, à quoi obviara la transpiration ainsi que nous voyons aux femmes hystériques.

Plus c'est que tout remède doit être appliqué sur la maladie et qu'une telle opération est faite hors du lieu malade et non sur le mal.

Outre, la schynance n'apporte pas seulement difficulté de respirer, mais aussi d'avalier, laquelle œuvre soulage la déglutition, qui est le moyen de la nourriture, fondement de la vie.

Finalement une telle opération serait infructueuse sans l'introduction de la tante canulée. Or si une gontte d'eau ou quelque petite miette de pain entre dedans la trachée artère, on n'a cesse de tousser jusqu'à ce qu'elle soit sortie dehors, à combien plus forte raison sera nuisible la grosseur d'une tante.

Bref, ce qui a le plus de force est l'expérience, laquelle nous montre qu'une telle opération ne se pratique nullement, et qui plus est il ne s'en voit aucun effet. (*Cap. XIV, p. 90.*)

La réponse à tels moyens.

Les moyens qui s'opposent aux preuves susdites fondées sur l'autorité, la raison, et l'expérience, seront détruites par les mêmes preuves.

Quant aux autorités je dis que tels praticiens avaient plus d'appréhension que de raison : joint que pour un auteur réputé, il y en a plusieurs qui l'advouent et consentent.

Touchant la raison, à la première je réponds que l'on peut faire hardiment un petit mal pour en guérir un grand.

À la seconde, je dis que les veines jugulaires, les artères carotides, ni les nerfs recurrens, ne sont situés au lieu où il faut faire l'opération, qui est en la partie la plus dénuée de l'âpre artère; en sorte qu'il semble que la nature ait fabriqué cette place pour seulement faire une telle opération, afin d'obvier à un si grand accident, et qui importe rien moins à l'homme que la privation de la vie.

Je réponds que cette opération ne se fait pas dans le corps des cartilages du Bronchus, ainsi entre les anneaux d'iceluy appelé Bronchia, lesquels se réunissent après l'extraction de la tante, et rapprochement des cartilages les uns des autres.

Je dis qu'en la suffocation de matrice le corps n'est faible faute d'esprits, d'autant qu'ils sont mêlés avec les vapeurs hystériques qui causent, un tel assoupissement, faisant que les mouvements volontaires sont abolis. Mais en la synanche, les esprits sont résolus, et le malade étouffé à cause de la chaleur naturelle qui n'est pas éventillée, ni purgée des excréments fuligineux qui sortent du cœur.

Aussi je dis que cette opération n'est pas faite pour la maladie, ainsi pour l'accident de suffocation et pour ce qui n'est loisible que l'œuvre soit faite à l'endroit du mal, mais plus bas qu'iceluy afin de faire pour le malade de l'air nécessaire.

À cette sixième raison, je réponds que l'on peut vivre quelque temps sans manger et non sans respirer, qui fait que la respiration étant libérée, on peut par après solliciter plus souvent, et hardiment le malade d'avaler des viandes faciles et liquides.

Touchant la septième et dernière raison, je réponds que la toux ne vient pas tant de la sensibilité de la partie, que de l'obstruction qui se fait au larynx, qui doit être libre pour laisser passer l'air.

Quand à l'expérience. je réponds qu'une telle opération ayant été faite par le passé se peut encore à présent faire; que si elle ne s'exécute, c'est ou pour l'ignorance des chirurgiens ou pour

leur timidité dont s'ensuivra la mort du malade de quoi il serait coupable devant Dieu.

Partout on peut faire sûrement la bronchotomie. (*Cap XV.*)

Les considérations pour faire la bronchotomie.

Il reste pour faire une telle opération, à considérer huit points fort remarquables : à savoir : 1° à qui il faut faire cette opération ; 2° le lieu où il faut la faire ; 3° par quoi elle doit être faite ; 4° de quelle façon ; 5° la grandeur qu'elle doit avoir ; 6° la nature de la tumeur ; 7° le temps qu'elle doit demeurer en la plaie et ce qu'il convient de faire en l'ôtant de la plaie.

Touchant le premier point, c'est qu'il faut faire une telle opération à ceux qui étouffent faute de l'entrée de l'air par le larynx. Mais il faut bien distinguer cet empêchement, car aux péripneumoniques, aux apoplectiques, et à ceux qui ont les sanglots de la mort, il ne convient faire une telle opération, ainsi à ceux qui ont les forces bonnes et entières, et néanmoins qui étouffent d'une Cynanche, c'est-à-dire d'une tumeur humorale, située aux muscles internes ou fermeurs de l'arythénoïde desquels j'ai cy-devant parlé, ou à ceux qui auraient avalé quelque chose qui étoufferait, (estouperoit), le larynx par compression, comme à celui qui, un jour des rois, avala un osselet d'esclanche de mouton, demeurant au pharynx, étouffa en la présence des médecins et chirurgiens sans le secourir de son mal.

Quand au second point qui touche le lieu où l'opération doit être faite, il est en litige dans les auteurs, car les uns disent qu'elle doit être faite en la canne ou gargamele (*Avic. lib. 3 fen 9, cap. II*) en quoi il y a bien de la différence, d'autant que la canne est proprement l'aspre artère, située en dessous du larynx, et la gargarille est l'épiglotte qui est située au-dessus du larynx comme son couvercle. Or si la bronchotomie se faisait à la gargarille, quel profit en arriverait-il, puisque le mal est situé au-dessous ? joint que la gorge n'admet une telle opération. Les autres disent que cette opération doit être faite à l'Epiglotte. (*Albucasis. Job. annot*) chose qui est ridicule, comme je viens de dire, à cause que l'épiglotte est au dessus du larynx, et qu'il faut faire l'opération au dessous. Autres veulent qu'elle soit faite à la trachée artère, appelée vulgairement nœud de la gorge (*Par-*

liv. 7) en quoi il y a bien de la distinction. Car la trachée artère est comme le long ou corps d'une flûte, et le larynx est comme le gros ou la tête d'icelle et m'étonne de lui qui était bon anatomiste, comment en la pratique, il s'est ainsi abusé, vu qu'il a si bien distingué l'âpre artère d'avec le larynx, voir qu'il en a baillé les figures et portraits (Par. liv. des fig. anat. lo 28) et les confondre en ce lieu. Ainsi la bronchotomie se doit faire à la trachée artère, et non au nœud de la gorge qui est proprement le larynx. Et d'autant que la trachée artère a plusieurs lieux, il faut savoir *en quel endroit l'œuvre doit être faite*. C'est pourquoi les uns disent qu'il la convient faire le premier et second anneau d'au-dessous le larynx. Les autres veulent que ce soit entre le troisième et le quatrième anneau. En quoi la difficulté n'est pas grande, car si c'est une personne maigre, on la peut faire entre le premier et le second anneau. Mais si c'est une personne grasse, elle se doit faire entre le troisième et le quatrième. Quoique ce soit, l'endroit où il faut faire cette opération est ou lieu le plus découvert et le moins dangereux de toute la trachée artère, tel qu'est celui à deux pouces au-dessous du larynx. Le troisième point est : un chirurgien expert, d'autant qu'un ignorant ne sachant l'anatomie, pourrait ouvrir quelque vaisseau de conséquence et par ce moyen causer la mort.

Le quatrième point et de la façon qu'il la convient de faire et pour ce que les auteurs n'en sont d'accord. Car Anthyllus veut que l'on enlève d'un coup la peau avec un crochet, et que l'on incise la trachée. Autres veulent que l'on fasse une incision transverse au cuir, si juste que l'on rencontre l'entre deux des cartilages (Paul, lib. 6, cap. 33). Et d'autres veulent (Job. pag. 269) que l'on fasse comme à la paracentaise, à savoir que l'orifice de la peau ne se rencontre avec celui de l'âpre artère : mais toutes ces façons semblent grandement s'éloigner de la raison. Car quelle apparence y a-t-il de prendre la peau avec un crochet pour faire deux trous différents en situation, et finalement de faire l'incision transversale du cuir et de la trachée artère ensemble. Mais cette manière me semble la meilleure à pratiquer promptement et sûrement, c'est que si le malade a les forces bastantes, le chirurgien le fera asseoir en une chaise de deux pieds en hauteur au derrière de laquelle posera un servi-

teur, l'encontre de la poitrine duquel il fera appuyer derrière la tête du malade, lui faisant hausser le menton le plus qu'il lui sera possible : puis des deux mains de ce serviteur, fera prendre la peau de la gorge du dit malade formant un pli au travers d'icelle, laissant entre les deux mains du dit serviteur un bon pouce du dit pli à découvert, puis d'un coup de rasoir ou de ciseau, le chirurgien fera sur celui pli une incision. En sorte que son serviteur délaissant la peau de la longueur d'un pouce, au milieu de laquelle le chirurgien avec ses doigts, ou quelque sonde a bouton, la dilatera en tirant à dextre et à fenêtré la peau de la dite gorge, pour voir plus aisément l'entre deux des cartilages, où il faut faire son opération : puis de sa main droite avec son bronchotomiste, percera en travers entre les dits deux anneaux de la trachée artère. Lesigne que l'opération sera faite est la sortie de l'air par la plaie, et alors sera introduite la sonde canulée.

5° En faisant une telle opération, faut bien adviser quelle figure et quantité on lui baillera, et pour ce les auteurs veulent qu'elle soit faite comme une narille. Et d'autant que les narilles sont bien différentes en leur grandeur, à cette occasion il est expédient de terminer une telle difficulté : et pour ce il faut remarquer avec quel instrument on la fera, à savoir comme il a été dit avec le bronchotomiste, qui est semblable à un perce lettres, ou bien garnir un bistouri, ou une lancette, avec du linge proprement, afin que la forme de la plaie qui ne saurait être que de travers, à cause de l'entre deux des cartilages, ne revienne qu'à la quantité d'un travers de pouce, ou de la grandeur de la tante de quoi on se veut servir.

6° Quand à la nature d'icelle, elle sera d'or, d'argent, ou de plomb, de telle grandeur qu'elle puisse entrer en la capacité de la trachée artère pour laisser entrer et sortir l'air ; pour cet effet elle sera un peu courbe avec un bord assez large pour qu'elle ne tombe en la plaie on la maintiendra au besoin de deux liens attachés derrière le col. Elle sera de telle longueur qu'elle pénétrera en la cavité de l'artère sans toucher la paroi opposée.

7° Touchant le temps qu'une telle plaie doit demeurer ouverte, il y a de la dispute, les uns veulent trois jours seulement, autres commandent davantage. Mais la plus saine opinion est de ceux

qui disent qu'elle demeurera ouverte jusques à temps que les accidents soient passés. Et de vérité qu'aurait servi d'avoir fait cette opération si l'action du larynx n'était rétablie. Or, posons le cas que l'inflammation et tumeur, qui occupaient le larynx soient tellement évanouies, que l'air ait son passage libre par le larynx, alors il faut adviser à considérer la playe du Bronchus.

8° Si par la trop longue demeure de la tante, ou agitation de l'air, ou application du médicament, les lèvres de la plaie sont trop, ar alors il les faudrait renouveler, en mouchetant les bordages avec une lancette, sinon la tante ôtée il faut rapprocher les deux cartilages, qui étaient séparés ou divisés par la tante puis rapprochant les lèvres de la peau, la coudre à points continus, ou à points séparés. Il y en a qui veulent faire deux coutures, l'une aux muscles, et l'autre à la peau ou si on trouve plus expédient, de laisser une aiguille d'or ou d'argent ou d'acier dedans les lèvres de la plaie, et entortiller le fil autour, comme il est démontré ci devant en la figure, on le peut faire et ainsi sera la plaie consolidée, et la vie du malade préservée.

SCHENKIUS

Columella inflammata, remedio secreto coempto, curata.

Dives quidam, columella inflammata, de suffocatione periclitabatur, et cum ei vena incideretur alius quidam incidit, qui se alias, si opus foret, ante incisionem venæ vocari jussit; quo facto, statim illito suo medicamento, hominem sanavit, et in multis aliis idem prestitit. Quod videns ille dives, mercede pactu est ut pharmacum ab ipso doceretur. At ille ita demum vim suam medicamentum præstare aiebat, si patiens quidnam esset, ignoraret ideoque fidelissimo cuipiam ex amicis id se ostensurum, ea conditione, ut alteri nemini, quamdiu ipse viveret, communicaret. Itaque ipso mortuo, ego quoque ab amico divitis illius ultro pharmaci descriptionem accepi. Id erat excrementum pueri aridum cum melle attico tritum; pascebatur autem puer biduo lupinis, quibus in cibo communiter utimur, cum optimo pane satis fermentato, et solito. Vinum bibebat vetus: omnia mediocriter, ut quam optime concoqueret. Tertio die sumptum excrementum arefaciens utebatur, sicut de canino diximus. Lupinis autem vescebatur ideo solum, ut minus foetidum excrementum fieret: alias enim se gallinarum et perdicum carnem in jure elixam exhibuisse, et nihilominus effecisse pharmacum, aiebat.

(*Gal. lib. 10. simpl.*).

DE GARGAREONE

Gurgulionis adeo laxati, ut ad dentes usque anteriores propenderet, curationis, historia.

Agitur nunc de gargareone; quendam mihi amicum invisi, cui repente ex labore hæc particula adeo laxata fuerat, ut ad anteriores usque dentes protenderetur; traxerat enim illam patiens digitis cum linguæ illam insidere sentiret, fretus pituitam vel aliud quippiam esse: parum sane absuit, quin illam tra-

hendo ruperit, quod tenuis facta esset, et hebetissimo imo potius nullo tunc sensu prædita, ejus radice excepta : nam et sana hebetem sensum habet. Hic eodem die solo gargarismate exsumpto liberatus fuit. Nulla enim alia medicamenta in promptu habebamus, quod in parvo pago essemus : quanquam et data opera non multitudine medicamentorum innitatur, non ignari paucis naturam esse contentam, si proprio ac loco fuerint usurpata. (*Botallus libell. de catarrho.*)

Columellam, si necessitas exigat, caute et prudenter esse excindendam : siquidem per errorem incisa, vocis detrimentum, spiritalibus refrigeratis phthisim aut citam mortem minatur.

Hujus partis (columellæ) ad finem usque amputationem, id est, discisiones extremæ lædunt omnia thoracis loca, et mutos reddunt, ut Galenus lib. de usu part. II. admonet. Ibidem enim gurgulionis usum esse tradit, ut aër ingrediens ab eo prius incidatur, impetusque ipsius violentia frangatur : ob idque ipsum et frigiditas. Hinc nonnulli, quibus ille ad basim usque esset amputatus, non modo deterius perspicue sunt locuti, verum etiam refrigeratis pulmone et thorace perierunt. Proinde ea pars non est temere abscindenda, sed portio quædam basis relinquenda est. (*Joubertus Tract. de affect. thoracis, cap. 3.*)

Gurgulio funditus exectus vocem obturbat, pulmones ac pectus refrigerat, cor infirmat, ut ait Zoar. Tabe consumuntur quibus gargar abscissum est (aphor.). Hoc non perpetuo verum, plures enim vidi obesulos, quibus gurgulio erat præcisus (Montanus lib. 6, c. 10, *cognos. morb. tom. I.*) (*Obs. III, p. 185.*)

Uvula imprudenter resecta mortis causa.

Fui vocatus ad presbyterum habentem apostema in uvula : quo viso, volui procedere ex arte, quærendo barbitonsorem et alia necessaria. In mei absentia interim alius accessit presbyter, et abscidit uvulam totam cum forfice. Qua abscisa, corpore patientis multum plethorico existente, sanguis et humores in tanta quantitate ad pectus defluerunt et secuta est tanto pecto-

ris et pulmonis strictura, quod patiens vix poterat anhelare : et finaliter non potuit spuere nec pectus purgare : et tertio die suffocatus mortuus est. (*Valescus capit. quinto, libro tertio, Philonii.*)

DE FAUCIBUS ET PALATO

Lapis in faucibus enatus.

Quidam dixerunt se vidisse lapidem generatum in faucibus. (*Nicol. serm. 5, tract. 9, cap. 12.*)

Faucium inflammationis ex pulsu, oris inspectione et idoneis medicamentis dignatio et curatio, contra Thessalicos asinos, — Resierat Commodus a lucta, cum ecce priusquam cœnaret, horam octava febris satis vehemens adorta est. Ut pulsum vero attingi, membrum quodpiam inflammati visum est. Quod simul atque Pitholaus audivit, mirari se dixit, quomodo faucium inflammatio, pueri pulsum, immutare posset, neque enim eum alia ulla parte inflammationem habere. Atque ita Commodi os adeperiens inspicere me jubebat; cum igitur fauces asperas quidem et rubras admodum esse, parum tamen intumuisse vidissem, quis illi os colluisset, postulavi, medicamento plus, quam puero conveniret adstringente. Respondente autem Pitholao se eum fuisse, qui pueri fauces abluendas censisset medicamento, quod ex melle et rhoë compositum uerat. Id ut emitteret, jussi, et aquam mulsam, in qua rosæ fervuissent, admoveret, præcepi eaque sola uteretur nocte illa, et subsequens die sæpius, et diebus sequentibus. Tertio autem die primo mane, cum inflammatio prorsus subsidisset et pene sine febre puer esset, Pitholaum monui, paulo post alumnum in balneas, cubiculo vicinas ductum, aqua perfunderet, alveo contenta, ac reliquum quidem corpus obrueret, caput autem solummodo mergeret. Quæ cum peregisset, et large prandium exhibuisset, sub horam tertiam Ania Faustina Imperatori matrimonio juncta perinde atque se excusatura, quod pridie Commodum non vidisset, accessit : Et heri inquit, post prandium novi te fili ægrotare : iisque etiam addidisti : Notum puto debuisse vos octavam horam excessisse, qua febris invadere solebat. Subrisit Pitholaus, et quomodo non expectas-

semus, inquit, Thessali diatriton præteriisse, nisi nos Galenus iste, ut hoc mane puerum inspexit squallidum ac modice febrientem, prohibuisset? quin et hoc vespere lavet se rursus, ac cœnet, quæmadmodum sanus facere consueverat. His auditis Faustina jam ibi commorata, quæ manu apprehendens exivit, ita in medicum quemdam ex comitibus suis methodicum jocans: Galenum hunc vides non verbis, sed rebus, vos methodicos expugnare. Multos enim quos incipere febrere credebatis, lavit; multoties et vinum ipse exhibuit, atque alios primos, alios tertio die ad consueta negotia dimisit. Vos autem, quotquot estis, simul atque duobus primis diebus ægrotantes sine cibo, perseverate imperastis, suspectas posmodum horas decumbendo transgrediantur, jubetis. Ac nunc quod subjunxit, scientiæ suæ certitudinem ostendit in absentis Imperatoris filio, quem duobus jam diebus, ut tu quoque heri intellexisti, vehementius febrientem, tertio die, quemadmodum vos oportere dicitis, octavam horam non expectare voluit, sed cum ante, et lavit, et cibo recreavit. Ipseque adolescentis altor Pitholaus, qui usque adeo diligens est, ut ejus diligentiam formidi nem existimare possis, viro artis experto prompte obtemperavit, et prius, quam suspecta invasionis hora excesserit, puerum ut vides, et lavit et cibavit. Hæc Faustina dicens ad currum pervenit, in quem cum ascensura foret, me magis abiens, dixi quam antea, medicis invisum reddidisti. Digressus ad Pitholaum me contuli, cui et hoc idem exposui, et ob hujusmodi medicorum invidiam, me nuper libros tres composuisse, unum de febrium differentiis alterum de diebus decretoriis, tertium de crisi. In quibus omnibus Hipp. monstravi tradidisse artem præcognoscendi, quid in singulis ægrotantibus eventurum sit: ij vero hebetes usque adeo sunt, ut neque meis expositionibus adjuti: ipsam ediscere queant. (*Galenus lib. de præcognit. ad Posthumium, cap. 12.*)

**Ex acri defluxione palati pars ad linguæ basim
mollior exesa.**

Cuidam e fluxione acri palati pars mollior ad radicem linguæ perforata est. Purgatum corpus, detractus sanguis, imperatum

gargarisma e decocto guaiaci et lacte, adpersus locus aqua alchymistarum cocta cum galla, malicorio et rosis. Acus imperata bene longa, postrema parte incurvata, et sub mucronem perforata, qua filum suendo loco traduceretur, e filo sericio cerato, præterea ut primum coagmentum vulneris rescinderetur, ac rursus resueretur. Ex quibus cum consecuta non fuisset integra sanitas, locus cera, vel spongia oclusus mansit, et postea, bene habuit æger. (*Hollerius libell. propr., obs. 4.*)

Palati lacuna morbi Gallici vitio aut aliter deperdita ut curatur.

Non rato fit ut bombardulæ ignivomæ missili globò ossis palati portio fracta, vel virulentæ luis carie exesa procidat, quo sit ut minus expresse loquantur ægri, sed obscurius, et turpidius : his etiam aliquid adferre arte nostra operæ pretium duximus. Id fiet repleta palati lacuna argentea vel aurea lamina paulo majore quam ipsa lacuna sit. Cæterum crassitiæ quæ aurei nummi solati crassitiem non excedat, figura testudinea ad ejus exteriorem, quæ scilicet, cerebrum versus ponenda est partem, religata hærebit spongiola, quæ mox humore a cerebro stillante ubi se ingurgitarit, sic lacunam, tumidior facta, implebit, ut excidere lamina ipsa nequeat, sed per se hæreat, stetque tanquam defixa. (*Pareus lib. 22, cap. 3.*)

Plura vide apud *Lusitanum* cent. 5. curat. 14. Et *Trajanum* lib. 7. cap. 18 de morbo Gallico, *Fallopium* de eodem morbo cap. 79 et *Rennerum*.

Caruncula in palato.

Caruncula in palato, juxta posteriorem dentium sedem, radice angusta, cuidam nata multis jam annis citra impedimentum præpenderet : accidit tamen vesiculam oblongam sanguine atro oppletam huic accrevisse, quæ dum in fauces dependens, molestiam aliquam exhiberet, casu in cibi masticatione confracta, evanuit. (*Platerus de observationibus propriis.*)

Cancer oris, cancer albus dictus.

Adhærescit nonnunquam recens editis puellis colore et consis-

tentia cretaceum aliquod excrementum, ad oris internas partes, linguamque totam. Id vitium ob oris intemperie natum cancrum album Gallorum vulgus nominat, et lactandi libertatem intercipit, in ulcera mox in fauces usque gulamque serpentina, nisi detergeatur, degenerans, et mortis causas plerisque inferens. Quod ne accidat medendum ipsi erit, detersione procurata, ex linteolo bacillo alligato, immersoque in medicamentum medio-cris consistentiæ ex oleo amygdalarum dulcium, melle et saccharo paratum. Hoc enim blande affricto madefactæ et deterasæ sordes eluuntur. (Pareus lib. 23, cap. 17.)

De scirrho ingenti, in ore nato, a multis pro cancro habito.

Cerdo, qui ad divi Dominici Cœnobium habitat, scirrhum prædurum, sed non omnino doloris expertem, in ore habet qui ex maxilla sinistra superiori ad palatum, ab hinc duos annos ortum, traxerat, et ita ingentem magnitudinem occupaverat, ut ex dente inferiori, illi respondente, ex directo, ita fortiter comprimeretur, ut medici consilio dentem illum album solidum et valde fixum, extrahere curaret. Cæterum, hic ad manus duodecim medicorum pro salute sua (ut aiebat) jam convenerat quorum nonnulli affirmabunt morbum hujus generis esse, ut ea scisso, aut perforato, illico vitam cum morte commutaturus esset æger, forte putantes, cerebri medullam ad eam partem descendisse, et similem hunc esse casum illi de quo alias, diximus, præcipue, de puero corniculum capite habente; alii autem morbum hunc cancrum esse prædicebant; reliqui vero morbum nunquam antea ab eis visum ac ea causa nolle illius aggredi curationem, nec eo periculum facere affirmabant: ad hunc igitur advocatus ipse, tumorem prædurum, solidum, decliviori tamen in parte aliquantulum mollem animadverto, qua de re, purgato ex levi pharmaco corpore, in mentem venit quod tumor hic prædurus cum sit, et locus minime idoneus, ut emollientibus medicamentis, et aliis ad curationem facientibus, uti libere possimus, candente ubi feramento summum in hoc casu esse remedium duximus; eo enim humorem illum frigidum, saxi duritiem præ se ferentem, caliditate ignea molliri, et ea

ipsum ad optimam viam exteri credibile erat: proinde ore adaperto, instrumento vulgari, ad id adaptato, tumorem hunc ignito ferramento perforo, ex quo aquositas nulla tunc, sed postea sanguis aqua dilutus, exivit, tunc tumor minor factus est, colore rubicundus, tactu mollis, et mitis, qui eo tempore unguento a pinguedinibus variis parato, colluebatur; cæterum elapsis duobus diebus, hic febris pertentari cœpit, et de capitis dolore conqueri, sed sequenti die melius habuit, ulcus tamen ex se putorem quendam emittere cœpit, ut æger ipse de eo conqueretur. Cæterum ulcere sæpe colluto ex decocto parato, rosis et orobo, melius habuit, ut omnibus jam spes esset, hunc ad sanitatem perventurum; semituberculi autem quantitas assumpta erat, demum ut multa paucis contraham his postea ter exustus fuit, et ad radices tuberculum extirpatum videbatur, pro cujus seminariis eradicandis oleo vitriolæo uti opus erat; sed interea, Ragusium, tunc dimisso Pisauro, me contuli. (*Amatus Lusitanus Cent. 5, Curat. 99.*)

Curatio.

Non ita dudum in manus nostras casus novus et admirandus incidit, et paucis ut est suspicio, visus, aut auditus. Mulier erat quinquagenaria major, in sinistra maxilla frequenter habens chœradas verrucis non absimiles: quæ cum annos aliquot, fixæ ibidem hæsisent, atque incrementum facerent, accidit tandem, ut eo fere loco, ubi genuini dentes oriri solent, tuberculum sese insinaret, quod sensim augescens in tantam molem extuberavit, ut totam buccam prorsus distenderet, adeo ut miseram, cynico spasmo, aut oris tortura apprehensam diceres. Et quum illa frustra, vel at ipsis empiricis opem implorasset, ita tandem excrevit, et in eam duritiem degeneravit (erat enim cartilaginosa substantia) ut depressis inferioribus dentibus, et loco suo quodam modo motis, occupata oris circumferentia extra os proeminens, Punicum malum magnitudine æquaret, adeo ut jam viam ingerendo cibo et potui fere præcluserit, quando nihil in buccam assumere potuerit, quod non citra maximos labores, auricularis digituli extremitas ingeretur. Quum igitur ad id, ut dixi, res devenisset, advocatus cum chirurgo, et Pharmacopæo nostro, admiramur protinus insolitum paucis cognitum, et peri-

culi plenum morbi genus, idque eo potissimum, quod illa nobis recitasset, quod quum agyrta quidam, per sectionem malo mederi studuisset, minimum abfuerit, quin ex immodica sanguinis profusione animam exhalasset. Igitur dum hæsitabundi quodammodo inter nos conferimus, qua ratione commodissime. præsentì symptomati succurrendum sit, et dum ego idem ad aliquod ab Hipp. Galenove scriptorum frustra referre studeo, venit tandem in mentem curatio 99. centuriæ quintæ *Amati Lusitani*, in qua agitur de scirrho ingenti in ore nato, et tandem per unctionem exempto. Præterea succurrebat nobis locus *Theophrasti Paracelsi* libro de apostematibus. C. 15. ubi morbum quendam describit (quem *alcola* vocari dixit) cui omnia accidentia, quæ accidisse huic mulieri diximus, accepta refert, tantum in natalibus nonnihil a nostro discrepare videtur. Dicit enim « *Alcola* est carnis quædam superfluitas, ex venis Jovialibus, per Martes regiones transeuntibus et nascitur solum in emunctorio Martis, id est, oris labiis ». Noster autem hic morbus, ut jam memini, originem trahebat circa extremum maxillæ inferioris processum, quem *προβόλη* vocant. Perpensis igitur singulis atque animadverso situ, et quam non atra summum vitæ periculum cauteria hic in usum vocare possemus, quamvis *Amatus Lusitanus* dicta curatione ea via processerit, et *Paracelsus* alcolam suam cum realgare præparato, et succo *Chelidoniæ* curandam dicat, tutiorem consilio per deligaturam curationem aggredi visum fuit. Filo igitur apprehensa excrescentia illa ex ore prominente, indies magis ac magis contrinximus, tantisper dum deligata pars filo resecata decideret, quod quum quater deligaturam semper altius figentes reiterassemus, totum malum tandem truncavimus, nisi postea medicamentis, quæ ad abstergendam putrilaginem, quæ mortuæ illi excrescentiæ adhærescere solet, ita gravissimum malum minimo tandem negotio superavimus. Nam et ipsos dentes loco suo ut scripsi motos et vascillantes gargarismate ex bis torta et aliis id genus concinnatis stabilivimus, et suo loco restituimus. (*Baldus Rossius* Epist. 7 *Miscell. medicinal.*)

**Ab osse ethmoido caro aliquando producta, ponderis
librarum quinque.**

Avicenna expresse vult quod quandoque de colatorio fuit

extracta quantitas carnis, quæ pervenit ad libras quinque, tamen non fuit cancer. (Hugo Senensis, consil. 28.)

Admiranda mulieris cuiusdam excrescentia, circa guttur nata, spiritum, cibum atque potum intercipiens.

Medicatus sum mulieris apostemati, quod natum erat intra guttur ejus, quod apostema erat subnigri coloris paucique sensus, jamque antequam vocatus essem, fere clauserat guttur, et mulier respirabat difficulter meatu stricto, et jam prohibuerat ei comestionem et potum, et jam venerat ad mortem, et si tantum remansisset uno die, aut duobus diebus et apostema jam ascenderat, et emiserat duos ramos super duo foramina nasi. Properavi ergo festinanter et fixi in unum eorum uncinum, deinde traxi ipsum, et tracta est ipsa portio magna, deinde abscidi eam ubi comprehendi ex foramine nasi. Mox eodem modo egi cum eo quod præcessit ex foramine nasi altero, deinde aperui os ejus, et pressi linguam ejus, postea fixi uncinum in ipsum apostema, deinde abscidi ex eo partem ejus, et effluxit ex eo sanguis paucus. Liberatum est ergo guttur mulieris, et incepit statim bibere aquam, statimque potuit etiam cibum deglutire. Non ergo cessavi incidere ex illo apostemate paulatim aliquandiu et apostema aliud succedebat loco ejus quod incidebam, et hoc pacto pugnavi diu cum malo, amputans hydræ caput, cum autem animadverterem semper succrescere aliam materiam in locum amputatæ, cauterizavi apostema intra guttur, quoare augeri amplius non potuit post cauterium. Et postea discessi, et nescio quidnam fecerit Deus cum ea, post meum discessum. (Albucasis chirurg. lib. 2, cap. 36.)

Verrucæ in gutture.

Jonnes Jacobus civis Montuanus, habitu corporis melancholico præditus, verrucis quam pluribus guttur, fauces et radicem linguæ occupantibus diu vexatus fuit, quæ presertim maxime deglutitionem offendebant, res sane non frequenter observata, sed raro admodum, nam et toto vitæ nostræ curriculo semel tantum et alteri Attilio Melagneno dicto, ejusmodi verruccis, sed longe

minoribus universam linguam conspersam videre licuit. Erant autem ex illis quas Myremetias appellant, vulgo porri dicuntur hujusmodi tubercula eo quod fila quædam intra se contineant, porrorum capillamentis radicalibus persimilia. Latini vero verrucas vocant eo quod montium eminentiis consimiles sint. (*Marcellus Donatus Histor. mirabil.* libro tertio, cap 5.)

Stomocatia.

Æmilius Gallus sub Augusto Imperat. cum in Arabiam exercitum Rom. traduxisset, in albo vico maximo Nabathæorum emporio per integrum annum exercitum relinquere fuit coactus, uti ægri milites reficerentur, qui sceletyrbe sive stomacia laborant, hoc est, oris et gingivarum putredine, et crurum maculis. (Strabo libro decimo sexto, circa finem.)

Cum Germanicus Cæsar in Germania trans Rhenum castra posuisset, in maritimo tractu fons erat aquæ dulcis solus, qua pota intra biennium dentes deciderent, compagesque in cruribus dissolverentur. Stomacacen medici vocabant, et sceletyrben. Et malo reperto auxilium est herba quæ vocatur Britannica, Frisiorum indicio. (Plin. lib. 25, cap. 3.)

Calculorum in tonsillis genitorum, pertinacem tussim excitantium historia et curatio.

Nobilis vir Sparnegker ecclesiæ Ratisponensis Ccanonicus, ob lapidem, in tonsillarum faucium abcessu concretum, continua affligebatur tussi. Ejus fauces cum medici quidam ex balaustiis, rosis, lauro, alexandrina ac alumine decocto, et aliis siccantibus colluere jussissent, quibus humore abcessus tenuiori absumpto, ex grossiori derelicto lapis magis accreverat, adeo ut laryngis musculos tumor fere occupasset : Alii vero medici bechica, tussis remedia, ad nauseam usque diu frustra exhibuissent, ego tandem accessitus, suasi ut non exsiccantibus, sed mollificantibus et maturantibus fauces affectas crebro collueret, et tepido ex malvis, ficubus, radicis althææ decocto elueret. A colluvione vero de electuario stomatico, quod ex mellis despumati unc. ij. butyri recentis insulsis ꝑ. j. pulvere ireos ꝑ. j.

aut nucleorum tribuli marini, farina bene contrita triduum lamberet : quo tumore emollito, oborta ex distillatione valida tussi, calculum gypseum excreavit, simillimum tophis, qui intra digitarum articulos accrescere ex pituita solent. (*Languis epistol.* 57, tome II.)

Præterito mense, in vicino urbis Pago, prædives quidam ut vocant, scultelus ob tonsillarum tumorem ægre spirabat et deglutiebat : In barbari tonsoris diuturna opera, qui dubio procul gargarismates e balaustis rosis, aluminisque decocto et aliis id genus siccantibus et repellentibus fauces colluit quibus tenuiori exsiccato et assumpto tumoris relicto ferreo (quod in œdematoris tumoribus ut plurimum advenit) in gypsum concrevit. Cum autem indies laryngis musculis tensis respiratio fieret molestior, me accessit cui malvarum caricarum et althææ radicum decocto tepido, os crebro colluere imperavi, a colluvione dispumatam vel todidemque recentis mulsi butyri, iridis florentinæ pulveris momento admixto, lembendum prescripsi. Unde factum, ut emollito tumore, obortaque distillatione calculum gypseum, validissima tussi excerneret, quo facto liberius duxit spiritus; curatoque ulcere convaluit. (*Joan. Jessenius, de Jessen obs. propr. CLVA Laurent. Scholtzie ad nos mis.*)

PHLEBOTOMIA

Senex annorum septuaginta, ab angina præfocativa, misso sanguine et aliis opportunis adhibitis auxiliis, integre curatur.

Senex Sabaterius, honoratus et ditissimus civis Arelatensis. senex annorum septuaginta, optimi habitus et solidorum membrorum, angina præfocativa corripitur : interna illa quidem, et a qua nihil foras apparebat, in discrimen vitæ incidit, prohibita voce, et phlegmonoso intus tumore in faucium radice consistente strangulatus, ita ut exerta lingua et tumefacta cum magno stertore spiritum duceret, instar eorum qui strangulantur. Suppuratur angina, et auxiliis multis adhibitis et venis incisis rumpitur; abcessus et sanatur ingenti cura et labore senex, qui jam ferme deploratus moribundus jacebat, supervixitque annos totos duodecim. (*Valleriola lib. 6, obs. 10.*)

Tonsillarum affectibus (Foramina).

Tonsillarum ulcerationes inspectioprehendit: in qua tamen observare decet, quod monet Fallopius, amygdalas præter aliarum glandularum conditionem, habere tunicam nervosam, multis amplioque foraminibus perviam, quæ dum illæ inflantur, magis dehiscentia, sudoribus facile imponunt ulcuscula ex credentibus; detumescentibus enim tantum glandulis, illa mox obliterantur. (Joubert, chap. 2, *Tractat. affect. thoracis.*)

De muliere, cui in tonsillis spina piscium inhærebat pene suffocationem inferens.

Mulier Delphensis vetula, cum spinam piscis devorasset, tonsillis inhærebat, ut pene suffocaretur; quæ neque ullo modo dimoveri potuit, neque potu largiore, neque aliis mollibus aut ossis, aut magno panis bolo, cui aliquando inhærere solet quæmobrem elegmata emollientia ex mucilagine et succo altheæ sem. malva, sebastim etc. (plurum cum syrupo confecta, ut continuo lamberet, imperavi. Deinde cataplasmata toti gutturi circumducta spinam cum pure evulsa, sanata fuit. (Forestus libri 15, observat. 27.)

Abcessus tonsillarum, tumoribus utrinque sub auribus obortis, repurgatus.

Laborabat inflammatione tonsillæ, utriusque filiola quædam duorum annorum, qua idonea remedia propter ætatem non admittente, natura viam sibi ad salutem quarens, morbum ad exteriora convertit. Nati sunt itaque utrinque in collo, infra aures, singuli tumores, quibus scelpello apertis, pus effluxit. Itaque ab abcessus tonsillarum liberata, sanitati restituta est (*Dodonæus observat. med.*, cap. 16). (*Lib. p. 199.*)

DE SUFFOCATIONE

A rebus variis, velut spina, pyro, acinis, pilo, pilula, caruncula, et pisciculo, suffocati.

Tarquinius Priscus, cum ad mensam sederet, os piscis trans-

versum adhæsit gutturi, ut nocte illa miserabiliter exspiraverit. Id attestatur Hagiographia *Guido Bitur.*

Matrona quædam Brixiensis, invito filio pilulam assumere neganti, digito imprudens, in arteriam compulsi: qui protinus exanimatus, in sinu jacuit. (*Alexander Benedictus in procæmio lib. 7, de curand. morb.*)

Sophoclem, Lucianus et Sotades apud Crinitum, contra Plinii sententiam, dicunt acino uvæ periisse. Val. Maximus tamen et Volaterranus, foveant partes Plinii, quorum sententiam sequitur Politianus.

Quemque senem, meritæ, rapuerunt gaudia palmæ. Nisi fortasse de Philippide intelligi male.

Anacreon Teius, poëta, 85. ætatis anno, dum passæ uvæ succo, tenues et exiles virium reliquias foveret, unius acini, pertinacior in aridis faucibus humor, eum suffocavit. (*Val. Maximus lib. 9. cap. 12, et Plin. lib. 7, cap. 7, Volat. lib. 13, cap. 3 Anthrop.*)

Terpanter, citharædus insignis, Spartæ canens in Stadio, cum ore hiaret, quidam ficum temere mittens, faucibus ejus tanta vi impexit, ut strangulatus fuerit; de quo *Triphon* in 1 *Græcorum Epigrammatum*, item *Varinus*.

Drusus Pompeius, Claudii Cæsaris, ex Herculaniilla filius, cui paucos ante dies, filia Sejani fuerat disposata, cum puer ludens, jactum in sublime pyrum, ore excepiisset, idque alte in guttur descendisset, præclusa anima, mortem obiit. (*Suetonius.*)

Fabius senator prætorius, hausto in lacte pilo, præcluso spiritum, animam egit. Adeo parva re hominis persæpe mors constat, qui superbe agendo, per amentiam, Deo se nonnunquam æquare contendit. (*Fulgos. lib. 9, cap. 12, ex Plin. lib. 7, cap. 7.*)

Juvenis quidam pomum furtim ablatum devoraturus, magnam ejus partem morsus abscidit. Interim a parente vocatus, venturum se respondet, ac simul in ipsum trachææ aditum, attrahit demorsam a pomo partem: unde suffocatio jamjam imminebat. Nisi collabanti quasi natura particulam pomi illam ita ex ore perturbasset, ac si per tubulum, vehementi spiritus impetu propulsus fuisset globus. (*Osvoldus Gabeichoverus de observationibus suis ad nos missis.*)

Puer, annorum circiter quinque vel sex, Arembergæ quod est Episcopatus Aichstadiensis oppidum, cum forte fortuna, matri

pisciculos ad cocturam præparanti adesset, et etiam unum ex illis ori inservisset : factum ut ille faucēs præcludendo, spiritum animæque meatum interciperet, ex quo misellus puer suffocatione exanimatus, interiit, magno parentum et inopinato luctu. Accidit autem hoc ipsum circa annum millesimum, quingentesimum septuagesimum octavum. Cujus rei certissimam mihi fidem fecit, industrius et laudatissimus hujus mei libri primæ editionis Typographus. (*Schenkius.*)

Filius cujusdam Manilii dicti, ex castro Bozoli, cum uvæ acerbæ grana avide ingurgitaret, superveniente matre, et cum objurgante, ex illius improviso et inexpectato adventu ; percussus puer, granum, quod jam in os indiderat, dum festinanter devorare satagit, forte in asperam arteriam delabitur, ita cum nullo auxilio sublevari posset, misellam animam exhalavit suffocatus.

Puer alius Hebræus Beseleel vocatus, dum siccam castaneam dentibus confringeret, quædam illius capita, in asperam arteriam fuerunt injecta, cui mulier subvenire studens, *dorsi percussione*, corpuscula castaneæ in pulmonis lobos delata fuere, ita quod minus anxie cor per patientiorem cannam tunc flabellari potuit, sicque oregmone et levi suffocatione interim irritantē, quatuor dierum spatio, miserrimam calamitosamque vitam duxit : verum quinto superveniente, dum a medico, in Aromatarii officina, consilium atque præsidium peteret, unius tantum tussiculæ impulsu universali nigredine infectus, ac si fune suspensus fuisset, in patris complexu e vita migravit. (*Marcell. Donat. hist. med. mirabil. lib. 3, cap. 7.*)

Joannes posthumus, Marci Perezii Antuerpiensis, qui Basileam venerat, puellus optime habitus nisi quod motu vehementiore, vel risu, vel hululatu, sæpe levideliquio tentari videbatur, hilaris lac nutricis sugens, repente anhelitu intercepto, Basileæ expiravit, anno Salutis 1576. Adaperto cadavere, ipsi laryngi adnata caruncula, nucis magnitudine reperta : quæ ubi ad justam magnitudinem excrevit, puerum novem mensium suffocavit. (*Zwingerus Theat. vol. 2, lib. 7, pagin. 515. edit. ultim*) Hanc historiam CL. V. Felix Platerus, pro suo in nos studio, et juvandæ posteritatis singulari affectu, una cum aliis plurimis observationibus suis, hisce verbis nobis communicavit. Filius Marci Peresii,

quinque menses natus, bene habitus, nullo præcedente alio affectu, subito cum stridore et respirationis difficultate, e medio sublatus est. Quo genere mortis quoque, cum duos amississet filios, causam scire cupiens, ipso rogante, pectus aperuimus et in regione juguli glandulam illius loci in strumam quandam magnam, unciam unam cum semisse pendentem, spongiosam, venisque refertam et quæ beneficio membranarum dumtaxat, vasis maximis illis juxta jugulum ascendentibus, adhærebat, excrevisse deprehendimus : cerebriformi quodam materia et sanguine oppleta : quo subito irruente strumamque illam dilatante, adeo, ut vasa illius loci, premeret, suffocatum fuisse infantem indicavimus.

Quum Neomagii apud Geldros quidam arrogantius deglutiret ovum gallinaceum integrum, quod naturalem œsophagi expansionem superaret, illud in eo coarctatum, residere nequivit : unde quoque compressa arteria, mox suffocabatur. (*Wierus.*)

Quidam piscandi et natandi peritissimus, quum manu in quodam profundo gurgite percam cœpisset, orique mordicus inseruisset, ut ad sodales enataret : Perca in gulam illapsa miserum in manibus sodalium, nihil non tentantium, exanimavit. (*Gilbertus Cognatus.*)

Quidam præcipuæ familiæ juvenis egregius, et magnæ expectationis mihi notissimus in Belgio a quadam fœmina philtro dementatus, incidit in mentis alienationem, a qua nullis remediis liberari potuit, sed sic illum in custodia libera continuerunt. Interdum vero (ut fieri solet) delirium hoc sua habuit intervalla mitiora, ut in ædibus obambulare, nihilque præter rationem adeo committeret. Is aliquando tum accedens ad fontem, in quo pisces asservabantur, statim arripuit percam minorem, et capite ipsius in os intruso, vivam illam deglutire voluit, sed perca suis spinosis pinnis in faucibus sese exserens, ita spiritum statim in faucibus impedivit, ut intra semihoram mortuus concideret. Genus profecto mortis, rarum et admiratione singulari dignum. (*Joa-chimi Camerari Norimb. Med. exemplum.*) (*Obs. I.*)

DE SPECIEBUS ET PROGNOSTICIS ANGINÆ,
SPECIES RARÆ**Anginæ raræ species, ex primis vertebris natæ.**

Ubi primæ vertebræ afficiuntur, licet raro, evenire tamen interdum angina potest, idque in pueris magis, quam adultis ; de qua Hippocrat. lib. 2. de morb. populariter vagantibus, in hunc modum scripsit « erant anginosorum affectiones hujusmodi : cervicis vertebræ ad internam conversæ sunt, aliis quidem plus, alii vero minus : atque in partibus exterioribus, manifesta videbatur in cervice concavitas ; dolorem laborans, ubi illic tangebatur, sentiebat ».

Accidit anginam cuidam, sub ea vertebra, quam dentem nominant, verum non adeo acuta : quibusdam vero ob rotunditatis magnitudinem, omnino conspicua. Fauces autem, ut ea vertebra, quæ dens dicitur, inflammatione minime laborabant, sed molestia afficiebantur. Ea quæ sub genis erant, tumebant quidem, sed inflammatione laborantibus haud erant consimilia. Inguina nullus dolor cruciabat, sed naturali potius habitu permanebant. Lingua haud facile convertebatur, atque aucta ipsis videbatur, atque exerta. Venæ sub lingua manifestæ. Deglutire, nisi magno cum labore, nequebant, At si vi quadam devorare conarentur, per nares effluebat id, quod ingesserant. Ex naribus loquebantur. Spiritus ipsis non admodum elatus ; nonnullis capitis, temporum atque cervicis venæ attollebantur. Atque horum quibusdam, quibus dolores recrudescebant, tempora paululum calebant, quamvis alioqui non febricitarent. Plurimi non suffocabantur, nisi quum vel sputum, vel aliud quippiam deglutire tentarent, Neque subsidebant oculi : Igitur quibus tumor non in alterutram partem deflexus sed rectus erat, nequaquam paralytici evadebant. Horum si quempiam periisse mihi constaret, id referre gravare minime. Nam quotquot memoria nunc consequi possum omnes superstites permanserunt. Atque alii quam celerrime sanitati sunt restituti : Alii non pauci quadragesimum diem præterierunt. Insuper nonnullos febris omnino non arripuit. (*Galenus* lib. 4, cap. 3, *De loc. affect.*)

(*De Angina, p. 207.*)

De latente ac difficili angina.

Nulla inter anginæ species æque periculosa est, ac ea in quam nullus tumor in faucibus ac collo apparet, quam latentem hac de causa non inepte dixerimus. Talis autem quandoque hominem paucis diebus conficit, ac e vita tollit mente et sensibus integris. Quod et Hippocrates prædictionum lib. 3. cap. 8. scriptum reliquit. Angina, inquit, gravissima est et celerrime interimit, quæ neque in cervice (id est collo, interprete Galeno) neque in faucibus conspicuum quid efficit. Hæc etenim eodem die, et secundo, et tertio, et quarto strangulat. Plurimum vero hanc quoque dolorem inferre, et spirandi (addit) difficultatem. Adsunt vero non modo hæc, sed et vehemens copiosaque humorum e capite destillatio, dolor autem circa laryngem et asperam arteriam talis, ut nec contingi, quantumcunque leniter, citra gravissimum dolorem queant, sed nec moveri sursumque attolli. Quamobrem non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed et cibus ac potus ægerrime, aut non, demittuntur. Cum etenim per œsophagum descendunt, cedit et sursum ascendit larynx. Inflammari per hujusmodi anginam, interiores ac latentes laryngis muscoli existimantur. Verum nos nullam juxta laryngem aut ejus musculos, vel circa asperam arteriam, inflammationem aut abscessum cognovimus, sed pulmonem male affectum observavimus.

Lanio quidam meridie circa laryngem et fauces dolorem sensit, et quandam in deglutiendo cibo ac potu difficultatem. Adiit sub vesperam pharmacopæum. Datur ex aquis plantaginis, lactucæ, et diamoron, addito aceto, gargarismus, quod cum subinde uteretur, doloribus intensis subito nocte mente constans, strangulatus interiit. Hujus corpore aperto, reperta est pulmonis substantia, mollis et in pus conversa, et ad unum ejus latus abscessus pure quoque impletus. Nulla tussis huic antea fuerat molesta, neque sanguis ulla sputatio præcesserat, sano validoque corpore eousque visus, eoque non gracili, sed obeso.

Eadem et superioribus similia, æstate anni 1565, diligenter annotavimus, quando multi angina ac simul molesta ex capite distillatione correpti fuere, præsertim ex his, qui præcedente hyeme, vel tussi, vel raucedine laborassent, aut e peripneumonia

evasissent. Plurimis horum posteaquam circa laryngem dolo^r remissior, tandem desiisset, peripneumonia successit, cum lateris dolore, non tamen pungente; aderant respirandi difficultas, et pulsus mollis. Horum non pauci intra non multos dies mortui; seniores evaserunt, et natura frigidiores. Pulmones horum vel purulenti fuere, vel abcessum habuere; juxta vero laryngem, aut ejus musculos nihil occurrit, quod vel adesse vel adfuisse inflammationem ostenderet. Satis quid emapparuit, pulmones male quidem prius affectos, superveniente ac accedente e capite destillatione reliqua symptomata successisse: laryngem vero non primario, sed per sympatiam, sive consensum laborasse. Verisimile vero etiam est, distillante humore, asperam arteriam, ejusque ramos impleri atque distendi: deinde eodem ad alia vasa transmissa a dolore liberari asperam arteriam, ac ejus supremum finem ipsam laryngem; pulmonis autem male affectas partes a dolore occupari, atque hoc modo ex angina in peripneumoniam permutationem fieri. Subvenit huic morbo mox, si vires ferant, venæ sectio; ita enim citissime impetus defluentis humoris et avertitur et compescitur: deinde quæ lenire asperam arteriam et pulmonem queunt, ac sputi facilem exitum procurare, cujusmodi sunt dulcia, ut glycyrrhiza, ejusque decoctum, uvæ passæ, vinum passum, aqua mulsa, vinum mulsum, dilutum, si febris adsit, et alia ejus generis, quæ a Cælio Aureliano commendantur. Adstringentium ac reepercutientium in hoc morbo usus, inutilis, aceti vero etiam perniciosus. (*Dodoneus cap. 18 observationum.*)

Appellat anginam Hippocrates. Gal. teste, affectum circa fauces, qui spirationem quoquo modo reddit deteriore. Hujus genera quatuor lib. de locis affectis 4. c. 5. enumerantur: alii deinde et affectus referuntur, per quos cibi potusque via impeditur, et cum difficultate cibum laborantes deglutiunt, potus vero etiam pernares resilit. His annumerari æsophagi, ab inhærente ossiculo, inflammatio potest. Per hos autem affectus, spirandi quoque difficultas quædam oboritur, sed citra suffocationis periculum. Est autem suffocatio (nonnullis strangulatio) non aliud, nisi interitus subitaneus, propter defectum inspirationis, (ut Gal. in comment. Aph. 34. lib. 4), qui fit ex angustia alicujus instrumenti, ex iis, quæ serviunt respirationi; angustia vero fit, vel

repleta media regione, quæ inter thoracem est atque pulmonem, aut pulmonum meatibus; vel aliqua inflammatione totum occupante viscerum, ad asperam arteriam, vel etiam partem, quæ veluti caput ejus est. Quæ etiam inflammatio aliquando fieri solet in præjacente spatio, quod fauces appellant. Atque una harum causarum, ejus de qua scripsimus anginae occasio fuit, pulmonis videlicet *χρσας* sive meatum atque ipsius asperæ arteriæ ex affatim defluente humore repletio. Quæ, quomodo, ac qua via in peripneumoniam convertatur, ostendimus. Est autem hæc inter anginas, per quas nullus in faucibus tumor apparet, et quæ subitaneum periculum adferunt, frequentior. Quæ vero asperæ arteriæ, vel musculorum, qui gulam cum gutture jungunt, inflammationem consequitur, omnino rarissima. Contingere hujusmodi aliquando posse, negari nequit, extante præsertim exemplo apud Anton. Benivenium. cap. 38. Pus etenim loco circa collum, altioribus plagis inciso, erumpens, inflammationem præcessisse vicinorum musculorum manifestum fecit. Idem scholia ad idem caput.

In angina affluxum sanguinis subinde recurrere.

Usu medendi observavi in anginosis affluxum sanguinis subinde recurrere. Itaque si ita necessitas suadeat, repetenda erit per vices quasdam sanguinis revulsio. Quinetiam in morbi progressu, discutientia minus utilia animadverti, quod irritent, ad defluxum humorum. Quare anodinis et lenientibus solis, tutius in hoc affectu proceditur. (*Jacob. Oethæus lib. observ. propriarum.*)

DE PROGNOSTICIS. — DE ANGINA

In angina rubor et tumor cervicis et pectoris, si intro convertantur, mortis argumentum.

Tanto securior angina est, quanto inflammatio magis secedit a partibus internis, et via respirationis. Talis est dispositio, per quam inflammantur cervix et pectus, ubi non recurat inflammatio aut sacer ignis ad partes interiores. Sic enim dixit Hipp. aph. 50, 7. sect. Ab angina habita, tumor et rubor in pectore super-

venientes, bonum : extra enim vertitur morbus ubi tamen contingat intro converti, malum erit. Quod contigit cuidam vetulæ sexagenariæ, quo tempore Illustrissimi Ducis de Medina Cœli patronis mei curam gerebam, passa est anginam in tertia specie, inflammatis faucibus et cervice, sine difficultate respirandi, convenientibus adhibitis remediis, rubor ad pectus descendit, plurimum demissa inflammatione faucium quinto die morbi, septimo die parum coctum spuebat in magna copia : cæterum decimo die recurrit rubor, subito namque spuere cessavit, febris aucta est, rubor pectoris evanuit, et undecimo die mortua est. (*Christ. a Vega. Comment. ad lib. 3. prognost. 28, Hippocratis. (Liv. II.)*)

Angina Lethalis.

Angina ista quatuor phlebotomiis, cum scarificationibus tribus sanguinis libris eductis, ægrum intra octo horas necavit.

Nonnulli vocarunt me, ut curarem Dominum Collam Libum ; Vir erat hic curialis et illustrissimo Alphonso Duci Ferrariæ carus : cœpi illum interrogare, sanus lectam ingressus erat vesperi ; hora decima experrectus, persensit in gutture dolorem, nec poterat anhelare, nec deglutire jussi ; ut aperiretur vena communis, et decem uncia sanguinis extraherentur vel duodecim, promissique me iterum accessurum cum alios quosdam ægros visitassem ; dum aberam, illum interim visitavit Elleonurus Sanseverinus, expertissimus in re medica vir, qui jussit ex humerali libram aliam sanguinis extrahi, postea discessit : sed et ab amicis fuit ad illum ductus excellentissimus Magister Sigismundus Nicrosolus, qui anhelitus difficultatem videns, ex alio brachio (nox prona a dextro, hic a sinistro), aliam sanguinis libram educi jussit, illincque discessit ; nos statuta hora Dominum Collam revisentes historia de aliis medicis enarrata est, erant tres sanguinis libræ eductæ, jussimus ut sub lingua venam secarent, itaque factum est, additæ sunt cucurbitulæ, et omnia diversionum genera, tamen fieri non potuit, quin decima octava hora obiret, et decima hora angina correptus erat. Cynanche erat. (*Anton. Brasavola Comment. ad lib. 4, de rat. vict. acut. Hipp.*)

**Angina octodecim, interdum duodecim, nonnunquam
etiam decem horis interficiens.**

Omnium periculosissimam anginam censuit Hippocrates, ubi neque in faucibus, neque in cervice quicquam apparet. Hujus quippe inflammatio penitus abstrusa, graviora infligit symptomata, non sine metu præsentis strangulatus. Hæc sæpe vidimus sublatum ægrotum horis octodecim constante mente, integrisque sensibus. (*Fernelius lib. 5, cap. 9, Patholog.*)

Proxenetæ ille, qui circa oleum versabatur, cum advesperasceret, quod de gutture, strangulabatur, conqueri cœpit, pro qua abigenda mala affectione, remedia varia sunt facta, vomitus namque evocatus fuit, et oxymelitis portiunculam per intervalla lambebat; ex stomacho namque malum hoc evenire credebatur, sed postea scapulis et cervici cucurbitulæ, secta cute, sunt adfixæ; demum morbo graviore facto, intra duodecim horas miser ex vita stertendo decessit; intromissa autem cerea candela per œsophagum sive gulam, nihil impedimenti perceptum est. Fuit igitur sævus hic morbus angina, asperam arteriam occludens, et respirationem impediens: cæterum hoc in casu, sanguinis per venæsectionem missio, et cætera remedia prætermissa sunt, quia volucris occasio. Porro vir ille ad quem vocati diligenter venimus angina strangulabatur, per signa namque et notas loquebatur, qua de re illico; nulla interposita mora, aut vacatione alia præhabita, sub lingua venas secare fecimus, et sanguinem ex eis convenientem fluere; quo constricto, pauculo interposito tempore ut ita dixerim, relictis viribus, repente brachicephalica vena, secta fuit, et ex ea per intervalla sanguis missus, unde brevi vir hic melius habuit, et postea nonnullis aliis celebratis remediis sanitatem pristinam adeptus est. (*Lusitanus. Centur. 7, curat. 90.*)

Synanche exacte peracuta est. Vidimus etenim synanchen, quæ in decem horis interfecit. (*Brassavolus comment. ad aphor. 10, lib. 5. Hipp.*)

Cuidam in musculis dextræ partis laryngis, cum orta esset inflammatio neque appareret, sed tactu duntaxat extremo dolorem præ se ferret, mors subita tribus horis a missione sanguinis, consecuta est. (*Scholiographi ad cap. 2. 3. Hollerii de morb. int.*)

**Ex angina strangulante, et febre peracuta, æger
in quatuor horas obiit.**

Annius Reynerus, qui in foro frumentario Delphis agebat, vir circiter annorum triginta in anginam lethalem et febrem peracutam incidit, ad quem Ericius Leydius medicus, collega meus, prius vocatus fuit; ab injecto clystere, sanguinem ex cephalica detrahare jubet, ac gargarismata, tum alia apta remedia præscribit; tertio die cum in Hagham comitis collega vocatus esset, cum suffocatio immineret, ad eum accitus sum, cum nihil deglutire posset, libenter sanguinem ex venis sub lingua detraxissem, sed os aperire non potuit; interea collega reverso, etiam Nievenius Medicus Haghanus una vocatur, verum cum nullum medicamentum per os sumere posset, iterum clyster injectus est, unde, probe quidem alvum deponebat sed nihil juvaminis, neque ex emplastris, aliisque remediis, exterius adhibitis, sentiebat, ita ut angina strangulante, tum febre peracuta obierit quarto die, cum et angina per se malum acutissimum, sine febre etiam aliquando ante quartum strangulet ac suffocet. (*Forestus, scholia ad observ. 5. lib. secundi (Observat. suarum.)*)

Historia cujusdam mulierculæ, angina laborantis quæ devoratis bolis aliquot cassiæ et vomitu excitato, statim strangulata interiit.

Quod si in angina ex molestia medicamenti concitetur vomitus, non ita velox strangulationis imminet periculum, si liquidum fuerit medicamentum, veluti si solidum; pilulæ enim et boli, dum vomitu ejiciuntur, confertim et valido impetu ad angustias oppressi ab inflammatione transitus, majus afferunt periculum. Unde aliqui hac ratione repente strangulati sunt. Ut accidit hic Patavii cuidam mulierculæ, laboranti angina, quæ devoratis bolis aliquot cassiæ, et vomitu excitato a molestia medicamenti, statim strangulata interiit. (*Trincavella lib. 5, cap. 7 de rat. curandi, part. human. corp. affect.*)

Selecta aliquot, tum de experimento, tum de historia ad anginam remedia.

Aqua ex floribus ac foliis Periclymeni, vulgo caprifolii, anginæ præstantissimum est remedium. (*Rob. Constantinus in supplement. ling. lat.*)

In angina cassiæ Ægyptiæ succus extractus, cumque aquæ plantaginis mistus, plurimum conducit. (*Camerarius in horto.*)

Annosæ arboris Sambuci, apud Boreales præsertim ramis accrescit excrementum corticosum coriaceumve, multis dotibus cognitu dignissimum, plebique Anglæ et Germanæ *indæ aures* vocatum propter effigiem auris, quam cartilagineo concretu rugosoque complexu multis plicis et mæandris æmulatur; sed colore pullo, prædurum, aquis mersum molescens, spongiæque ritu tumens; anginæ certissimo experimento utilissimum, et tumoribus intus forisque nunquam satis laudatum gustu pene insipidum, cutis elixæ, aut corii. (*Pæna et Lobellius in advers. stirp.*)

Fungus sambucinus in vino coctus et potatus, præsens remedium est anginosi, præcedente et sequente suffitu de olibano. (*Leonellus in praxis.*) Plura de hoc remedio, vide in *Iatreio Wirtembergico*, p. 244.

Lignum hederæ a proprietate valet ad apostemata gutturis; ideo comedens ex cochleari de hederæ ligno, vel bibens ex vase ligneo hederaceo, nunquam vel rara in apostema gutturis aut uvulæ incurrit. (*Joan. Marguærdus in pratica, Cap. de angina.*)

Rubeta synanchicis cocta, pro emplastro imposita, adeo prodest, ut quemdam hoc auxilio, cui tam tamquam morienti, de more candelæ inscensæ fuerant, liberaverim. Crediderim et filum, quo suspensus interierit, conferre. (*Cardanus lib. 7, cap. 38, De varietate rerum.*)

ꝯ Gumi sambuci drach. ij. aristol. rot. drach. j. aquæ capri, folii. unc. iij. bulliant; simul et fiat gargarismus. (*Chalmeteus enchirid. Chirurg. cap. 30.*)

Cinis hirundinum combustus, Melichio admodum probatus, antidotario suo. (*Lib. II, De angina obs. I, experim.*)

Admirandum Galeni ad anginam experimentum.

Memini me admirandum canini stercoris expertam facultatem. Canino etenim stercore, uti assidue consuevit præceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani edenda exhibens, duobus continuo diebus, ex quibus durum, candidum ac minime fœtens stercus proveniebat. Hoc igitur acceptum desiccabat, ut cum postea usus esset, facile ad lævorem posset redigi. Utebatur eo ad anginam et dysenteriam, et summe inveterata ulcera ad anginam quidem, iis medicamentis admiscens, quæ alioqui huic affectui congruebant, etc. (*Galen. lib. 10 simpl.*)

(*Magie.*) Anginæ cura, per guttur lupi.

Lupi guttur (asperam arteriam) hoc loci memorandum mihi visum est, ob insignem experientiam, cujus cum insigni docto medico, Adolpho Occone, Augustanæ reipublicæ Physico officiossimo, paucissimi medici hactenus consci fuere. Nam qui per hoc guttur bibit, in synanche, id est, angina, certissima salute evadit. (*Joan. Agricola, lib. 2, Medicinæ herbariæ.*)

Anginæ curatio mira et superstitiosa.

Mulier quædam superstisiose butyrum mense maio asservabat, et colligebat tribus diebus rogationum, imprimis e lacte vaccæ, quæ matrem peperisset mulieribus, quæ feminam. Urgente angina, inungebat collo, cervicis partibus vicinis, carpo plurimum fricando. Atque hac ratione non paucos sanitati restituit. (*Scholiographi ad c. 22, lib. I Hollerii de morb. intern.*)

INGENIOSA TUMORIS CURA.

Variæ et ingeniosæ suppurati tumoris in angina aperiendi rationes.

Hiante ore, lingua deprimitur, culter ligneus acutus indagatur, ut tumor disrumpatur. Tum prono capite sanies repurgetur in guttur. Ubi in faucibus manifestus est tumor, vellicandus est unguibus, aut ferro aperiendus. Alii spongiæ partem ad magnitudinem avellanæ suspendunt et filo, et ita ab ægro devorati jubent. Intumescit spongia atque dum vi

retrahitur, tumorem rumpit. Alii bolo carnis salsæ semicoctæ ita suspenso et devorato tum vi retracto moliuntur. Alioqui scarificandus locus est, sub maxillis, sub mento in collo, vitatis semper nervis et arteriis. Sic enim aliquando sanies effluit. alioqui cucurbitulæ scarificatis locis apponendæ sunt. (*Hollerius* lib. 1, cap. 23 *de curand. morb. intern.*)

Nonnulli etiam panis crustam devorandam præbent. (*Duretius*, in *adversariis* ad eundum locum.)

Quidam optimo successu, attingunt duntaxat oleo ex vitriolo et mox rumpitur abcessus. Sunt qui ceream candelam impingant, et rumpant. *Arculanus*, cuspide ferrea ligno infixa, sic ut alias partes non vulneret, illud efficit. Neque ei placet, quod nonnulli volunt spongia ex filo pendente ac devorata, et paulo post, dum humore turget, violenter evulsa, id tentare. Qui enim illam transglutient, cum vix liquidissima quæque absorbeant? *Rogerus* idem facit ex frusto bubulæ carnis semicoctæ : utrumque probare videtur *Guido* non absque ratione prorsus. Quando enim suppuravit materia, solito minor est tumor ; cum per maturationem fiat quidam fervor, et per ebullitionem non parum humoris exhalet et absumatur. Unde *Aetius* quoque præcipit in tonsillarum inflammatione frusta panis in aqua macerata quam maxima et alios cibos, acervatim ingerere. Vehementiore enim circa abcessus obvolutione facta (inquit) eodem modo afficiuntur, ac si sectionem substineant. (*Joubertus*, *tractat de thoracis parium affect. cap. 1.*)

Si apostema venerit jam ad maturationem et non rumpatur, oportet ipsum aperire, ut exeat sanguis. Inspiciat ergo medicus in ore, et si appareat, hoc modo rumpatur. Accipiat unum lignum subtile, rotundum ; in cujus extremitate apponat ferrum acutum, cujus longitudo sit tantæ quantitatis, quantæ est medietas digiti, in ore ; deinde ore aperto ponat lignum intra dentes ægroti, ac si esset frænum, deinde ponat cannulam illam cum ferro ad locum apostematis, ac scindat. : aperto apostemate, pronus declinet caput inferius, ore aperto, ut exeat sanies. Si autem non potest rumpi, quia non appareat visui, imponat digitum in os, et cum unguibus rumpat, si potest. Rupto apostemate, mundificetur hoc modo. Accipiat aquam mellis, secundum artem decoctam, et gargariset. (*Leonell. Praticæ, cap. 19.*)

Anginæ suppuratio ruptorio medicamento promota, exemplum memorabile.

Illustris mulier, Gabriela Gouffier, Domina a Saultour, cum angina autumnali, omnium periculosissima, detineretur, venit in mentem legisse me apud *Aetium lib. 15, cap. 6*: Agaricum occultos abcessus absorbere, vel foras materiam evocare; statim agaricum in taleolos conscissum, in decocto rad althææ, ficuum cum momento zinzib. et quarta parte vini albi, maceravi, addidi syr. de althæa, potionem ægrotæ dedi, monuique ne illam statim deglutiret, sed aliquod tempus, in imis faucibus contineret, si hac potione vitam sibi redimere vellet. Obsequitur ægrotæ, iterum dum cum illa sermonem confero, ecce magna puris albi copia, tam putridi et graveolentis, ore rejicitur, ut filia quæ ad matrem cum pelvi adstabat, emissio pure, nec consueto et illius puris fœtore, conciderit animo; reliqui custodes magna corporis contentione foras proruperint; accurrunt aliæ, purulenta detrahunt, detergent; festinant aliæ, ut intolerabilem gravis odoris fœtiditatem, suffitu quodam depellerent, qua sublata ad ægrotam rediit, quam plane et vocis vitio et respiratione difficili, et gravi deglutitione et febre levatam reperi, et ab omni vitæ periculo tutam qua nunc fruitur incolumis. (*Jacobus Douynet apolog. lib. 3, cap. 21.*)

Anginæ tumor maturus, in muliere quinquaginta quinque annorum feliciter sectus.

Quoniam bona casuum narratio, multum corroborat operantem, ponam in hoc loco quid mihi accidit in civitate Mediolani, de quadam domina quinquagenaria quinta quæ habuit squinantiam phlegmaticam, quæ totam occupavit gulam, intus et extra: ita quod extra tumor maximus apparebat. Et cum hoc non loquebatur, nec poterat transglutire. Hæc fuit in cura cujusdam juvenis mei scholaris per plures dies; de malo in pejus quotidie procedebat. Tunc quasi in casu desperationis fui vocatus, et inveni eam in statu pessima, quia pluribus non comederat diebus, nec audebat dormire, quia timebat subito suffocari;

tunc tangens pulsum ipsum, in ultima inveni debilitate. Tangens *locum corruptum*, sensi materiam in profundo; quod cognoscens, cognovi quod potius suffocaretur, quam exterius apostema vel interius rumperetur; tunc mihi preparavi *rasorium*, et locum palrans cum digitis, inveni maturam materiam, *inter mentum et epiglottum* plusquam in alio loco congregatam. Tunc locum palrans cum digito, ut possem nervos, venas et arterias evitare, vulnus ibi feci profundum; per quod de corrupta et male foetente materia magnam partem extraxi, magnamque partem dimisi, quam tunc evacuare poteram; secundum rationem volui, quam scivisti. Tunc ægro leviores habuit anhelitus, pulsusque fuit fortificatus timorque mortis subito diminutus: eo quod ad cor major poterat aëris quantitas delegari. Tunc administrans ei brodium, per vulnus magna ipsius quantitas exibat; tunc ingeniavi ut cum argentea *canula*, quæ posita in ore totum vulnus transibat, sua cura reciperet ad ipsius necessaria nutrimenta. Gulam totam et collum cum medicinis mundificantibus et residuum materiæ maturantibus circumdabam, donec extraxi de vulnere frustum magnum viscosæ materiæ et foetentis; quæ fuerat sicut quodam intestinum longum plus et grassum, unius majoris digiti magnitudine: quæ quidem materia calore fuerat extraneo condensata, quæ quidem remota, remansit locus sine foetore, et ægra incepit maxime confortari. Tamen in ea continuavi mundificativa et in carnativis et cicacitrativis; vulnus optime sigillavi et ægra fuit sanitati pristinæ restituta. (*Lanfrancus, chirurgiæ majoris, doctrina. 2, tract. 3, cap. 5.*)

(Voir obs. III.)

De angina gravi præfocativa, a qua converso extrorsum tumore et suppurato, liberatus æger fuit.

Jonnes *Coblet* Piscator, angina gravi laborans et in præfocationis periculum adductus, crassiore reddita lingua, ut præ tumore contineri intra os minime posset, exertaque lingua, rubentibus et prominentibus oculis, in horas præfocari videbatur; converso extrorsum tumore et suppurato, liberatur integre. (*Valle-riola lib. 2, Observat. 10.*)

Apertis post aures tumoribus, evacuato puro soluta angina.

Quod Dodonæus in puella bimula se observasse retulit Idem ego in viro 34. aut circiter annorum, sed pauperculo videre me memini ante 10 circiter annos Backnangi. Cui itidem apertis tumoribus post aures satis magnis, cum pus copiosum effluxisset, angina soluta est. (*Osswaldus Gabelchoferus de observationibus suis.*)

Ab angina sanguinea æger inedia sanatus plurimum dierum.

Quidam in angina sanguinea ægro venam non secuit, quoniam macer esset languidisque venarum receptaculis; in cubiculo eum frigidissimo collocarunt, ne sitiret esuriretque, neque vires resolverentur: tum enim synanchicus inedia plurimum dierum sanatus est, quoniam sanguis alimentum corpori subministravit. Indicio sit, quod apostema non intumescit, neque distenditur. (*Alex. Benedict. de curand. morb. lib. 7, cap. 19.*)

(*Voir obs. I.*)

LARYNGOTOMIA

1° Extractum Benivieni (voir textes Benivieni).

2° Extractum Agricolæ. — « Ubi tantum inturgescere cœperit locus, ut tam cibum quam aër permeare nequeat, universalibus indicationibus satisfacito scilicet venæ sectione, et revulsivis et aversivis cum evacuativis præmissis, deinde robore vitali perseverante, inter semicirculos cactilagineos et signodes, arteriæ asperæ vulnusculum ex transverso non nulli incidunt. Per id enim cor pro sui refrigeratione aerem frigidum inspirat, expulsis et emissis inde fuliginosis halitibus et fumosis. (*Joan. Agricola lib. 2, Medicinæ Herbariæ.*)

3° Extractum Jouberti (voir textes). (Joubertius.)

4° Extractum Brassavolæ. — Non possum silentio præterire quod vidi; ancilla cepit cultellum, et misit eum in guttur suum, et incidit eo partem canalıs pulmonis, et vocatus sum ad curationem ejus et inveni eam mugire, sicut est mugitus mortui;

conspicui ergo ad vulnerem, et inveni sanguinem paucum, qui egressus fuerat a vulnere. Colligere ergo potui, quod ipsa non absciderat venam, neque quid egi, et ventus egrediebatur ex vulnere; properavi ergo et sui vulnus, et curavi ipsum donec sanatum est, et non accidit ancillæ aliud malum, quam raucedo in voce. (*Albucasis lib. 2, cap. 43, methoda medendi.*)

Nostris manibus incisionem fecimus in uno qui jamjam expirasset, magistro Sancto tonsore non audente, et sanitati restitutus est. Ab Alphonso Illustrissimo Duci Ferrariæ tertio visa est res hæc adeo ardua, ut dignatus sit ægrum illum visitare et foramen inspicere. Videmus in suppuratione thoracis circa quartam et quintam costam aperiri, et ascitem per incisionem curari et fiunt in umbilico incisiones curari, in inguinibus in his qui Intestinalem herniam patiuntur, in perinæo in lapide vesicæ. Neque prædictæ rationes contra hanc incisionem valent, nam quod de vesicâ et intestinis adducitur, simile non est, quia vesica musculos non habet, per quos consolidari possit quando incisa est, neque intestina tenuia, de quibus loquitur Hippocrates musculos habent. In gutture verò inter annulum et annulum musculus adjacet; per quem agglutinatio fieri poterit. Visimus nos quendam, qui illustrissimi Ducis bubulos pascebat qui multos habebat perfractos gutturis annulos; hic ob quædam scelera torquebatur, et cum prætor illi comminaretur, nisi vera patefaceret, sequenti die esse œquuleo levandum, desperatus hic in carceribus modum se necandi quærebat, invenit fortunata cujusdam ferreæ loricæ partem, ab ea laminam abstulit ferream et propriis manibus guttur sibi dissecare cæpit, et magnam annulorum anteriorum partem dissecuit ad numerum quinarium, et partem epiglotti, abstulitque in latitudine portionem; tamen sanitati restitutus est. In *ultima desperatione* in angina, semper suaderem *guttur secundum esse*, tum ob prædicta, tum quia experientia hoc ostendit. In brutis animalibus nam si collo suspendantur obeunt, quia spiritus via occluditur; at dum suspensa antequam sint penitus suffocata, si trachea arteria aperiatur, non suffocantur sed sanantur, si a colli suspensione liberentur. Ex hoc igitur, experimento inferri potest, *gutturis sectionem tuto fieri posse* in anginosis: nec mirum quod hæc animalia vivant, nulla arte illis adhi-

bita, in hominibus vero artē plurimum facere. Adde nonnunquam contigisse aliquibus guttur fuisse vulneratum, et annulos incisos, tamen sanitati restituti sunt. Cur igitur in tanto discrimine potius non est adhibenda huic operationi manus, quam sinere ægrum suffocari? Petis, quonam modo ejusmodi gutturis incisio fieri debeat? Respondemus: recentiores dicere, jubendum patientem stare semierectus super unum sedem anteriore colli parte bene tensa, mox excoriandum in tertio aut quarto circulo sub epiglottis, et postea inter cartilaginem unam et aliam tres fiant aut quatuor scissuræ rotundæ, quarum duæ versus dextram partem, et alteræ duæ sint versus sinistram, et ita relinquantur quoad periculum transactum sit, vel fiant unum in dextra parte aliud in sinistra, denique utantur incarnante medicamento, et ægri sanantur. Nos talem excoriationem non facimus, ne dolor inferatur ægroto, qui jam satis doloris perpressus est; propterea jubemus ut extendatur pellis supra guttur, et quicquid supra positum est, postea e regione spatii inter annulum et annulum fiat sectio una per transversum, neque duo solum foramina fiant vel tot foramina. Nos etenim his manibus ita fecimus et æger, convaluit. Et Paulus Ægyneta ex Anthyllo pellem extendit, non excoriat, nisi illi sint ignati qui incidunt, ne annulos inciderent: locus vero conveniens distat ab epiglottis per tres aut quatuor annulos, secundum recentes. Sed cum incertus sit locus abcessus, opus est in inferiore parte magis aperire, ut simus sub abcessu, quia cum oculis non videtur, est sub quarto annulo, et tutius est inferius incidere, quia si superius facta esset incisio, iterum incidere oporteret, neque mihi placet hos incidendos sedere, nam facile sedendes in syncopen transeunt sed jaceant ut sunt, si contingat in illa parte esse abcessum quandoque inciditur et exit pus, ut mihi in incidendo evenit, pus exivit et sanguis extra cannam collectus, et is qui per aliquot horas neque voces effingere poterat, loqui cæpit. (*Brassavolus comment. in lib. 4, sect. 35, Hipp. de rat. vict. in morbis acutis.*)

Quidam jussit sibi gurgulionis finem amputari, absente medico cum inde suffocaretur et servatus est. (*Scholiographi ad cap. 23, lib. I Hollerii de morb. int.*)

Percussa aspera arteria interdum certo mortem affert, inter-

dum periculum ingens, sine certa tamen desperatione; nonnunquam etiam, si convenienter vulnus tractetur, sanati potest, ut veterum laryngotomia probat. In synanchicis enim ore, et gargareone inflammatione obsessis, aut etiam tonsillis asperæ arteriæ os aperientibus, cum strangulatus periculum imminet, cum alia ratione occuri non potest, infra arteriæ incolumis caput spatio trium ipsius quatuorve circulorum; secant scalpello arteriæ membranosa vincula intra duos cartilagine, donec spiritus per vulnus cum murmure quodam erumpat, et vox intercidatur, imprimis cavendo, ne vasa et tunica cartilaginum exquisitissimo sensu prædita dividantur. Tum declinato strangulatus periculo, ora vulneris renovant; mox suturis cutem citra cartilaginem committunt et convenientibus remediis glutinant. Simili curatione utuntur, si quis mortis desiderio, aut aliter jugulum sibi inciderit. Idem confirmat. *Paulus 6, 33 ex Anthyllo. Avicenna fen. 9, 3, cap. 2, præcipit. Albucasis felici cum successu expertum scribit in ancilla. Rases 3. continent. Avenzoar 10 tract. 14. Haly. 2. Pract. 38. idem docent. Galenus I, de loc. affect. 1. et 5 method. 8, bronchiorum in pulmone ligamenta dividi sæpe testatur, vel a puris acrimonia exesa, vel ab humiditatis copia quorum abscissione bronchiorum, decidere et expui contingit, unde nec necessario, nec nisi post longum intervallum, mors consequitur. Quinetiam alio loco scribit, satius esse, ut simul cum, vena vel arteria pulmonis rupta, ramus asperæ proximus dividatur quam si servaretur integer, quia fluenti sanguini exitus facilius est per asperam, quo integra expurgatio speratur. Ubi enim bronchiorum vincula illæsa manent, per solas anastomoses asperæ sanguis transcolatus retinetur, atque in grumum concrevens per moram putrescit pulmones vitiat, tandemque interficit. Ex his intelligitur asperæ arteriæ vulnera, neque necessarie, neque semper esse lethalia, nisi ut recte adjecit Hippocrates, magna ad modum fuerint. (*Jacotius Comment. ad aph. 16, lib. I, sect. 3, coac. Hippocr.*)*

Ne quid in hujusmodi vulneribus desperet, aut intentatum relinquat chirurgus, placet aliquot exemplis, quam mira sint naturæ arte adjunctæ opera, patefacere. Servo cuidam domini *Champagne*, nobilis andegavensis, ense vulnus ad jugulum inflictum est, ex quo jugularium venarum alterutra cum aspera

arteria excisa erat. Sanguinis aderat ingens profluvium, et sistendi impotentia, eaque symptomata eo usque perseverarunt, quod consutum vulnus esset et medicamentis obductum. Medicamenta vero si quando liquidiora essent, ea per vulnus et suturæ interstitia tanquam fugient, et sucta allectaque ore mox reddebat æger. Itaque exactius inspiciens vulneris magnitudinem, partium affectarum, præsertim vero asperæ arteriæ, et jugularis venæ spermaticam adeoque siccam et exsanguem naturam agglutinationi rebellem expendens, tum etiam quod trachea arteria iis motibus, quos inter deglutiendum œsophagus obit, obnoxia sit, propter tunicam internam quæ œsophagi tunica continua est, cujus occasione partes illæ mutuo sibi obsequiosæ, motu reciproco inserviunt, quemadmodum ductorius funis, directis ductionibus per trochleæ orbiculos circumactis; præterea arteriæ usum, respirationi et cordis calori temperando necessarium cogitans, quæmadmodum venæ jugularis ad nutritionem partium supernarum, expensa porro apud me sanguinis, in quo naturæ thesaurus est, magna vi, quæ ipsi profluxerat, propinquam et certam, apud adstantes, illi instare mortem præsagiebam. Et tamen præter expectationem, divino potius favore, quam nostris artibus, superstes convaluit. Æque admirabilis est quæ sequitur historia. Angli duo ad Vincennarum sylvam animi gratia obambulabant: sed unus, comitis sui nummis et torqui aureo quem ponderosum circumferbat inhians, ipsum incautum oppressit jugulatumque et spoliatum in illis, quæ illic sunt, vitibus dimisit, interfecisse ratus, trachea arteria et œsophago pugione confossis. Sicarius prædo in urbem se recepit. Alter semiexaminatus, cum vix tandem hinc in rustici cujusdam casam se subtraxisset, præsentibus et quæ ad manum erant remediis curatus, in urbem perductus, mihi, qui curam ejus agerem, a familiaribus sui traditus est. Ego primo quoque excisam tempore penitus tracheam arteriam, sutura quam sedulo potui comprehendere atque vulneris labra sibi quam proxime licuit admovi; œsophagum comprehendere non potui, quod totus se in stomachum subduxerat: hinc totum vulnus medicamentis, diplomatis linteis, et fasciis idoneis obduxi. Sic curatus loqui cæpit, et sicarium prædonem, facinoris auctorem, nomine proprio exprimito, adeo ut ille deprehensus,

rotæque affixus, confractis membris, miserrimam pro innocentis anima, qui quarto a vulnere die obierat, reddiderit vitam.

Par vulneris casus Germano cuidam contigit, qui in vico Nucum, apud Perotum Trapezitam commorabatur. Ille diris furialibus percitus, de nocte gladio, ipse sibi jugulum confodit. mane ab amicis, qui ipsum invisebant, vocatus hominem, iisdem prorsus, quibus Anglum artibus, curavi. Itaque repente locutus, qui antea ne mutire quidem poterat, servum qui in eodem cum ipso cubiculo dormiebat, tanquam sceleris autorem, in vinculo conjectum, criminis suspicione atque carcere liberavit : remque ut gesta erat, professus, quatrimum, a vulnere supervixit, jussulorum per anum clysteris instar infusorum, et succorum alendo idoneorum, ut panis recenter a clibano extracti, et vino generoso macerati, suavi vapore sustentatus. Id profecto arte Chirurgica consecutus, ut ex aphono loquens per quatrimum fieret. (*Pareus lib. 9, cap. 29.*)

Vide quendam Dominum Bonifacium nepotem Domini Alberti, Marchionis Pallavicinis, qui vulneratus fuit cum quadam sagitta parvissima, debili, per *Guidez* vel venam quæ est apud tracheam arteriam, in manifesto gulæ. Et fuit illud vulnus in latere sinistro tracheæ arteriæ, et ab illo vulnere non exivit, nisi stillicidium sanguinis et non penetravit sagitta aliquid intranec applicata fuit in loco ut staret aliquo modo, et mortuus fuit eadem hora coram me, et locus totus denigratus fuit ; et habuit rugitum in canna, velut origmon, vel sonitum usque ad sinem vitæ. Considerans quod hoc esset propter venenum, inveni quod nihil fuit : sed evenit hoc eidem manifeste propter vulnus in vena, quæ portavit sanguinem ad pulmonem et cor, propter ejus affinitatem cum illis nobilibus membris, et ex hoc illa nobilia membra venæ compassa fuerunt, et mortuus fuit. Cogitaveram enim phlebotomare de ambobus brachiis, ut sanguis ad aliam traheretur partem, et ut non transiret ad cor, vel derivaretur ; sed tempus breve opus præcogitatum impedivit.

Vidi quendam alium, qui vocabatur Fansus ; home Curialis erat, et fuit percussus coram me a milite quodam, cum acie manus ludendo in trachea arteria, et circa venas *Guidez* ; et cecidit in terram quasi mortuus, et stetit sic per horam, et indicavit ipsum mortuum, per ea quæ apparebant : sed in eo

permansit aliquid anhelitus quasi insensibilis, et finaliter rediit, nam et revixit.

Vidi etiam quendam carceratum in civitate Cremona, qui per desperationem secavit sibi cannam pulmonis et stomachi, ita quod hora comestionis exhibat cibus et potus et aër a vulnere manifeste. Ego continuavi partes decenter, et confirmavi locum bene cum pulveribus, et plumaceolis, et fuit curatus in uno mense, et vixit : scio quod in secatione non læsit venas quæ appellantur *Guidez*.

Iterum vidi quendam militem de Pergamo, qui percussus fuit in quodam exercitu in quo erat, cum sagitta magna de turno, et intravit sagitta gulam ex parte dextra gulæ apud *Guidez* et non læsit venam, et perforavit totam gulam usque ad spatulam sinistram. Et ego manibus meis extraxi sagittam cum observatione solennitatis dictæ superius, et curatus fuit perfecte, et vixit longo tempore et habui bonum salarium. (*Guiliel. Placent. Chirurg. lib. 2, cap. 7.*)

HOFFMANN

Bien que cet auteur ait embrassé dans ses écrits la médecine presque tout entière et qu'à ce titre nous ayons étudié dans le chapitre du II^e volume consacré aux médecins, néanmoins il n'a pas composé de traité de nosographie, dans le sens étroit du mot, mais des œuvres détachées. C'est de l'une d'elles que nous tirons ce passage.

De angina.

Theses pathologicæ. — § I. Angina est inflammatio faucium, juncta cum ardente dolore, tumore, rubore, respirandi vel etiam deglutiendi difficultate et febre, orta a sanguinis, vel seri viscidis acris, in sanguineis, vel lymphaticis tubulis stasi, periculi non expers.

§ II. In dignotione hujus morbis, locus ubi consistit imprimis notandus. Est autem sedes in faucibus maximeque iis partibus, quæ pharyngem occupant et constituunt. Huic occurrunt plures numero, et maximi usus ac sensibilibioris indolis partes : radix scilicet linguæ cum osse hyoide, narium foramina in os hiantia, œsophagi initium, musculi pharyngis, item laryngis interni, et externi quorum numerantur tredecim, glandulæ porro majores et minores, tonsillæ, musculi maxillas moventes, vasorum sanguineorum et lymphaticorum, nec non teneræ nervorum propagines.

§ III. Prout igitur inflammatio alias atque alias ex his partibus tangit et occupat, gravior, vel levior est, et varia etiam sortitur nomina. Nimirum vetustissima est distinctio anginæ generalis in interiorem et exteriorem, sive manifestam et occultam. Illa in interioribus nerveis et musculosis faucium tunicis consistit, et ob id neque in collo exterius, neque in ore, quantum visui patet, tumor et inflammatio conspicitur, sed ardor internus, febris acuta, in graviore casu non modo spirandi, sed et deglutiendi difficultas, multumque periculi subest. Aretæus ita tamen describit, lib. I, cap. IX, lingua extra dentes et labia prominens,

saliva effunditur, pituita crassissima, facies rubicunda et inflata, oculi exserti, patentes, valde rubent, potus in nares refunditur, dolores acerbi sunt, sed strangulatione vexati, eos obscurius sentiunt, pectus et cor ardent, frigidi aëris desiderium adest, et admodum exigue inspirant, eo usque donec demum intercluso pectoris transitu strangulentur. Externa autem magis in oculos incurrit, et occupat potissimum musculosas et glandulosas externas partes, amygdalas, linguae radicem et uvulam; facilius quoque discutitur.

§ IV. Speciali ratione partis affectae considerata angina, gravissima et periculi plenissima esse solet ea, quae internis laryngis musculis insidet, et in qua exterius non rubor, nil circa cervicem aut collum, observatur, sed interne ardens dolor urget, et ob angustatum asperae arteriae caput, vox non modo supprimitur, sed et spiritus difficilis redditur, quin quandoque plane praeccluditur, et quidem tam celeriter, ut observatorum fide, haud raro intra viginti quatuor horas, vel tertio die necet. Graeci hanc vocant *cynanchem*. Quae autem ipsis *synanche* audit, internos pharyngis musculos occupat, pariter sine conspicuo externo tumore et rubore, majori deglutiendi, quam spirandi difficultate stipatur, sed ingesta plerumque cum impetu per nares redduntur. Sed quando tumor et rubor oculos et tactum incurrit, inflammatio quae externis pharyngis musculis incumbit, *parasy-nanche*, quae autem laryngis, *paracynanche* a veteribus appellatur.

§ V. Deinceps a practicis angina distinguitur in veram, sive exquisitam, et notham. Vera oritur a sanguinis stasi, spuria vero magis a congestione seri, quam sanguinis inflammatoria, in faucibus et colli internis. Illa morbus acutus est, nunquam sine rigore et febre, haec autem junctam habet febrem plus lymphaticam et catarrhalem, quam acutam. In exquisita non modo dolor ardens et pungitivus circa interiora faucium observatur, sed et lingua sanguine turget, obscuro, rubicundo colore tincta facies simul rubet, arteriae temporales valide pulsant, quandoque cephalalgia, sopor, vel sensuum torpor jungitur, quandoque lipothymiae accedunt, quin, si gravior, spiritus difficulter trahitur, anxietas est maxima, inquietudo et extremorum refrigeratio. Citam hinc poscit opem, multumque periculi alit. Sed in spuria

gravior hæc pathemata partim plane absunt, partim mitiora adsunt, minus etiam periculi, si rite tractetur, metuendum. Distingui porro angina potest in siccam et valde ardentem, et humidam aut valde mucosam. Illa fit a sanguine, cum febre valde acuta, uti dictum de vera. Hæc autem magis chronica est febribus catarrhalibus associatur, cachectisis et scorbuticis familiaris est, atque etiam linguam et fauces crasso viscido mucoso oris foetorem obducit.

§ VI. Omnes hæc anginæ species merito discernendæ ab aliis faucium affectibus. Vera quidem et sicca non permutanda cum illa inflammatione oris et œsophagi mucosa, quæ vocari solet *prunella alba*. In hac enim muco albo tota faucium regi et lingua oblinitur, lingua fissuras dolorificas contrahit, et junctus est simul magnus ardor, qui usque ad præcordia pertingit, proptereaque, Germanus audit die Hertz-Braune. Malignis hæc sæpe accedit febribus, omine plerumque malo, quia præsentem arguit ventriculis et œsophagi inflammationem. Neque etiam omnis faucium inflammatio est angina sed ea tentum, que cum spirandi et deglutatiendi difficultate juncta. Hinc multum utique ab ipsa discrepat levior inflammatio colli et internorum in faucibus, cum tumore et dolore glandularum, quam nostri dicunt, die bösen Halse, quæ frequens admodum et scorbuticis, nec non si malum contumax cum erosione lue venerea affectis. Vera quoque et interna angina discernendo a solennibus fœminis hystericis et hypochondriacis spasmiss, qui faciem constringunt et respirationem æque ac deglutationem reddunt difficilem. Hi enim sine febre sunt, mox remittunt atque recedunt, atque etiam discuti possunt facile. Demum angina differt ab ardentibus illis et dolentibus in lingua pustulis, quas dicunt aphtas. Etenim in angina dolor et ardor latius sese disscidit et vicinas partes simul in consensum trahit; aphthæ vero certas duntaxat partes afficiunt, quibus pustulae cum dolore et rubore insident, neque tam familiarem habent comitem febrem, quam angina.

§ VII. Causa igitur anginæ proxima stantis, vel quandoque congestio seri inflammatoria in faucium internis evenient ad quam inducendam faciunt multa. Scilicet observatione constat, eandem frequentius incurrere, quibus evacuatione sanguinis spontaneæ per nares, uterum hemorrhoides, aut lochia, sup-

pressæ, aut omissæ artificiales, per scarificationes, vel venarum sectiones. In his certe pronita ipsius genesis post impensio-rem, sive per potum spirituosum inebriantem, sive per validam corporis exercitationem, vel etiam nimiam vociferationem præsertim in aere frigido factam. Observavi quoque a sumpto fortiori sudorifero, admissa mox aere frigidiori, item a balneo nimis calido, post haustum potus frigidi, inflammationis anginosæ initia, quæ tamen adhibitis congruis internis et externis remediis, feliciter mox discussæ. Neque minus frequens anginae generatio admissis in fauces acribus, fibras vasaque irritantibus impensius et constringentibus. Sic experientia teste, funesto sæpe faucium inflammatio accidit iis, qui conclavo calæ recenter inducto inhabitant et bidormiunt, quo quidem aliquando plures simul infantes enectos esse ego novi, ac idem notabili exemplo confirmat. (Tulpius lib. III, cap. XLI.) Eandem inflammatem venenis causticis inesse facultatem, inter omnes constat. Ex purgantibus, elleborus albus specifica quasi indole petit fauces et strangulationem facit. Argentum vivum, præsertim male ex ipsa præparato pharmaco, fauces male afficere et inflammare pariter constat. Et idem quoque de solano furioso, nec non morsus canis rabidi accidere, medicorum testantur observata. Inprimis arsenicalium etiam et mercurialium minerarum fumi, item vapores spirituum mineralium, item hoc malum improvide hausti causantur. Horum quippe omnium subtilissima et magno penetrantiæ spicula altius sese musculis, qui cartilagine laryngis movent, insinuando, nervosas ibi tunicas stringendo et liberum sanguinis per vasa transitum intercipiendo, tumorem ejusmodi inflammatorium, pulsatorium, cum dolore pungitivo, sæpius excitant funestum. Quod enim res acutæ pungentes, firmis hi partibus inhærentes, solam hujus affectus suppeditare possint causam, manifesto testantur spinæ piscium aut ossicula aspera deglutita et faucibus intrusa, a quibus tale malum sæpissime excitatur de quo notabilis observatio est Hildani Cent. III, obs. 42.

VIII. — Sic per se et sua sponte exoritur angina; succedit vero etiam haud raro aliis morbis ceu symptoma. Accidit hoc sæpius in diarrhæa et dysenteria, præsertim si fluxus intempestive cohibetur, de quo memorabile exemplum apud Hildanum cent. III,

obs. XXVII idem evenit, a repulso præpostere erysipelate, aut topicis perperam tractato podagrigo dolore. Neque minus in variolis et febribus malignis ac pestilentialibus, cum summo vitæ discrimine, demum supervenit. Inprimis de febre sic dicto Hungarico observationes anatomico-practicæ testantur, quod ut plurimum inflammatione meningum et faucium, quæ ad ventriculum et œsophagum extenditur, necet. Sed causa hujus symptomatici insultus plerumque vel in nimis, diuturna alvi constipatione, vel perspiratione improvide cohibita, vel repulsa præpostere ad interiora materia acri caustica, quærenda. Quando vero epidemium est malum aeris vitiotribuendum, et plerumque aliquid maligni complicatum. Accidit hoc haud raro, si diuturna aeris pluviosa et humida fuit constitutio, si ver est vel autumnus, prisco jam Hippo. sect. III aph. 16, 20, 22, testimonio, et illud verum esse, propria observatione confirmat Bartholinus cent. I, obs. XXXII. Frequens quoque hujus mali incursus, si ær effluviis sole acerrimo subtili, ob infectorum copiam, refectus, sole præsertim occiduo, hauritur eamque ob causam Romæ familiarem esse et quandoque pestis instar grassari anginam fidem facit. (Hollerius lib. I præx., c. XXIII.)

IX. — Cœterum anginæ morbus, tam ob febrem haud rare acutam, quam suffocationis metum multum alit periculi.

Periculossimam autem esse veram internam et latentem, jam diximus, et de hac valet illud Hippocratis effatum prædic. lib. III c. VIII angina gravissima est, celerrime interimit, quæ neque in cervice, neque in faucibus conspicuum quid habet: Hæc etenim eodem die, secundo, tertio, quarto, strangulat. Inprimis maximum suffocationis est periculum, quando, musculus qui vocatur thyro-arythénoïdeus, rimæ occlusioni dicatus, affectus; Anceps porro admodum est symptomatica, ob corpus jam debile et materiæ virulentiam raro superando. Malum etiam, quando tumor in externis subito disparet, non imminutis, sed auctis potius symptomatibus. Tum enim alias nervosas partes transilit morbus, et vel cerebrum petens, phrenitidem cum convulsionibus vel ad pulmones delatus peripneumonia facit, testi omnium Hippocrate sect. V aph. lethalem. Sed quando suffocatio strangulatoria remittit, tumor, dolor et rubor magis extrorsum vergit sensimque evanescit, felicem solutionem nunciat. Sin secus, in aposthema

aut mortem fit transitus. Si in apostema ac pus in bronchio et pulmones effunditur, teste Foresto lib. XV, obs. XXIV, anceps admodum eventus. Si in mortem, nunciat hanc spuma antes os, lingua valde tumida purpureo-nigra, extremorum rigor, summa præcordiorum angustia atque anxietas, cum pulsu duro, convulsivo et intermittente.

(*Cap. IV, l. II.*)

RICHARD MEAD

De angina.

Anginæ varias species diligenter exposuerunt auctores medici; at tres tamen, quæ sunt omnium acutissimæ et maxime perniciosæ, non satis pro morbi natura dilucide explanarunt. Harum primam aquosam, alteram tonsillarum gangrænam, tertiam faucium strangulationem appellare licet.

In prima igitur oris, palati, et vicinarum partium glandulæ distenduntur et tumescunt. In altera tonsillas occupat inflammatio sine perfecta suppuratione; illæ tument, et indurescunt; illico fit gangræna, quæ, nisi citissime succurratur, est lethalis. In tertia, nervis omnibus convulsione distentis, æger subito concidit mortuus. Tertiam hanc speciem ipse semel vidi; et licet bis sex horarum spatio detractus fuerat largissime sanguis, nihil profuit tanta exinanitio. Incisæ autem post mortem fauces ne minimam quidem tumoris, vel inflammationis, in glandulis aut musculis notam ostendebant; sanguine vero crassiori turgidæ arteriæ, venæque omnes, ubique prominebant. Morbum hunc, etsi rarus sit, descripsit Hippocrates. Ex anginis, inquit, gravissimæ sunt, et celerrime interimunt, quæ neque in faucibus, neque in cervice, quidquam conspicuum faciunt; plurimum vero doloris et orthopnœæ inducunt. Præceps autem in omnibus hisce malis est periculum, cui non uno modo occurrere oportet.

Memini elapsis jam aliquot annis, apud Wallenses, in locis præsertim mari vicinis, in febris popularis modum sævisse aquosam istam luem, multosque intra biduum aut triduum ex correptos periisse. Medico cuidam illic degenti rogatus consilium dedi, ut, missa quam primum copia satis larga sanguine, et laxata, vel clystere, vel si id fieri posset, leni potione alvo, emplastra vesicatoria sub mento et ad latera colli admoveret; si autem per hæc parum proficeretur, ut in palato circa uvam, venasque sub lingua, plagis satis altis vulnera infligeret, quibus

morbus erumperet. Interim febris causa ter die quaterve assumendum suasi pulverem, ex pulvere contrayervæ composito, et nitro purissimo, pari portione confectum. Illa cura quam plurimis saluti fuit.

In tonsillarum gangræna, detracto primum sanguine et lotionibus ducta alvo, unicum remedium est, glandulas hasce tribus quatuorve in locis vulneribus satis profundis scapello incidere, quæ melle rosaceo, adjecta mellis ægyptiaci aliqua portione, sunt curanda; interim tamen os faucesque hordei et ficuum decocto colluere oportet. Hæc autem in principio morbi fieri convenit; post biduum enim aut triduum ad gulam serpit malum, et exitiale est. Vidi nonnullos hac medendi via salvos evasisse, alios vero in quibus ea neglecta aut sero tentata fuerat, periisse: cum Medici interim adstantes, quoniam calor febrilis imminutus videbatur, nihil periculi subesse, et rem in vado esse, existimarent; qui anidmadvertisse certe debuerant, pulsum ægri vacillantem, summam inquietudinem, et sudores frigidos se invicem, excipientes, instantis fati prænuncios esse.

Morbus iste pueros præcipue infestat, cujus descriptionem raccuatissime, ut omnia, tradidit Aretæus; quam commentario luculento illustravit doctriissimus Severinus, παιδαρχόνην λομυωδη vocans, atque hanc ipsam, quam proposui, medicinam commendans: quin et eandem olim executus est Latinus Hippocrates Celsus.

Strangulatio faucium, quam tertiam anginæ perniciosæ speciem dixi, si prævideri possit depletionibus omnis genero præcaveri debet; sanguinis scilicet detractionibus, purgationibus, emplastris vesicatoriis fonticulis, medicamentisque urinam moventibus. Neque etiam inutilis est abstinencia, moderatio nimirum in cibo et potu.

(Cap. IV.)

CAUBIUS

Des maladies des solides contenantants.

La dilatation produit d'abord des tumeurs souvent prodigieuses, lorsque les parois trop tenaces éprouvent longtemps la force qui les distend peu à peu. La nature prévient alors quelquefois la rupture de ces parois, qui serait la suite de leur amincissement, en les rendant plus denses, plus épaisses et en les revêtant extérieurement ou intérieurement par additions successives de nouvelles couches membraneuses, en fortifiant les parois des cavités : elle a aussi soin, la matière dilatante qui touche les parois des vaisseaux étant un peu épaisse, qu'elle serve de soutien aux parois des canaux. L'écartement trop considérable cause des ruptures, d'où l'écoulement des fluides est parfois même avantageux.

L'effort trop considérable de la matière poussée dans les cavités distendues, son passage étant intercepté, le mouvement vital étant augmenté ainsi que la chaleur, produit l'inflammation, la suppuration, ou cause de la mort; la chaleur étant augmentée, la pourriture excitée, la force de la pression arrêtant l'influence vitale sur les vaisseaux des parois et les parties voisines, ou le mouvement progressif étant retardé par degrés, enfin intercepté, il acquiert d'autres acrimonies de différente nature, souvent rongeante, et qui, en irritant le solide vif, excitent des mouvements irréguliers. Si une partie déliée de la matière amassée dans une cavité devenue plus large, transude par un orifice trop étroit, ou par l'écartement des parois, la partie la plus épaisse étant retenue, devenant peu à peu plus dense, produit des tumeurs solides, molles, dures.

Des actions lésées des premières voies.

En même temps que la mastication a plusieurs organes, plusieurs causes et conditions, sans lesquelles elle ne peut se faire comme il faut, elle peut être aussi lésée de différentes manières

par plusieurs vices qui attaquent les différentes parties où elle s'exécute : telles sont les plaies, l'inflammation, l'ulcère, l'excoriation, la tumeur de la bouche, des lèvres, des joues, de la langue; le trop grand resserrement du filet de la langue, ou sa mutilation, etc.; le défaut de dents, leur faiblesse, le mal de dents, la fracture, la luxation, la carie, l'ankylose des mâchoires, le spasme, la paralysie, la douleur des muscles qui meuvent ces parties, et enfin le défaut de salive.

La déglutition peut être aussi viciée de plusieurs façons. On doit chercher la siège de ces différents vices dans la langue, le palais, les amygdales, la luette, le pharynx, le larynx, l'œsophage, l'estomac, les mâchoires, les vertèbres voisines, les muscles de ces parties affectées de douleurs, de plaies, d'inflammation, d'excoriation, d'ulcère, de tumeur, de luxation, fracture, carie, mauvaise conformation, spasme, paralysie, différents rétrécissements (209), sécheresse; car il suit nécessairement de là ou que le passage pour la matière que l'on doit avaler est empêché ou que l'action régulière, la direction des puissances motrices manquent.

Des maladies des solides contenantants.

L'autre espèce d'affection morbifique des cavités renferme les maladies du rétrécissement dont il est aussi utile de connaître les espèces décrites avec précision par les anciens, suivant qu'elles diffèrent entre elles, par les diverses manières dont elles arrivent. Ces maladies sont :

1^o L'obstruction qui désigne une cavité si remplie d'une matière amassée et trop épaisse pour circuler, qu'elle cesse de donner passage au fluide convenable, qui est poussée par hasard dans les orifices dilatés des conduits qui, naturellement plus rétroits, ne sont destinés qu'à charrier une liqueur plus déliée ce qui peut arriver par anastomose ou c'est une matière naturelle qui a dégénéré, qui est devenue trop tenace, ou c'est enfin une matière étrangère, une pierre, du plâtre, un gluten, un ver, des excrescences considérables, des os, des corps étrangers avalés, des corps onctueux et autres semblables ou engendrés, dans le corps par maladie ou entrés extérieurement, appliqués

et engagés dans les cavités des conduits ou les orifices, en sorte qu'ils ne peuvent ni eux ni les autres corps convenables en être chassés. On pourrait encore ajouter l'introduction d'une partie dans une autre : *volvulus*.

2° L'engouement très bien connu par les soins de Kaemphius, qui ne diffère de l'obstruction, qu'en ce qu'il établit, sinon les maladies au moins les dispositions contre nature même des parties contenant qu'il a surtout lésées dans les viscères étroits, lorsque les vaisseaux sanguins sont gorgés, distendus par le sang qui circule trop lentement et qui devient stagnant, qui est mal mélangé, déjà corrompu par lui-même et par la stagnation, qui est dépouillé de sa fluidité, polypeux, épais, ou lorsque d'autres humeurs bilieuses, muqueuses, pituiteuses amassés dans les follicules, les réservoirs, les vaisseaux, ayant perdu leur partie la plus fluide, et ayant acquis différentes aigreurs, deviennent stagnantes, et aggravant, distendant, pressant et irritant les parties contenant, occasionnent en elles différentes maladies. De là naissent les affections très graves des *nerfs* et de la *fibres vitale* et un grand nombre de maladies.

3° L'étroitesse, le resserrement, le rétrécissement du passage, qui arrive lorsque les parois ont leur épaisseur augmentée contre nature, ou que des tumeurs saillantes intérieurement diminuent, détruisent la cavité; ce à quoi contribuent les humeurs amassées dans les vaisseaux ou dans les interstices des membranes, la chondrogénie, l'emphysème, les tumeurs inflammatoires, purulentes, les sarcomes, les polypes, les caroncules, etc. nés dans le tissu des parois et proéminent dans les cavités.

(*Pathologie des maladies*, p. 97.)

II. ANATOMOPATHOLOGISTES.

BONNET

Deglutitio læsa ob columellæ et tonsillarum absentiam.

Uxor Johannis G. G. uno partu et filium et filiam mense febr. anno 1620 Dresdæ enititur. Filia quidem optime constituta atque omnibus membris perfecta erat, filius vero *columella* et *tonsillis destituebatur*, unde et lac quod sugubat, per nares partim reddebat, non diu superstes fuit, sed. XXI saltem ætatis diem attigit. (*Ph. Salmulth. cent. III, obs. IV.*)

(*Lib. III, obs. V, sect. IV.*)

Scholia.

Columella destituebatur. Hic usus illi adscribitur ab Anatomicis, ne ex ore potus in nares remeet; ideo binis musculis exiguis suspensa est, qui eam antrorsum et retrorsum movent in deglutitione: quoad tonsillas, inter varios usus illis adscriptos, hic numeratus, ut humectent linguam, fauces, laryngem et oesophagum; continent enim naturaliter humorem quasi mucilaginem, et lubricandis partibus maxime accommodum, faucibus scil. partibusque vicinis et præsertim oesophago; hinc collige a defectu istarum glandularum, humorem quoque illum, quem naturaliter continent, abfuisse, ac proinde difficultatem in deglutendo sequitam esse. Obiit mihi filia semestris cui ad obitum usque maxima hausti lactis portio in nares rejiciebatur. In inspiratione vero sibilus quidam perpetuo circa isthmum percipiebatur, a defectu columellæ. Cultro anatomico exponere, quo accuratius innotescere, vetuit amor paternus.

Deglutitio læsa ab adipis copia gulæ et tracheæ adnata.

Nobili N. tracheæ arteriæ et gulæ tantum adipis indurati adhæsit, ut paucos dies ante obitum cibos assumere nequiverit, solo potu sustentatus. (Vide lib. 2, tit. de Dyspnœa.)

(*Obs. IV, lib. III, sect. IV.*)

Deglutitio læsa ob epiglottidem indurata.

Epiglottidem adeo quandoque indurata deprehendi, ut non solum loquelæ abolitionem inferat, verum etiam nonnisi frustra magna deglutire ægrum posse efficiat; potus, et omnia quæ cochleari exhibentur, trachæam intrant, rigidiore ab epiglottide non satis clausam: Malum hoc incurabile habetur. (*P. Bar-bette anat. pract. lib. I, cap. IV.*) (*Lib. III, sect. IV; obs. VI.*)

Deglutitio læsa ob molem carneam circa exhortum asperæ arteriæ innatam et œsophagum.

In puella hectica dissecta circa exhortum asperæ arteriæ, ex pulmonis substantia, moles steatomatum carne permixta ovi magnitudinem excedens inventa est, quæ tam asperæ arteriæ quam œsophago adhærescebat, hinc deglutiendi difficultas. (*Vide lib. II, tit. de Phthisi.*) (*Obs. III. lib. III, sect. IV.*)

Deglutitio læsa a tuberculo fauces occupante.

Adolescenti tuberculum ad palati forulum enatum est, quod tandem totas hominis fauces opplens, alimenti potusque transitum etc. impediit. Præfectum tuberculum in mortuo ostracinum intra repertum est, cum aliquo particulæ conformatu, etc. (*Vide lib. II, tit. de suffocatione.*) (*Lib. III, sect. IX, obs. II.*)

Deglutitio læsa ob pruni ossiculum subsistens in sinu quodam tonsillis insculpto, viam cibi potuique arctans.

Tonsillæ, vulgo amygdala dictæ, laxæ et spongiosæ sunt, ac sinus habent varios, unum amplum et ovalem in os apertum. pluresque parvos, quibus humiditatem salivalem cerebri suscipiunt, eaque laryngem, fauces, linguam et œsophagum continue

humectant ac lubricant, Fallopius bene notat interdum magni sinus interioris aperturam ulcusculum æmulari, et nonnunquam pro tali ab imperitis Chirurgis tractari; nempe quoties ejus osculum, ab humorum copioso in glandulam decubitu, nimium dehiscit. Quantum autem interdum dehiscat, vidi in rustica quadam, quæ famelica comederat pruna damascena cocta, et propter in edendo festinationem, nesci quo casu, lapillus unius pruni majusculi ingressus est in aperturam dicti magni sinus, unde glandula mox intumuit, adeoque cibi potusque viam præcluserat, ut sequentibus quatuor diebus ægra nec cibi nec potus quicquam deglutire potuerit atque hinc meum consilium tunc implorare coacta fuerit. Depressa lingua glandulam admodum tumidam. in dextro latere, sed minime inflammata, ejusque ante dictam aperturam præter solitum valde dehiscentem conspexi, sed pruni lapillum non vidi; mox pauxillum decocti hordei cum syrupo de althea mixtum mulieri sorbendum dedi, et foris pollicem meum regioni glandulæ istius tumidæ imposui, eamque fortiter pressi, et tunc jussi ut mulier magno impetu contentum ore liquorem deglutire niteretur. Prima vice resilit liquor per nares, sed secunda vice, ob compressionem quæ foris per pollicem, et intus per retractam versus posteriora linguam fiebat, lapillus e glandula exsiliit in os, ægraque illico rursus cibos potusque deglutire potuit.

Similis fere casus a me visus fuit in cive Ultrajectino, cui frustulum crustulæ duræ casei in antedicti sinus aperturam illapsum fuit, totamque deglutitionem protinus impedivit; verum hujus curatio non tam prompte successit, sed aliquot dierum molestiam nobis exhibuit. (*Diemberbroeck anatom. lib.2, cap. 16.*) (*Lib. III, sect. I, obs. 1.*)

Angina latens a pulmonis abcessu purulento.

Lanio quidam meridie circa et laryngem fauces dolorem sentit, et quandam in deglutiendo cibo et potu difficultatem, adiit sub vesperam Pharmacopæum; datur ex aquis plantaginis, lactucæ et diamoron, addito aceto, gargarismus, quo cum subinde uteretur, doloribus intensis, subito, nocte, mente constans strangulatus interiit.

Hujus corpore aperto, reperta est pulmonis substantia, sive

πνευμα, in pus conversa, et ad unum ejus latus, abcessus pure, quoque impletus : nulla tussis huic antea fuerat molestia, neque sanguinis ulla sputatio præcesserat, sano validoque corpore quousque visus, eoque non gracili sed obeso. (*Dodonæus*, cap. 18, *observat.*)

Scholia.

Nulla inter Anginæ species æque periculosa est ac ea in qua nullus tumor in faucibus ac collo apparet, quam latentem hac de causa non inepte dixerimus. Talis autem quandoque hominem paucis diebus conficit ac e vita tollit, mente et sensibus intègris; quod et Hipp. prædict. lib. 3. cap. 8 scriptum reliquit « Angina, inquit, gravissima est et celerrime interimit, quæ neque in cervice (sive collo, interprete Galeno) neque in faucibus conspicuum quid exhibet; hæc etenim eodem die et secundo et tertio et quarto strangulat ». Plurimum vero hanc quoque dolorem inferre et spirandi difficultatem. Adsunt vero non modo hæc sed et vehemens copiosaque humorum e capite distillatio, dolor autem circa laryngem et asperam arteriam talis, ut nec contingi quantuncumque leniter, citra gravissimum dolorem queat, sed nec moveri sursumque attolli; quare non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed et cibus ac potus ægerrime, aut non demittuntur, cum etenim per œsophagum descendunt cedit et sursum ascendit larynx. Inflammati per ejusmodi anginam interiores ac latentes laryngis muscoli existimantur, verum nos nullam juxta laryngem, aut ejus musculos, vel circa asperam arteriam inflammationem aut abcessum cognovimus, sed pulmonem male affectum, quod superior historia demonstrat. Eadem et similia æstate anni 1565 diligenter annotavimus, quando multi angina, ac simul molesta ex capite distillatione correpti fuere, præsertim ex his qui præcedente hyeme vel tussi vel raucedine laborassent, aut e peripneumonia evasissent. Plurimis eorum posteaquam circa laryngem dolor remissior tandem desiisset, peripneumonia successit cum lateris dolore, non tamen pungente. Aderant respirandi difficultas et pulsus mollis; horum non pauci, intra non multos dies mortui, seniores evaserunt et natura frigidiores. Pulmones horum vel purulenti fuere vel abcessum habuere. Juxta vero laryngem aut

ejus musculos nihil occurrit, quod vel adesse vel adfuisse inflammationem ostenderet. Satis quidem apparuit pulmonibus male quidem prius affectis, superveniente ac accedente e capite destillatione, reliqua symptomata successisse; laryngem vero non primatim sed per sympathiam laborasse. Verisimile vero etiam est destillante humore asperam arteriam ejusques ramos impleri atque distendi : deinde eodem ad alia vasa transmissio, a dolore liberati quidem asperam arteriam, ac ejus supremum sinem, ipsam laryngem : Pulmonis autem modo ex angina in peripneumoniam permutationem fieri. (*Hactenus Dodonæus.*)

Ad hanc anginæ speciem, in qua nec intus nec foris rubor aut tumor adest, referenda ea videtur de qua *Aretæus lib. I, cap. 7*, ubi collapsionem instrumentorum adesse ait et strangulationem vehementem, ut ipsimet in pectore latentibus partibus, circum cor atque pulmones, abdita esse inflammatio videatur; et συναγχην hanc propterea dicunt, quasi συνδεοσσαν εν τοῖς αγγεοις, h. e. interius vergentem et augmentem : Ego vero existimo, inquit, solius spiritus id vitium esse ad calidissimum siccissimumque conversi, nulla corporis parte inflammatione laborante. Sunt itaque pro Aretæo duæ anginæ species, una cum tumore ingenti ac rubore tonsillarum et foris versus; quin etiam interdum, inquit, lingua, gurgulio, cæteræque partes in tumorem efferuntur. Altera efficitur illis locis collapsis, sed interius compressio majore strangulatu discruciat, ut interna inflammatio ad cor usque pertinere videatur. Sennertus autem vix ad anginam hanc speciem commode referri posse putat, sed potius ad suffocationem, quia in pectore vitium sit, ubi spirandi initium ponitur. Atque si ea quæ trahit Aretæus diligenter perpendantur, de acutissima aliqua pulmonis inflammatione, aut certe de æstuosissima et acutissima febre, qua spiritus calidissimus redditur, loqui existimat. Heurnius dubitat num illa symptomata, quæ narrat Aretæus, oriuntur ab inflammatione ejus nervi profecto magni, qui enatus ex vertebri colli, ac per pericardium elatus, una cum illo pericardio et diaphragmati implantatur. Sciunt, ait, illi qui anatomica tractant, pericardium et diaphragma consocialia et juncta adeo esse, ut vix dicas num hoc ab illo, vel num pericardium a diaphragmate nascatur, symphysis illa pericardii ad diaphragma æquat quatuor digitorum fere amplitudinem ad

sinistram si ab osse sterno abeas; et ab ipsa ossis sterni superficie, si duorum digitorum latitudine deflectas; hinc valida illa symptomata nasci posse quis dubitet?

Pulmonis substantia.

Fonseca consult. 3 refert anno 1601, in Ducatu Urbini, et Piceni regione, grassatas esse Anginas, Aleuritides, Peripneumonias, atque sectis ægrotantium, cadaveribus, repertos esse pulmonum abcessus, e quibus materia fœtens prodibat. Unde, inferre licet Anginam ortum quoque habuisse ex illis pulmonum abcessibus, atque pleuritides Peripneumonias vocandas fuisse, quia simul obsessi erant Pulmones. Ejusmodi anginæ, ut et pleuritides et peripneumonix, sæpe contingunt in febribus, materiæ parte ad hunc locum depulsa, ut febris essentialis potius sit, vel comitata, ut ait Excell. Platerus, quam symptomatica.

(Obs. I, lib. I.)

Circa laryngem et fauces.

Anginæ differentias, et causas omnium optime et clare tradit Platerus Prax. lib 2 cap. 91. Sanguinis, ait, influxus si in fauces obsidentes musculos diffundatur, inflammationem veram: anginam appellatam, parit; sæviorem tolerabilioremve prout defluxio interiora exteriorave magis possidet. Nam si interiores musculos laryngis et faucium, ac ossis hyoïdis, qui respirationi, voci et deglutioni inserviunt, procumbat, cum vehementer tunc angat et velut suffocet, prima et deterior erit anginæ species; si vero in exteriores potius collum illic occupantes lædit musculos cum minus hisce functionibus tunc incommodet; mitiorem, et quæ tum tumore externo sese quandoque manifestat, tertiæ speciei dictam anginam procreabit: Quod si vero tam ad interiores quam exteriores se musculos dispergat defluxio, medio modo se habens, secundæ speciei appellata nascetur angina, in qua cum tumor non ita collectus et abditus, ut in prima sit, ille in faucium interioribus, se nonnihil profert, ibique potest conspici. Qua ratione et rectius anginæ veræ differentix explicantur, quam si, prout in hos illosve musculos defluxio, cadit, cum in illis in abdito occultatis hoc discernere nequeamus;

alia insuper ipsarum genera statuamus et pro horum differentiis, cynanchas, paracynanchas, synanchas, parasynanchas appellamus. Cæterum si sanguis in glandulas illic positas potius defluat, illicque inflammet præsertim humiliores asperæ arteriæ utrinque adstratur, quæ propter venas, quibus intextæ sunt et nigricant nonnihil, facile inflammantur. Anginæ quoque erit species, eoque magis cum et tunc vicini quoque muscoli fere inflammentur, deterior mitiorve prout se in musculos dictos diffundit inflammatio. Si vero in glandulas elatiores, tonsillas se vel gargareonem feratur, harum partium inflammationes, Antiadum et uvulæ nominibus expressas parit, quæ ad vicinas quoque partes sæpe expanduntur, frequentiusque, quam anginæ fiunt, cum sanguis in laxas hasce glandulas, magnis venis adstratus, citius quam in alias, cum fluit, feratur; quod si in galæ seu œsophagi sedem potius descendat, quod rarum est, dolorem graviorem longe, præsertim in deglutione, a principio gulæ ad ventriculum usque sese exserentem, sed non cum tanta spirandi difficultate, nisi ad vicinas quoque partes se extendat, procreat; cujus influxus sanguinis, atque inde natæ inflammationis, causa eadem quæ cæterarum inflammationum existit, nimium plethorâ, sanguine admodum in corpore redundante, vel ferventiore et tenuiore existente, eoque se potius quam alio ob partium dispositionem exonerante etc.

Circa laryngem.

Errare censet P. Barbette in anat, practica, eos qui laryngem inflammari adscribunt; licet enim cartilagine ipsas inflammari; hunc corrumpi posse non neget, certum tamen credit inflammationem cartilaginibus adscriptam adsitis glandulis, carnosisque faucium partibus competere; alioquin tam sæpius curationem non admissuram., cum corruptio atque inflammatio aryngis lethalis, eo iudice, sit morbus....

Adiit Pharmacopeum.....

Accessitus Medicus phlebotomiam eamque iteratam, quæ in ejusmodi inflammationibus princeps est remedium, præscripsit. Tunduntur venæ in brachiis, maxime cephalica, post venæ sub lingua; sed maximæ momenti est jugularium apertio. Auxilij celeritas et efficacia inde est, quod serum in sanguine super-

fluum, e cerebro perductum peculiorem in jugulares venas, extra cranium, refunditur; (vide lib. I, Tit. de *Catarrho*, ex *Louvero*); quarum depletio, ob viciniam et communicationem cum parte affecta, opem citissimam affert. Serum autem sanguini commixtum illi vehiculo est, quod facilius exiles earum partium venas subeat. Hinc annotatum eos qui sudantes ab exercitio collum nudo aëri exponunt, angina facile tentari, represso sero, et in musculos glandulasque vicinas ambientis vel retrahito; sævæ anginae, quam neque terna venarum brachij. sectio, ac profusa sanguinis miscio, neque raninarum apertio tollere potuit, solutionem, eamque citam, beneficio apertæ jugularis, vidi anno 1675. Mensis Maii. in Dom. Dyonisio Bordier Genevensi. Ea die faucium dolore et deglutiendi difficultate corripitur; comites erant nausea et cardialgia, phlebotomiam alias necessariam prohibentes; livebant enim præ sanguinis copia extremæ manus. Iis sedatis sanguis ad uncias decem, et basilica, ob delitescentem cephalicam, educitur, floridus et rutilus: Iteratur postridie, mane et vespere, etiamnum expers vitii, atque adeo nullo successu; ad cucurbitulas scarificatas, transitus quoque fit, præmissa raninarum sectione. Tandem incisa jugulari sinistra a Magistro Foubert dexterrimo Chirurgo, sanguis omnino putris affatim exiliit; ejus educatione angina cessit, sed succedente pejore affectu, qui priori socium se plerumque adjungit, scilicet peripneumonia a qua tamen, quamquam gravi, paucis post diebus emersit.

Angina pestifera in capite fomitem habens.

Ab anno 1618, erupit insuetus inter nostras gentes affectus, qui homines, potissimum pueros, extincto vel praecluso spiritu interimeret, *αρχονηλοιμωδης* dictus, tonsillæ pestilentes, ab aliis strangulatorius faucium affectus, aut carbunculus pestilens, aut laqueus gutturis: a plerisque passio anginosa, quibusdam aut ulcus syriacum, cum Aretæo, aut tonsillæ pestilentes, cum Aëtio. Indicant autem plura non obscure superiore tonsillis loco sedem affectam, quæ cerebrum est, cui nostræ suasioni favet anatome complurium corporum vi morbi enectorum, in quorum capitibus exectis reperti grumi sanguinis lato schemate diffusi, sub maximos sinus membranæ crassioris etc. (*Severinus*

de abcessibus, tract. ult.) Nervos per occipitis foramen in musculos cervicis, laryngis, hyoïdis, et faucium in sanguinoso hoc affectu non leviter læsosprehendimus. (*Thom. Bartholinus comment. in dictum affectum, Exercit. 1.*)

(*Sect. XXVIII, obs. III, lib. I, p. 380.*)

Scholia.

Eum affectum antecessit boum annua lues, quo mirum in modum strangulati concidebant. Extant de hac re peculiaria, compendiosa, luculenta et accomodata Aretei monumenta, quæ huc integra produci placet, ut antiquæ morbi ideæ quantum hodierna perspicipossit. (Is cap. 9. lib. de causis et signis morborum.)

Ulcera tonsillis fiunt aliqua mitia, familiaria, non lædentia, aliqua aliena; pestifera necantia; mitia quidem sunt munda, exigua non altè descendentia, non inflammata; pestifera sunt laxa, cava, pingua, quodam concreto tumore albo, aut livido, aut nigro sordentia; id genus ulcera Aphtæ noncupantur. Quod si concerto illa sordes altius descenderit, affectus ille Eschara est, quam circumveniunt rubor excellens et inflammatio, et venarum dolor, quemadmodum in carbunculo, et exiguæ raræque pustulæ, quas Græci exanthemata vocant, orientes, hisque aliæ supervenientes in unum coalescunt, atque inde latum ulcus efficitur; id si in os interius serpit depascendo, ad collumellam usque pervenit, ipsamque exedit, et linguam etiam occupat, et gingivas et dentium alveolas, dentesque inde labefactantur et denigrescunt. In collum etiam phlegmone erumpit; atque isti haud ita multis diebus post phlegmone, febribus, fœtore inediaque consumpti intereunt. At si in pectus per arteriam id malum invadat, illo eodem die strangulat; pulmo enim et cor neque talem odoris fœtiditatem, neque ulcera neque saniosa humores sustinent, sed tussis spirandique difficultas enascitur. Causa maleficii tonsillarum est frigidorum, asperorum, calidorum, acidorum stringentiumque devoratio; quandoquidem hæ partes pectoris ad vocem spiritumque edendum inserviunt, et ventri ad alimenti transmissionem, et gulæ ad ejusdem devotionem obsequio sunt. Internis vere partibus si quod contingat incommodum ventri scil. gulæ et pectoris ad isthum et ton-

sillas, et loca ibi posita, mali consensus et eructationes perveniunt, quare pueri usque ad pubertatem maxime hoc morbo tentantur, præcipue namque pueri multum frigidum aërem inspirant, quoniam in his plurimum caloris inest, et ad cibos intemperantes sunt, et varia concupiscunt, et frigidam potant, et excandescentes ac ludentes altius vociferantur. Puellis quoque usque ad menstruæ purgationis tempore hæc vitia usitata sunt : regio Ægypti horum affectuum plane fecunda est; aer enim spirando siccus adducitur, varios præterea cibos suggerit; radices enim herbæ atque olera ibi large proveniunt, et acria semina et potio crassa, utpote Nili aqua. Syria quoque illa, maxime quæ Coele, id est, cava nominatur, hujus modi morbos procreat, unde Ægyptiaca et Syriaca ulcera id genus appellant. Modus vero mortis quam miserrimus accidit, dolor quidem acer et calidus, qualis in carbunculo spiritus vitiat. Exhalant enim maximæ putredinis odorem, eundemque vehementer in pectus spirando adducunt. Immundi adeo sunt ut neque suum ipsorum odorem ferre queant; pallida his scil. livida facies, febres acutæ; sitis, ut igne accensi videantur. Potum dolores non admittunt; tristantur enim cum tonsillæ comprimuntur, aut potius (potus) in nares resilit. Cumque decumbunt, surgunt, ut sedeant, quiete carentes; iterum decumbere coguntur; plerumque autem recti stantes obambulant, nam quiescere nequeunt, solitudinem fugiunt, dolorem tollere dolore tentantes; inspiratio magna est, frigidum enim aërem ad refrigerationem desiderant, expiratio vero parva; nam veluti igne exusta ulcera cum sint, a calido præterea spiritu incenduntur; raucitas adest, vox nihil significat, atque hæc in pejus ruunt cum subito in terram delapsis anima defecit. (*Hæc Areteus.*)

Cui Græcanicæ morbi figuræ dispar haud est Italica nostra, nisi quod paulo auctior per symptomata capitis, quæ minime : recensita veteribus, visuntur non infrequenter in nostris hominibus male affectis, præsertim viris et fæminis natu jam grandioribus : Equidem inter cæteros notavi duos, qui non sine comate, stupore, caribaria, atque aliis hoc genus occubere. Neque enim sæva Proserpina pepercit capiti Medici quadragenario majoris; altera fuit Parmacopæi conjux, cui delirium per morbum sæpe apparuit, morbo commortuo. Excrétiones

e naribus consuetæ, putridæ, pituitosæ, ichoroides, aliquando cruori commistæ, aliquando duntaxat cruentæ mero ; puella quoque nubilis eodem affectu dire gravata, cum exitum e strangulatum expectaret, ex subita hæmorrhagia profusioræ præsentaneam opem sensit, postremo vero ex malo ori venefico servata, incertum qua nova morbi vi fuit inopine sublata : iterim scire licet unum e tribus pueris, qui pessime habuit inter cæteros, et nervorum languore relictum, cruribus opprimi imbecillum, atque oculo strabum, transvoratu vero sic impeditum, etiam a diu præterito affectu, ut vix emollitum humore panem demittere valeret : quanquam duriusculas panis offas, et solidas molles fabas ingereret commodiuscule ; qua eadem sanguinis per nares excretiones facta, puero decenni salus perfecte reddita est, quanquam hic jugularis venæ sectione fuerit egregie levatus. Indicant hæc porro non obscure superiore tonsillis loco sedem affectam, quæ cerebrum est, cui nostræ suasioni favet anatome complurium corporum hoc morbi enectorum, in quorum capitibus exectis reperti grumi sanguinis lato schemate diffusi, sub maximos sinus membranæ crassioris. Accedit quod in duobus pueris provectoribus, et puero quinquenni, dira lues nares utrasque compleverit putridis et prælatis aphthis, quæ viru putridissimo manabant ; quid, quod cum putrilaginem reddere visæ sunt nares, ut cerebri substantiam retulerint : sed, et illud notandum, quod etsi tonsillas pestilentes hocce vitii vocitemus, nihilominus observatum est sæpe supra strangulatum, et puris jam visceribus, sublatis pueros morbo, qui liberi fuerant reputati : imo post 30. dies et 40. jam *prærepti morbi* furoribus præter omnium opinionem ex *improviso* sunt *extincti*, adeo Scil. recondita veneni vis est...

Quoad morbi procreationem, certum est luem hanc analogiam habere ad ætatem puerilem, forsân ob excedens calidum et humidum temperamentum, ad putredinem et pestem concipiendam aptum ; aut ob naturalem impotentiam obsistendi causis morbificis, ratione laxi, teneri, spongiosique corporis, aut ratione inordinati victus, ob quem subinde sanguis redundat crudus et impurus, paratus ad putredinem et exinde luem concipiendam ; unde altera pendet analogia ; cui tertia partis Scil. est adjungenda, quæ mea opinione cerebrum est, his ar-

gumentis; nam eo primum supposito, quod probatissimorum auctorum consensus docuit, contagium ad distans, atque omnem pestilentiam communicari per aërem inquinatum, porro aer ex Hipp. lib. de morbo sacro, primum admitti a cerebro, relinquens in ipso suum ipsius vigorem. « Si enim, inquit, in corpus primo adveniret, posterius in cerebrum, dignotione aut iudicio in carnibus venis relictæ, ad cerebrum calidior jam existens perveniret et non sincerus ac purus, sed admixto humore a carnibus et sanguine. » His accedit quod cerebrum ad patiendum, et ad suscipiendum maxime imbecillum et minime obsistens, molle Scil. et laxum, præsertim humidum et glutinosum est, quod unice facit ad concipiendam labem humidam et glutinosam; ad hæc cerebrum est glandulæ consimile; ex Hipp. lib. de glandulis, n. 7, atqui glandulas apprimè corripit pestilentia, nimirum parotidas, alas, inguina, quod experimento quotidiano docemur? Postremo constat sanguinem fœdum, putridum fœtidumque fluere in ista lue de naribus, et vocem raucidam ex his podire quod partim humorem, ut dixi, crudum, partim affectam sedem ostendit. Quæ cum demonstrare voluerim naturalibus adductis causis manifestatis, non est tamen quod occultæ morbi formæ fuerim oblitus. Generationis autem modus hic est: deductus aër putris per canales priorum sinuum cerebri, pervenit ad retiformen plexum arteriarum et venarum. Ibi primum corrupto sanguine, mox sædit et penetrat corpus cerebri, quod corruptum restat a postremo contagio; quo tempore consummatur status et forma, sive idea morbi. Hæc enim inquam Sphacelismus et corruptio cerebri, ex qua deinde sequuntur affectus alii ac symptomata omnia. Quod autem sit corruptio cerebri, audiendus Hipp 1, 2, de morb. n. 1 « Corruptum cerebrum cum aut nimium calefactum, aut perfrigeratum, biliosum aut pituitosum plus solito factum fuerit. Et in Coacis, cerebro corrupto alii in tribus diebus, alii in septem moriuntur, hos vero si effugerint servantur » item aph. 51, 7 ubi Galenus corruptionem non accipit vulgari modo, sed pro nativi caloris exsolutione a materia prævalente; quo quidem sensu, non mirabile est quod morbi quidam et læsiones cerebri non consequuntur perpetuo, ut apoplexia, catalepsis et cæteræ organicæ passionēs, quæ obveniunt secundum nervos et sinus

ductusque cerebri; hæc alioqui passio sit secundum cerebri substantiam æqualiter; ac ut in hectica febre non agnoscitur dolor, aut alteratio aliqua præcellens, et sine his etiam ad mortem itur, sic et in re nostra non est cerebro præcellens officialis aliqua læsio, præsertim exordio, sed conclusa illa et profunda labes tacito quodam exitio perdit omnem ejus crasin. Quæ dum fiunt, communicatur et subjectis partibus vitium, id est vicinæ tracheæ, pulmonibus ac subinde cordi. Hinc esto talis morbi definitio, quocunque nomine veniat: Sideratio cerebri pestilens, contagiosa, a seminariis impense putridis, delatis cum aëre, per ventos præsertim australes, ad glandulosas puerorum partes. (M. A. *Séverinus* tractatu proprio, qui ultimus est lib. de abcessibus, unde hæc desumpta: videatur et comm. Clar. Th. Bartholini.)

Homines potissimum pueros..... Invenes senibus frequentius angina corripuntur, quod bilioso sanguine scateant: Viri frequentius quam fœminæ (exquisita scilicet) quod earum sanguis frigidior, larynx minor, ac gutturis partes et venæ, angustiores exilioresque; qua de causa sanguinem difficilius admittunt; interim anginæ nothæ ob partium laxitatem excrementiorumque ubertatem, viris magis obnoxia sunt cur vere angina hæc pestifera pueros præsertim adoriatur, causas reddit supra Aretæus.

Extinctus vel præclusus spiritus.

Non pauci cor in primæ partes participationem adsciscunt: sed certum est omnium malorum hanc clausulam (mortem) sequi cerebrum, non præcedere, eo præcipue argumento, quod sine febrili intemperie Pædanchone fatum maturet, cerebri non cordis affecti indicium; cor enim omnis alienæ contrariæque virtutis adventu, velut ad rem diversam et noxiam, quocunque gradu contractum, perpetuos pulsuum motus vel retardat vel accelerat. At vero alia cerebri conditio corruptionem, sine vitalium intemperie, eousque perfert, donec venas, cordis ductus, vitii, magnitudine infecerit; imo ex se, sine cordis consensu, mortem inducere quid vetat? Quod animalium spirituum ad vitæ usuram juxta necessarium fata moderatur. De cerebro, media fides in Pædanchone minus ambigo, quam ejusdem partibus in societatem mali, ne prærogativam dicam, adscribenda.

Quippe interior nobilioris cerebri recessus, quem medullam vocant, ut pars princeps excludi non meretur, apud quam animalis vitæ sedes arbitrium et potestas. Ab hac enim nervorum origine, per occipitis foramen in musculos cervicis, laryngis, hyoidis et faucium disseminatur par Vagum, ad latera et respirationis moderatores expandens, quos in sanguinoso hoc affectu non leviter læsos deprehendimus ; quanquam causam alii, inter quos Aetius, in impeditum pulmonum motum conjecerint! Hinc pendet problematis solutio, quo fiat fato ut subito subinde, sine alia manifesta causa extinguantur ægroti? In promptu ratio quæsitæ, ex cerebri nuclei conditione, quo vel leviter læso, sive ab interiori incidente, sive punctura exteriori, animans inopinato mortis genere prosternitur ; quod laniorum artificium, solo acus in cervicem impactu, apud Subalpinos, improvidi boves experientur. (*Barthol. com. in Pædanchonem.*)

Angina latens ab inflammatione pulmonum in gangrænam desinente — Tumor Thymi glandulæ, phlegmone obsessæ.

Miles gregarius recens conscriptus a nobili Domino Buisson, Genevensi capitaneo, Helvetiorum legionibus, Regis Christianissimi castra sequentis adscripto, cui nomen Abrahamus Perroux, Territorii Lausannensis, quinquagesimum annum prætergressus, enteroceles molestias declinaturus castrationi se submitit, quæ feliciter peracta est inclinante mense septembri anni 1677.

Tertia post hebdomada, rite omnibus se habentibus ac consolidatione vulneris jam proxima, jamque per urbem vagari ubi inciperet, difficultate deglutiendi prehenditur cum difficili respiratione. Tertia die et instante ægro accessus sum ; lingua, præter apicem, atro carboni erat nigrior, erecto pectore cubabat, siquid e cochleari offerretur, suffocationem inducebat, quamobrem licet extreme debilis magno conatu oblata respuebat : velamina omnia abiciens, quanquam actu frigidus esset, solos pedes cooperiri permittens ; pastorem, qui animæ consuleret, illico advocari jubeo, anginae symptomata omnia video, quanquam nihil omnino, neque intus neque extra appareret, si insignem illum linguæ nigrorem exceperis, unde pronuntiavi interiorem adesse gangrænam, internæ inflammationi sobolem, quam in pulmo-

nibus, esse credidi, memor consensus qui inter Testes et peccatus intercedit, ad quem attentum esse jubet Hipp. (medicum lib. 6 Epid.), Miscellus sesquihora a meo discessu interiit.

Explorato vulnere inguini dextro inflicto, operationis rite et ex arte peractæ, a juvene Colet vocato, indicia fuere, nullis inflammationis notis præsentibus, ad superiora facto progressu, dissecta secundum longitudinem pars colli interior, ubi salva trachea arteria reperta est, omnis phlegmonis inexpress, ut et adjacentes muscoli : Thymus glandula intumuerat; atro sanguine referta tracheam premebat. Compresso thorace exsudabat per sectionem factam sanies; ille apertus inflammationis insignis in pulmonibus notas exhibuit aterrimo sanguine distensis lividis, nigris creberrimis maculis conspersis, juxta dorsum præsertim, cum gangrænæ indiciis evidentibus. Hinc apparuit deglutiendi et spirandi difficulatis, ac loquelæ impeditæ causas (vocales enim tantum literas A et O efferebat æger) adscribendas fuisse, tum compressioni tracheæ a tumida illa glandula, tum ejusdem retractioni ad inferiora a pulmonum infarctorum pondere; abcessum latentem inquirere, e quo sanies effundebatur, non licuit ob instantem sepulturam; jecur tamen vitiose coloratum admodum tumidum, diaphragma sursum compellens se offerebat : Voracissimum fuisse audiui.

Scholia.

Thymus glandulæ intumuerat atro sanguine referta.

Thymus glans venæ cavæ adnexa vice pulvini substernitur atque superjicitur, ita ut suo sinu eam comprehendat. Animadvertit Galenus hanc glandulam in nuper natis animalibus prægrandem esse, ob vasorum mollietatem et imbecillitatem : crescentibus illis, utpote durioribus, ipsam exsiccari atque decrescere, ita ut in juvenibus exiguum ejus vestigium remaneat ; sed in mulieribus est mollior et crassior, ideoque suffocationes quæ accidunt mulieribus frequenter, viris interdum sine læsa respiratione, ab ista glandula turgida dependent. (*Riolanus Anthropogr.* lib. 3, cap. 13.)

MORGAGNI

(Traduction Desormeaux.)

Angine.

Actuellement passons à une maladie du larynx ou du pharynx, ou de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire à l'angine. Ce n'est pas sans étonnement que vous m'avez vu me plaindre (épist. 14, n° 39), lorsque j'ai écrit sur cette affection, de ce qu'il n'existe pas de dissections de sujets qui y ont succombé. En effet il semble que cela n'était pas possible pour une maladie non seulement aussi dangereuse, mais encore assez fréquente, et qui règne même quelquefois épidémiquement, comme autrefois (Macrobe, *Saturnales*, I, c. 10) a rapporté ceci d'après Julius Modestus, lorsqu'on fit des sacrifices à la déesse Angeronia, parce que le peuple romain fut délivré après avoir formé des vœux d'une maladie qu'on appelle angine; et dans un temps plus près de nous, elle a principalement attaqué les enfants, sur lesquels elle a exercé pendant longtemps de grands ravages. Cependant, quoique la louable coutume de disséquer les cadavres humains fût déjà en vigueur, et que les médecins fussent assez versés dans l'anatomie, comme J.-B. Cortesius en Sicile et A. Severin à Naples, lesquels visitèrent les malades et ont écrit sur leurs maladies (*Miscell. medic. dec. 9, épist. 6 de recond. abcess. nat. 1, 8, sive diatribes de pedanch.*). Vous ne trouverez dans leurs écrits aucune dissection qui se rapporte à ceci. Bien plus, Cortesius fut du nombre de ceux qui persuadèrent ou qui du moins crurent avoir persuadé aux sénateurs de Messine qui réclamaient la dissection « que l'ouverture des cadavres était tout à fait inutile pour connaître cette maladie » car il pensait qu'elle consistait dans l'inflammation et la gangrène des parties qu'on pouvait voir en ouvrant la bouche, surtout des tonsilles. Séverin, pensant aussi que la maladie était assez connue par ses signes, n'a même pas voulu se donner la peine de décrire le siège de l'affection, ou le vice lui-même (Fran-

cofurti 1610), aussi envoya-t-il à peine à la fin à l'imprimeur de Francfort, une seule observation qui, n'ayant pas pu être insérée dans le livre déjà écrit, fut publiée à la fin du volume, au milieu d'autres choses qui devaient être ajoutées aux livres précédents. Elle est bien dans le *Sepulchretum* où je l'avais lue moi-même (lib. 23, obs. 4); mais elle est décrite avec tant de négligence qu'entre autres expressions qui avaient presque pour but de confirmer l'hypothèse de Séverin, on a mis ce peu de détails qui appartenaient aussi au titre sur l'angine : le larynx examiné fut trouvé couvert, à sa face externe, d'une puitte crustacée, sans apparence d'ulcère. Mais depuis je vous ai écrit ceci, je n'ai pu trouver que cette observation relative à l'examen du larynx d'un sujet mort d'une angine, quoique je ne doute pas que si M. Séverin avait voulu faire des recherches de cette espèce, non pas une fois, mais plusieurs (car l'occasion ne manquait pas puisque cette angine, d'après son propre témoignage, avait tué tant de milliers d'enfants), il aurait trouvé d'autres choses sur d'autres cadavres. Aussi comme je n'ai trouvé que cette observation unique de Séverin, qui ait été recueillie sur l'homme, j'ai cherché s'il en existait du moins quelques-unes qui l'eussent été sur les bêtes, mais à peine ai-je trouvé les objets suivants que Stegman (*Eph. VI. C. dec. 3 à 5 et 6, obs. 169*) observa sur des chiens morts d'une angine : le cou était tuméfié à l'extérieur, l'intérieur de la gorge et les muscles du gosier étaient enflammés. Or si les anatomistes eussent cherché et décrit plus souvent le siège de cette maladie, comme celui des autres affections, croyez-vous qu'il y aurait eu quelqu'un dans notre siècle, qui eût prétendu, sans rapporter aucune recherche de ce genre, que la glande thyroïde est la seule et unique partie qui soit le siège de l'angine, maladie très violente.

17. — Mais depuis que j'ai recueilli moi-même une observation que je vous ai envoyée (*epist. 44, n. 3.*) plus tard sur l'état de la gorge, du larynx et de la trachée artère d'un jeune homme qui était mort d'une angine, je sais qu'il en paru d'autres qui ont été recueillies la même année surtout sur des enfants, qu'une angine très violente enlevait alors en France, où elle régnait comme j'ai dit qu'elle régnait autrefois dans le royaume de Naples et de celui de Sicile. Les médecins de

ce pays ne se contentèrent ni des signes de la maladie ni de l'examen des seules parties que l'on voit en faisant ouvrir la bouche des malades. Et ce ne fut pas en vain, car en disséquant les cadavres des enfants, ils trouvèrent manifestement quelle lésion était cachée dans la trachée artère, comme vous l'apprendrez par deux dissections envoyées à l'Académie royale des sciences par Arnault, habile médecin d'Orléans et publiées par elle (mem. a. 1748). (LXIII.)...

Un charpentier âgé d'environ trente-trois ans, d'une taille élevée, d'une grande corpulence, et d'une constitution un peu grasse, était bien portant auparavant, autant qu'on put le savoir, lorsque s'étant échauffé extraordinairement auprès du feu et avec du vin, il se retira chez lui pendant la nuit par un temps très froid. Là, ayant été pris d'une fièvre violente et d'une angine, on appelle cette nuit même un médecin qui lui tire du sang du bras. La maladie n'éprouvant aucune rémission, on le porte le matin à l'hôpital où le même moyen est réitéré mais inutilement en sorte qu'on pratiqua une saignée du pied dans les heures de l'après-midi. Le lendemain, comme les autres remèdes qu'on avait employés auparavant et qu'on employait alors, soit qu'il les avalât lentement, comme il pouvait, soit qu'on les appliquât à l'extérieur, n'apportaient aucun soulagement, on lui tira de nouveau du sang du bras le matin, et, l'après-midi, des veines qui sont sous la langue, car la jugulaire ne pouvait pas être ouverte, comme on l'aurait voulu, parce que le malade ne supportait pas la position qui était nécessaire pour cette opération. Après tous ces moyens la fièvre et l'agitation du corps, loin de diminuer, augmentaient au contraire toujours en même temps que la difficulté d'avaler, de parler et de respirer, lorsque ayant dit au troisième jour de sa maladie qu'il avait une gonorrhée virulente depuis quinze jours ou du moins pas depuis beaucoup plus longtemps, on lui ouvrit de nouveau la veine du pied. Le sang qu'on lui tira tant de fois ne présenta jamais de couenne à la partie supérieure, mais il fut toujours un peu dur, et il fournit peu de sérosité. Le cou était un peu tuméfié, la face n'était ni gonflée, ni rouge. Quoique le pouls fut encore fort deux heures environ après la dernière saignée du pied, cependant le malade pressentit que sa mort était prochaine. Elle s'o-

péra effectivement bientôt après le même troisième jour, de sorte néanmoins qu'elle pouvait paraître avoir eu lieu par hasard. En effet, ayant demandé de l'eau dont il faisait usage, et en ayant peut-être voulu laisser tomber imprudemment dans la gorge un peu plus qu'à l'ordinaire, il mourut aussitôt de manière à faire croire aux assistants qu'il avait été suffoqué par cette cause. Comme le jour où je devais commencer le cours d'anatomie dans l'amphitéâtre c'est-à-dire le 19 janvier 1748, approchait, on conserva le cadavre pendant deux ou trois jours, ce qui n'empêcha pas qu'il fût très propre à la dissection, (car c'était dans la plus froide saison de l'année), en sorte que vingt six jours après la mort je pus encore me servir de quelques unes de ses parties. Il fut donc disséqué en entier par ordre et avec soin, et il offrit d'autres dispositions remarquables qui n'appartiennent point à ce sujet, mais surtout celles que je décrirai ici en revenant des derniers objets aux premiers.

Examen du cadavre. — Les vaisseaux du cerveau quise trouvent soit à son intérieur, soit à son extérieur, et non seulement dans les ventricules, mais encore çà et là dans la substance médullaire étaient distendus par du sang mais ceux qui rampent dans la partie gauche de la pie-mère l'étaient davantage. Cette méninge, de même que toutes les membranes de ce corps résistait plus qu'à l'ordinaire, soit qu'on voulut l'inciser ou la déchirer. Il y avait un peu d'eau sanguinolente dans les ventricules latéraux. La langue parut plus épaisse que dans l'état naturel, mais il est certain que ces vaisseaux, qui se dirigent de la base sur la pointe par la face supérieure, étaient non seulement apparents, mais encore un peu gros, ce qui dépendait de la stagnation du sang. Le voile et la partie mobile du palais étaient sains, il est vrai, mais la membrane qui couvre les tonsilles était épaissie par de la sérosité jaune qui s'y était arrêtée, et qui ressemblait à une gélatine jaunâtre, et les tonsilles elles-mêmes étaient tuméfiées, surtout celle du côté gauche, qui se trouvait endurcie et qui répandait du pus par expression ou par incision. Non seulement les cartilages voisins du larynx, mais encore ses muscles propres, que j'examinai chacun en particulier avec soin, étaient exempts de toute altération et de toute inflammation. Mais il existait une lésion de la membrane qui tapisse

le larynx à l'intérieur et à l'extérieur et qui était affectée d'une manière plus légère en dedans, et plus grave en dehors. En effet elle était plus rouge qu'à l'ordinaire à l'intérieur de cet organe, de même aussi que dans la partie voisine de la trachée artère, elle s'y trouvait également un peu tuméfiée, mais légèrement, en sorte que la fente de la glotte ne paraissait point trop étroite par suite de cet état. Mais, à l'endroit où la même membrane couvrait l'épiglotte, elle était également tuméfiée, soit à la face concave, soit à la face convexe, soit aussi sur les côtés, avec une couleur rouge dans certains endroits, et une teinte d'un rouge brun dans d'autres; cependant elle l'était moins à sa face concave qu'ailleurs et elle ne l'était pas dans toute cette face, mais dans son tiers supérieur seulement. Il était évident par la dissection que cette tuméfaction et cette couleur étaient dues au sang et à la sérosité, qui ne distendaient que la membrane et les grains glanduleux, annexés; or, une partie de ces tumeurs commençait déjà à se convertir en pus dans la face convexe. D'un autre côté, à l'endroit où la même membrane couvre le larynx en dehors et par derrière, elle et les grains glanduleux annexes étaient attaqués d'une grande inflammation, principalement sur les parties latérales, car il s'élevait de chaque côté une protubérance un peu moins grosse que l'épaisseur du petit doigt. Ces protubérances nées de la partie inférieure de la base du cartilage cricoïde, convergeaient en montant, et parvenaient à un endroit tel qu'elles dépassaient un peu la hauteur des cartilages aryténoïdes, desquelles cependant elles étaient entièrement séparées, ainsi que de la partie supérieure du larynx, tandis qu'elles étaient adhérentes au reste de sa partie inférieure. Vous auriez dit deux condylomes-enflammés, en voyant leur forme et leur couleur qui était les mêmes que j'ai décrites sur l'épiglotte, si ce n'est que sur ces protubérances elle était plus rouge et moins brune. Du reste, en disséquant la membrane et les grains, je vis qu'ils étaient tuméfiés par du sang et de la sérosité en stagnation, et cela d'une manière plus remarquable à gauche; côté qui était le plus affecté dans cette partie, comme je l'ai dit également pour les tonsilles et la première. Voilà ce que je trouvai relativement au siège et à la nature de cette angine. (LX, IV.)

Enfin pour ce qui regarde la section vingt-troisième qui traite de l'angine, il est fort étonnant qu'il n'y ait aucune observation d'une maladie très grave et très fréquente du larynx et des parties voisines de la gorge, qui fasse connaître ce que l'on a trouvé sur les sujets morts d'une véritable angine. En effet, parmi les histoires qui y sont rapportées, les unes appartiennent aux poumons et au thymus qui étaient tellement remplis de sang, que ceux-là tiraient en bas la trachée artère par leur poids et que celui-ci comprimait ce conduit sur son volume vicieusement augmenté; les autres ont rapport à des lésions du cerveau ou d'autres parties, de sorte que quelqu'un sans expérience pourrait douter si cette affection attaque jamais le larynx ou la gorge. Mais certes la tumeur qui dans une angine existe souvent aux environs de cette dernière partie, extérieurement ou intérieurement, que j'ai vue plus d'une fois, et que j'ai fait ouvrir avec prudence lorsque déjà elle contenait du pus, et qui fut le premier motif qui engage à pratiquer l'opération que l'on appelle laryngotomie, fait voir que cette maladie dépend d'une inflammation qui attaque les organes que je viens d'indiquer. En effet, pour ne pas parler des muscles qui portent les cartilages aryténoïdes dans l'adduction, à moins que vous ne supposiez que les glandes qui lubréfient le larynx soient entièrement exemptes de ce qui arrive aux autres de la même espèce, on verra qu'il est impossible que des inflammations, et des inflammations très fâcheuses n'attaquent pas quelquefois, par exemple, les glandes aryténoïdes que j'ai découverte, et dont la tuméfaction intercepte nécessairement la voie étroite de l'air. Mais je dis cela non pas parce que je crois que vous pensez autrement, mais seulement pour que vous compreniez que c'est là une de ces maladies dont le siège, la nature, et les effets particuliers, tantôt plus tantôt moins graves, ne paraissent pas avoir été cherchés par la dissection, quoiqu'ils eussent dû l'être d'une manière spéciale. Pour moi, je ne l'ai pas fait, parce qu'une fois je n'ai pas eu le temps et que depuis je n'ai jamais trouvé l'occasion de disséquer de sujets morts d'une véritable angine. Cependant j'ai ouvert un ou deux corps, chez lesquels cette maladie avait peut-être existé avec d'autres, mais dont elle n'avait certainement pas causé la mort; vous verrez, en relisant

la quatrième lettre que je vous ai écrite ce que j'ai noté dans la gorge et dans le larynx de ces cadavres. D'ailleurs vous pourrez rapporter en partie à une véritable angine, quelques-uns des objets dont j'ai parlé en traitant de l'hydrophobie. Adieu.

(*Lettre XIV, vol. II, parag. 39.*)

De la cécité, de l'aphonie, de l'angine.

..... Mais quelques-uns de nos compatriotes d'une exactitude et d'une bonne foi reconnues, n'ont pas manqué à leur devoir comme je l'ai compris par une histoire décrite par l'un d'eux, et qui est parvenue jusqu'à nous. En voici le sommaire : On trouva sur un homme mort d'une angine le larynx enflammé et la voûte du pharynx, ainsi que le palais mobiles et les tonsilles, gangrénés, sphacelés entièrement noirâtres et corrompus.

§ 18. — Vous comprenez que j'ai parlé jusqu'ici de même que dans la quatorzième lettre, de l'angine légitime, c'est-à-dire de l'angine inflammatoire. Quant à la fausse angine qui est appelée aujourd'hui aqueuse, à ce que je vois, par des médecins illustres qui font aussi mention d'autres espèces d'angines, entre autres de la convulsive, si par hasard vous demandez ce que j'ai vu moi même par la dissection, le voici : pour ce qui concerne la fausse angine, j'ai disséqué un ou deux sujets, dont je vous ai fait la description dans la même lettre, et qui moururent, si vous voulez, avec cette maladie, mais non certainement par son effet. Relativement à l'angine convulsive si je ne puis rapporter à elle celle qui rapprocha plutôt de l'angine que quelques-uns appellent paralytodée, et qui enleva une femme dont je vais rapporter immédiatement l'histoire :

§ 19. — Une vieille femme avait été couchée à l'hôpital dans un tel état de maigreur, qu'elle paraissait n'avoir que les os et la peau. Une fièvre s'étant enfin déclarée, ou étant devenue plus manifeste, comme elle ne pouvait ni avaler, ni ouvrir la bouche pour laisser voir assez bien dans son intérieur, on crut qu'elle était morte d'une angine vers la fin de 1755.

Examen du cadavre. — En disséquant la tête au même endroit nous trouvâmes les glandes maxillaires internes volumineuses, surtout celles du côté droit, de sorte qu'elles pouvaient

peut-être s'opposer à ce que la mâchoire fut abaissée autant qu'il était nécessaire pour ouvrir grandement la bouche, et jusqu'à un certain point aussi à ce que la déglutition s'opérât, mais point assez cependant pour qu'elle fut entièrement empêchée. Du reste le larynx fut trouvé sain, ainsi que la trachée artère, et la gorge avec la partie mobile du palais, les tonsilles et la racine de la langue; et ce volume des glandes maxillaires ne paraissait pas exister depuis peu. Dans la poitrine une petite partie des poumons était dure et non sans pus. Alors aussi on remarqua que l'épine s'éloignait de sa direction naturelle mais légèrement. Toutefois cette inclinaison avait peut-être été cause que la femme portait la tête de telle sorte que, des deux ligaments ronds qui attachent la dent à la seconde vertèbre du bord du grand trou du crâne, se trouvait le droit plus long et plus épais que le gauche.

§ 20. Méad n'avait certainement pas trouvé la plus petite trace de tuméfaction ou d'inflammation dans les glandes ou les muscles, en disséquant la gorge d'un homme qui était mort d'une angine convulsive; mais tous les vaisseaux étaient engorgés d'un sang fort épais, et saillant partout. Bien plus, il fait mention de convulsions de tous les nerfs dans cette angine, et il la nomme même strangulation de la gorge. Le sentiment de cette strangulation et les autres symptômes qui viennent d'être indiqués n'existèrent point sur la femme en question, qui présenta au contraire quelques-uns de ceux que Boerhaave nomme dans l'angine qui paralyse les nerfs et les muscles non seulement parce qu'elle se montre sans aucun signe de tumeur externe ou interne, mais encore parce qu'elle survient à la fin des maladies chroniques sur un corps très épuisé, et qu'elle est presque toujours le signe d'une mort imminente, après laquelle elle laisse voir le poumon en suppuration. Je croirais que cette angine approchait non pas d'une affection convulsive, mais d'une affection paralytique, si on doit la rapporter à l'une ou à l'autre.

§ 21. — J'avais écrit ceci, lorsqu'en feuilletant le volume des Actes des Erudits, qui m'a été apporté tout récemment de Leipzig, j'ai appris d'après quelques livres dont nous sommes privés ici, quelques choses qui appartiennent à l'un ou à l'autre

genre de maladie dont il a été traité dans cette lettre, à l'angine et à la cécité. C'est à l'angine qu'appartient la dissertation historique écrite en français sur l'angine gangreneuse des enfants, qui est la même je crois que celle dont il a été parlé plus haut (Lettre LXIII, § 17).

III. PROCESSUS SPÉCIFIQUES

I. AUTEURS AYANT ÉCRIT SUR LA DIPHTÉRIE.

JEAN WIERUS

De angina publice grassante.

Anno enim a Christi nativitate M DLXIII invasere hyeme colli tumores externi, glandulosi, pituitosi, discriminis expertes, quibus postea incipiente vere successerunt et per potissimam ætatis partem extendebantur *anginæ crebræ, periculosæ et velocis terminationis*; quæ præterquam quod malignitatis suæ contagione crudelissimis pestilentiaë insultibus penitus adæquarentur, tum etiam brevi perdurationis decursu interficiebant, ut nonnullas deprehendere liceret saltem ephemeræ, aliquas triduas, vel quatruiduas, pauciores septenarias; at cæteræ octidui periodum excedentes, plerumque medelam receperunt.

Oboriebantur primum cum febre et vomitu, ac potissimum ex causarum προκαταρτυτικών occasione, utpote novilunio, exercitio corporis vehementiore, deambulatione per solis fervorem, aliisque exæstuationum focus; deinde momentanea accessione supervenit linguæ tumor, loquela adimebatur ex obturatione laryngis. Ipse etiam œsophagus arctissime occludebatur, ut ne vix quidem potum admitteret, multo certe minus cibi solidioris deglutitionem, quorum symptomatum confluxus ægros necabat strangulatu. Quo nullum mortis genus existit aut

atrocius aut calamitosius. Interea vero, præter paucissimorum erysipelatum apparitionem, nullus in colli ambitu conspiciebatur tumor; sed intrinsecus considebat fere semper virulenti humoris defluxus, qui plerumque excitabat phrenitidem, facta exhalationum cum cerebro communicatione. Sæpenumero etiam relicta priori in faucibus statione, ad latera sub cutem costas tegentem distillabat, unde lethalis cynanches efficiebatur. Pleuritis non minus mortifera consequebatur. Raro autem ad pulmones transferebatur materia, quæ peripneumoniam non minus tutam mox excitabat. Interdum quoque thorace relicto, ad spinam dorsalem convertebatur, ejusque dolorem gignebat intolerabilem, præsertim etiam in mulieribus menstruum effluvium patientibus (quod peculiariter notandum succurrit) quo difficili symptomate prope liberabatur nemo, moriebantur plerique omnes. Tam malitiosum erat tenuissimi humoris virus, ex cujus vehementia et contagione ob venæ magnæ vicinitatem sanguis vitiat, ad proximas uteri venas fluxionis menstrua assuetas defluxe, erupitque, unde et gravior in corpore veneni facta commotio et spiritum evacuatio. Observabatur præterea in pestilente hac cynanche pueros, quorum tamen ætas maxime hujus ægritudinis erat particeps, provectionibus minus pereclitari, atque eos prope citius reliquis evasisse, qui decubitum in lecto negligebant. Idcirco, quod horum reluctatio fortassis minus concepti veneni, vel (si voles) naturæ robustas vires, argueret: aliorum autem obsequium denotaret impotentiam ex veneno severius eam ætatem infestante. Quantum curativæ methodi rationem spectat, universalis corporis evacuationes, quæ præstantur aut pharmaci purgantis assumptione, aut phlebotomiæ usurpatione, plus læsionis quam emolumenti inferebant, nisi quod in principio cucurbitulas sine scarificatione humeris collo proximis in teneriori ætate affixas juvisse, et in aliis sanguinis e linguæ venulis extractionem quandoque profuisse, conscius sim. Adeo ut in hac anginâ angina Hippocratis præceptum fuerit repudiandum, *lib. de locis in homine*, cujus hæc sunt verba « angina affectis, a venis quæ in brachiis sunt, sanguinem detrahes et simul alvum inferne subduces, quod id quod morbum committit detrahatur. Omni exactius considerato, curationem instituebam, partim corroborando partes inferiores adversus fluxionum injurias

partim veneni pestilentis vim infringendo; hinc et localium remedium applicatione dissipando. Quandoque idipsum, quod immediate causæ conjunctæ præsertim fovebat. Ubi tamen cautione summa opus est alioqui hæc medicationis pars hic prætermittenda. Nam facile ex localium dissipantium vel digerentium potentia, hic humor sua tenuitate ad alia declivia vergebat loca, ut dictum est, ubi periculum consequbatur quoque, licet serius aliquando.

Porro nec hoc quidem silentio prætereundum est, quod dum tantopere sævirent et in aliis locis pestilentiae et in his nostris anginae epidemiae. Frequentissime hyeme præcedenti, noctu potissimum, apparuissent, aut celeri ejaculatione aut constante permansione, horrendi et varii in aëre fulgores et typhodes qui duraverunt per totam æstatem, hic nondum prorsus defuissent, evacuerunt tamen circa adventum hybernæ constitutionis; quæ tam severi extremi algoris dominio nos tandem oppressit et devastavit per integrum duorum mensium, eoque amplius, spatium, ut ab hominum memoria hyems nulla existisse asperior censeatur.

PALMARIUS

De carbunculo pestilente.

... Omnis carbunculus magnæ molis ac magnitudinis horrendæ pertimescendus, cum præsertim serpit, ad subjectas partes depascitur, velut nos aliquando in *faucibus* vidimus, qui ad asperam arteriam usque et in epigastrio, qui ad peritoneum usque rodendo pervaserant, qui fauces occupat, non raro tracheam arteriam sic comprimit, ut strangulet; sed bubo multo sæpius..... Venenata materia, quæ vel bubonem, vel carbunculum, vel utrumque parere debuit, *intus manens* non raro in præcipuam partem, velut antea diximus, irrumpit et inflammationem efficit. Si igitur in jecore vel liene impingitur, lancinans ac punctorius dolor locum affectum declarat; si in pulmonibus latitat, spirandi difficultas et tussis insunt, nonnunquam et sputum cruentum; si in latere præterea, dolor etiam punctorius inest; si in renibus et vesica, vel urina supprimatur, vel molestissimus dolor inter merendum premit. Si materia in cerebrum rapitur, delirium adest. (Cap. 27.)

PETRUS FORESTUS

De quibusdam sævis carbunculis in peste Delphensi
apparentibus.

Pestis hæc Delphica et pestilens hæc febris rarius sine carbunculis et bubonibus grassabatur, ideo et signa suprascripta, quæ in febribus pestilentibus ex humoribus apparere solent, magna ex parte ægros concomitabantur. Fuerunt nonnulli in nosocomio decumbentes quibus carbones non solum in diversis locis efflorescebant, sed etiam submento, ut tanta moles carnis excideret, ut interiora simul visui undique manifesta essent, qui tamen evaserunt. At anthraces *gulam internam* invasisse non spectavimus; neque chirurgus id per totum tempus, quo pestis sæviebat, observavit. Neque in faucibus carbones vidit, sed guttur *exterius* sæpe occupasse, et demum ad interiora pervenisse, animadvertit. Quibus enim circa stomachum, sive æsophagum, faucesque incidat carbunculus, subito (ut ait Celsus) spiritum sæpe elidit. At puella anthracem sublabro intus habens unde vapor pestiferus exhalans, integram domum infecit, ipsa moriente ac reliquis omnibus pueris, exceptis parentibus. Tanta enim sævitia ex molli membro magis putredini obnoxio oborta est, ut postea in multos hæc lues grussata fuerit, neque reprimi potuerit.

(*Lib. VI, obs. XII.*)

VILLAREAL

An morbus suffocativus fuerit cognitus a medicis antiquis et neothericis.

Difficultatem hanc in duas partes divisam circumferri audio ; illa tamen pertracto, ut ex auctoribus antiquis, et neothericis aliquam forte eliciam curandi formulam, quidque circa rem hanc probabilius dici possit. Aliqui enim dicunt, morbum hunc cognitum fuisse ab Antiquis et Neothericis. Potest probari primo ex *Hippocrate* II *Epidem.* sect. 1, statim in principio dicente in cranone carbunculi æstivi. Si ergo morbus hic est carbunculus (quod infra disputabo) sequitur Hippocratem cognovisse. Et lib. III. *Epidem.* sect. 3, n° 50, habet hæc verba : Carbunculi æstate multi et alia, quæ putredo vocabantur. Et 6 lib. *Epidem.* sect. 7, n° 1 : Quibus spiratio in sublime ferebatur, his pessimum erat, et brevissimo tempore jugulabentur. Et *Galenus* lib. de *dissectione venarum, et arteriarum*, cap. 7 ut doceat quam necessarium sit medico cognoscere varietatem venarum, quæ sunt in collo, quando curatio circa collum manufacienda est, sic loquitur : Quin et putrifera quædam vitia ita aliquando circumjacente cute, omnia quæ suberant, detexerunt, ut nudæ conspicerentur venæ, idque per omnes continenter corporis partes ; tunc maxime licuit cum fæda quædam lues carbunculorum in Asiam vulgariter ingruisset.

Probatur secundo ex *Celso* lib. 5, cap. 28, dicente : etsi circa stomachum, faucesve incidit, subito spiritum sæpe elidit. Per stomachum enim œsophagum intelligit, et loquebatur de carbunculo.

Tertia probatur, hanc ægretudinem cognitam fuisse a neothericis, ex eo quod *Marcilius Ficinus* de *triplici vita*, tract. de *antitotis epidemicis*, cap. 13, ubi postquam dixerat carbonem et anthracem tempore pestis reperiri in emunctoris, sic loquitur : Cerebrum per emunctoria, per aures dimittit venenum, necnon in collum. Et *Julius Palmarius* lib. de *morbis conta-*

giosis, tract. de *febre pestilenti*, cap. 27, testatur se vidisse carbunculum obsidentem utramque claviculam, et fauces, et alium usque ad asperam arteriam pertingentem. Et *Forestus* lib. 6, *suarum observationum* 12, asserit in peste Delphica visos fuisse sub mento carbones, a quibus tanquam magna carnis molles excidisset, ut interiora conspicerentur. Non igitur negandum est, antiquos et neothericos expertos fuisse, carbunculos pestilentes oriri in collo et partibus faucium.

Quibus ego addo ex *Aetio tetrabibl.* 2, sermo 4, cap. 46, quod inscribit sic de crustosis et pestilentibus tonsillarum ulceribus, ubi refert hæc ulcera fieri frequentissime pueris, atque etiam ætate perfectis, maxime his, qui vitiosis humoribus abundant; et velut tradens signa addit: sunt autem partim alba maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, quæ ferro incurrentur. Accidit autem ægris siccitas in transglutiendo, et suffocatio coacervatim incidit, et quæ non possunt expressius morbum nostrum depingere...

Aræteus etiam videtur expresse hunc nostrum morbum depingere; nam lib. 1 de *causis et signis acutorum*, cap. 7, duas adducit species, sive differentias anginæ: alteram dicit esse inflammationem instrumentorum respirandi, alteram esse affectum solius spiritus; primam appellat caninam. Secundam vero speciem anginæ *Aræteus* putat esse solius spiritus, ut antea dixi, et cap. 9 agens de ulceribus tonsillarum, sic ait: Ulcera in tonsillis fiunt aliqua familiaria, mitia, non lædentia, aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidem sunt munda, exigua, non alte descendentia, non inflammata, dolorem non excitant; pestifera sunt lata, cava, pingua, quodam concreto humore, albo, aut livido, aut nigro sordentia.

Uterus ex *Plinio* potest confirmari hæc sententia; nam lib. 26 *historiæ naturalis* c. 1, dum agit de lichenibus, carbunculo, et elephantiasi, et docet carbunculos esse peculiares *provinciæ Narbonensi*, addit: Nascitur in occultissimis corporum partibus, et plerumque *sub lingua* duritia rubens varicis modo, sed nigricans capite, alias livida, corpus intendens, neque intumescens, sine dolore, sine pruritu, sine alio quam somni indicio, quo gravatos in triduo aufert, aliquando et horrorem afferens, circaque pustulas parvas, rarius febrem, stomachum, faucesque

cum invasit, occyssime exanimans. Hæc Plinius, quæ si consideres, ea quæ reperiuntur in morbo suffocanti invenies consentaneam esse historiam Plinii.

..... Sed opposita sententia est probabilis nempe morbum suffocantem, de quo agimus, non fuisse cognitum ab antiquis medicis, aut neothericis, a tempore quo apparuisse referam capite tertio hujus libri. Probabo enim infra morbum suffocantem non esse vere carbunculum, quantumvis sapiat ejus naturam; quod si probavero efficaciter, id non debet inferri medicos antiquos cognovisse hunc morbum, ex eo quod cognoverint carbunculos in collo, mento et faucibus. Neque enim dubium est, in quacunque nostri corporis parte posse carbunculos excitari..... Sed adhuc habet difficultatem explicare verba Aretæi; conabor tamen in sensum probabile adducere. Primo quod dicat, illa ulcera esse pestifera, non probat cognovisse nostrum morbum; nam possunt esse pestifera ob tenuem humorem. Nec secundo, quod dicat esse lata; nam licet latæ pustulæ sive exanthemata fiant ab humore frigidiori, ut docent Hippocrates et Galenus... Nec tertio quod dicat esse pingua quodam concreto humore albo, aut livido, aut nigro sordentia; *nam dum humor calidus et tenuis frigidiorum partem tangit, potest concretionem pinguescere.*

An sit contagiosus et pestilens morbus.

.... His habitis de contagio, ad morbum suffocantem redeunt, asserimus contagiosum esse, fomitem et per contactum, non vero ad distans. Id enim quod est contagiosum ad distans, est tale fomitem, et per contactum; non vero e contra, quod est contagiosum per contractum, est tale fomitem, et ad distans. Id dixit *Fracastor* loco citato, et ratio quoque dicit; nam cum agentia naturalia fortius agant in proximum quam in distans, ut dixi supra ex *Aristotele*, agens quod potest in distans, potest in proximum; non vero et contra quod potest in proximum, potest in distans... Contagiosus quidem, cum observaverim integras familias laborasse *incipiente ab uno, et per plures serpente*; per contactum vero, cum infantes et pueros hoc morbo laborantes viderim, qui *matribus lactantibus*, aut secus morbum commu-

nicaverunt. Et e contra matres laborantes pueros infecerunt eodem morbo; at fomite, cum post obitum ægrotantium viderim plures utentes *eisdem lectis* eodem morbo laborare. Non vero ad distans, cum conversantes cum ægrotis, intrantes et exeuntes non solebant capi hoc morbo; unde præciso contactu et præciso fomite non laborabant.... Nostrum morbum suffocantem esse pestilentem et malignum nemo dubitat, cum inferat syncope, aut animi exolutiones, et partium extremarum frigus, quæ sapiunt naturam malignam, ut docet *Galenus* 4 lib. *aphor.* 48; inferit etiam anxietates. pulsus parvos et frequentes, quæ indicant malignam naturam, ut supra dicebam ex *Galeno* 6 lib. de loc. affect. 4. Et cum omnes morbi pestilentes et maligni, sint ejusdem naturæ et magnitudinis, non omnes habent eadem et æqualia symptomata, sed varia et diversa, ut docuit *Aetius* *tebrab.* 2, serm. 1, cap. 94, et *Paulus* (*Ægineta*) lib. 2, de *Arte medendi.* cap 36.

(Cap. IV.)

De signis.

.... Secundum dubium est (an sit angina) quoniam sæpe observavi, hoc morbum laborantes non semper habere febrem; plures enim a principio erant animo exoluti, non febricitantes, sed potius intus et extra frigidi; non sicut in febre lippiria (algida) interius ardebant, algentibus externis...., quod non fit ex eo quod non sit causa febricitandi, sed ob extinctionem caloris naturalis, factam a causæ facientis morbum malignitatem.... Sic in morbo suffocatorio non est *pulsus* magnus.... Tamen in morbo suffocatorio mollities pulsus non reperitur ut in morbis pituitosis, sed potius repræsentat duritiem et tensionem, quoniam causa est solida, impacta et tendens. Unde per initia hujus morbi apparent pulsus mediocres, tensi, celeres et inæquales.... Circa *urinas*, solum habeo quod dicam, modo apparere naturales, modo secus, sed potius tenues, et decolores. Quod indicat non tam mutari ex vi morbi quam vi alterius venarum affectus complicati.... Tandem audivi alios medicos dicentes hoc morbo laborantes, modo capi *phrenitide*, modo *lethargo*, quod non nego posse contingere, eosque vidisse credo. Ego tamen, qui diligenter, observavi, quæ hunc morbum comitantur symptomata nunquam vidi phreneticos, aut lethargicos similes laborantes

ad magis, aliquos vidi in somnum delatione sive delirio, quæ non possunt constituere lethargum, cum hic habeat pro signo pathognomonico, non solum delirium sed perpetuum delirium

Circa *signa propria*, quæ in hoc morbo conspiciuntur, non semper eodem modo apparent; nam ore aperto et depressa lingua, modo conspiciebam apicem omnino album, exeuntem ab imo gulæ, et impedientem deglutionem, modo *quandam crustam veluti membranam*, cingentem *fauces, guttur*, et *gulam*, non perfecte albam, sed declinantem ad lividitatem; quæ diversitas nascitur ex causæ diversitate: et simul cum hoc apparebat lingua alba a radice ejus usque ad medietatem, aut fere totam; per quod signum simul cum difficultate deglutiendi, et grassante tali epidemia, potest cognosci morbus hic incipiens, antea quam appareat frustrum illud album. Albedo enim linguæ indicat esse in parte subjecta, et inferiori, crustam albam, quæ jamjam per œsophagum, aut guttur, se manifestat; nam licet possit reperiri lingua alba in febre alia acuta, et sic non sit proprium, et pathognomicum hujus morbi! tamen sensata simul difficultate deglutiendi, et grassante tali epidemia, sit certum morbum esse suffocantem. Auges certitudinem, si in collo et *retro aures declivius, tumores conspicias*: nam tales tumores in omnibus reperiuntur, et magis in illis, quorum crusta ad lividum declinat, et est velut membrana; hic enim tumores simul cum aliis signis, syndromen constituunt signorum morbi suffocantis, nondum apparente crusta; aut si jam appereat, si tamen puer renitens oris apertioni; in grandioribus enim crusta jam manifesta, ore aperto, et depressa lingua, evidenter cognoscitur. Hæc infra magis patefient.

HERRERA

Causæ occultæ (astronomicæ), quæ in hoc affectu reperiri possunt, et ei accommodari.

Aliæ causæ præter jam assignatas merita enumerari possunt illæ, quæ occultæ et absconditæ, etsine manifestis causis solent inveniri, quarum primum locum obtinere videtur ea, quam Hippocr: Variis in locis divinum aliquod in morbis existens appellat, quasi velit dicere, aliquos esse morbos ita confusæ et obscuræ conquisitionis, ut solis influxibus cœlestibus tribui possint. Et si alicui ægritudine vere hoc potest adaptari, huic crudeli affectui potius quam aliis convenire videtur. Quemadmodum etiam effectibus *magnæ conjunctionis* præteritæ Anno millesimo sexcentesimo tertio, die vigesimosexto Septembris cujus infausti effectus per spatium triginta annorum ante et post, aut plus, *astronomici* aucthores omnes perdurare affirmant.

Quia effectus cujuscunque maxime conjunctionis duorum superiorum Planetarum (annis 794 diebus 331 recurrentis) per nebulam quasi quandam adumbratæ significatæ temporis successu per medias conjunctiones (anni 1603 diebus 265 cursum explentes), in lucem magis proferantur; per minores vero (annis 19. diebus 318) metam perficientes ipsi manifestius exhibeantur; ac tandem per luminarium eclipses, et annorum revolutiones, prædeterminentur, et invalescant; hinc fit, ut conjunctio minor Saturni et Jovis anno 1583 in *signo Piscium* anginosos et lethales carbunculos portenderit: Saturnus etenim materiam præbens et in signo Piscium collum; Jupiter vero formam et in eodem signo caput et cor, collateralia reliqua infestantia astra efficientem causam objiciunt ex quibus omnibus fuit iste teterrimis morbus productus, et quæ infestanda determinavit; cujus primarius et atrox effectus pullulavit anno 1587, 1588 et 1589. His namque annis ter fuit orbata lumine Luna, in signo Piscium, quia conjunctionis prædictæ ejusdem,

et quia tale prædominans in urbe *Hispalensi*, quam ideo et convicina loca crudeliter invasit; in Hispania namque minabatur universalior significatio magnæ conjunctionis superiorum antecedentis, propter gradus ultimos *Scorpionis*, jamjam Sagittarii signum emergens, cui tota subijcitur hæc nostra regio. Effectus etiam iste lethalis se extendit ad alios annos acrius pungens anno 1590 et 1591 propter alios tres eclipses in signo Cancræ, signi prædicti trigoni ejusdem; crevit quoque, et crudelius invaluit anno 1598, propter solis defectum in eodem conjunctionis signo, et anno 1600, propter alium, in signo Cancræ ejusdem triplicitatis. Anno denique 1604, propter maximam superiorem planetarum conjunctionem circa præcedentis anni 1603 finem, (in quo. ut dixi, accidit illa maxima conjunctio, de cujus effectu in præsentī agimus) in signo Sagittarii visam, totam Hispaniæ regionem irruit, insævit præsertim in pueros, et in juvenes cruentus iste influxus propter Mercurii his prædominantis comitatum, causam (ut diximus de prima conjunctione) præparantis cum reliquis efficiens. His vero temporibus, quotiescumque alterum luminarium deliquium patiatur, in signo Sagittarii, vel ipsius trigoni propter maximam conjunctionem proximius antecedentem in eo repertam, eo atrocius urget, et infestabit pestilens prædictus suffocativus effectus, cujus causa jam transiit in signum igneum, quo robustiores estu malignitate et dilatatione vires accipiat. Et utinam saxit Deus, ut ejus conquinamentum non diu, ut minatur, perduret sed manu sua potentissima extinguat. Et fortassis annis elapsis per tot curriculo temporum aliqui epidemiei morbi pestilentes et mortiferi, non solum in homines, verum etiam in *bruta* et omnia genera, et species, tam *boum, equorum, arietum, caprarum*, aut aliorum quadrupedum et ferarum, sed in *gallinas*, et alias *volatiles aves, pisces* maris et fluminum, in *arbores* etiam, et plantas insævierunt, cum aliqui astrorum influxus damnum hoc intulerint, finitque fuerunt, sine eo quod eorum noticia ad nos pervenerit, cum nullus de eis scripserit, propter pigritiam forte, aut temporis, sapientiumve scriptorum defectum, quod non secus accidit, cum aliqui Doctores de hoc crudeli et carnifice morbo egerint; et præsens opusculum indies de hoc affectu ad plura tractanda fortassis alios invitabit, quod præcipue in

animo habui. Et ut illi influxus aut epidemiæ pertransierunt, Deo volente, hic etiam præteribit, vimque et malitiam amittet.

(*Cap. III, p. 12.*)

An hic suffocans morbus reputari possit inter eos, quorum dæmones sunt immissores.

Illud nobis ad hujus operis occasum (ne quid intactum remaneat) monendum est, quod a *Martino del Rio* (3, *disquisitionum magicarum* part. 1, quæst. 5, sect. 5,) luculentius tractatur, quam ut hic longiorem disputationem quærat. Esse morbos et ulcera nonnulla, quorum immissores sint dæmones juxta cum modum a peritissimo *Francisco Vallesio* (de *sacra philosophia* capite 2) accurate descriptum, atque in hoc numero forsitan esse morbum hunc, velut alii, qui per dæmones mortalibus inferuntur. Sane *Codronchus*, *Cæsalpinus*, *Fernelius*, ipse *Vallessius* et alii optimi medici (lib. 2 *disquisitionum magicarum*) relati a Martino del Rio in hanc nostram suspicionem sunt proclives; cui magno faciunt antiquitatis et autoritatis fundamenta *Tertullianus* in *apolog.* D. *Hieronym.* in-4. *Matth.* D. *Chrysostomus* *homil.* 54, in cap. 17, *Matth.* et D. Th. 1 part. quæst. 115, art. 5. Nec mirum cuiquam videatur, si tempore nostro quo grassatur iniquitas, morbus etiam novus iste grassetur dæmonum præstigiis, cum Jobum innocentissimum virum Deo permittente diabolus percusserit ulcere pessimo. Quam facilem inficiet vitales spiritus malefico morbo imbuens ad gutturis suffocationem, quod cum facit, ægre hominum ingenia efficacia remedia possunt, vel solent adhibere; quo enim causa abstrusior, hoc quoque ad læthum est acrior et efficacior; consuevitque omne anteire medela.

Hoc autem nostrum decretum maxime rationi consonum est: cum enim dæmonis natura sit sublimior substantia mediis causis naturalis potestatem habet morbos vehementes in nostris corporibus causare, transcendendo naturæ ordinem; quicumque enim ex maleficio morbo aliquo detinentur, ea extrinsecus a dæmone subministrari possunt. Cum autem dæmo intromissus fuerit, spiritus aliquis, vel humor hunc ac illuc motus potest omnem morbum causare, adhuc suffocantem pestilentem. 9. Nec

mirum est, primum medicinæ parentem hujusmodi prætermis-
sisse morbos, siquidem ratione naturali a medico, et eorum
dignitio et curatio prætermittitur, quoniam artis limites exce-
dunt, quanquam hæc pars, qua id quod divinum in morbis est,
inquiri, magnam gloriam medico præstare potest. Omne ergo
genus morbi ex maleficiis inferre posse jam probavi. Quomodo
vero dignoscantur et separentur a cæteris, in quibusdam diffi-
cile est invenire; nam præter ejus particulæ affectum functiones
offendentem, nihil aliud ostenditur. Et quemadmodum morbus
epilepticus aliquando a dæmone causatur, mota ab ipso aura ad
caput, si in cor et pulmonem excitat, difficilem respirationem,
palpitationem et syncopem, ad ventriculum, vomitum cum sin-
gultu, et morbum suffocantem causari aliquando ab humore cor-
rosivo a dæmone moto in fauces, non dubito. Difficultas autem
cognitionis hujusmodi causa provenit; nam præter ægritudinem
quæ suas causas naturales habere videtur, plerumque nihil
ostenditur quæ supra naturam sunt, et sic signa a juvantibus
et nocentibus desumuntur, etsi rem cum maleficis habuerit;
quamdiu enim maleficium persistit, affectio non cedit remediis
naturalibus secundum rationem factis.

Similia multa hujus materiæ et circa totum hoc opus, multo-
rumque aucthorum varias opiniones, si liceret, possem adducere
sed ut quidam juriconsultus non contemnendus affirmat, meliore
est una bona consideratio quam multæ allegationes confusæ;
ornatus tamen causa, et ut nil, quod ad hujus affectus splendi-
dam et completam tractationem spectet intactu relinquatur, et
omnem, ut dicitur, lapidem non moveam, in hoc opusculo de hoc
mentionem feci.

(*Cap. VI, p. 13.*)

De signis pathognomicis supervenientibus, aut mox apparentibus affectus hujus.

Cum signa sint ea, quibus præterita cognoscimus, præsentia
inspicimus, et futura prædicimus, et tantæ sint in Apollinea
facultate dignitatis, operæ pretium duxi, breviter et succincte
præcipua hujus affectus signa describere, quibus facilius dis-
gnosci queat.

Et imprimis, cum pars affecta sit guttur fauces, gula, aut
œsophagus, aspera arteria et partes eis propinque, necessario

respiratio et deglutitio læduntur cum sensu ulceroso et febre; nam hæc signa comitantur hunc affectum a principio ad finem morbi, augentur et minuuntur, quando morbus hic crescit, stat, aut declinat. Nam hæc est signorum propriorum, quæ pathonomica, sive demonstrativa nuncupantur, conditio. Cum ergo morbus hic nomen suffocantis (Garrotillo Hispanæ) præsentibus his signis mereatur, absentibus vero illis hoc appellatione non insigniatur; certum est hæc esse signa propria, cætera que sequuntur, supervenientia sunt, et quæ morem morbi, sive malignam pestilentemque naturam ostendunt. Et cum magna sit inflammatio a materia venneata causata, *febris accidentalis* (quæ si apparatus morbosum inveniatur, solet complicari cum humoralis putrida, aut in eam converti, aut febris punctulari cum aliquibus accidentibus *phreniticis*, aut *lethargicis*, aliisque commiseri) hunc affectum comitatur; et sic quamvis aliquando animo exsoluto a principio, et non febricitantes videantur, interius tamen calorem magnum patiuntur; febris namque caloris-nativi extincti percipi quandoque vix potest a causa faciente morbum provenire, quæ cum magna sit, et aliquando cum interna inflammatione, calorem intra evocat, et sic solent extrema frigescere, ut in febre lipiria accidere solet, calore intra febrili recondito absumente spiritus vitales, orbatique partibus extremis influenti calore summa frigiditate algent, animoque linquntur fere syncope correpti.

Et ita hoc morbo affecti cum *pulsu* parvo, inæquali, crebro, celeri, et nonnunquam raro, communicato cordi veneno inte-reunt. Quapropter melius est evidenter febricitare, quam sine calore tepescere, febre perseverante, præsentis ad huc crusta, et respirationis difficultate. Unde etiam colligo, morbum hunc malignum esse, cum malignus morbus sit, dicente Galen. I. por-retic. Qui cum periculum vitæ minetur, spem tamen salutis non adimit. At in hoc morbo perspicuum est, et præter id ejus malignitas cognoscitur, quia accidentia quæ superveniunt, scilicet inquietudo et anxietas, febris magnitudini, e ulceris faucium, e difficultati respirationis non respondent; nam ulcera parva visui ostenduntur, difficultas deglutiendi, aut respirandi ab ægris non multum sentitur, et febris remissa, et cum hoc anxietas magna, maleque ferre morbum, alimenta renuere,

urina colore, et substantia fere similis naturali absque sedimento quod pejus est, pestilentemque naturam sapit ; quæ conditio pestilens plures de medio tollere nata est; estque superior ad malignum morbum nam qui pestilens est malignus necessario existit; non vero malignus pestilens esse debet. De his signis 3 de præsagio, cap. 3 et 4, late meminit Galen. quæ in illa magna pestilentia visa sunt.

(*Cap. IV.*)

MERCADO

De faucium et gutturis anginosis et lethalibus ulceribus.

Inter affectiones gravissimas (quas solum curare hac in parte institui) qui in decursu mearum ætatum, sese mihi obtulerunt, una fuit (forsan cunctis gravior) quæ his temporibus novissime visa est per plures provincias et civitates grassata, non plurimum neque frequenter antea visa, aut saltem non satis huc usque animadversa (in antiquitate ab Hipp. Gal. et Celso non prætermis-
sa) sita quidem in anginosis, et lethalibus faucium et gutturis tumoribus carbunculosis et ulcerosis. Quam quidem, ob certum et breve admodum periculum, vulgus medicorum Hispano sermone Garrotillo nuncupant, diversa quidem quam plurimum periculo, brevitate et complicatione putredinosi et ustivi atque ulcerosi tumoris a communi angina; licet loco et symptomate suffocationes summo opere conveniant. Cujus primo historiam gravissimis periculis et difficultatibus plenam recensebo, secundo hujus mali naturam, causas et signa, et ultimo curationem, tam in pueris, quibus frequentius accidit, quam in adultioribus.

Ad curandum filium suum primogenitum me vocavit nobilissimus vir Rodericus Xuarez a Toletis : cui, cum biennis esset, cæpit catharrhosa defluxio eo impetu et celeritate ac malitia succrescere, ut pene primo die suffocationem minaretur. Erat quidem puerulus sanguineus cum abundantia adusti succi, quia pustulis maculis frequenter in facie insignitus erat. Qui etiam ineunte hyeme cæpit febricitari cum acri fluxione ad nares, præcedente capitis gravitate, ita ut vix posset oculos elevare. Eadem die difficulter deglutire lac, ac respirare cæpit, nec probe vocem emittere poterat, ita ut coegerit medicos fauces et guttur inspicere. Quæ partes rubore saturato apparuerunt insignitæ, nec defecit glandulosus tumor in parte gutturis. Dextra et externa quæ digitis leviter adhuc compressa, maximum in puero commovebat ploratum : ita ut conjicerem, magno simul

affici dolore. Statim ante quartum diem fœtor incredibilis, et aperto ore apparuerunt pustulæ varii coloris, maxime ad nigrum vergentes mucoribus fœtidis circumdatæ cum putrilagine et mollitie earum partium.

Viso quidem præsentē ac sævissimo affectu, primo diligenter inter nos investigavimus mali hujus essentiam et naturam. atque differentiam a sibi similibus; item quas sortiebatur causas, quæ ipsum eam malignitate et periculo insigniverint, tandem quibus signis nosse a principio liceret, et ultimo qua diligentia, præceptis et præsiidiis ipsum curare potuissemus. Verum licet in omnibus aliis consultationibus, diversa ordine rem explicuerim, in hac vero prius in communi (tanquam in affectu qui secum novitatem adducit non parvam) rem aperiā, naturam, causas et signa investigabo, ac postea qualiter cum hoc puero et patre ejus, qui consimili affectu fuit sævissime affectus, actum sit, et ejus curatione instituerimus consulentes; nam uterque affectus gravissimus fuit, ut mille considerationibus opus fuerit, ad ejus legalem et ad æquatam curationem.

Ut constet differentia inter reliquas gutturis et faucium inflammationes, et earum partium ulcēra, et inter hunc affectum, quem vulgus Garratillo appellat, statuendum est, ejus essentiam non consistere in sola illarum partium inflammatione, ut de angina fertur; neque stat in sola exulceratione ac soluta unitate, ut in morbo Gallico affectis non raro conspiciamus: quibus partes affectæ in gutture, et faucibus profunde exulcerantur. Nihilominus tamen, neque difficulter respirant, aut difficulter alimenta deglutunt. Neque adhuc in his simul junctis et complicatis, solum sita existit, sed etiam secum habet adjunctum humoris ad partem fluentis id vitium, ea conditione malefica affectum, quod ut contagiosis pestis more, in citissimam mortem pueros et adultos deducat. Quippe tota hujus molis natura et essentia in complicatione horum omnium sita existit, nam aliquando ab inflammatione incipiens, ocyssime exulceratur; nonnunquam ulcere ex corrosivo humore facto, in tumorem mox commigrat. In qua rescindendum est, neque inflammationem esse vulgaris naturæ, uti in quavis anginæ specie experimur, quæ ut plurimum in suppurationem terminatur, si prius resolvi non possit. Sed etiam tertium quid habet adjunctum, nimirum humorem ibidem

contentum ejus, esseferitaris et malignæ conditionis, quod ocysime in putrilaginosum, corrosivum ac perniciosum ulcus commigret, et partem protinus usque ad ossa perdat, more carbonum pestilentium. Item ulcus si ibidem accidat, non est ut Gallica ulcera; est alia quæ vulgariter conspiciuntur, licet a defluxionibus mordacibus fiant, sed insuper quid inflammatorium illis accedit, ita ut ulcerata pars etiam in tumorem attollatur, non quidem quod abcessus vere fiat, sed quod humor ille perniciosus in poris partium, gutturis et faucium immersus, eas in tumorem elevat, et figuram vitiat : et præter id, carnem pejus foeda corruptione et ustione perdit, et prorsus ad putrilaginem contagiosam deducit. Ex quibus prodit quam citissima suffocatio, etiam affectus non sit in musculis internis, ut in gravissima angina, quia habet adjunctam solutam unitatem, quo minus moveri possit ad ejus attractionem, et emissionem, ac simul foedissimam putredinem, qua tota partis substantia depopulata visitur quam brevissimo tempore, præter febris malignissimæ accessum, quæ mortem accelerare per se nata existit. Quibus diligenter consideratis, facile erit, morbi naturam nosse, et a similibus distinguere, et accidentium, quæ sævissima sunt, causas et mortis celeritatem prænosse. Neque opus est in hac parte quærere, an Hipp. vel Gal. aut aliquis alius ex veteribus hujus meminerit morbi, nam satis est veluti delineasse ejus naturam ut Hipp. 4. acut. tex. 30 et libr. de fluxibus et de locis in homine. Sed Aretæus specialius lib. 1, cap. 9, hæc refert verba. « Ulcera in tonsillis fiunt aliqua, mitia, familiaria, non lædentia; alia aliena. pestifera necantia, pestifera lata cava pingua, quodam concreto albo humore, aut nigro sordentia » et paulo inferius inquit « crusta vero circumveniunt rubor excellens, et inflammatio, et venarum dolor, quemadmodum in carbunculo, in collo etiam plegmone, erumpit, et si in pectus per arteriam id malum invadat, eo die strangulat » Quibus profecto verbis fere integram naturam hujus sævissimi affectus depinxisse visus est. Et addit « Dolor acer et calidus, qualis in carbunculo, spiritus vitiatos exhalantes, maxime putredinis odorem, eumque vehemente in pectus spirando adducuntur; immundi adeo fiunt, ut neque suum ipsorum odorem ferre queant, pallida his, seu livida facies, febris acuta, sitis ut igne accensi videantur ». Ejusdem,

sententiæ fuit Aetius tetrabibl. 2, sect. 4, cap. 46 de crustis et pestilentibus tonsillarum ulceribus, sic scribens « crustosa, et pestilentium tonsillarum ulcera, ut plurimum, nullo præcedente tonsillarum ulcere, ut plurimum nullo præcedente tonsillarum fluxu, incipiunt; aliquando enim a consuetis fieri inflammationibus maxime efferatis proficiscuntur. Fiunt autem frequentissime pueris, atque etiam ætate jam perfectis, maxime iis qui vitiosis humoribus abundant, præsertim in pestilentibus constitutionibus. » Et postea subdit « sunt autem partim alba, maculis similia partim cinereo colore, aut similia crustis, quæ ferro inuruntur; accidit autem ægris siccitas in deglutiendo, et suffocatio, etc. » Ex quibus constat hunc morbum anginosam esse affectionem. Cæterum multis modis diversam a vera et exquisita angina (in duobus morbis est suffocatio) quia hæc non raro carbunculosa existit et ulcerosa. Dissidet etiam ab omni fere alia ulcerum sorte, ob impensam malignitatem sibi adjunctam et habet quoque malignissimam febrem, præterquam quod hic perniciosus affectus omnia simul vitia habet adjuncta, et contagiosus est.

Causas hujus perniciosissimi morbi, qui studuerit ad unguem comprehendere, sciat id esse perdifficile; cum certum earum esse quam plurimas, quarum naturam, modum, conditionem, et originem non possumus capere. Quis enim pulcherrimi et formosi pueri, vel hominis aut fœminæ hujus aut illius ætatis, cum sani videantur, conjicere poterit, latere, et absconditos esse adeo perniciosos succos, quod subito, aut quam brevissimo tempore, ubicunque ferint, exulcerent, corrumpant, putrefaciant, et usque ad gangrænam deducant partem. Nec minus mirandum erit levissimum faucium tumorem magnam moliri putrilaginem, et invincibilem corruptionem; cum longe majora ulcera, et turgentes, elevati, et magni tumores id non ita facile patiantur; quinimo brevissimo tempore et levissimis atque communissimis præsiidiis ad sanitatem perducantur. At in hoc pernicioso affectu, nec maxima prosunt, et si majora adhibeas, non raro malum adeo exacerbatur, quod citissima morte laborans, quivis is est, præveniatur. Quo profecto censeo humores, qui sive a capite distillant, sive a toto in fauces, aut in caput eant, et postea ad fauces dilabantur, adeo esse invincibilis

naturæ et perniciosæ conditionis, quod ratione indomitæ essentiae natura partis nullam coctionem nullamque gratiam illis præstare possit: et cum non superentur, ocysissime partem devincant, superent et prorsus perdant, ac ceterrime insuperabilem et contagiosam corruptionem degenerent. Mihi tamen dubium non est, hos posse esse biliosos, pituitosos, melancholicos, aut sanguinosos nimis ustos; cæterum existimo adeo sortiri contrariam toto genere conditionem et nostræ naturæ adversam, quod dum in quovis loco recipiantur, quam facillime pars illa cedat, et ab eis superetur atque corrumpatur, more pestilentis conditionis. Quippe certissimum est, hujus modi depravatam naturam non consistere in qualitatibus primis aut secundis solum, sed adhuc cum eis adesse eam formam, quæ nulla naturæ actione nata sit, in partis quæ tales humores recipit, contagem et similitudinem mutare: quinimo ipsa pars protinus ab ipsis patitur tali passionis sorte, qualis fuerit humoris conditio, adusta, acris, mordax, et corrosiva: eo quidem magis, quo vel humores fuerint penetrantes, ac sese facilius inserverint in intima partis, aut glutinosa, et contagiosa, quod fixius adhæreat; medium quidem ad validam actionem summopere necessarium. Quibus omnibus carniū gutturis et faucium mollities efficitur, tenuitas et facilitas ad recipiendum et patiendum prædicta mala, non solum ex validissimis agentibus, verum a minoribus.

Sic profecto in natura causarum primo investigabis sortem humoris, in quo subjicitur hæc deleteria et maligna conditio. Secundo, qualem habet lædendi potestatem. Primum venaberis ex his quæ humorem peccantem monstrant: nam bilem ex colore, ex amarore et siti, ac celeritate motus morbi; sanguinem ex rubore, tensione tumoris, et ex aliis quæ ipsum attestantur; adustum sanguinem, bilem aut melancholiam, ex pustularum quæ superveniunt colore, aut ex modo putredinis ipsius ulceris. Dimitto hac in parte, urinarum, pulsus, alimenti et vitæ anteactæ signa, quibus causa abundans monstratur; nam sæpe depravata adeo humoris conditio naturam ipsius mutat, ut alterius sortis videatur, præter quam quod ad veram hujus mali providentiam, non tam non ducit humoris natura propria, quam deleteria conditio acquisita; si quidem citius

compescitur alexipharmacis, quam aliis, quæ qualitatibus contrariis iis quæ propriæ sunt cujusque humoris polleant. Et ob id consuluimus considerare secundo in his causis lædendi modum; nam ex humoribus, quidam serpendo lædunt, quidam abradendo, sicut et alii exulcerando, et plerique pustulas elevando et tumescendo carnem ipsam, alii quidem putrescendo mucidam et putrilaginosam reddendo. Quæ omnia diligenter ediscere teneris, ut possis juste et legaliter præsidia cuique juxta innatum lædendi modum præstare.

Signis etiam in hoc malo mille rationibus opus habemus; nam licet pleraque sint cunctis anginæ sortibus communia; tamen in hoc malo unicuique eorum adjungitur quid novum, malignius et periculosius; quod facile cui mediocriter erudito apparet, hanc strangulationis sortem a communi angina differre. Quippe vehementissima suffocatio, tumore et ulcere conspicuis aperto ore, diversa est ab anginæ conditione apparente tumore. Item nihil conspicuum videre, et foedissimum spirare, longe diversum est a vehemente angina, cum tumor non apparet. Præterea difficultas respirandi, et non raro deglutiendi, cum pectoris et dorsi dolore a velutis compressione suffocante, simul cum pestilenti odore, et vehementi harum omnium partium ardore, et rubore totius oris et colli, cum vocis et loquelæ vitio ac linguæ extractione, et siti incompressibili, perniciosissimæ et pestilentis conditionis supra anginam evidentissima existunt signa, addita quidem supra anginæ conditionem, et similia his, quæ in gravissima angina depinxerat Hipp. 4 acut. 33. et Gal. 4 de loc. cap. 3. Quibus etiam accedit sublimis respiratio et alta, ac spirituum revulsio, cum maxima pinarum nasi distensione, ut etiam retulerat. Hipp. 4 acut 34. Quibus etiam accedit saniei per os et nares excretio, variis ulcerum coloribus, et intensissimo fœtore nauseam plerumque movente cum sordida excretionem. In aliquibus vero extra, prope cervicem, et infra mentum glandulæ apparent, pestiferi morbi naturam redolentes, et universum cervix, et collum intumescunt et fauces cum rubore saturato, instar laqueo suffocatorum. Præterea id malum perniciosæ esse conditionis, cognosces, quia nullis præsidiis ex iis quæ anginosi prodesse solent, cedere visum est; sed indies magis ac magis hæc accidentia crescunt, donec brevissimo tempore labo-

rantium majorem partem perimat, idque non raro intra quartum diem. Quippe sevimissima affectio minatur longemajus et celerius periculum, quam id sit, quod de communi angina prædixerat Hipp. 3 prorr. 68 et 4 acut. text. 30 cum certum sit, illa omnia mala huic succrescere, addita pestilenti et sordida putrefactione ac invincibili malitia, quæ reddunt affectum fere desperatum. Maxime si accedent ulceris conditiones, quas depinxerat. Hipp. 1. prorr. 18 quibus tu ipse addere poteris eamdem pestiferam malignitatem; nam illa signa fere omnia ostendunt jacturam caloris et virtutis, hæc autem diram mali conditionem, vehementiam ac potestatem, et victoriam morbigicæ causæ; ita ut non raro succrescant colliquativi fluxus per nares, aut per os quam foedissimi, signum profecto instantis mortis. Quibus omnibus addes febrem vel ardentissimam vel malignam, licet non semper talis incipiat: siquidem possibile est, a febre mite, aut benigna morbum jucipere, postea vero, vel in malignam, feritate putredinis mutari, vel in ardentissimam, si cordi accessit causa, vel causæ vapor aliquis ex æstuans. Nec multum fidere oportet si febris mox non appareat, aut succrescat, nam sæpe citius suffocat affectio, quam causa succendatur; ac non malignitas humoris corrumpit spiritus, et mortem accelerat, sine eo quod febris succendatur. Quapropter varietatem hanc diligenter considerare oportet, et alia quæ in ægris singulariter conspiciamus, veluti fuit sputum pueri cujusdam, qui *papillam nutricis sugendo* ore mucore venefico pleno, *inflammationem accersivit*, et mortificationem partis uberis cum papilla; cui consimile malum succrevit patri hujus pueri, cujus historiam hac in parte narramus. Quapropter cavendum est diligenter, ne sic affecti deglutiant propriam salivam, quinimo ora puerorum diligentissime sunt abluenda penicillis et linteolis aliquo detergente madidis.

Curandi rationem qui exquisite ediscere voluerit, expendat, nullum haberi certum ac determinatum perceptum in hoc sævissimo malo, ex his quæ tumoribus, fluxionibus aut ulceribus debentur. Nam hæc est lex et conditio perniciosorum et malignorum morborum quod omnia prærequisita morbo cui adjungitur, mutet, evertat, et non raro eis et sibi contrario expostulet. Hoc tamen unum habent perpetuum, quod semper

alexipharmaca expostulent, cunctis aliis præsidiiis et alimentis admista. Quia cum potissima ratio brevissimæ mortis (præter loci affecti præstantiam) sita sit in malefica conditione et invincibili natura, ob id qualitatem, quæ operetur tota substantia, potissimum expotulat. Quo supposito statuendum est in hoc gravissimo affectu, quæ prorsus et vicissim ad se convertunt, omne curantis consilium (ne quis existimet, uno eodemque gradu semper incedendum esse in hac curatione) nam puerorum conditio et facilitas in patiendo majorem requirit diligentiam, et diversam medicamentorum efficaciam, licet ejusdem sint officii; adulatorum vero validiora expostulant. Item ulcera hæc, quæ celerrimam corruptionem minantur, protinus illis subveniendum esse indicant; licet ut ulcus est, aliter sit agendum. Nonnunquam suffocationis periculum trahit ad se omne præsidium, ita ut ante corruptionem, vel suppurationem, liceat tumorem aperire. Insuper magnitudine tumoris, qui ad extima sese extendit, auxilia extra et intra apponi jubet. Præterea venosa et deleteria conditio, alexipharmaca requirit, quæ si non prosint, ad caustica et usque ad ignem fore deveniendum indicat. Quapropter, ut his omnibus provideamus, exemplo pueri propositi in genere, et juxta naturam et modum affectus ipsius, generalia et illi debita peculiariter auxilia referam; et mox ad partis eodem malo affectæ per contagium a puero susceptum, curationem deveniemus. Ubi omnia quæ in hoc malo in adultis et pueris necessaria existunt, reperiat diligens lector.

Visa igitur sævitia mali hujus pueri, cœperunt Medici diligenter omnia necessaria præparare, initio sumpto a victus institutione. Circa quam conventum fuit inter nos, sufficere lactentibus lac, et his qui jam gustaverint solidiorem victum, farre condito jure aliquo, aut solum concedere jus pulli aut pullæ, admixtis alexipharmacis, quæ perniciosam conditionem retundant, ac frænent, et simul alimentum præstent. Hujus naturæ est stillitica aqua ex pullis saginatis confectione Alchermes, electuario de hyacinto, radice scorcioneræ, et foliorum plantaginis, scordii, si hac lege extraxeris. Excipe pullorum num. 2. munda ab omni recremento; et eorum ventres reple foliorum plantaginis, scordii ana pj. radicum scorcioneræ unciam j. et s. confectionis alchermes et electuarii de hyacinto diluti in unciis

iiij. aquæ rosarum et scorcioneræ, 3 ij imbibentur omnia vino albo, et coquantur in lib iiij. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, et omnia simul instillentur duplici vase cum jure prædicto. Cujus instillationis admiscebis aliquid potui, et præstabis bis, terve in die, et hac lege infantem alere curabis. In quo opere etiam considerare oportet, neque exquisito victus modo utendum esse, ne vires amplius labantur, neque ad crassitiem plurimum inclinare, ne mali causam ad augeas, sed medio modo tegeres ; quia corruptio pestilens non solum exposit victum, ut alimentum, ad virium custodiam, sed ut medicamentum, ad virium humorum compescendum, ut Gal. consuluit, ubi humorum est corruptio vel defectus.

Victus hac lege instituto, disputare cœpimus de sanguine extrahendo ; si quidem non defuerunt Medici, qui id renuerent cæterum unanimi consulentium consensu, primo die sanguinem misimus, cruribus scarificatis, et mox octava noctis hora brachiis, aut si ultra duos annos fuerit natus, ex vena brachii ; quas non temere scindes, quia longe magis imbecillantur pueri, quam cute scarificata ; nam in hoc malo plurimum vereri oportet, vires plurimum dejicere, tanquam in pestiferis affectionibus et in his, in quibus ad validam respirationem eis opus habemus. In quo opere statuendum est, si plurimum ad affectam partem fluxit, protinus ad brachia et cephalicas venas pervenire, quia urget magis quod in parte continetur, quam in quo fluxum est ; sin aliter, in pueris qui sanguine, abundant ex cruribus, et mox eadem die (ut dictum est) ex brachiis. Circa quod præsidium in pueris exequendum, consulo, ne differatur quia ejus occasio solum est, antequam fluxio in partibus contenta, ad putredinem commigret. Nam tunc temporis si sanguinem fuderis, summopere lædes (quæ causa fuit, quod multi medicorum, viso hoc damno, renuerint sanguinem mittere) quia vires maxime dissipantur, et nihil ejus succi qui computruit, extrahes, neque revulsiones, neque derivatione, neque vacuatione ; quia putridum et in parte impactum, solis topicis aufertur. Cum hoc tamen utilissimum præsidium fuit, viribus non renuentibus, partem proximius evacuare, et sub mento sanguifugas affigere, scalpello factes duabus scarificationibus, aut juxta cervicem cucurbitas scarificare, quando in pueris venas sub lingua scin-

dere non datur, ob ineptitudinem ætatis. Evidentissimum quidem est, hoc præsidium sanguinis solum dum confluit prodesse revulsionis gratia, aut totius corporis evacuatione, namque ubi semel summum illud vitium contraxerit humor, velut topicum præsidium, ex usu esse potest, ut mox dicemus.

FRANC. PEREZ CASCALES**De natura morbi hispanice garrotillo.**

Sunt (ut dixi) qui existiment, et serena fronte defendant, hujus morbi essentiam in oris vel faucium ulceribus contituendam fore. Alii autem optimis rationibus fortes, et gravissimorum doctorum locis muniti, affirmant, non in ulceribus faucium, sed in tumore et inflammatione musculorum faucium aut gutturis, quam Hipp. Galenus, Celsus, et omnes alii medici, tam Græci, quam Latini, anginam appellare consueverunt, consistere fidentur, ut longius sum probaturus.

Utraque tamen opinio multis probatur et corroboratur gravissimorum doctorum autoritatibus et rationibus, prout hanc aut illam suam unusquisque tuetur sententiam.

Pro existimantibus autem morbi hujus essentiam in faucium aut oris ulceribus sitam esse atque contentam, nonnulla prius scitu digna et quæ illorum Doctorum mentem et opinionem clariorem sunt redditura, explicare non gravabor. Hoc unum primum erit ulcerum cognitio, in quibus illi morbi essentiam constituunt... (cap. III).

Sed jam rationibus enixi hujus opinionis sectatores, sic suam probare intendunt positionem. Est prima ratio.

Diversa doctores loquuntur de angina et de oris exulceratione, et in diversis et variis locis varia pertractant; ergo non sunt unus et idem morbus angina, et aphta, sive oris exulceratio. Patet ex his locis, in quibus Hipp., Galenus, Paulus et Cornelius loquebantur de ulceribus, nihil de angina pertractantes: ergo uti diversi sunt morbi, in diversis locis de illis pertractant.

Secundo arguunt: Ulcus, et inflammatio differunt specie, ergo angina, et ulcus, aut garrotillo morbi sunt diversi. Antecedens probant, quoniam ulcus morbus est in solutione continui constitutus, angina vero est morbus in magnitudine, qui morbi specie differunt; ergo et garrotillo, qui in oris ulceribus consistit, non potest esse anginam.

Si unus et idem morbus sit angina, garrotillo, et exulcera-

tiones oris aut faucium, apparentibus exulcerationibus, debet apparere angina ; at exulcerationes apparent, angina vero non videtur, neque ejus tumor : ergo non sunt unus et idem morbus angina, exulcerationes, et garrotillo. Major hujus discursus vera est, et ab omnibus recepta. Minorem probant ex Hipp. 3, prognost. 16 asserente. Anginæ gravissimæ sunt et celerrimæ interimunt quæcunque, nihil conspicuum faciunt in faucibus, neque in cervice, plurimum vero dolorem inferunt, atque orthopnæam : hæ enim eodem die strangulant, et 2 et 3, et 4. Galenus in comment. hujus loci dicit, illam anginam esse gravissimam, quæcunque nec in cervice, neque in faucibus aliquam dispositionem præter naturam indicet ex colore, calore et mole, etc. Hæc Galenus. Si ergo viceribus apparentibus, et angina non apparente, suffocari videtur homo propter garrotillo ; illa suffocatio ab ulceribus est et non ab angina ; ergo non sunt unus et idem morbus angina et exulcerationes.

HEREDIA

De anginæ malignæ essentia.

Nomine anginæ malignæ non quamcunque speciem illius intelligimus, sedeam solum quæ vulgo Garotillo appellatur, affectio quidem de toto genere exitiosissima, quia et brevissime interficit, et rarissime remediis placatur; trademus vero brevissime, et per modum compendii ad essentiam illius prognostica, et medellam pertinentia, non enim ad unius morbi explicationem integrum librum (ut alii fecere) conficere placuit; et cum inter auctores, qui hactenus naturam hujus morbi exposuerunt tanta discordia, ut neque in essentia, nec in curatione conveniant, nullatenus mentem ipsorum, sed opinandi modos referemus, sed per assertiones, quod nobis in tanto consentaneum rationi videatur, trademus non curantes, qualiter alii opinati, ne dicam obcæcati fuerint tuncque diversa sensere. Verum hoc non mirum, cum perdifficile sit morbi de novo incipientis, aut si non incepti, de novo oblivioni jam traditi primo insultu ad amussim, et exquisite naturam explicare.

Existimo ergo probabilius affectionem hanc strangulantem, a nobis Garrotillo appellatam, sic disiniendam esse; est angina exulcerata maligne. Ita docet Ludovicus Mercado lib. de consultat c. 24 quem sequitur doctissimus Ildephonsus Nuñez a cubilo medicus Regius estque jam communis sententia. Constat ergo esse affectionem compositam ex tumore anginoso et ulcere maligno, idque experimento testatur, quia nec datur, sine ulceribus, nec sine accidentibus ex tumore suffocante enatis; ulcera sensui conspicuo cum sint, nullus hactenus negavit, imo quia magis patentia et claro ob sorditiem et crustas multi putarunt, ad solam ulcerum malignam naturam esse reponendum hunc morbum quos probat doctissimus Nuñez, non quia in ulcerum malignorum morbi naturam reducant, sed quia in solis ulceribus eam constitam, nam suffocatio tam brevis ut in hoc exitioso morbo contingit; ex nullo alio morbo quam ex tumore

anginoso originari potest; ulcera enim non tantum impediunt liberum aëris ingressum per asperam arteriam ad cor : verum si eorum attendamus naturam sub formali ratione ulcerum ampliorem, magisque capacem aëris viam constituunt, quia exulcerando carnem exedunt, ob idque existimo ab aliquibus statui modi hujus naturam in solis ulceribus, quia inflammatio internos gutturis musculos obsidebat. In quo eventu nullum sensibile signum inflammationis se ostendat ut docuit Hippocrates 3 prognost. Ex eo enim quo visus nullum signum inflammationis percipiat, male colligitur sine inflammatione dari, oculis quidem occultatur ex toto inflammatio, quando officit solos internos gutturis musculos, in quo eventu suffocatio brevissima et continua febris cum dolore interno gutturis, et pulsus durities affectum inflammatorium manifeste significant : ad quod accedit, rarissime dari affectionem prædictam quin in colli regione exteriori tumor satis conspicuus appareat. Et confirmatur hoc efficaciter : quia nullus qui interiit per totius gutturis aut faucium affectum sine tumore migravit e vita. Consulto dixi, per solius gutturis, aut faucium affectum, quia sæpe observavimus, malo omnino in gutture et faucibus deficiente ægrotos semisim perire, quia putredo per gulam aut asperam arteriam interius communicata deliquiis, syncope, inappetentia, et alimenti assiduo vomitu cum frigidityte extremorum, miseros ægrotantes necavit paulatim sine febris sæpissime, et si aderat, lenta et remissa percipiebatur; nam malum quod corruptione et partium mortificatione adimit vitam, febrem nullam aut tepidissimam causat in fine, quia sine copia vitalis caloris Febris magna non datur, deficit vero calor vitalis. et partium sphacellismum, et gangrena, nec in hoc modo mortis succi putrescunt copiose, sed cum paulatim serpat putredo per continuam alterationem partibus solidis communicata, non est quod essumet, et cor totum afficiat, sed glutinosa potius putrilagine et minime evaporabile interna afficiuntur. Ii ergo qui sic perierunt inflammatione in ore, et reliquis partibus sedata, licet per anginam malignam contraxerint periculum, non tamen angina perierunt ut constat, quia nullo dolore aut suffocatione præsentem in gutture aut faucibus sed putredine interna gulæ ventriculi aut cordis et asperæ arteriæ. Et quia frequentissime associatur hæc

serpens putredo anginosæ tumoris, communicaturque pluribus partibus medio contagio, quibus non communicatur inflammatio ipsa ; ideo putaverunt multi, sine inflammatio dari hujusmodi morbum, quia interius existens maligna inflammatio neque conspicua visui contagione inficit præter externas, quæ cum mucidæ et putrilaginosæ solum conspicerentur absque inflammatione aliqua, absolute docuerunt in ulceribus solum morbi naturam constituendam esse decepti apparentibus.

Probatur ulterius, quia nullum genus ulcerum, etsi malignum, deglutitionem aut respirationem impedit, viam earum actionum obstruendo ; nullus enim inter signa malignorum ulcerum oris internas partes afficientium deglutitionem aut respirationem impeditam constituit ob viæ defectum : experimur vero in morbo hoc suffocante ita contingere ; potum enim et liquida reddunt per nares et impedita via deglutitionis, suffocantur ; similiter non alio modo quam coarctata aspera arteria ; ergo vere invenitur impedimentum et obstaculum, a hujus modi actione : non ergo posito quovis ulcere pascitur morbus suffocans, nisi inflammatione suffocetur. Quod si diligentius attendamus causas, ob quas difficulter ægroti respiranti Galenus innumeris locis præsertim 4 lib. de loc. affectus, cap. 8. 1. difficult. resp. cap. 3, clare inveniemus repugnare ex ulceris natura causari, nam nec impeditur cavitas, nec dolor in corde contra naturam producitur, nec instrumenta respirandi læduntur modo necessario ad difficulter respirandum : quia evidenter confirmat fere semper apperere ulcera anginosa in loco ad respirationem minime necessario, et ita si impedita respiratio, est, quia ratione tumoris per consensum coarctatur aspera arteria ; idemque argumentum de deglutitione læsa fieri potest.

Similiter ut hoc malum propriam ostendeat naturam, non sufficit esse inflammationem in partibus oris faucium, aut gutturis, sed etiam requiritur cum inflammatione tantam malignitatem esse in causa ut partem pessime exulceret, nam etsi ad suffocandos ægrotos ulcus impertinens sit, non tamen ut constituentur integra morbi essentia, Garrottillo appellati, sed communi in consensu utrumque requiritur : inflammatio tumida cum malignis ulceribus. Unde sola inflammatio existens sine ulceratione, angina dicetur aut vocabitur ex nomine quo insi-

gnitur quævis pars oris interna, dum tumore corripitur. Similiter si solum malignum ulcus signis percipiatur, affligere absque tumore aut inflammatione tumida ulcus vocabitur, minime vero Garrotillo. Est ergo hæc perniciosa morbi constitutio complicatio quædam tumoris præter naturam cum ulcere pravo.

Ex dictis patet garrulum auctorem Polienteæ inepte definisse morbum prædictum. Dixit enim esse interdum inflammationem venenosam faucium et tonsillarum, interdum ulcus contagiosum ex venosa materia arida, et ferventi. Peccat enim in multis definitio relata, tum quia inflammatio venenosa in prædictis partibus dari potest sine ulcere aliquo, sine quo Garrotillo non datur, tum etiam quia cum supponata ut certum periclitari ita affectos ob suffocationem, explicare non potuit quo modo ab ulcere solo tale symptoma oriatur. Præterquam quod eundem morbum in specie explicare per duos omnino diversos disjunctive repugnat veræ definitioni; nam si natura morbi composita utrumque morbum necessario respicit, utrumque simul et conjuncte explicare tenetur definitio non disjunctive, aut seorsim, ut ille fecit.

Male etiam doctor Villareal, lib. 1. in fine cap. 7. docuit, non esse dubium prædictum morbum esse anginam, si habet signa pathogenica, ejus nempe difficultatem respirandi, et deglutiendi. Consistit, inquit, angina in angustia gutturis, angustia autem semper est eadem, a quavis causa dependeat. Male quidem id censet; nam etsi quævis angustia sit idem morbus in conformatione, non tamen quævis angustia gutturis appellatur angina, ut docte adnotavit magister lib. de locis affect. cap. proprio. Nam si a siccitate convellerentur muscoli gutturis, non diceretur angustia anginosa, nam hæc solum dicitur talis quando ex causa efficiente tumorem suffocatio contingit: Nullus enim ex antiquis anginam curavit nisi auxiliis evacuantibus, unde etsi illa fateatur, prædictam suffocationem a materia causari; loquitur adhuc improprie, quia nullus medicus appellat anginam, nisi ortam ex tumore præter naturam ab humoribus orto. Ille autem putavit materiam hujus morbi non tumefacere ob impensam crassitiem, cujus ratione per poros augustos intrare non potest, et sic per solam irrigationem causari putavit, quod utinam ita esset, redderetur morbus curabilior, miran-

dumque est ita opinatum fuisse, cum tam magis tumores, tamque conspicui in hoc morbo inveniantur, clarem monstrantes non esse tam crassam materiam, ut ad poros partium transmitti non possit.

Dixi ulterius in definitione, hunc morbum esse malignum quia non solum inducit inflammationem cum ulcere pravo, sed etiam habet propriam malignatam adjunctam : nam præterquam quod contagio communicatur celeriter, carnem et partes, quas afficit, exedit, corrumpit, et mucosa putredine destruit. ita ut usque ad ossa non sistatur putredo, ut docuit Mercatus. Habet etiam plurimum venenosæ naturæ, ut ex accidentibus liquet adducentis postea. Erravit non leviter doctor Guadalajara cap. 7. putans hunc morbum contagiosum non esse ; contrarium enim experimento monstratur, et docet Mercatus historia illa celebri lib. consult. cons. 24. Et ratio est, qua in causa hujus morbi inveniuntur omnia requisita ad contagium, nam est maligna putredo, et causa lentorem habet fortemque permixtionem. Estque probabilius morbum non esse contagiosum ad distans, sed solo contractu, aut medio fomite, quia tam mucilaginoso est materia ab illa, et ita solum per contactum, aut media fomite communicatur.

An vero causæ hujus morbi insit venosa qualitas, difficile percipi potest ; nam ut docte adnotavit doctissimus Nunnez contra Mercatum, nec ex celerrima morte id colligere licet, nam cum sit hic morbus de anginarum natura, et hæc intra diem suffocare possit, ut docuit Hippocrates 3. lib. prognost. Ita et morbus iste absque maligna qualitate brevissimam affert mortem, tum etiam quia cum causa tam valide putrefaciat et partes mortificet, insitque viæ respirationis per quam aer ad cor ingreditur, gravia symptomata causat ex se sine conjunctione qualitatis malignæ. Hanc enim medici inquirunt, ubi dantur symptomata in manifestam causam irreducibilia, quod hic non evenit, cum tam patens sit *subitæ mortis* et aliorum accidentum origo.

Ex alia vero parte pulsus parvitas, et debilitas statim accedens, extremorum frigus, somnus profundus non vaporibus obstruentibus, ut ego existimo, semper causatus, sed resolutione nimia animalium spirituum, quod indicat impotentia ad motum et debilitas in reliquis internis potentiis, deli-

quia animi, a syncope; quibus ita affectos versari percipimus, non levem suspicionem malignitatis, et veneni offerunt. Demonstrant enim hæc symptomata morbum hunc cordi insidiari, quod est proprium venenis. Quod confirmat causam hujus mali ita reddi toto genere contra naturam ut incoctibus fiat humoribus malignis. Videmus enim suppuratos, etsi magnam copiam puris in thorace contineant, et cordi tam proximam non ita debilitari, sed per multum tempus durare sine relatis accidentibus. Suspicio igitur aliquo venenosæ naturæ esse potest, præcipue ubi tam intolerabilis fœtor adest perpetuo, et causam tam parvam in quantitate magnis remediis non cedere, sed vim auxiliorum ita contemere, ut nullis etsi intempestive exhibitis edomari possit, illud non minus indicat. Ad quod accedit, quod major pars correptorum hoc morbo internecatur. Signum pestilentis affectus, et maligni et cum nihil sit magis proprium, veneno, quam naturam humanam confertim corrumpere, hocque experiamur in hoc dicto morbo, non quia obstruat viam respirationis, sed quia alterat totam substantiam, spiritus, summamque imbecillitatem inferit et sic venenosæ naturæ satis magnum præbet indicium.

De signis hujus morbi.

Si essentiam hujus morbi compositam fecimus ex tumore contra naturam, et ulcere, signa apparebunt utique morbo essentialia; statim ergo in principio mali, ore aperto et lingua depressa, tumor contra naturam intra illud apparet cum sorditie, ichoribus exputrilagine ulceris emanantibus, ideoque facillima est hujus mali cognitio. Sæpe vero ex solis externis signis facillime perspicitur. Nam tumor apparet in partibus exterioribus colli satis conspicuus cum difficili respiratione, et mucosa excretionem per nares, et vox rauca producitur. Frequentissimum ex ulceris sorditie albam monstrari; aliquando vero mire in coloribus variat ob diversam, et variam succorum et partis corruptionem, et ita interdum palida, interdum nigra interim livida, aut cinerea, aut diversis coloribus variegata, crusta precipitur, aut sordicies, et excrementum ex ulcere resudante simili causa in coloribus variant. Constat vero vel me tacente

tumorem præter naturam visui conspicuum signis non egere, ut cognoscatur per scipsam. Dum vero *visui occultatur*, aliis signis percipitur; dolore scilicet, pulsus duricie, nisi pendeat ex pituita, nam tunc mollior quam secundum naturam erit, ut est durior ex aliis causis. Frequentissimum est in hoc malo vel respirare difficile, vel deglutire male, aut utrumque contingere, secundum quod *aspera arteria*, aut *gula* magis, aut minus afficiantur a distendente tumore, et relatas partes coarctant, ut minus bene deglutitio et respiratio fiant. Febris etiam continua statim in initio apparet symphomatica quidem utpote ex inflammatione pendens, cui non raro associatur putrida ex materia intra vasa per contagium faucium corrupta; nec inconvenit putridam esse excitatam ex solo affectu inflammatorio, quando tanta est in faucibus, gutture, et partibus oris putredo, ut ex illa eleventur vapores corrupti, et ad cor, et totum distribuuntur, ut possint, variat febris in sua intensione quamplurimum, prout ex fervidiori causa tumor causatur: sæpe vero remissa percipitur, quia ex succo frigidiori dependet, parvior est inflammatio, et partes externos oris potius afficit, estque remissa putredo.

Ingravescente malo tumor increscit, corruptio partium, sordes, et foetor augentur; respirant difficillime, nec facilius deglutunt, sicque potum rejectant per nares cum malignis ichoribus cæterisque colliquamentis per easdem expulsis, tumor totum occupat collum, cervicem convellit, indurat tensione, ut nisi recte respirare non possint, et interim tumor ad thoracem extenditur, cum non levi desperatione solutis; inæqualis redditur pulsus, debilis, et creber, cum febre majori vox depravatur raucedine, per nares loquuntur; cruda rejectant, media tussi sine levamine, et somno graviore capiuntur, non tantum obstructione causato quam vitali et animali spiritu extinctis, ut ad commode sentiendum satis non sint remanentes. Alimenta vomunt, anxique quiescunt, nullibi semper jacendi figuram evariantes. Estque frequentissimum gurgulionem inflammari, corrumpi putredine ut exedatur totus, corruptus pellatur, et quando in desperationem res venit, *raucedo increscit*, per asperam arteriam putredo serpit ad cor, et consumptis vitalibus spiritibus paulatim infrigidantur extremo, mitior fit febris ad raritatem, et parvitatem cum summa debilitate pulsus mutatur, et sæpe bene respirantes, nulloque

vitio in ore apparente, obeunt. Eodem modo, sed non tam breviter necat, quando per gulam usque ad ventriculum putredo trajicitur; corrumpuntur etiam spiritus, alimentum vomitur assidue cum potu, sic per os collatorium cerebrum afficitur, et per nares stillicidiæ sanguinis emanant, signum onmino mortale; significat enim versus cerebrum putredinem tendere; ex multis enim, in quibus hoc signum apparuit, nescio an præter unum quis liberatus fuerit.

Mira tamen variatio in signis percipitur; sæpe enim inflammationis et tumoris manifestissima signa monstrantur, ulceris vero, aut nuda, aut quasi præludia. Deinde vero *tractu* temporis *crusta*, et *ulcus* apparent manifeste, aliquando vero contra, statim *a principio* mali eschara, crusta ulcusque satis conspicua cernuntur: inflammatio vero levissima, et parvissima est; increscit tamen postea; sæpe vero ulceris signa occultantur, quia lætet in internis musculis gutturis aut faucium cognoscitur vero conjecturis non levibus; nam præterquam quod tumor exterius apparet cum dolore in partibus interioribus et difficili respiratione et deglutitione; semper fere per nares vitiatam humiditatem emittunt lentam, glutinosam, et crassam; vox depravatur, et lingua versus partes internas et ejus radices albicans percipitur, quod indicat in partibus internis crustam et ulcus existere, et incipiunt se manifestare per albedinem linguæ causatam ex excrementis pituitosis putridisque ab ulcere interno emanantibus, et linguæ suo lentore hærentibus. (Cap. VI.)

De parte affecta et de causis.

Si rigorese loquamur, affecta pars in hoc morbo, uti proprie dicatur morbus suffocans et Garotillo, debet esse illa quæ in affectionibus anginosus patitur, ac per consequens patietur guttur, quod *caput asperæ arteriæ* dicitur ob omnibus, aut patientur fauces; nam in quacumque harum partium exsiccata inflammatio angina appellatur. Sciendum igitur est in capite asperæ arteriæ seu gutturis esse internos et externos musculos; ita etiam in faucibus sunt interni et externi. Gravissima excitatur Angina, quando interni muscoli gutturis inflamman- tur; occluditur enim facillime via respirationis, et ideo docuit Hippocrates intra diem vitam cum morte commutare, eodemque modo.

experimur in morbo hoc suffocante, intra diem sciliter ægros suffocari, tanta enim est hujus mali pernicies, et acuties. Hæc angina dicitur ab antiquis Cynanche: quando vero externi musculi gutturis inflammantur, minus periculosa est affectio. Est autem levior, et dicitur paracynanche. Si vero musculi interim faucium inflammantur, dicitur synanche. Sicut Parasy-nanche, quando inflammantur interni. In his igitur partibus existere tenetur inflammatio cum ulcere, ut dicatur Garrotillo, qui inter species anginæ collocatur ab auctoribus melius sentientibus. Unde sicut in medico rigore non appellatur angina inflammatio cum ulcere maligno in qualibet parte, sed tantum in illis, in quibus exitatur angina. Sicut ergo gurgulionis inflammatio non appellatur angina, nec inflammatio glandularum à lateribus gulæ et gutturis existentium: ita nec dicitur Garrotillo in rigore prædictarum partium inflammatio cum gutture, quia non habent; ut putant aliqui tanquam signum essenziale, et necessarium difficilem inducere respirationem, sed illam solum lædit, quando nimis increvit, et magnum acquisivit tumorem. Est autem in omni angina inseparabile, quod statim primo insultu difficilem inducere respirationem causet. Quidquid autem sit de hoc, certum est quod sicut antiquitas noluit anginam appellare, nisi affectum inflammatorium gutturis aut faucium, ita nec appellabitur vere Garrotillo, nisi inflammatio, exulcerata relatas partes obsideat: communit tamen ubi in quavis parte oris interna, dummodo lingua non sit, inflammatio cum ulcere sit, Garrotillo appellatur, licet in rigore et proprie loquendo talis non sit; experimento enim constat sæpe incipere hujusmodi malum ab inflammatione ulcerata gurgulionis aut glandularum, et crescente malo suffocari ægrotantes gutturi et faucibus communicata læsione.

Excitatur hujusmodi malum a quovis humore ulcerari potente, non quidem ex sua nativa temperie; nam sic sola bilis auctor illius putaretur, cum ergo exedatur locus affectus, et exulceretur ob malignam corruptionem, quam contra naturam acquirit, et nullus sit humor incapax hujus corruptionis ab omnibus causabitur. Et cum rursus ad corrodentem naturam acquirendam aptior sit bilis, quam alius quivis humor, videtur constituenda, ut causa frequentior; sine ratione enim videntur quidam

asserere, quod sanguis hujus morbi causa esse nequeat, eo quod nunquam rubor in parte ulcerata invenitur: contrarium enim evidenter experimente probatur. Nec obstat, quæ semper pernicies alba percipiatur in ulcerata particula; nam præterquam quod hoc non est verum, constat illum albicantem colorem non pendere semper ex humore fluente, sed ex parte quæ exeditur, et putredine corrumpitur. Accedit etiam, quod partes afflictae sunt semper humidis et pituitosis excrementis imbutæ, quæ debilitatem morbi sequentia, nec concoquunt neque expellunt pituitosa illa excrementa, et ita abundant illa et obscurant causam mediatam et propriam hujus mali.

Verum inter omnes convenit frequentiores causas esse bilem, melancholiam, pituitam salsam præsertim, sicque constare ex coloribus tumorum præter naturam; quia vero malum hoc semper fere dependet a capite tanquam a parte mittente in fauces et guttur, quod de omni angina Galenus tradit, et caput semper fere excrementis crassis, et pituitosis scatet; adeo frequentissimum est relatum malum causari a pituitosis humoribus talem contrahentibus labem et violentam naturam, quod corrosivi reddantur, et exedentes. Unde cum alios tales humores crassiciem cum lentore participant, partibus adhærant validissime, et diutius detentos illos exulcerant maligne hincque constat, cur pueri et tenerioris ætatis frequentius hac labe infestentur; sunt quippe humidissimi cerebri, unde distillationibus in guttur et fauces obnoxii. Legatur Galenus in comment. aphor. 2, 6 lib. Hoc tamen in causa hujus mali peculiare invenitur, prout distinguitur contra causas anginæ simplicioris, quod tam pessima conditione sigillatur, et corrumpitur, ut incoctiles omnino reddantur in quo non leve periculum est; nunquam enim in suppurationem veram illius causa mutatur, sed inutilis omnino, et toto genere contra natura redditur quasi excrementum malignum, unde suppuratione, resolutione, magis quam coctione media; ad quod non parum facit debilitas summa. quam ex tam perniciosa causa contrahit pars, ut ex duplici capite incoctilis sit materia hujus mali, et quia extraneam putredinem et corruptionem concipit, et quia extreme effœminatur partis temperies, et vitali calore, nativoque destituitur, ut impotens maneat ad coquendum non solum tam mali-

gnam causam verum et proprium ac naturale alimentum, quia et hoc fœdatur non minus quam partis afflicta temperies.

Signa vero diversas causas monstrantia ex natura tumoris et ulcerum, sordibus satis conspicua erunt ; nam ubi rubor cum dolore et calore, tensioneque percipitur, adestque durities in pulsu, cum non levi febre sanguis calidus in causa est. Ubi albicans regio gutturis faucium et oris apparet, tumor laxus, pulsusque cum mollitie percipitur, dolor moderatus, et febris remissa apparent, pituita erit causa : sic nigra eschara, aut livida citra nigrantem dolorem ex melancholia dependet, tensioque adest : quod si nigrities cum maximo incendio percipiatur adsitque crusta veluti exsiccata ustione et fervente sanguine, et in atrabilem mutato tumor nascetur, magna erit febris cum sitia implacabili et difficultate nimia deglutiendi, et respirandi, exsiccata enim est musculorum caro adustione, et quasi in carbonem versa, et ideo difficulter moventur et magno dolore. Interim vero lividus aut niger invenitur color, non quia ex succis nigris natura, aut adustione dependeat, sed quia sphacelo pars denigratur, aut livida redditur, ut in externis partibus experimur, quando maligna fluxione destruitur omnino partium naturalis temperies, et gangrena mortificatæ lividæ redduntur, aut nigræ cum fœtore intolerabili.

Quando autem partium corrosio celerrime extenditur, et ad plures partes dilatatur, acerrimus significatur humor et summe penetrans partes : sæpe vero accidit humorem esse lentum, et crassum, et non nimis acrem, et partibus primo affectis tenaciter hæret, nec serpit in alias contagium ob lentem actionem ex remissa virtute. Legite Aretæum lib. 1, de natura acutorum morborum, c. 9, ubi doctissime, et eleganter hujus morbi naturam exponit, quidquid reclamant Neotherici Scriptores, putantes hoc genus morbi antiquis ignotum fuisse, cujus vestigia fuit secutus Aëtius, et verba Aretæi transtulit.

(*Cap. VII.*)

De prognosticis hujus morbi.

Fallacissimam esse hujus morbi naturam confitentur omnes. Est autem duplex principalis fallacia. Primo qua ulceribus oris et partium, quæ visui existebant, conspicue recte curatis, et sedata

inflammatione, æger periclitetur. Ratio pendet ex eo quod paulatim serpit putredo per *asperam arteriam* ad cor, aut per gulam ad ventriculum sine aliquo dolore, aut febre sensibili, cujus sit habendo cura, et cum medicis auxiliis ablata fuerint ulcera, et inflammationes sedatæ in partibus visui patientibus : Medici triviales salutem pollicentur, cum alioqui occulta putredo paulatim mortificans partes internas, cordi insidietur, et tabe parvissimis, et debilissimis pulsibus, extinctione caloris, refrigeratione extremorum, faciei extenuatione in appetentia perpetua, et molesta mutatione decubitus, somno apparente, quia vigilandi impotentia somnum verum æmulatur, misere ægrotantes interficit, ut visum jam sit subito, et inopinata morte periisse aliquos ob medici præceptum et imperitiam, e lecto fugientes, et intra domos ambulantes, ab quo etsi quæ vitia apparebant in faucibus, aut partibus aliis in melius mutata conspiciantur, non licet salutem polliceri, quia solet, ut dixi, *communicari* paulatim putredo, et gangrena partibus internis versus cor per *asperam arteriam*, aut ventriculum per gulam, aut ad cerebrum per partem oris supernam, gurgulionem, et alias vias, et anguem in herbis latere, quando partes, quæ erant visui patentes non tantum mutantur in melius, verum omnino sanæ absque ulcere, aut inflammatione videntur.

Secunda fallacia est : quod si nimis tumeant *partes externæ*, *perniciosum* sit signum, quod in reliquis anginis putatur saluberrimum, ut ex Hippocrate constat. 3, prognostic 6, aphorism. text. 37, 7 aphor. text. 49. Ratio diversitatis est quia in hoc morbo humorum confluxus per vasa jugularia in internas partes delabitur, ut rarissimum sit non affici prius partes externas colli, et ex illis præcipitari humores ad intima. Unde quia malum internum fovetur ex defluxione externorum, quanto magis tument externa, compatiuntur interna, sicque perniciosum exitialeque signum existit, glandulas cordis et partes externas thoracemque in magnum fastigium elevari, nimisque intumescere. Ad quod accedit ita partes affectos in hoc malo debilitari, ut quod receperunt semel, nequeant in alias transferre; nam cum sorditie, corruptione, et inflammatione efferata, tam laxa, putrilaginosa, aut in crustam conversa pars percipiatur affecta, ut merito dicas radicaliter esse subversum, tempera-

mentum ejus nativum nequivit extradere quod semel recepit. Ad quod conducit non parum humorum crassities, et lentor- quibus causa hujus mali fere semper oriatur ; quæ omnia, cum in aliis anginis non mirum partes affectas, convenientibus auxiliis adjutas trajicere posse, quæ semel receperunt : at vero in angina maligna non tumen externa, quia in illa ex externis translata materia fuerit, sed quia ita adimplentur interna, ut materiam fluentem non capiant, et sic ad externa dilabitur.

Est etiam perniciosum signum quodcunque significans putrilaginem intus existere : nam auxilia nequeunt illud vitium corrigere ob indebitam applicationem, glutinositas enim et crassities escharæ, et magna requirunt auxilia, et applicata diutius, et eadem requirit maligna putredo, et partium gangrena. Hæc vero nec devorari sine periculo vitæ, nec applicari partibus internis tempore commodo possunt. Nec existimo, ob aliud tam desperatum esse hujusmodi malum, quam ob celerrimum contagium partibus non conspicuis communicatum ; nam cum vitia in ore consecuta tam assiduam diligentiam requirant, tamque continuatam auxiliorum applicationem, ut moderari possint, quid sperandum, nisi certum exitium, ubi interna contaminantur ? Hinc ichor, seu sanies graveolens per nares emanans certam innuit perniciem : cui si adjungatur in somnum falsum delatio desperata res est, maligna enim indicatur corruptio internas partes exedens, estque tam pessima humorum conditio, tamque adversa naturæ, ut spiritus dissipando nequeant vigilare ægrotantes, quod est false et apparenter dormire.

Eandem malignam significationem præbet sanguis stillans e naribus ; ex corrosione quippe vasorum, et putrilagine emanat, innuitque certissimam mortem, quia putredo interna cohiberi non potest ; idem de sanguine excreto per os summa ratione judicandum est ; nam etsi partes non afficiantur principales, neque affectus nasorum exitialis, existat tamen in quantum istarum partium erosio principalem causam, et valde corrodentem, aut putrefacientem significant, indeque inemendabilem a natura ; ideo periculosissimus censetur sanguinis fluxus ex naribus, aut ore. Quidam cum hoc signo nullum vidisse liberatum docent ; nos vero unicum solum ægrotum summa diligentia a tanto periculo vindicavimus.

Est etiam perniciosum signum, quod remittatur febris quando ulcus putrilaginosum magis conspicitur, et inflammatio aut tumor non minuitur; summa enim extensio vitalis caloris arguitur et partium gangrena. Ratio est, quia humor commotus ad focum, putrescit calore fuliginum, quæ elewantur ex partium nutritione, et actione caloris et humore transmissio : partes vero jam mortuæ sphacelismo nec nutriuntur, nec habent calorem, medio quo intra se fuligines elevent ex humoribus ad nutritionem dicatis. Unde etsi confluant humores anginam facturi, in locum affectum non alterantur, nec putrescunt, et sic nec febris augetur, sed constante elevatione fuliginum, et materia, et materia non mutata in vapores, nullus calor cordi et universo corpori communicatur contra naturam. et ita deficit febris ad proportionem qua corrumpuntur partes. Adduximus locum Galeni celebrem text. de temporibus morborum, ubi docuit : Febris elevationem sæpe pendere ex defectu nativi caloris, partium mortificatione. (Legite locum 3, lib. Epid. in histor. Hemocrates comment.)

Ubi apparet crusta, aut eschara livida, aut nigra, periculosissimus excitatur morbus ex humoribus adustis atrabiliaris causatus.

Estque cancrrosa gutturis affectio et exulceratio; indeque lethalis, cum non talis censeatur ab omnibus affectio relata, etsi alias partes non principes obsideat, possintque commode auxilia idonea applicari majori ratione, lethalis consebitur dum guttur et fauces molestat. Dixit enim Hippocrates, 4 Aphor. dysenteriam ab atrabile causatam lethalem esse. Est autem guttur pars ad vitam necessaria magis quam intestina, et ejus passiones cito interimunt.

Ratione partis affectæ sumitur majus aut minus periculum; nam si afficiatur pars interna gutturis eodem die, aliquando strangulat, ut de angina docuit Hippocrates in Prognost. Cognoscitur vero ex eo quod nihil conspicuum in faucibus sit, nec tumor, et rubor appareat depressa lingua, inducit tamen difficillimam respirationem, seu orthopneam, maximumque dolorem secundum locum participat, quod afficiuntur muscoli externi gutturis : tertium, quando interni faucium, quartum quando externi : ultimum quando glandulæ ad linguæ radicem consti-

tutæ. Nullum vero genus est securum, quia ex quacumque parte facile communicatur internis, et cum aër deductus ad cor per affectas partes necessario transeat et alteretur, secumque deferat quod vaposum ex putrilagine elevatur, compatitur cor facillime, et læditur vehementer; eisdem de causis compatitur cerebrum, repugnat vero cum cibo et potu aliquid putridum non delabi, in ventriculum, omnibus principibus partibus insidiatur hoc malum et totum corpus contaminatur: præsentī et patente periculo ægrorum imaginationem eorum excruciat: nullus quippe ignorat ullius malignitatem et ferocitatem, ut animi agonia debilitentur non minus quam sævitia symptomatum. Habet hoc insigne periculum, non posse scilicet naturam aliquam salutarem crīsim tentare ob delibitatem extremam facultatibus partium inductam humorisque crassitudinem et lentitiam: Undeque experimento monstratur, quamcunque evacuatio semper alvum aut sudorem inutilem esse et nocivum, quia cum non prosit necessario debilitat. Est autem aliqua spes in frequenti expuitione, quando crassa et glutinosa, creantur; nam inflammatio anginosa sic judicatur, teste Hippocrate *in coctis prenot.* Et cum magna vis requiratur ad excreandas crassas materias, ideo infantes et pueri plus periclitantur, imo loco excretionis ad extra ichores, et excrementa a vulneribus resudentia deglutiunt, viscera inficientes veneno.

Proximam vero esse mortem, quando sublime respirant ægroti, et in parvitatem, et raritatem pulsus permutatur cum animi exsolutione, frigiditate extremorum nullus ignorat. Est enim in hoc malo pernitiōsa virium debilitas; nam si in anginosa simpliciore eam dominavit Galenus, in maligna erit execrabilior et pejor, infantium et puerorum copia maxima periit quia nec expuere, nec excreare lentas et crustaceas materias possunt, minus auxiliis obediunt, et quia calidis et humidis malignæ putrescentiæ magis obnoxie sunt, etiam cerebri humidiora sunt et excrementitia, indeque in guttur facile liquata excrementa præcipitantur, partes oris internas laxas, porosas et tenerimas habent, sicque recipientes promptissime quod in eas transfertur et instar spongiæ excrementa exolvuntur, et putrescunt quam facile, quia tenera, et mollis partium conditio causæ erodenti, et putrefacienti resistere nequit. Hinc summa et

intensa putredo intolerabilem causans fœtorem, in sese concidere partis gutturis cogit ob impensam mollitiem. Concidentia vero inflammatione crassis, lentisque excrementiis occluditur omnino respirationis foramen, quando jam nihil per vocem significantes cum summa rauedines, et animi angore e vita discedunt.

De signis et prognosticis anginæ communis (*).

Si angina non est unicapars afflicta, nec signa essentialia poterunt esse communia cuicumque speciei anginæ. Rursus si ex diversis humoribus originari potest, sequitur etiam nec ex quavis causa eodem signa speranda esse. De exquisita ergo angina ex parte humorum loquentes (est autem illa, quæ ex calidis humoribus pendet) cum sit acutus morbus convenientes auctores esse essentialia signa ea quæ inflammationis ex calidis succis debentur, nimirum dolorē partem calidiorem sentiri, et pulsum esse durum. Hæc enim inseparabilia sunt a qualibet inflammatione partem sentientem obsidente. Est etiam inseparabile quod pars ruborem contrahat, hæc igitur signa, sive inflammantur partes, sive in gutture necessario inveniuntur, quia sequuntur solum natura succi aposthematis partem privatam sensu tactus; est etiam meo videri inseparabilis a qualibet anginæ exquisitæ specie deglutio difficilis; si inflammantur musculi faucium, res est certissima, quia ut docuit *Galen.* lib. de *dissectione musculorum*, 15, in faucibus musculus utriusque unius habetur, tunc munere suo fungens eum vox editur, aut deglutio fit, hæc minus, si guttur patiatur. Ratio est, quia omnes istæ partes in deglutione moventur non leviter, repugnat vero in ipsa motione non dolore magis, ac per consequens deglutionem difficilem fieri, qui refugiendo natura doloris augmentum, pigre musculos movet; et tardissimo conatu, levique compressione, et inde necessario læditur deglutitio, quia non fit naturali modo, et celeritate. Hoc respiciens, causa est quia ad *Almansorem*. cap. de angustia dixit: cum in deglutiendo sentitur angustia adest passio, quæ synanche vocatur, quasi sit inseparabilis difficilis deglutio ab omni angina. Et ex his constat, quod licet respiratio difficilis sit inseparabilis difficilis. Quoniam guttur afficitur, quia redditur

(*) Donné pour établir la comparaison avec le Garrottillo.

angustior respirationis via, id tamen non eveniet necessario, quando fauces partiuntur. Ratio est, quia non comprimitur necessario nec coartatur guttur, si inflammantur fauces, et inde nec respiratio difficilis redditur, tum quia non movetur pars inflammata ad metum respirationis, et ista non dolet, dum sit quod docuit Cesalpinus, lib. 2 99, *Medicorum*, 9, 19; constat ex *Galeno* 3 *prognost. comm.* 22, in quo explicando secundam speciem anginae dicit: qui nec magnopere dolent, nec difficilem habent respirationem nulla in re affecto gutture; ergo si nullatenus afficitur guttur, illæsa respiratio manebit. Idem docuit Hippocrates, 6 sect. 7, text. 1, dicendo in summa qui solum deglutire non poterant: iis valde mites, ac toleratu faciles erant, ubi insola deglutitione læsionem possit, id est quando alimentum adsumitur, ut interpretatur noster *Vallesius*, et Hippocratis doctrinam tradit Avicenna, cap. 9, fen. 9, lib. 3, dicendo: Et difficile inter malum aposthemosum quod non est malitia, et quia est in postremo lacerto; mirum est, quod videtur, quod cum eo non constringatur anhelitu, nisi cum est deglutio.

Nec obstat quod idem auctor in initio; c. 9. dicat. Intentio communis omnibus speciebus præfocationum est constrictio anhelitus, et difficultas deglutiendi. Nam per omnem intentionem non intelligit, quod cuicumque speciei illa duo symptomata competant, sed tradidit, quod omnibus est commune, et inseparabile, quia omnis angina necessario lædit deglutionem, aut respirationem, et in eodem sensu intelligendus Galenus venit, ubi læsionem respirationis ut inseparabilem tradi dit ab angina.

Dico ulterius, quod tanto minus inflammatio partium oris meretur nomen anginae quanto minorem suffocationem inducit ut rigore loquendo; illæ tamen inflammationes anginae dicendæ sint quæ difficilem causant respirationem, id constat primo, ex ipsa nominis etymologia; dicitur enim angina ab angendo, seu molestia inducta per suffocationem, ut refert *Aurelianus* lib. 3 *acut. passion.* cap. 1, et *Aretæus* inquit angina paracutus affectus est: spiritus enim comprehensio est. Et *Galenus* 4 *de locis affect.*, c. 8, sic dictus: Ex iis constat, omnes passionem quæ huic loco accedunt, si respirationem quoquomodo reddant deteriore, ab ipso anginas

nominari. Hinc Hippocrates velut distinguens in inflammationes faucium ab angina 6 Epid. sect. 7, text. 1, « Quibusdam autem fauces inflammabantur; quibusdam autem anginæ. » In cujus loci expositione nostram assertionem tuetur *Vallesius*, ut si probabilissimum, et rationi magis consentaneum, nullam inflammationem oris esse veram anginam, nisi respirationem offendat, ut quando sine hoc illius inflammatur pars, sit appellando inflammatio talis partis, non angina.

Præsagia hujus mali varia sunt. Est autem ut testatur *Tralianus*, acutissimus morbus; ægros enim laquei, funisque modo strangulat. Est vero acutissima præ cæteris speciebus, quæ musculos internos gutturis afficit, nam intra diem hominem perdit, ut testatur *Hippocrates* 3, *prognost.* text. 26. Ratio periculi in angina ex difficili respiratione monstratur, cum non aliter quam suffocando interimat. Gravissimæ anginæ sunt qui nihil conspicui in faucibus faciunt, nec in cervice, plurimum tamen dolorem inferunt, atque orthopnæam et enim eodem die strangulant vel 2 et 3 et 4. Iis enim signis inflammatio internorum musculorum gutturis significatur; insidiatur etiam hæc species anginæ cordi, et pulmone quia ex internis musculis facile præcipitatur materia in pulmones, et cor, præcipue si nimis astringentibus utatur medicus quibus translatio materiæ ocissime fit. Quam transmutationem cum vitæ periculo experta fuit uxor Polemarchi 5, epidem. tex. 57, etsi tumor fuisset conspicuus Hippocrates. Constat vero talis permutatio in pulmones ex propriis pneumoniæ signis, ex tussi nimirum thoracis gravitate moliri.

(P. 98, cap. VII.)

SGAMBATI

Cerebrum non esse præcipue affectum.

Qui partem præcipue affectam cerebrum esse existimabat, his potissimum innitebantur. Faucium (dicebant) affectus, qui respirationem non lædit, tam cito adveniens mors tribui minime potest. Tribuendum hoc cerebro est, cujus mala, facillime ob vicinitatem impartiri faucibus possunt; celerrime ob consortium in consensum cor trahere solent. Quo nomine, uno excepto corde, ob nullius alterius partis morbos, celerius homines intereunt, quam ob cerebri. Si a prægressis causis sunt argumenta sumenda: quid repentinis mutationibus magis cerebro noxium? Si a subsequentibus molis, qui in fauces, et collum destillant succi affectum esse cerebrum indicant. Sed quid frustra, hinc inde, argumenta conquirimus, si declaravit hoc sectio, si oculis hoc cernere licuit? Secto puero, qui hac lue interierat cerebrum putrefactum inventum fuit. Hæc ipsi, sed dicant nobis quis nam sit affectus in cerebro, qui faucibus impartitus, nobis conspicuum fit. Inflammatio ne, an corruptio illa faucium? præter hoc, nullum aliud malum in faucibus est; si ergo affectus faucium communicatus illic a cerebro fuit, duorum alterum, vel ambo deberent in cerebro prius incipere, deinde in faucibus; sed si cerebrum inflammatum, vel corruptum esset antequam fauces, utique inter initio, facultatum principum, quæ in cerebro resident, lesa aliqua cerneretur; quod cum non sit, non est dicendum cerebrum pars affecta. Audio dicentem non incipere primo affectum in cerebro; sed vel relinqui portionem succi illius, qui distillat in fauces in capite, atque ita producere affectum similem in cerebro, vel ortum malum in faucibus mox impartiri cerebro. Ita ut semper mors non sequatur faucium affectum, sed cerebri. Verum si mors semper ob cerebri corruptionem, vel inflammationem accideret, debuissent saltem omnes, qui hoc morbo interierunt, interire cum facultatibus principibus læsis; sed ut plurimum hi obierunt nulla illarum læsa,

ergo erat consimilis læsio in cerebro. Dixi autem ut plurimum, nam non nego ex vita discensisse nonnullos, quos morti proximos, coma vel delitium vexavit. Sed hoc illis contingebat ob aliam causam, de qua suo loco, non ob naturam morbi, ob quam si contigisset debuissent omnes cum his symptomatibus interire quæ enim peculiarem morbi naturam sequuntur, semper cum illo sunt, una cum morbo accedunt, et postea illi recedunt. Admittendum ergo non est affectum similem illi qui conspiciebatur in faucibus extitisse in cerebro, neque hoc fuisse partem præcipue affectam. Argumentum a secto puero acceptum nil probat, nam desumptum est a particulari exemplo. Neque contra nos facit quod in aliquo communicata cerebro corruptio fuerit : sectos fuisse alios certo scimus in quibus cerebrum illæsum inventum fuit. Quomodo affectus faucium, respirationem non reddens difficilem, interficere possit, dicemus agentes de causis. Cæterea argumenta monstrat solummodo ad hanc ægritudinem generandam magnam partem cerebrum habuisse, ex quo in fauces distillarunt humores excrementii; in quo nos cum iis sentimus : Sed tunc cerebrum fuit pars mittens, ut medici loquuntur non pars præcipue affecta.

(Cap. III.)

Non esse aphtas malignas.

Digrediamur inde ad eos, qui putabant affectum hunc esse aphtas malignas ; inflammationem vero, supervenientem, ulceri. His videtur favere Aetius (sermone 8) loquens de pestilentibus tonsillarum ulceribus. Sed multo magis Aretæus, qui de tonsillarum ulceribus sermonem habens, videtur ad unguem describere morbum, qui his temporibus sæviit. Inquit enim ulcera in tonsillis et fiunt aliqua mitia familiaria non lædentia : « aliqua aliena pestifera necantia mitia quidem quotquot sunt » munda exigua, non alte descendentia, non inflammata, dolorem non excitantia, Pestifera autem quotquot sunt, lata, cava, pingua quodam concreto albo, aut livido, aut nigra sordentia « Id genus ulceris aphtæ nuncupantur. » Et paucis post verbis. « In collumellam phlegmone erumpit; atque isti haud ita multis diebus post, phlegmone, febribus, fœtore inediaque consumpti, intereunt. » Et addit « Dolor quidem acer, et calidus, calit in

« carbunculo; spiritus vitiat; exhalant enim maxime putredinis « odorera. » Et circa finem capitis addit. Raucitas adest; vocisque defectio. Quæ malo inquit pueris potissimum usque ad pubertatem accidere. Quæ et si morbo huic congruant, sunt quidam tamen qui putant affectum hunc esse aphthas malignas inflammationem vero symptomaticam supervenientem ulceri. Primum quidem in eo quod putant inflammationem ulcus consequi. Nam antequam album illud, (quod ipsi putant esse ulcus) incipiat apparere, inceptum jam inflammatio, ut diximus supra narrantes historiam, et nonnulli qui levissime ægrotarunt inflammatas solummodo tonsillas habuerunt, potius ergo dicendum est aphthas supervenire inflammationi, quod inflammationem aphtis. Præterea sic recte velimus dicere ea mala non esse aphthas. Nam hæ sunt ulcera; ulcus autem omne, morbus est in solutione continui cum deperditione substantiæ; in his autem puerulis nulla in principio est substantiæ deperditio, sed eadem pars inflammata redditur alba. Qui color elusit me inter initia, nam cum primum in quadam puella inflammata partem dealbatam conspexissem putabam factam fuisse suppurationem. Quo signo ductus, argenteo quodam stylo tentavi *exteriolem cuticulam* dirumpere, quo puri daretur egressus; sed tactu iudice certior factus fui nullum sub cute pus contineri, sed ipsam carnem in suum colorem mutatam esse jam mortificatam. Quod confirmavit eventus nam altero die manifesta erat corruptio denigratis faucibus, et gravissimum odorem oris anhelitus effluebat. Quam in re felicior illis fui qui, et si jam annus esset ex quo pestilens hic morbus grassari cæperat, scapello dealbatam carnem inciderunt abcessum aperire putantes. Sed (non sine artis ludibrio) manavit inde non pus. Sed ater quidam sanguis, obiitque puer paucas post horas. Cum ergo nulla in principio sit substantiæ deperditio, non possunt appellati ulcera, ob id neque aphthæ. Quod si dein liquida carne ab integra separata, adsit jam deperditio substantiæ; tunc neque appellati potest ulcus, sed gangræna. Ubi aphtha in putridinem vertitur, et exulcerationes facit, Gal. indice aphtha amplius, affectio nominanda non est; nos aphtham appellabimus affectum qui a putredine incipit? minime certe. Quod si ipsum morbum quem suo proprio nomine gangrenam appellavimus, maluerint aphthas malignas vocare, vocent ut lubet; modo res maneat

integra, nullam in principio esse substantiæ deperditionem, sed carnem dealbari ut delabatur quando inuritur medicamento caustico ad excitandum fonticulum. Cum hac solum diversitate, quod ubi inuritur pars aliqua, crustosum ulcus excitatur, caro vero quæ substat alba redditur : in hoc vero affectu nullo crusto conspicitur. Ex quo colligi potest Aetium, citato loco cum de crustosis ulceribus loquitur, de affectu cujus nunc naturam investigamus, nihil dicit. Areteus certe quam simillimum affectum depinxit, et fortasse eundem prorsus. Non meminit autem inflammationis præcedentis, quia brevi tempore perdurat, neque mali aliquid in hac lue ab inflammatione ut inflammatio est provenit. Communeravit vero illam inter ulcera, eo quod quamvis affectus hic, ab ulcere non incipiat, in ulcus tamen celeriter migrat, ob gangrænam supervenientem. (Cap. IX.)

Non esse carbunculum.

Sentiendum ne cum illis erit, qui existimarunt esse carbunculum? Videtur namque, in multis affectus, qui nunc sæviit, cum carbunculo convenire; ambo sunt affectus inflammatorii; supervenit huic color albus, deinde niger, et carbunculi cineream colorem, ac nigrum supervenire testatur Galenus : hic corrumpit fauces et carbunculum quoque carnis corruptio sequitur. Ita contigit in illa pestilentia quæ Asiam vexavit : in quæ fœdo quædam carbunculorum lues grassata est a quibus partes circumjecta cute detegebantur, ut nudæ conspicerentur venæ. Recipiendo ne ergo erit horum sententia? minime vero, mea quidem sententia. Etenim adductæ similitudines, desumptæ sunt non ex propriis carbunculi symptomatibus, sed ex iis quæ multis aliis malis communia sunt. Nam quod sit tumor inflammatorius, convenit non modo illi, sed omnibus tumoribus, qui fiunt a succis calidis; neque illud non movet, quod illi putredo vel corruptio superveniat; nam hæc supervenire possunt inflammationi, erysipelati, et aliis malis, ut infra monstrabimus, agentes de causis gangrænæ. Quantum vero ad coloris mutationem: Nunquam Galenus dixit mutari in carbunculo colorem carnis ad album, vel nigrum, sed nigram ubique, et cinerulentam (nolo immutare Galeni verba) apparere carbunculorum ulce-

ris crustam, quod vel ipsum nomen indicat quod a carbonum nigredine, et exustione ductum docet Ægineta; in affectu autem, qui nunc grassatur, nulla adest crusta sed ipsa caro mollem servans substantiæ modum, alba redditur. Contractavimus illam sæpissime *digitis* et nisi albo colori mollitudo adjungeretur, medici nunquam elusi fuissent, putantes factam fuisse supurationem, et opus esse incisione. Quod si mortuam carnem, crustam appellare voluerint, facile hoc illi dabimus, modo dent ipsi nobis proprie crustam medicis significare durum quemdam corticem, quo ulcera et partes quæ inuruntur causticis, obduci solent; quo nomine crusta carbunculum comitatur; nam humor illius causa, vim habet exurendi, ut diximus. Quod unum argumentum satis est ad monstrandum affectum hunc non esse carbunculum. Nam si quod est symptoma proprium, et inseparabile carbunculi, hoc est, ulcus crustosum excitare. Hinc Galenus 14 Morb. ubi quasdam carbunculorum differentias expressisset, subnectens id, in quo omnes conveniunt omnibus (inquit) tamen ut dixi crustosum ulcus fit, modo crusta ipsa cineris colorem præferente, modo nigrorem. Cujus symptomata meminit ubicumque de natura carbunculi loquitur. Præterea cum carbunculis ex adusto sanguine, ad atræ bilis naturam accedente ortum ducat, (ex quo fit ut ignito carboni comparetur a qua similitudine nomen accepit) hinc fit, ut circumposita caro inflammata, minime rubra cernatur ut in cæteris inflammationibus, sed subnigra. Ac si (Galenus inquit) plusculos rubro, minus misceas nigri, qui vero in ista tonsillarum inflammatione cernitur, ruber est color, qui ad floridum potius, quam ad nigrum vergit: qualis est color erysipelatis, superveniente vero liquatione, per quam mutatur color inflammatæ partis ex rubro, ad album, circumposita caro primum retinet colorem. Quod si dein lividus color, et niger conspiciantur, tunc jam cæpit sphacelos, quam comitantur hi colores, foetidum expuit, vel manifesta omnibus est oris corruptio. Colorem nigrum, qui in carbunculo conspicitur habere aliquid splendentis ut bitumen et pix; in re enim tam clara argumentis amplius non egemus, non potest ergo affectus qui hoc tempore grassatur reponi inter carbunculos.

Anginam proprie dictam non esse.

Illorum nunc opinionem discutiamus, qui affectum hunc numerarunt inter anginas, qui inter cæteros aptius nomen illi imposuisse mihi videntur. Modo accipiant anginæ nomen in latiori quadam notione, nam si crediderint (ut crediderunt nonnulli) esse anginam proprie dictam falluntur; habet enim angina pathognomonicum symptoma, difficultatem respirationis, alias majorem, alias minorem, cujus nomine synanchia, ab antiquis Græcis appellata fuit: sumpta similitudine ut advertit Cælius Aurelianus a suspensio, quod non aliter, quam laquei instar intercluso gutturi meatu interficiat. Ob id Hippocrates affectus omnes, qui circa cervicem existunt, et respirationem lædant, anginas appellare consuevit; vel etiam si nulla adsit inflammatio, sed solo vertebratum ad interna luxatio spiritum reddens difficilem, anginosos sic affectos appellet Hippocrates, isto solum nomine (ut Galenus notat) quia læsam habent respirationem, nullo existente in thorace vel pulmone vitio. Cum ergo angina proprie dicta spiritum difficilem reddat, si verum fateri velimus, angina appellari non poterit affectus hic, in quo spiritus est ut plurimum facilis, sed potius *inflammatio tonsillarum*, et gurgulionis. Quod si anginæ nomen in Paulo latiori notione accipere voluerint, dicere poterunt, et hos angina laborare. Nec temere, cum eam appellationem usurpaverit aliquando ipsemet Hippocrates. Hic 6 Epidem. enarrans constitutionem quandam anginarum, in summa (inquit) qui solum deglutire non poterant, his valde mites, et toleratu facile erant, qui vero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores, et diuturniores. Quibus vero etiam venæ circa tempora, et cervices attollebantur, his aliquantulum malæ erant. Pessime vero his quibus et spiritus sublimis. Et quæ quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant. Quæ vero posterius, non sine prioribus. Hæc Hipp. quo loco omnes angina laborasse scribit, et si primi solum deglutationem læsam haberent. Ita hos angina laborare dici potest qui obscuram vocem, et læsam deglutationem habeant. Sed hoc est nomen quærere et non rem.

Probatur esse sacrum ignem, non modo malignum sed pestilentem.

Nunc ergo naturam hujus affectus investigemus ex propriis symptomatibus, non ex communibus. Sunt autem propria morborum symptomata appellata pathognomonica, quæ non superveniunt, seu invadunt una cum morbis, et cum illis recedunt. Incipiunt cum hoc affectu rubor, et levis tumor, initia tumoris calidi, quorum prima genera duo sunt, inflammatio, et erysipela. Tumor hic ante quam œdema superveniat, plus habet erysipelatis, quam inflammationis. Nam nec tensio, nec tumor adest, qualis inflammationibus irritatur per tertium, color rubeus floridus, qualis comitari solet Erysipelata. Audio dicentem colorem erysipelatis esse flavum, cum fiat ex bile. At mihi multum accidit videre erysipelata quorum nullum nisi rubrum colorem præse ferebat; differt autem color erysipelatis a colore inflammationis, quia inflammatio, cum fiat a sanguine mediocrem habente crassitiem, colorem habet rubrum tendentem ad fuscum erysipela vero, quia vel a bile mixta sanguini sit, vel a sanguine tenuissimo, et fervescente, colorem habet rubrum dilutum, quem Galenus 2, ad Glauc. comparans colori inflammationis, dixit multo magis colorem flavum representare. Non quod crediderit Galenus, vere flavum esse (nam ita credidisset inflammationis quoque colorem esse flavum, afferens erysipelatis colorem, multo magis colorem flavum representare) sed ad flavum vergere: hinc illum paucis post verbis rubidum appellavit. Nunquam enim erysipelatis color flavus esse potest, cum a sincera bile non erysipela, sed herpes oriatur. Sed uno profecto in ea re argumento confirmanda quæ sensum habere indicem potest. Cernuntur quotidie erysipelata colore subrubra. Instas iterum non esse exquisita. Galenus igitur, hunc constitutum affectum esse erysipelas firmavit (sive ut latino vocabulo utamur sacrum ignem); inventa morbi natura, veniamus ad declarandum morbi symptomata, quæ superveniunt: supervenit autem hujus sacri igni putredo, malignitatis clarissimum argumentum; non enim ut Galenus inquit enarrans illam Hipp. sententiam ab erysipelate putredinem vel suppurationem esse nisi nunc cum grassatur epidemice sacer

ignis malignus. Silentio hoc prætereundum non est, Clarissimum virum Petrum Vecchionium, Comitem Palatinum, et Regium. Olim Archiatrum tametsi non nisi paucissimis hac lue affectis medicinam facere illi licuerit, morbi tamen maturam assecutum fuisse, cum lue hanc inter malignes factos ignes, numerandum esse senserit. Morte dein præventum, ab illo qui morbi hujus initia viderat observare non potuit. Erat vir hic acri judicio peditus, et mira in agnoscendis morbos celeritate. Sed illum pro dignitate laudare, nostræ tenuitatis non est. Redeamus unde defleximus. Qui ergo nunc grassatur affectus, sacer ignis malignus est. Hic eam afferre potest symptomatum varietatem, quæ causa fuit, ut medici in varias abirent sententias. Incipit affectus ab inflammatione, abit in gangrænam, desinit in ulcus; et sacer ignis, ut sacer ignis. Tumor inflammatorius est, ut malignus putrefacit, putrefacta carne absumpta, relinquitur ulcus. Huic similem constitutionem narrat Hipp. Hic in pestilenti quodam statu sacrum ignem sæviisse refert, qui malignus cum esset, multos interimebat. Oberrabat autem per varias corporis partes, quas ita depascebat putredo, ut multis brachium, vel totus cubitus decideret, nonnullis totum femur, vel tibiæ denudarentur. Erat autem id gravissimum, cum ventrem, et pudenda malum laboraret. Quorum caput tentabat, his caput totum glabrescebat, et mentum, ossaque denudabantur. Erant autem hæc (inquit Hipp.) formidabiliora, quam deteriora. Eo quod (ait Galenus in comm.) putredo extimam cutem apprehendens terribiliorem quidem morbi speciem præbebat, periculum vero minus, quam si is pudenda teneret affectus, aut guttur, aut aliam principem partem. Si ergo malignus hic sacer ignis qui Hippocratis tempore grassatus est, multos interemit : nullum videri debet si qui nunc sævit paucissimis parcit; qui non ignobilem aliquam partem ex exterioribus, sed fauces occupat, illasque sua malignitate corrumpit. In quibus membris putrefactio, inquit Avenzoar, non nisi tempore epidemiæ, et pessimæ mortalitatis oritur. Quare partes gulæ (nolo immutare auctoris verba) corrumpuntur. Et hoc non accidit nisi quando est epidemia maligna, pessima, et mortifera, quo nomine non modo sacer hic ignis malignus appellandus est, sed pestilens : his enim duobus vel Gal. teste pestis continetur ut morbus vulgaris

sit et plurimos perdat. Non me fugit existimasse non nullos, præter hæc duo, requiri tertium; nimirum, ut aëris vitio, morbis accedat. Et certe, cum pestis morbus communis sit, necessario communem causam habere debet : communissima omnium res autem aer. est. Quo nomine, ut plurimum pestes aëris vitio (ut partes illæ que a Galeno referuntur) communes morbi, et perniciosi oriuntur, qui procul dubio pestilentiis adnumerandi sunt. Cum varietas causæ, non immutet naturam effectus, idemque calor specie sit, qui a colore, et qui a frigore producit, verum tamen pestes quæ ab aëre non accedunt, minus communes sunt, aliis enim causis non sunt homines ita obnoxii. Sed ne amplius immoremur in quæstione de nomine, quæ semper quidem inutiliter exagitur, nunc vero non modo inutiliter, sed frustra; cum pestilens hic sacer ignis, causam habuerit non victus sed aëre, ut monstrabimus, nunc, agitandum de causis.

(Cap. VIII.)

Quid de hujus morbi causis alii senserint.

Non minor de hujus morbi causis inter medicos dissensio fuit, quam de natura. Nam quantum ad procatarecticas, alii luem hanc, ex *Hispania* fluxisse putabant, alii tribuebant morbi hujus ortum pestilentiae quæ priore anno in *boves* ingruerat, quidam causabantur *cometas* : sed sciscitati, quo modo fieri posset, ut sicco existente anno, qualis esse solet cometarum tempore, pestilens morbus grassari potuerit *Piscibus* (signum zodiaci) taciturniores evadebant. Cujus difficultatis nomine plurimi ad *occultas* et *abditas* causas confugiebant. Quantum vero ad interiores, quærebatur inter alios cur contagio *pueris* potissimum ob esset, natu grandioribus, parceret, quorum paucissimos læsit. Tribuebant hoc quidam puerorum naturæ humidæ, et delicatæ, quæ facit ut ad patiendum sint aptiores : maximam dicebant in generatione ægritudinum, partem habet ejus, cui passurus est habitudo corporis : quæ Galeno indice tantum potest, quantum aër, et cum ambo coeunt, tunc vulgares morbi oriuntur. Aliis hujus argumenti vim faciles eludebant; aiebant enim futurum ut in tenerior ætas magis esset morbis obnoxia, pestes quodlibet semper pueris primo nocere deberent, utpote omnium tenerissi-

mis; quod cum non accidat, alia enim pestis pueros, alia senes, alia juvenes lædere solet, necesse est ut non solum ob humidam et delicatam puerorum naturam accideret, ut contagio illis obesset, sed una cum ea causa, aliqua alia conjungeretur, ad constituendam hanc perculiarem analogiam. Hujusmodi erat inter hos controversio. Interim alii non minori contentione de gangrænæ causis certabant, putantibus quibusdam corruptionem illam in faucibus, accidere ob tumoris magnitudinem suffocato calore, aliis vero ob humoris qui eo fluxisset vitium, qui interrogati ut dicerent in quo consisteret humoris malignitas, et qua ratione putrefacret, ad ineffabiles formæ proprietates confugiebant.

(Cap. IX.)

Ex Hispania non fluxisse huc seminaria contagionis.

Credidit antiquitas, pestilentiam certos progressus facere, nec nisi a meridie in occasum solis rem posse, quod seccutus est Plinus lib. 7 suæ natur. Hist. cap. 50. Qua in re, inquit, observatum a meridianis partibus, ad occasum solis pestilentiam semper ire. Quæ si vera essent, argumentis non egeremus, ut planum fieret seminaria contagionis, ex Hispania, huc non fluxisse. Nam quamvis et Hispani, et nos, terras ad occidentem positas incolamus, quam ob causam utramque regionem Hesperiam, quasi occidentem Græci nominant, est tamen Hispania solis occasui magis proxima, cui comparata regio nostra orientalis appellari potest: atque ita inde, in hanc manare non posset ex qualibet mundi plago venti fluunt, ita ex qualibet contagionis seminaria pelli possunt, et attica pestis a Thucydide descripta, Orientem versus perrexit, ex Ægypto in Persidem transiens, quæ Ægypto orientalis est, verba Thucydidis sunt. Cæpit autem malum, ut aiunt, ex Æthiopia quæ est supra Ægyptum, inde in Ægyptum descendit, et in Lybiam tum in regiones amplissimas Regi subjectas. Manifestum est autem Regem a Thucydide cæterisque Græcis historicis intelligi regem Persarum. Cum ergo non in re scio nullam me allaturam demonstrationem existimo tamen quædam me allaturum argumentum quod meam sententiam versimillimam ostendit; quibus argumentis nisi moveret, sentirem profecto, ex Hispania, ad nos derivatum hoc

malum. Aiunt igitur qui adventitiam hanc pestem esse volunt, eadem symptomata utrobique esse atque id testari eos, qui de hoc morbo (quem Garottillo Hispani vocant) scripserunt: nec esse mirum si in aliquo leviter differre videatur, quando si ob varium corporis apparatus, pestis in eadem regione sævientis, non eadem in omnibus facies est, quanto magis in diversis. Contagionis vero seminaria, posse ex una regione in aliam irruere, non esse inauditum, quando celebrem illam pestilentiam quæ Athenis nocuit ex Aethopia manasse, opinatus est Galenus. Hæc ipsi, quibus libentissime assentirer, nisi obstarēt hæc. Nam prima, venti, qui duobus ab hinc annis ut plurimum spirarunt, fuerunt ii, qui flant a septentrione, boreas nimirum, et illius collateralis aquilo: hi autem pellere hinc seminaria possunt potius, quam importare. At dicent, spirarunt aliquando occidentales venti. Esto: demum potuisse plus qui rarius flarunt, quam qui frequentissime: sed dicant obsecro, quo corrupta pretio fuerunt seminaria contagionis, a tot gentibus, inter hos, et Hispanos interjectis, ut illis nequaquam læsis, huc irreperent? Præterea, cur multis annis antea, seminaria huc non fluxerunt? Quis illa nunc sollicitavit? Cum vel ab anno MDLXXXI in civitate Hispalensi visam fuisse luem hanc, testentur qui de hoc argumento scripserunt anno MDCVII, postremo si concedamus inde manasse pestis initium, adhuc investiganda causa erit, cur in Hispania grassari cæperit: si confugient ad aspectus siderum, et ad conjunctionem factam mense decembris anno MDCIII Saturni et Jovis, in qua adfuit aspectus sextilis Martis cæperat morbus (taceo conjunctionem hanc siccitatem afferre, et nos præter conjunctionem Saturni, et Martis, in primo gradu Gemi: factam die VIII. Junii anno MDCXVIII. apertiores hic habuisse siccitatis causas) jam multos annos antea. Respondent (est responsio Joannis Alphonsi de Fontecha) adfuisse tunc temporis, præter conjunctiones alias, cometa illum insignem anno MDLXXX. Sed his etiam temporibus cometæ visæ sunt; si ergo his tribuendo, est hujus pestis origo, opus non erit ad Hispaniam confugere argumentum ab attica peste desumptum, contra adversarios facit, cum illa, teste Thucydide, Lybiæ et Ægypto nocuerit, quæ regiones Athenas, et Æthiopiam interjacent. Quod si quis dicere voluerit, impor-

tata, huc fuisse seminaria in fomite, contra eum quoque, quæ diximus faciunt. Cur nimirum non antea importata fuerint, et quare non aliis regionibus, cum quibus Hispani commercium habent.

(Cap. X.)

**Sacrum hunc ignem, non quod calidus humidus sit,
sed quod calidus siccus, putrefacere.**

Age quoniam planum fecimus non modo calida humida, sed calida sicca posse putrefacere, videamus nunc siccitatem ne, an humiditatem habeat adjunctam calor, qui causa est, ut huic sacro igni gangræna superveniat a simili. Certe ille, qui in austrina, et humida tempestate Hippocratis tempore sæviit (cujus nos supra meminimus) carnem depascebat quod humor illius causa humidus esset et putris : ab exuperante humida (ut Galenus inquit) ventorum tranquillitate generatus. At hic sicut in contraria tempestate (in sicca nimirum), cometarum tempore, grassari cæpit, ita ob contrariam causam putrefacit. Sicci enim cum sint et maxime tenues ignem sacrum efficientes humores (sanguis nimirum et bilis) fauces liquat, non secus ac septica vocata medicamenta, quam septicam vim per siccam tempestatem induerunt. Ad quod confirmandum illud unum satis est firmissimum argumentum, quod alba redditur emortua caro, ut redditur cum septicis medicamentis colliquatur. Clarissime eventum hunc tunc cernere licet, cum ad excitandum fonticulum partem aliquam caustico inuri jubemus, quod a septica partium crassitie differt. Hoc ergo cutim cui adhæret excurit, et crustam excitat, tenuissima vero illius pars quæ cuti non adhærescit, sed penetrat et ob tenuitatem similis septicis est subjectam carnem eliquat, quo colliquatam jam, non amplius rubram, sed albam adspicimus. Quem non modo colorem, sed substantiæ modum puerorum fauces cum gangrena incipit habere sed cur alba redditur caro, quæ a septicis vel ejusdem naturæ humoribus colliquatur, et non potius nigra? septica sunt potentia ignis, hic autem atra reddere solet eo in quæ agit. Certe ignis est interdum causa coloris nigri, sed per accidens ; nam per se, cum rarefaciat, et extenuet, reddit, quæ immutat magis diaphana, ac proinde alba. Hinc illi ab Arist. non niger sed albus color tribui-

tur. q 18 sect. prob. Quærens cur lividi efficiantur qui rigent, quia gelatus (inquit) sanguis nigrescit propter caloris inopiam igni tribuitur. Cujus etiam sententiæ Galenus fuit 2 de fract. Sæpe enim (inquit) videlicet, quæ nigra sunt, cum incipiunt verti in pus, livida se ostendere: tum paulatim nigritie, amissa, ad ignis colorem accedentia, albidiora evadere. Per se ergo ignis semper est causa coloris albi; nigrefacit vero cum humidum comburit. Audiamus Aristotelem hoc ipsum dicentem: nigrum autem colorem fieri contingit (verba sunt illius in libello de coloribus) cum aër et aqua ob igne comburantur; quare et omnia ambusta nigrescunt, veluti ligna et carbones. Hæc Arist.; ita humor, qui ambustus in carbonibus relinquitur nigritiæ effectus est, quo tandem assidua ignis actione consumpto, albi cineres relinquuntur. Si ergo tunc ignis nigrefacit cum urit, septicum autem non urere, sed liquore et attenuare humidum supra monstravimus, non mirum sinon atro, sed albo colore carnem suffundant: tum quia illorum vi sanguis rubri coloris factor corrumpitur, qui nimium extenuatus in aliam multa tenuiorem naturam abit: tum quia caro colliquata rarior redditur, et humidum illius tenuius, et ærum magis. Albedinem vero omnibus, inquit Aristoteles, aër vaporosus præbet inclusus; aer enim pellucens albedinem facit. Atque hæc est causa cur carnis color ex rubro mutetur, in album septicis. Quo colore cum emortua tonsillarum caro suffusa conspiciatur, jure inde duximus argumentum ad monstrandum sacrum hunc ignem putrefacere ob siccitatem calori adjunctam, non ob humiditatem. Quod cum firmissimum sit, reliqua quæ afferri possent redeamus. Si enim argumentis adhuc egeremus, vel ex eo quam maxime sententiam hanc confirmare possemus, quod semper affectus hic, vel in siccis natura regionibus, vel in siccis tempestatibus ortum habuerit; nam primo pestilentia illa Aretæi ulcera (quibus et huic sacro igni eodem fere symptomata superveniunt) potissimum color albus, et gangræna. Ægyptus, et Syria regiones siccissimæ procreant unde Ægyptiacum et Syriacum id genus appellant, quia in his regionibus (verba sunt Aretæi) aër spirando siccus attrahitur. Præterea hic idem morbus in Hispania sicca regione ad plures annos grassatus est, ut testantur, qui de hoc argumento scripserunt postremo hoc Neapoli cometarum tempore, in tempestate sicca in

siccioribus suburbiis sævire cæpit. Quæ omnia non modo sacrum hunc ignem ob siccitatem calori adjunctam putrefacere confirmant, sed præcipuam causam morbi hujus siccitatem fuisse.

(*Cap. XVI.*)

De signis prognosticis generatim.

Veniamus nunc ad signa prognostica, qua in re quærenda sunt duo: primum quidem quid predicendum ut de hoc morbo generatim, deinde speciatim, cum jam Galliam, invasit. Quod ad primum spectat, quæri possunt de hoc morbo tria: primum quidem, adhuc ne perduraturus sit: præterea, num futurum sit, ut natu grandioribus noceat: postremo, num malum alias Regni hujus regiones invasurum sit. Quæ præcognoscere, res est non præclara minus, quam ardua: quæ autem physice dici possunt sunt satis pauca, neque omnino certa; dicentur tamen et nobis, ne videamur aliquid omisisse quod ad hoc argumentum spectet. Credidit Cardamus, pestem omnem, nonnisi triennium sævire posse: apud quem, facilis res est pestium perduratiorem præsagire. Quæ sententia quam vera sit, examinandum relinquamus Scaligero, arguto non minus, quam acuto illius censori. Neque proferenda a nobis nunc erunt exempla multa pestium, quæ plus triennio sævierunt; sat erit proferre hoc unum, sumptum ex hoc eodem postilenti faucium affectu, quem ad multo plures annos in Hispania sævisse scimus. Ob quam primo historiam, vereor ut hac hyeme, vel vere proximo lues hæc non extinguatur, ut quosdam sentire intelligo. Præterea, non aliter possumus futura prædicere, naturæ vestigiis insistere, quam si præsentes causas intereamus, præcipuæ autem caulæ mali hujus, fuerunt, ut monstravimus, siccitates, et crebræ temporum mutationes, quæ cum adhuc perseveret non possumus non vereri, ne diutius perduratura sit hæc lues: eo vel maxime, quod hoc anno, die XXVII Junii, iterum Mars, cum Saturno, in *Geminis* conjungetur: quæ conjunctio cum siccitate inferat, una cum aliis causis (sola enim ipsa adeo metuanda non esset, quæ secundo quoque; anno fit, tametsi non semper in eodem signo) luem hæc conservata facile poterit. Sperandum tamen est, non modo futuram post hac miti orem, cum causæ quæ perseverant non sint ejusdem efficacisë, et vis

tempestatis illius pluviae et humidæ, quæ non parum contulit, ut lues hæc gravior esset, tempore semper magis debilitata: verum quoque, non tandiu hic perduraturam, quamdiu in Hispania perduravit. Nam si morbus hic in Ægyptio et Syria patrius est, Areteo teste, ob nimiam regionum illarum siccitatem, non mirum si in Hispania semet exortus, ad multos annos grassatus fuerit; nam et ipsa sicca regio est. Nostra vero, cum humida potius quam sicca sit, tandiu lues hanc fovere non poterit. Num vero grandiores natu invasura sit, res est quæ prognostico non indiget: jam enim cæpit in eos ingruere. Non tamen in eos, sicut in pueros grassabitur, et paucissimos necabit; nam quæ fecerunt ut malum in pueros potissimum sæviret, faucium nimirum mollitudo atque teneritas cerebrum, quod facillime superfluitatibus repletur, nunquam in gradioribus natu conjungi poterunt. Quantum vero ad urbes spectat, jam lues Campaniam omnem populari cæpit; reliquæ civitates, et oppida, potissimum quæ non multum à Campania distant, sine sollicitudine esse non poterunt; facile enim in eas contagionis seminaria manare poterunt. Sed hæc omnia ut diximus, ex iis sunt que non habent multum certitudinis. Si quid autem mali anguratus sum, in ea me deceptum finalem, quam quod erat affectum, atque illud precor, quod cum de peste agit Virgil. precatur.

(*Cap. XIX.*)

De signis gnosticis.

Quamvis, morbi hujus signa, tacite jam expressa fuerint, operis initio, cum narravimus symptomata omnia, quæ lue affectos comitantur, ex quibus, tam quam ex manifestis sensui, morborum signa sumuntur: verum quia tum historicum potius quam medicum egimus, ne aliquid desideretur, quod ad argumentum quod tractandum suscepimus spectare videatur, quando de causis egimus, ipsamet ordinis ratio postulat, ut de signis agamus. Cum autem affectus cujus signa exponenda sunt, sit sacer ignis malignus, in faucibus, alia erunt signa illius ut est sacer ignis in faucibus, alia ut malignus est; illa desumuntur ex propriis symptomatibus, quæ una cum morbo invadunt, hæc ex iis quæ superveniunt. Signa ergo morbum indicantia sunt, exiguus tonsillarum et proximarum partium tumor, et rubor

quidam igneus (ut ita dicam) qualis comitari solet vero erysipelata, faucium dolor, et læsa deglutitio, quorum alia affectus signa sunt, alia affectæ partis. His febris adjungitur acuta; omnia autem hæc, simul incipiunt cum ipso morbo. Quæ vero illius malignitatem significant, primum quidem (quod eodem, ut plurimum, die se ostendit) est mutatio coloris inflammatæ carnis ex rubro in album indicium liquationis et gangrenæ a simili, præterea vox obscura antequam pituitosa fluxio irruere incipiat. Sed quo modo vox obscura esse poterit malignitatis signum? Nonne (ut taceam alias causas) tumefactis, vel irrigatis tantum aquæ pituita gutturis membranis, lædi potest vox? ita sane verum, vox obscura in hac lue affectis malignitatis signum est, non per se, sed quia signum est liquationis et putredinis jam cæptæ, quàm esse causam obscuræ vocis inter initia, antequam œdema supervenerit, diximus supra. Hinc ego pluries ex sola vocis læsione cognovi adesse jam in faucibus vocatum ulcus; læsa enim in his erat vox, non ut per raucedinem lædi solet, sed alia quadam peculiari læsionis specie, quæ verbis non potest exprimi sed exemplo, qualis nimirum solet in iis esse qui fauces habent ulceratas ex lue gallica. Ita obscura vox, per acciders signum esse potest sacri hujus ignis maligni. Sed his dein alia adjunguntur: tumor nimirum œdematosus cervicis, qui superveniens non juvat, sed lædit, fætida exspiratio, faucium sphacelas, et denigratio. Verum tunc jam malum vel vulgaribus cœpit distingui autem quando color lividus et niger, gangræna suffocatio sequitur, quando adest qui putredo (nam utrinque causam habere potest, ut diximus capite superiori) et facilis res est. Nam ubi ob gangrænam supervenit, præcedit lividum colorem tumor magnus, eoque colore suffusa cernitur, non modo exesa carnis facies, sed etiam illius, quæ exesa non est, et sola inflammatione laborat; color vero niger vel lividus, qui putredinem solam comitatur, magno tumori non conjungitur, et in exesa tantum carne adspicitur.

(Cap. XVIII.)

De præservatione.

Antequam quicquam de curatione dicamus, præservationi exponendæ dabimus operam, nam quanto optabilius est integris

viribus esse, quam eas afflictas habere tanto gratius eo audire, quibus fiat ne æger unquam sis, quam ea, quibus fieri potest ut ex ægitudine convalescas. Instituamus igitur de præservatione questionem. Præservari possunt vel integræ societates, vel homines singuli; quantum ad urbes attinet, res solis precibus agenda erit, nam Hippocraticum illud ex igne petatum auxilium ad aërem purgandum, quo Mæonem quoque usum fuisse testatur Plutarchus, ut in suffocato cœli statu et in austrina tempestate utile, ita in sicca inspectum est; relinquitur ergo, ut quæ ad præservandas singulos facere possunt, a nobis tradantur. Agitur præservatio omnis removendo causas, non externas modo sed internas; sunt autem externæ causæ hujus morbi, aëris intemperies et contagium: quæ non aliter quam *fuga* vitari possunt, si vitemus non modo domos sed vicos et urbes in quibus malum grassatur. Sed hoc neque ab omnibus fieri potest neque semper juvat, non enim illos qui jam ab externa causa mali occasionem contraxerunt. In eo ergo spes omnis posita est, ut internæ causæ removeantur. Sunt autem internæ causæ redundantia calidorum succorum, bilis nimirum et tenuissimi sanguinis, et redundantia pituitæ, qui succi evacuandi erunt, maxime calidi; nunquam enim frigidi nocent, nisi calidi nocere cœperint. Præmissa ergo missione sanguinis, corpus erit expugandum manna, et syr. ros. solut. cum agarei decocto, ac dein semper alvus evacuanda erit. Verum quia succi isti, non omnes nocent, sed qui continentur in capite, neque semper, sed cum in fauces irruunt: vitanda erunt omnia quæ caput superfluitatibus replere solent et exasperare fauces. Caput implent repentinæ mutationes aër, et indumentorum mora in locis humidis vel sub nocturno cælo vinum. Exasperant fauces pulvis in guttur effluens nimius vocis usus præterea vociferatio quæ omnium maxime declinanda erit: Nam in illa anginarum pestilenti constitutione, sexto epidem. descripta, refert Hipp. eos, qui vocibus amplius se fatigarunt, anginis magis correptos fuisse. Crediderunt nonnulli, nil ad præservandum facere magis quam fonticulos aperire in occipite vel in brachis, per quos facillime cerebri superfluitates repurgantur. Ego in hac re dicam adjuvare potest: inustionem occipitis, nullo modo probare possum, nam hoc remedium evacuat potius, quam revellit

capite; hinc inter curativa potius quam inter præservativa auxilia connumenari poterit; metuendum præterea est, utpote quod facile possit fluxionem ad proximas fauces concitare. Brachii vero inustio nocere non potest, verum non est remedium præsentaneum, lente enim, et post longum tempus revellit a capite noxios humores. Si ergo alio nomine juvare possit, hujus morbi causa, accelari poterit. Præter hæc alexipharmacorum usus posthabendus non est. Qua in re est illud adnotandum, eligenda esse inter hæc illa quæ ex manifestis qualitatibus caliditatem adjunctam non habent; semper enim illud memoria firmiter tenendum est, primam malo originem calidos humores præbare, quorum calor medicamentis et victu temperandus est, non augendus. (Cap. XXI.)

De auxiliis chirurgicis.

Auxiliis chirurgicis modo ad revellendum utimur, modo ad evacuandum. Agemus primo de revellentibus, nam præcedit natura sua revulsio evacuationem. Inter revellentia primum sibi vindicat locum sanguinis missio: quo auxilio an in pestilentiis utendum sit, res est controversa et plena dissensionis inter medicos. Sed mihi nunc non est frustra exagitando hæc controversia, nam quoad in pestilentibus affectibus venam secari jubeamus, prohibere possunt duo: virium imbecillitas, et metus ne *contagionis seminaria e poris cutis in venas attrahantur*. Cum hoc vero morbo, neque virium languor conjungitur, neque seminaria toti nocent, sed determinatæ partes. Quam cum primum lædere incipiant, revulsio per sanguinis missionem jure fit. Poscit hoc idem auxilium affectus ipse, qui ab inflammatione incipit, et acuta febris adjuncta. Revellunt quoque cucurbitulæ scarificatæ in humeris, quæ etiam inter initia multum conferre poterunt. Nam vessicatoria revellunt et ipsa, sed serius quam perniciosa morbi hujus celeritas non patitur. Est autem in hac re animadvertendum illud: nimirum, in hoc sacro igne, non esse mittendum sanguinem in ea quantitate, sicut in angina exquisita mitti solet, quæ necat strangulatione orta ex magnitudine inflammationis. Neque dandos esse missionibus sanguinis plures dies. Meminisse enim oportet causam mali esse bilem

et ferventissimum sanguinem, qui natura proximus bili est, deinde vero et pituitam quibus expurgatio debetur; et larga nimis sanguinis effusio nocet. Pervulgatum est apud medicos axioma, frenum esse succorum omnium sanguineus, et sua mediocritate frigidos nimis et calidos moderari. Prima ergo dies danda revulsionibus erit, quo in secunda corpus expurgari possit. Secari autem præcipientur venas in brachiis, mox scarificari humeros, nisi aliunde incipiendum in natu grandioribus, retenta aliqua evacuatio suadeat. Me non latet, invaluisse nunc apud quosdam usum mittendi sanguinis (ne aliquid intentatum reliquisse videantur) ex pedibus, in omnibus hac lue affectis nam oportet (inquiunt) quam longissime ab ea parte, in quam succi irruunt, humores revellere. Sed me tritum hoc et commune argumentum nil movet; cui si standum esset, non modo in hoc sacro igne, sed in affectibus omnibus capitis, thoracis et jecoris, partiumque omnium quæ supra renes sitæ sunt, inchoanda semper curatio esset amissione sanguinis ex pedibus; quod tamen neque ipsi observant, neque faciendum est; nam, quamvis revulsio semper fieri debeat humores retrahendos in contrariam partem, non tamen semper a superioribus in inferiora. Cum non modo contraria sint inferiora superioribus, sed dextra sinistris: externa internis; anteriora posterioribus. Verum hæc argumentis confirmare hujus loci non est, exagitando hic tantummodo sunt ea controversiæ, quæ ad argumentum spectant, quod tractandum suscepimus, non quæ communes sunt omnibus morbis. Satis sit nunc admonere, multo utilius in hac lue sanguinem mitti ex brachiis, quia una simul et revulsio et derivatio fit, quod maxime optandum est in acutissimo morbo, qui intra quatuor, vel quinque dies perimit. Hactenus de revellentibus venio ad evacuantia. Placuit quibusdam in hoc morbo secare venas sub lingua, alii admoventur hirundines, collo mihi nulla istarum evacuationum unquam pobari potuit. Nam cum tumor superveniens ex sanguine non oriatur, sed ex pituita, frustra adhibentur ea auxilia, quæ ad sanguinem ex parte affecta evacuandum exagitata fuerunt. Præterea his evacuationibus, educto sanguine, redditur calor partis imbecillior, qui deinde superatur facilius, atque ita præstatur occasio, ut gangræna et corruptio major superveniat. Adhibuerunt quidam in Hispania

vessicatoria collo, quorum usus nocere non potest, prodesse tamen aut parum aut nihil potest. Antequam enim ab excitatis ulcusculis sanies manare incipiat jam sphacelos nocuit, et imminet mors; itaque frustra ad evacuandum adhibentur. Quo nomine hoc auxilio numquam usi fuimus neque plura sunt, quæ de chirurgicis auxiliis dicenda censeo.

(*Cap. XXIV.*)

CORTESIUS

**Epistola Joanni Antonio Anguillonio classis Triremium
Sacrae Religionis Equitum Hierosolymitanorum Archiatro
dignissimo.**

Abdita naturæ vi humani generis pectoribus, incertum est, ut obviis quibusque et passim occurrentibus malis, aut non ita sedulo consideratis, in ea omnem animi contentionem omnemque diligentiam adhibeamus, quæ aut novitatis aliquid præ se ferant, aut quam rarissime evenire compertum habeamus. Nihil igitur mirum si Parthenopœi Medici in exordio strangulatorii affectus, qui Neapolitanum regnum primum, mox universam Siciliam insolita sævitia invadens plurima puerorum millia e medio abstulit, omnes nervos tum disputationibus, tum scriptis in lucem editis ad naturam illius causas curandi, ac præservandi moda pervestiganda intenderint. At nos quoque eodem morbi summe primum exorientis essentiam indagandi cupido incessit (quid ni enim et homines sumus, et nobis medicis novus morbus offertur). Quare dum hic esses cum tuis Melitensibus nihil aliud in nostris suavissimis mihi colloquiis pertractatum, quam de hujusmodi affectus origine, progressu, atque curatione. Sed quia antiqua ex hac urbe profiscereris, haud mediocriter a me efflagitasti, ut quicquid super ea re meditatus fuerim, calamo vel currente exararem, ea propter ut tuis honestissimis votis a me, quoad fieri potest, satisfiat, haud prolixa oratione cuncta ad exactam rei notitiam attinentia perstringere decrevi. Cæterum vellem, mi Anguilloni, persuasum habeas, nihil gratius mihi contingere posse, quam si hæc licet levia, quæ ut tibi morem gererem conscripsi, læto animo exceperis; sic enim video nec re inscisse, ut pœniteat, quod quam maxime desiderandum mihi esse arbitror.

Morbus hic, cujus naturam scire optas, respirationem sed maxime deglutationem lædit, nullumque aliud nomen in hac urbe adeptus est nisi gulæ morbum, eo quod appareat partes

spectantes ad gulam ita læsas esse, ut etiam deglutiendi actio plane lædatur. De eo varie quidem multi auctores Parthenopæi hactenus scripserunt, sed inter se parum constantes sunt, si nomen sive essentiam consideremus; alii enim affectum strangulatorium, alii phlegmonem anginosum, alii pestilentem faucium affectum, nonnulli epidemicam gutturis luem, et aliqui tandem variis nominibus pro varias ipsorum opiniones designarunt; et hæc quod ad nomen.

Quod spectat ad essentiam, alii scribunt eum esse aphtas malignas, alii arbitrati sunt reponendum esse in genere carbunculorum, alii intrepide pronunciarunt esse anginam, qui inter se tamen divisi sunt; nam horum aliqui existimarunt esse anginam proprie dictam, alii e contra anginam lato modo et improprie acceptam, alii determinarunt esse erysipelas, seu ignem sacrum faucium, alii denique putarunt esse inflammationem proprie dictam, quam phlegmonem Græci appellant, quorum omnium sententiæ rationibus, et autoritatibus gravissimorum auctorum videntur confirmari, quas sane hic recensendis nec tempus nec locus est; mea enim intentio est tibi quam brevissime possum satisfacere tractans de affectione ea, quæ per hanc civitatem vagatur, non autem de Parthenopæo morbo a variis scriptoribus, ut dictum est, declarans; hujus enim naturam minime nisi ex aliorum scriptis agnovi. In hoc igitur describendo morbum dicam primum quæ partes afficiantur; deinde describam morbum ipsum, et quæ symptomata ipsum sequantur; tandem, quid pro ipsius curatione per unumquodque Medicinæ instrumentum fieri oporteat. Hæc affectio lædit pharyngem, quæ est pars oris continens multas alias partes a Johanne Baptista Carnevale pulchre descriptas; sunt vero partes istæ ore adaptato conspicuæ, ut palatum in cujus fine adest uvea vocata, seu gargareon, quæ est portiuncula quædam carnea recta a palato ad linguæ basim; describit hanc partem, et inquit, quando præternaturalis est a quapiam fluxione a capite, si oblongior fuerit, columella appellatur, at si crassior ab ima parte et rotunda, uva dicitur; nihilque magis conspicue ore adaptato apparet quam faciant hujusmodi cavitates, sub quibus ad latera utrinque situatæ sunt glandulæ duæ, quos antiades Græci, nostrates vero tonsillas atque amygdalas appellant, et

istæ sunt omnes partes, quæ ab hoc proposito morbo læduntur.

Affectus autem fuit morbus in mala compositione nempe in magnitudine prædictarum partium adaucta præter naturam. Modus erat diversus, nam aliquando pars extrema palati rubicunda et inflammata simul cum ipsa uva apparebat glandulis, nonnunquam et sæpius glandulæ prædictæ intumescabant cum calore et rubore primum, deinceps cum dolore et magna deglutiendi difficultate; nonnunquam adeo tumidæ erant, ut ad invicem se contingerent, viam ad deglutendum et respirandum intercludentes; igitur omnes istæ partes aliquando sola inflammatione, nonnunquam solo erysipelate, interdum omnes simul corripiebantur uno vel altero affectu. Verum si ad hunc remansissent modum, hoc est vel inflammatione vel erysipelate facile ægrotantes liberati fuissent, sed ad prædictam partium inflammationem subsequebatur interdum materia quædam pituitosa a capite tam repente et inopinato descendens, ut miseri ægrotantes subito suffocarentur. Non raro apparebat materia quædam alba in superficie, quæ paulo post ad livorem, deinde ad nigredinem absque dolore mutabatur quod gangrænæ signum est manifestissimum, verum in *sola superficie* esse sensus iudicabat, et quod magis est, videbatur a *subjectis partibus* facile *divelli* posse.

Si quis tamen vel digitis, vel aliquo instrumento levi ipsam auferre tentasset, quamvis operatio hæc fieret absque dolore, ea tamen ablata brevissimo tempore peribant ægrotantes, quod præ cæteris in Petri filiolo observatum est, cui quum huiusmodi mortificatio apparuisset in suprema superficie dictarum glandularum faucium et palati, cum crusta videretur esse obnoxia respirationi, et deglutationi, chirurgus existimans posse facillimo negotio a subjectis partibus eam separari solis digitis, levissime quidem eam abstulit, qua ablata tantum abest, ut juverit deglutationem, aut respirationem, aut potius utraque actio læsa magis fuerit unde brevissimo tempore miser secum maximè dolore mortem appetiit, id quod etiam quam plurimis pueris sæpius observavi, et præsertim in ejusdem Petri filiolo nepoti ex filia quinque annorum mihi carissimo qui post paucos dies eodem modo quo pater vitam cum morte mutavit.

Aliquando, ut dixi, harum partium unam tantum vel duas, vel

etiam omnes simul hujusmodi mortificatio celeriter invadebat cum fœtore, et ubi tale symptoma apparebat, sive cum fœtore, casus omnino erat deploratus, omnia enim medicamenta tam intus quam extra frustra admovebantur, qui ægrotantes celeriter moriebantur, nonnunquam in quarto die, et citius etiam, raro septimum diem attingentes, et quod miserabile admodum erat, observebatur in una et eadem domo *plures periclitari*, et absque auxilio interire. Medici propterea plerique admirantes celeritatem, qua ad mortem ducebantur ægrotantes, in varias ibant sententias de natura hujus affectionis; nam aliqui gangrænam illam jam dictam in extima superficie tantum lædere dicebant, unde eam referri debere ad malignas et pravas aphtas, de quibus dicebant Celsum locutum fuisse lib. 2 cap. 1 et Aetium lib. 8 cap. 39 Verum ab his auctoribus aphtæ describuntur ulcerationes superficiem tantum oris et partium illius in pueris lædentes; at erraverunt, nam experientia offendit, quod longe profundius hæc affectio serpebat, et adeo deposcebatur partes subjectas, ut ad gangrænam eas reducerent ut dictum est; quare putantes esse aphtas decepti sunt hoc præsertim argumento, quod tam subito ad mortem ægrotantes ducebantur, id quod in aphtis nusquam observatum fuit. Alii vero animadvertentes in tonsillis ulcus non dissimile esse iis quæ a ferro ignito fieri consueverunt, putabant esse carbunculum; sed et ipsi decepti sunt, cum jam mortificandæ essent partes, et gangræna ita irrepebat, ut actiones præcipuæ, deglutienti scilicet, atque respirandi brevissimo tempore abolerentur et hæc fuerunt pessima hujus affectus natura atque symptoma.

An modo *contagiosus* fuerit hujusmodi morbus, non advocat suspicionem; nam multi medici observantes tot interire, et præsertim *in una et eadem domo* et tam frequenter, cogitabant omnino morbum esse *contagiosum*. Et quemadmodum fieri consuevit id tam frequenter calamitate interim, ubi homines inter sese colligunt rem ipsam admirantes, multi adversus Medicos susurrabant, quasi culpa ipsorum tot morerentur; putabant enim quod cognito morbo statim subsequi debebat sanatio, quod tamen non est semper, ut optime scitur, verum quia licet absque morbi cognitione vix credibile posse morbum sanari; non tamen sequitur semper quod morbus cognitus si est, illico curetur, idque ob multiplices

causas sic cancro apparet, qui quamvis ab omnibus cognoscatur nihilominus raro curatur. Dicebat aliqui susurrones ad cognoscendum morbum opus esse aliqua cadavera horum morientium dissecare, et explorare posse, unde veniat cur tot moriantur. Interdum adeo frequens erat concursus hominum otiosorum varia inter se loquentium, et in medium afferentium nescio quid, de quodam malo in corde nato, qui hujus necis tam frequentis erat causa, ut facile illustrissimo hujus urbis senatui persuaverint, ut juberet medicos inter se convenire, anatomenque in aliquorum defunctorum celebrare, id quod minime fieri licebat, cum anatome vulgaribus non admodum admittatur, imo vero potius *ea odio habeatur*; putant enim quod si permitterent aliquod cadaver ex suis affinibus *sectioni exponi afficiendam esse injuriam*, ac dedecus. Verumenimvero cum senatui ostendimus, et multis quidem rationibus cadaverum sectionem ad cognoscendum hunc morbum esse prorsus inutilem, desistuerunt senatores ab hujusmodi requisitione. Et certe si exploremus naturam hujus affectionis, videbimus sum naturam cognitam esse, et vix tamen esse curabilem non tam ratione sui, quam partium affectarum causa, quæ lesam deglutitionem (ut dictum est) statim et respirationem inhibent, unde est, quod est, quod ut plurimum suffocati patientes moriantur.

Sed præter multitudinem causarum, quæ contagionem aliquam præ se ferre videbantur, est etiam *respiratio*: nam in tractatu de febre maligna ostendi febrem malignam contagiosam esse, non simpliciter, sed per *solam inspirationem* et expirationem. Anno præterito contigit res digna auditu; Divi. Francisci Custos, vir doctrina et moribus insignis, hac lue obsessus, tonsillas solummodo, et gargareonem inflammatione læsas habebat, et continuo querebatur ne percipere in ore fœtorum quendam, et ut hac de re certior redderetur, ad se vocavit Baccalaureum quendam sibi amicissimum, qui maximo affectu assistebat, rogavitque, ut vellet olfacere percipereque naribus, an verum esse talem fœtorem emittere, an ab imaginatione ejus prodiret; olfecit Baccalaureus me præsentem, et multis aliis, at statim non multis elapsis horis decubuit sola faucium et glandularum inflammatione vexatus absque aliqua manifesta corruptione partium, omnibusque præsidiis ex arte frustra factis, quarto die

suffocatus periit, et tamen Custodem non tetigerat, sed solo olfactu aërem ab ore prodeunte naribus traxerat, quare ab hujusmodi exemplo veni in sententiam hunc morbum non esse absque aliqua contagione. Non idcirco tamen judico ipsum esse contagiosum immediate sed per medium aërem inspiratum, et quamvis non me lateat aliquos hanc *specimen contagionis* appellasse *ad distans*, eo quod ab inspirato aëre exeunte a faucibus ægrotantis prodeat, et per cubiculum multiplicetur, nihilominus puto probabilius aërem exspiratum, et ab alio inspiratum posse dici contagium mediatum, non immediatum, quod non fiat a vero et immediatò contactu. Hanc opinionem de duplici hoc contagii specie referies in Epistola 200 apud Laurentium Scholizium his verbis :

« Contagium, hoc est transitus morbi de corpore in corpus, quod fit per contactum vel mediate vel immediate; immediate est quum corpora sese absque ullo medio contingunt, et labem mali communicant, sicut fit in scabie et morbo gallico per frictionem; mediate autem intercedente alio corpore, nempe aëre per aerem contagium communicato inspirando et expirando, ita ut aër vehiculi rationem habeat. Nunquam mea opinione observatum fuit in toto hoc morbo fuisse aliquem a vero, et immediato contactu correptum, sed ut dictum est, per inspirationem et expirationem. At inquires fortasse, an vis hujus contagii fuerit in putredine fixa, ut videtur esse communis opinio eorum, qui de natura contagii tractant; respondeo id evenire ut plurimum, cum semina contagii lenta et viscida sint, et propterea non separari a putredine; non est tamen inconveniens quod vapores acres, et aridi ab ore ægrotantium manantes non possint a proximo halitu attrahi, atque ubi semel faucibus adhærerint, humescere et (ut inquit Mercurialis) lentescere absque ulla putredine, aut saltem exigua simulque cerebrum et universum corpus ejus, qui aërem inspirat, contaminare, et interficere tandem, ut evenisse Baccalaureo supra dictum fuit, is nam contagium est vapor quidam fortiter commistus a tota substantia dissimilis corporis humani, de quo loquens Capivaccius in epistola quadam adversus Thomam Erastum dicebat contagium aptum esse inducere corporibus nostris non modo intemperiem sed malam compositionem, et solutionem continui.

Morbum igitur hunc contagiosum esse putamus non ad distans, neque per fomitem. Non quidem ad distans, quia hic observatum non est aliunde provenisse, quemadmodum Thucydidem et Galenum scripsisse scimus de seminariis illis pestis, quæ per aërem ex Æthiopia Athenis fuerunt delata; neque per fomitem dici poterat contagiosus, cum multoties observatum sit post mortem eorum; qui hoc affectu interierunt supellectiles aliis datas nulla intulisse læsionem. Neque dici potest contagionem ex immediato corporum contactu; experientia enim rerum magistra ostendit et matrem et patrem cum filiis decubuisse, et tamen nulla ratione affecti sunt, etiam si ægrotantes interierunt. Adde, ex illis, qui præfuerunt curationi ipsorum ægrotantium, nullum observatum fuisse ex contactu suscepisse morbum. Relinquitur igitur dicendum ex *contactu mediato* ipsum fuisse contagiosum nam ex expiratione facta malignitas communicabatur aëri *cubuli*, in quo agebant ægrotantes, quæ per inspirationem ab alio potuit producere morbum, eo modo quo diximus de febre maligna.

Causæ hujus morbi aliæ sunt non naturales, aliæ præternaturales, et aliæ naturales; inter non naturales aërem fuisse pro certo habeo, non quod fuerit ad substantiam male affectus, sed quia ad qualitates valde alteratus, et varius; nam modo calidior quam requirebat anni tempus, modo nebulosus, et ventosus erat. His quippe duobus annis ventus australis semper prædominium habuit, et aerem spirarunt quidem, sed non more consueto; autumnus varius fuit; modo enim siccus, modo humidus, in summa magis fuerit frigidus et siccus quam frigidus et humidus. Hyems et ipsa varia, et inconstans fuit spirantibus, ut plurimum ventis australibus. Ver, quod sua natura debet esse temperatum, frigidum, et humidum fuit, et valde inconstans. Ab aëre autem ita affecto morbos communes fieri scripsit Hippocrates lib. I epidem. et Galenus, in comment.

Alimenta quoque, et potus inter res non naturales suum in hoc generando morbo locum habuerunt, non modo sua culpa, nam ubi tempora anni non servant suam propriam naturam, necesse quoque est ut omnia quæ ab ipsis fiunt non recte et ut decet, et substantiam et qualitatem recipiant. Gal. 1 epidem. dicebat aërem inspiratum tali dispositione corpora nostra afficere, quo

ipse est præditus, quod idem de aliis corporibus intelligendum est. Sed ob inordinatum et intempestivum modum, quo nonnulli horum humorum in aliis pituitosorum in aliis biliosorum copia magis in aliis melancholicorum aderat pro diversitate scilicet usus, seu abusus rerum non naturalium jam dictarum; et pro varia corporum complexione, ætate, consuetudine, et exercitio, quæ sunt causæ naturales, unde mirum non est, si modo phlegmon, modo erysipelas phlegmonosum aut œdematosum faucium in hominibus comperiebatur. Verum non videtur esse inconveniens, si in hominibus hujusmodi species inflammationum grassetur, cum evenire possit pro diversitate victus rationis, verum in pueris apparet aliqua difficultas, unde sit quod ex iis plures in hanc affectionem incidant quam ex adultis, cui quæsito videtur ex Gal. respondendum esse, qui de sanitat tuend. scribit : pueros morbis a fluxione et redundantia enatis maxime tantari, cujus rei ratio est, quia fluxiones a capite prodeuntes, non nisi ratione alicujus materiæ contentæ in cerebro eveniunt, quæ in pueris ob inordinatam victus rationem, cerebrique mollitiem et humiditatem facillimo negotio vel ibi generatur, vel aliumde transmittitur, et cum a calore naturali discuti nequeat, vel a frigidityte expressa, vel a caliditate liquefacta a facultate cerebri expultrice ad viciniore partes et imbecilliores expellitur. Cum itaque inter partes imbecilles imbecillimæ omnium sint glandulæ, et partes quæ ad ipsas sunt, ut est uva et tonsillæ, quiquid humoris a circumvicinis partibus propellitur, facile recipiunt, et cum pueri sua natura molliores sint adultis, necesse est, ut partes jam dictæ ad fauces existentes sint mollissimæ, et laxissimæ, ac proinde magis aptæ ad hujusmodi impressiones recipiendas; hinc igitur est, cur pueri frequentius ab hujusmodi morbo corripiantur, et istæ sunt causæ exteriores, quæ ad hunc morbum faciendum concurrunt. (*Miscellanea medica*)

SUMIÈRE

Observation sur une espèce de fièvre gangreneuse.

Ce fut le matin que je le vis (il s'agit d'un malade âgé de 40 ans) : sa fièvre était tombée, son pouls était petit, quoique fréquent : la chaleur était à peu près naturelle ; mais il avait paru sur le visage, et principalement à la lèvre supérieure, aux joues, sur les os de la pommette, au nez et aux deux sourcils une éruption gangreneuse qui tuméfiait beaucoup les parties, et qui le rendait affreux ; l'intérieur de la bouche était parsemé d'aphtes noirs ; on en voyait une rangée le long des dents molaires de la mâchoire supérieure du côté droit ; il suintait un ichor séreux, jaunâtre, et extrêmement fétide des boutons qui étaient sur la face ; il était difficile de soutenir l'odeur cadavéreuse qui s'exhalait de ce malade, et surtout celle que répandait la fumée épaisse qui accompagnait le souffle qui sortait de la bouche, lorsqu'il l'ouvrait ; sa voix s'était déjà fort affaiblie : il se plaignait d'une douleur sur le devant de la poitrine. On me montra le sang qu'on avait tiré de la dernière saignée ; il s'en était séparé peu de sérosité jaunâtre, et la partie solide ou coaguleuse avait la superficie couenneuse et marbrée, d'une molle consistance. » Suit le traitement à l'ipécacuanha, etc... Le 10, « les aphtes gangreneux avaient gagné toutes les gencives du côté droit, et la gangrène s'était répandue dans toute la bouche et s'était étendue vraisemblablement jusque dans l'œsophage, et peut-être dans la trachée artère... Il lui fut ordonné un gargarisme à l'eau de rose camphrée... Le 11, il avait perdu entièrement la voix ; un chirurgien fut appelé et lui fit des scarifications dans la bouche, qu'il toucha ensuite avec une plume trempée dans du miel rosat avec de l'esprit de vitriol. Il fut soulagé, et cependant il avait toujours la voix couverte et il signifiait qu'il avait encore beaucoup d'embarras dans son gosier et dans la poitrine.

Il continua le traitement, mais malheureusement la gangrène ayant fait des progrès dans l'œsophage, et peut-être dans la trachée-artère et les poumons, il mourut.

(7 de med.)

DUBOUEIX

Angine membraneuse.

Quatre enfants d'un fermier, après un dégel de la fin du mois de janvier 1781, avaient passé la plupart du temps à la pluie ayant leurs vêtements et leurs chaussures mouillés. Leur habitation quoique sur un terrain pierreux et élevé était entourée de fumier et de mares infectes.

Ces enfants étaient :

1° une fille âgée de six ans, attaquée depuis huit jours.

2° un garçon de huit ans pris depuis six jours.

3° un garçon de trois ans et demi que M. Duboueix trouva expirant.

4° une fille de cinq ans attaquée depuis deux jours.

Ces enfants étaient tous d'un tempérament robuste et replet.

La maladie s'était déclarée avec les mêmes symptômes sur les quatre sujets : par un dégoût pour les aliments, par une respiration fréquente et difficile, par une voix rauque et aiguë, par une douleur à la partie inférieure de la trachée artère avec un léger gonflement au-dessous du cartilage thyroïde.

Le poulx dans les trois premiers était, dans le commencement, fréquent et plein. Dans la suite M. Duboueix le trouva mou et déprimé, excepté à la petite fille n° 4 qui n'était qu'au deuxième jour de la maladie. Sur la fin le visage devenait bouffi, d'un rouge violet ou livide.

Dans ces trois premiers enfants ces symptômes augmentèrent par degré jusqu'à la fin. Ils étaient très légers dans l'enfant n° 4.

Ces enfants ne se plaignaient presque d'aucun mal; on ne découvrait aucun ulcère ni aucune inflammation dans leur gosier; leurs sens étaient entièrement libres. Lorsqu'ils tousaient, ce qui arrivait rarement, la toux était plus suffocante et plus courte qu'elle ne l'est ordinairement; elle rendait un son rauque comme celui de la voix.

Ils étaient ordinairement assoupis, mais ils allaient et venaient dans leur maison, même dehors lorsqu'on les excitait, et malgré leur dégoût ils continuaient de se présenter aux repas. La déglutition n'était pas très difficile; l'haleine n'exhalait aucune mauvaise odeur.

La fille de six ans (n° 1) conservait encore assez de force et avait le visage très rouge, lorsque M. Duboueix fut appelé. Ce dernier lui fit donner aussitôt un pédiluve et un lavement emollient; ensuite il prescrivit l'application des sangsues aux deux côtés de la gorge et une dose d'ipécacuanha pour faire expectorer la membrane morbifique par le vomissement; il fit ajouter l'oxymel scillitique à la boisson ordinaire, qui était une infusion d'hyssope ou de fleurs de sureau. Il faisait respirer très souvent la vapeur de l'oxycrat ou de la boisson. Cette malade mourut le lendemain, neuvième jour de la maladie, après avoir expectoré quelque temps avant de mourir des crachats visqueux, purulents, et quelques portions de *membrane* tenace.

Le garçon de huit ans (n° 2) attaqué depuis six jours conservait encore plus de force que sa sœur n° 1. On lui fit le même traitement. De plus on lui appliqua un vésicatoire à la nuque, et chaque jour on lui frottait le cou avec un demi gros de pommade mercurielle. Il mourut le dixième jour au moment où on le trouvait beaucoup mieux. Avant de mourir il expectora des matières semblables à celles que sa sœur avait rendues.

M. Duboueix ne fit donner aucun remède à l'enfant de trois ans et demi (n° 3); il le trouva sans ressource: Cet enfant mourut peu après sa visite; quelque moment avant de mourir il s'était promené dans la chambre et on l'avait cru presque hors de danger.

La petite fille de cinq ans n'était encore que dès le premier degré de la maladie; son poulx était fort et soutenu, sa respiration devenait par degrés plus difficile que les autres. On peut, dit M. Duboueix, regarder ce premier état comme inflammatoire. Aussi fit-il appliquer à l'enfant les sangsues en plus grand nombre, et ordonna-t-il de les faire saigner plus longtemps. Il prescrivit aussi des pédiluves, des lavements, l'inspiration de vapeurs acéteuses; il fit donner à la malade un minoratif vermifuge qui l'évacua copieusement et lui fit rendre quelques vers. Le lende-

main on lui appliqua un vésicatoire à la nuque et l'on commença les onctions mercurielles qui furent continuées pendant plusieurs jours. Cette petite fille buvait la même infusion que ses frères et sœur, on y ajoutait seulement l'oxymel scillitique. Ses urines devinrent abondantes; elle eut le bonheur d'échapper au danger qui la menaçait, mais sa convalescence fut longue et très laborieuse.

Cette enfant n'expectora point comme les autres des matières purulentes et membraneuses; elle cracha seulement pendant quelques jours une humeur visqueuse.

Les trois enfants qui moururent, eurent peu après leur mort toute la peau parsemée d'un jauné brun, et leurs corps se putréfièrent très promptement.

(Résumé du J. de Méd.)

CHAMBON

Autopsies de cas de croup.

Nous avons ouvert il y a quelques mois, M. de Fourcroy et moi, le cadavre d'un enfant mort du croup, quai Pelletier. Le cadavre ne présentait à l'extérieur que la marque d'une circulation difficile dans les poumons, mais sans inflammation. La peau était d'une pâleur plus marquée que celle qu'on observe dans les autres maladies aiguës ; elle avait beaucoup de ressemblance avec celles des personnes mortes d'hydropisie, à la suite d'obstruction du foie ; une teinte manifestement jaune, mais légère, était unie à une pâleur extrême ; les veines du col étaient très gonflées et donnèrent à l'ouverture une grande quantité de sang ; la bouche était enduite d'une humeur blanche un peu visqueuse ; la base de la langue en était plus chargée, mais l'humeur y était plus divisée et plus fluide. Nous enlevâmes les poumons avec la trachée artère, jusqu'au larynx inclusivement : nous la trouvâmes remplie d'une matière purulente ; dont la proportion était en raison inverse du diamètre de ce canal et de ses divisions. Les cavités latérales du larynx étaient remplies de cette humeur ; une portion s'était épaissie sur les anneaux de la trachée, et formait une espèce de membrane, mais elle était loin d'avoir la consistance admise par la plupart des médecins qui ont écrit sur le croup. Elle se rompait et se déchirait avec une facilité extrême.

(*Mém. de la Soc. roy. de méd.*)

II. AUTEURS AYANT ÉCRIT SUR LA SCARLATINE.

INGRASSIAS

Præter quas ambo species et alias adhuc duas passim advenire conspeximus, quorum alteram nostri vulgo rossaniam vel rosaliam vocant, alteram vero crystallos, quoniam scilicet in hac quædam per universum corpus diversæ pustulæ efflorescunt, lupini magnitudine plus minusve, albæ ac instar crystalli resplendentes; quibus deinde apertis, aquositas quædam effluere visa est. Alteram vero idcirco rossaniam nuncupat, quoniam maculæ per universum corpus, plurimæ magnæ ac parvæ ignitæ ac rubræ cum vix effatu digno tumore, erysipelate nulla seorsum distincta instar, dispersæ sunt, ut totum corpus appareat. Utrumque horum vulgares, ut ejusdem generationis cum variolis ac morbillis existimant.... quorum vero (trium) affectuum duos tantum primos Arabes expresse definierunt. Rossaniam vero ab illis descriptam non offendimus nisi sub dictione alhamica Hali-Abbas ipsam comprehenderimus. Est enim Alhamica (Avicenna definiente) aliquid de variolis et morbillis; quæ definitio dictæ rossaniæ congruit.... Idipsum vero maxima ex parte observatum a nonnullis est ut variolæ morbillos præcedant, ac demum rossalia sive rubeola adveniat. Prius nam crassiorem sanguinem natura expurgat (variola), deinde vero bilioso sanguini materiam adhuc mitem (morbilli), et tandem puriorem bilam sanguinemque (rossania). Quanquam nonnulli sunt qui morbillos rossaniam esse existimant, nos autem distinctos esse duos istos affectus inspeximus... Nec solum cuti sed *visceribus* (exanthemata et enanthemata), oculisque et auribus, ac demum (ut uno verbo me expediam) toti corpori efflorescere....

MORTON.

De febre scarlatina.

Hunc morbum (universali medicorum consensu titulo peculiari donetur) prorsus eundem esse cum morbillis censeo, et solo efflorescentiæ modo ab illis distare. Quæ differentia tanti non est ut alterum Morbum constituat, nisi pari ratione Variolæ confluenti et discretæ, Herpes simplex et miliaris, erysipelas phlegmonodes et œdematosum, pleuritis vero et spuria, cæterique morbi ex accidenti aliquo inter se differentes, ubi causæ, symptomata, prognostica, curativæ indicationes atque methodus medendi (ab invicem minime distent) in diversos morbos dividantur; unde morborum tituli nimis luxuriantes frustra in artis nostræ et professorum damnum mirum in modum multiplicarentur. Ratio differentis Morborum nomenclaturæ rite petenda est a differente eorum causa, symptomatis et indicationibus curativis differentibus. Quorsum enim, ubi causa morbi est eadem, eadem fere symptomata, atque methodus medendi prorsus eadem, nova nomina affectibus imponantur, et morbi tanquam specie differentes sub alio atque alio titulo tractentur? Indolem autem febris scarlatinæ dictæ, et morbillorum prorsus eandem esse sequentia demonstrant. Ab eadem causa evidente, scilicet ambientis aëris injuriis, sive frigore in poros cutis admissis, sive miasmate contagio eosdem poros invadente, uterque affectus originem suam trahit, uterque venenarum fermentum colliquativum et deleterium morbi causam continentem sortitur; febris primum utriusque insultum comitans speciem prorsus eandem induit durante apparatu efflorescentiam præcedente, et cum comate, deliriis, cæterisque malignitatis indiciis conjuncta est, et iisdem symptomatibus a colliquatione provenientibus, tussi scilicet ferma cerebri gravitate, sterutinatione indesinent, diarrhæa, lachrymis involuntariis, etc. insignitur. Insuper efflorescentia in utroque affectu eandem partem, cuticulam scilicet, occupat, nec non stadia utriusque morbi

eodem modo pro genio fermenti plus minusve deleterii magis minusve protenduntur : ubi morbus est benignus utraque efflorescentia, 2 vel 3 morbi die incipit, atque 4 vel 5 die, una cum febre comitante recedit; ubi malignus est et epidemicus, non raro utriusque efflorentiæ apparatus ad 6 tum vel 7 tum diem protrahitur et efflorentia usque ad decimum quartum et ultra durat, et *inter ea* glandulæ oculorum, pharyngis, laryngis et bronchiorum inflammantur, febris inflammatoria accenditur, deglutitio et respiratio læditur, cæteraque anginæ et peripneumonix symptomata sæpius ingravescunt: Nec non febris post utramque efflorescentiam peractam pro ratione veneni diversa, naturam jam, *Συνεχὴς* jam *Συνοχὴς* malignæ sibi adjiscit, et denique morbi ipsissimi, scilicet tussis et phthisis pulmonaris, ophtalmia, diarrhæa pertinax et colliquativa, affectus strumosis. Cachexia, leucophlegmatia, ascites, etc utrumque notham indiscriminatim consequuntur; uterque eundem prorsus prognostica indifferentes ministrat, nec minus eandem plane medendi methodum postulat, adeo ut actum agere videamur, si post sermonem de morbillis habitum filum ejus protrahamus, ut de febre scarlatina, quæ quoad causas, symptomata, differentias, prognostica, indicationes curativas atque methodum medendi, idem ipsissimus morbus est, ulterius differamus. Exulet igitur per me e censu morborum hæcce febris, nisi cuiquam morbillorum confluentium titulo eam designare in posterum visum fuerit. Ideoque sicco pede eam præterire consulto statuimus, inter historias morbillorum unum vel alterum ejus exemplar proferre lubet, unde constare queat, eam eandem plane naturam cum morbillis obtinere.

(Cap. V.)

DUPUY DE LA PORCHERIE

Abrégé historique sur le mal de gorge gangreneux, épidémie qui a régné à Charon en 1762.

... Dès que l'on sut mon arrivée au château de Charon (le vendredi 23 juillet), l'on m'appella pour aller dans le bourg voir la femme du nommé Brion, tailleur d'habits, âgée de vingt un ans, d'une assez bonne constitution, et nourrice. Je la trouvai au lit; elle avait été attaquée, dans la nuit, par une fièvre brûlante, d'un grand mal à la partie antérieure de la tête, avec délire, mais surtout d'un grand mal de gorge qui gênait la déglutition, tant des liquides que des solides. L'intérieur de la gorge ne me parut ni tuméfié, ni enflammé; l'extérieur, du côté gauche, était tendu et très douloureux au toucher; les pulsations de l'artère carotide étaient évidemment redoublées; cette tension occupait tout l'espace qui est depuis la clavicule jusque derrière l'oreille; les glandes maxillaire et parotide étaient par conséquent très tuméfiées. La langue était recouverte d'un sédiment jaune; sa base me parut visqueuse et gluante. Je trouvai le poulx de la malade si petit, si misérable, que je crus devoir remettre la saignée à un autre temps; j'avais d'ailleurs su par le chirurgien du lieu, qui avait traité jusqu'à là tous ceux qui s'étaient trouvés dans le même cas, que les saignées plus ou moins répétées étaient devenues meurtrières; le mal, suivant son rapport, tombait à vue d'œil sur la poitrine et les étouffait. Ces mauvais effets des saignées ne le rebutèrent pas, parce qu'il croyait très fermement que ces maux de gorge étaient de l'espèce simplement inflammatoire, et que par conséquent la saignée y convenait; aussi son avis était que l'on saignât cette femme. Elle ne le fut cependant point. Mais voyant qu'il n'y avait pas de moment à perdre, le chirurgien lui donna, en ma présence, le tartre stibié avec la confection d'hyacinthe, fondus et délayés dans le moins de véhicule qu'il fut possible pour trois doses, à prendre de demi-heure en demi-heure; le remède fit effet; la malade vomit

beaucoup de bile très épaisse; les parties de la gorge se dégorgèrent, et les principaux accidents disparurent. Ce soir-là même, il n'y avait que très peu de fièvre.....

..... Le nombre des malades que je visitais chaque jour sur cette paroisse augmentant de jour en jour, monta à cent et plus. Ils avaient, en général, le pouls petit et fréquent avec plus ou moins de chaleur et de sécheresse à la peau, un grand mal de tête qui se faisait sentir chez tous à la partie antérieure, des vomissements de bile pure, et des déjections de même nature, avec plus ou moins de mal de gorge et de difficulté d'avaler. Plusieurs rendaient des vers, et cela était plus ordinaire parmi les enfants; d'autres ne se plaignaient que de la fièvre et de douleurs vagues dans le bas-ventre, qui s'étendaient à la poitrine extérieurement jusqu'à l'épaule; ces fièvres étaient continues, avec très peu de rémission; d'autres enfin, et c'était le plus grand nombre, avaient des fièvres d'accès quotidiennes, tierces et quartes, qui sont comme endémiques dans les marais; elles cédèrent au traitement usité en pareil cas.

Malgré la diversité apparente des symptômes sous lesquels cette épidémie paraissait se marquer, il me fut aisé de reconnaître que la cause qui les enfantait était générale; c'était dans tous une bile pure, plus ou moins exaltée, qui passait, avec plus ou moins de rapidité, des premières voies dans les secondes, affectait la tête et la gorge des personnes de tous les âges, de tous les sexes et de tous les tempéraments; dans ceux où elle se développait avec plus ou moins de fureur, elle formait, dans le fond de la gorge près de l'os hyoïde, dans la partie gauche, une inflammation qui suppurait promptement, et dont le pus très divisé se répandait bientôt dans la trachée artère et dans les bronches, d'où la mort s'ensuivait nécessairement.

J'ai trouvé dans tous les malades des marques évidentes de putridité de l'espèce bilieuse. (J. de Méd., 1765.)

HUXHAM

Sur les maux de gorge gangreneux (essai sur les fièvres).

Il est évident que cette maladie est une espèce de fièvre maligne et pestilentielle, dans laquelle le sang acquérait un très grand degré d'acrimonie, de dissolution et de putrescence. On ne doute point qu'elle ne fût contagieuse, puisqu'elle infectait souvent les familles entières, principalement les jeunes personnes. L'histoire de cette maladie démontre que la contagion produisait un très grand degré d'acrimonie dans le sang..... Ces maux de gorge gangreneux ne paraissaient pas en beaucoup de cas avoir moins de virulence; car à l'ouverture des cadavres on trouvait non seulement la gorge, mais encore les poudrons, les intestins, etc., gangrenés et toute la masse changée en sanie putride. L'inoculation de la petite vérole nous a appris qu'il ne fallait qu'une quantité infiniment petite de matière morbifique pour infecter toute la masse du sang.....

..... Quoique cette esquinancie maligne et ulcéreuse paraisse être une maladie distincte, cependant elle a une très grande ressemblance avec la fièvre angineuse que j'ai décrite dans le premier volume de mes *Obs. de Aere et Morbis epidemicis*, et c'est une chose très remarquable que la fièvre angineuse tenait beaucoup plus de la nature inflammatoire que les maux de gorge gangreneux, dont je traite ici: le sang était beaucoup plus dense et plus visqueux dans la première que dans la dernière et par conséquent demandait plus de saignées. Mais il en peut être de cette maladie comme de beaucoup d'autres épidémies, particulièrement de la petite vérole, de la rougeole et de la fièvre scarlatine, etc. La maladie générale varie beaucoup par la constitution particulière du malade....

..... Combien la fièvre scarlatine décrite par Morton ne diffère-t-elle pas de celle dont parle Sydenham? En effet, quoique la même contagion produise toujours la même maladie, cependant elle diffère beaucoup dans les différents sujets, et doit y

être traitée en conséquence : il y a certainement quelques maux de gorge gangreneux accompagnés d'une fièvre très violente, dans lesquels la saignée réussit au début..... La promptitude avec laquelle les corps de ceux qui meurent d'une fièvre putride maligne deviennent puants et infects, s'enflent et laissent couler une espèce de sanie de toutes leurs ouvertures, sont des preuves du grand mouvement intestin, de la raréfaction et de l'acrimonie des humeurs. Cela s'observait communément dans tous ceux qui mouraient des maux de gorge gangreneux que je viens de décrire. J'ai vu leur corps s'enfler prodigieusement même jusqu'à l'extrémité des doigts et des orteils, et devenir d'une lividité cadavéreuse, quoique presque entièrement froids, et exhaler une puanteur insupportable même avant que la personne ne fût morte, le sang sortir en même temps des oreilles, du nez, de la bouche et des intestins, lors même que le pouls avait été très faible et très petit, quoique excessivement fréquent depuis le commencement de la maladie. Tous ces phénomènes ne sont-ils pas dûs à l'air engendré par le mouvement intestin, la chaleur et la putridité du sang qu'on sait produire beaucoup d'air? L'emphysème qu'on observe dans certains sphacèles ne vient-il pas de la même cause?

(Trad. franç. du XVIII^e siècle.)

BONTÉ

De la fièvre maligne épidémique qui a régné à Coutances et dans ses environs pendant les années 1772 et 1773.

Dans un grand nombre la langue était sèche, aride et noire, les dents se couvraient d'une croûte de même couleur, le visage se gonflait, il devenait fort rouge par intervalles, surtout dans les redoublements; quelquefois cette rougeur ne se soutenait que quelques heures. Si le délire ne survenait pas, l'assoupissement était profond, les malades sans aucun sentiment laissaient échapper involontairement leurs excréments. La respiration était gênée et difficile, avec une toux fréquente et sèche, et une voix très rauque. La déglutition ne se faisait qu'avec peine, quelquefois à cause du dessèchement des organes du pharynx, quelquefois à raison des aphtes dont le gosier et les parties intérieures de la bouche étaient couvertes. Le pouls devenait plus fréquent, plus petit, souvent inégal; l'inégalité qu'il conservait était favorable. Il y avait une chaleur âcre à la peau; cette chaleur ne se soutenait pas également; les extrémités se refroidissaient même dans quelques moments : il arrivait un ou plusieurs redoublements dans le jour sans régularité ; ceux du soir étaient les plus violents. On voyait paraître sur l'habitude du corps des éruptions de différente nature. Souvent le malade était couvert de pétéchies rondes, sans aucune élévation, d'une figure quelquefois irrégulière, d'une couleur rouge, violette, ou noirâtre ; elles se montraient principalement sur les bras et sur les jambes. Dans quelques sujets elles se répandaient sur toute l'habitude du corps ; elles dégénéraient sur les lombes et sur les fesses en espèces de vergetures. Leur éruption n'était point constante : elles paraissaient et disparaissaient à diverses reprises; dans les redoublements elles se multipliaient. A ces pétéchies se joignait la miliaire : elles devenaient alors plus élevées, cette miliaire n'était pas abondante; vers le col et la poitrine les pustules étaient plus nombreuses qu'ailleurs.

TISSOT

Maux de gorge.

Il y eu ici ce printemps une quantité étonnante de maux de gorge de deux espèces ; les uns, dont je ne dirai rien, étaient des maux de gorge ordinaires, tels que je les ai décrits ; sans avoir rien de particulier, ils ont été fréquents parmi les adultes et ont trèsbien guéri par la méthode que j'ai proposée ; les autres, dont je dirai quelque chose, parce que je sais qu'ils ont régné dans quelques villages et qu'ils ont fait du ravage, attaquaient aussi les adultes, mais surtout les enfants, depuis l'âge d'un an, même au-dessous, jusque à douze ou treize.

Les premiers symptômes étaient, comme dans les maux ordinaires, le frisson, la chaleur, l'abattement, le mal de tête, le mal de gorge ; mais ce qui les distinguait, c'est 1° que souvent les malades avaient de la toux, et un peu d'oppression ; 2° le pouls était plus vite, mais moins dur et moins fort qu'il nel'est ordinairement dans les maux de gorge ; 3° ils avaient une chaleur âcre, sèche, et une grande inquiétude ; 4° ils crachaient moins qu'on ne crache dans le mal de gorge, et avaient la langue très sèche ; 5° quoique ils eussent de la peine à avaler, cependant ce n'est pas ce qui les incommodait le plus et ils pouvaient boire suffisamment ; 6° le gonflement et la rougeur des amygdales, de la luette et du fond du palais, n'étant que peu considérables, mais les glandes parotides et maxillaires et surtout ces dernières étant extrêmement gonflées et enflammées, la douleur dont ils se plaignaient le plus était cette douleur extérieure ; 7° quand le mal était grave, tout le col gonflait, et quelquefois même les vaisseaux qui rapportent le sang du cerveau étant gênés, les malades avaient de l'assoupissement et du délire ; 8° les redoublements de la fièvre étaient assez irréguliers et les urines n'étaient pas aussi enflammées que dans les autres maux de gorge ; 10° la saignée et les autres remèdes ne lessoulaient pas aussi promptement, le mal était plus long ; 11° il ne venait pas à

suppuration comme les autres espèces, *mais quelquefois les amygdales s'ulcéraient* chez presque tous les enfants et un grand nombre d'adultes, et il survenait ou dès le premier jour ou les jours suivants jusqu'au mieux une ébullition qui chez quelques-uns ressemblait assez à la rougeole, mais d'une couleur moins vive, et sans élévation.

J'ai vu quelques personnes chez lesquelles le mal de gorge s'est dissipé entièrement sans éruption et sans sueurs, mais qui restaient dans une inquiétude et dans une angoisse très forte avec un pouls vite et petit... (Suit le traitement).

... Un grand nombre éprouvaient un changement singulier dans la voix, différent de celui des maux de gorge ordinaires ; l'intérieur des narines était extrêmement sec.

Dans quelques sujets il n'y avait pas de symptômes inflammatoires et le mal dépendait uniquement d'embarras putrides dans les premières voies ; quelques malades même rendaient des vers, alors je n'ai point fait de saignées, etc... la sueur survenait naturellement et le malade guérissait.

Je sais qu'il est mort dans quelques villages un grand nombre de malades, avec une enflure au col prodigieuse.

(Avis au peuple, Lausanne 1761 et 1763.)

READ

Histoire de l'esquinancie gangreneuse pétéchiale qui a régné dans le village de Moiron au mois de novembre.

..... Cette maladie se manifesta vers le commencement du mois de novembre. Plusieurs enfants et adolescents se trouvèrent pris à la fois d'une douleur aiguë aux parties externes et internes de la gorge. Ils rapportaient presque tous cette douleur au cartilage thyroïde extérieurement, et intérieurement à la base de la langue. Bientôt les amygdales s'enflammaient, se tuméfiaient, le cou s'enflait, la langue s'épaississait, et se couvrait d'aphtes ; la respiration était gênée, la déglutition difficile. Tels étaient les symptômes relatifs aux parties essentiellement engorgées.

Une fièvre précédée de frissons et caractérisée dans le moment de l'invasion par un pouls grand, dur et vif, qui perdait ce premier caractère le troisième et quatrième jour, une douleur gravative à la partie antérieure de la tête, un assoupissement continu, un délire obscur, accompagnaient dès leur principe les symptômes d'engorgement ; le visage était enflammé, les yeux étaient ardents, saillants, humectés de larmes, la chaleur de la peau était âcre. Ces phénomènes étaient les effets nécessaires de la cause irritante mécanique, de l'engorgement des amygdales et des parties voisines.

Le principe putride s'annonçait bientôt par les nausées, la fétidité de l'haleine, la saburre de la langue, les excréments verdâtres d'une odeur insupportable, et toujours mêlés de vers ; les malades en rendaient aussi par la bouche. Les urines étaient rouges et enflammées dès le commencement de la maladie, elles devenaient blanchâtres et fort troubles vers le quatrième jour, et se maintenaient dans cet état jusqu'à ce que la rémission des symptômes permit l'usage des évacuants.

Les malades chez qui l'inflammation des amygdales se termina par résolution spontanée, c'est-à-dire indépendante de

l'action des vésicatoires eurent, pendant dix, douze à quinze jours, un écoulement d'une matière sanieuse et ichoreuse par le nez, les oreilles et les yeux; l'âcreté de cette matière excoriait les parties voisines. L'abondante évacuation que procuraient les vésicatoires à chaque pansement, suppléait avantageusement à cet écoulement incommode. Un seul malade à qui ce secours avait été administré tard, réunit l'écoulement du nez, des oreilles et des yeux avec celui qu'occasionnait l'action des cantharides.

La puanteur de ces écoulements était telle, que les malades ne pouvaient la supporter lorsqu'elle leur était propre, encore moins lorsqu'elle provenait des malades placés dans leur lit, même dans leur chambre.

La concentration du pouls, l'abattement des forces, la noirceur des dents, des lèvres, déterminaient évidemment le caractère de malignité.

Une éruption pétéchiiale qui paraissait le second, le troisième et souvent le quatrième jour, et qui occupait la poitrine, les bras et le visage, quelquefois toute l'habitude du corps, des taches livides, des phlictènes gangreneuses aux cuisses annonçaient enfin le suprême degré d'activité de la cause morbifique, la peste. Ce caractère était pleinement confirmé par la prompte lividité, et l'infection précipitée des cadavres que l'on était obligé d'inhumer peu d'heures après la mort.

Les taches pétéchiiales qui paraissaient dans cette maladie plus tôt qu'on ne les voit ordinairement dans les fièvres de ce genre, ne changeaient rien au caractère et à la marche des symptômes essentiels. Elles disparaissaient chez quelques-uns le même jour qu'elles avaient paru; d'autres les conservaient deux et trois jours; ceux chez qui elles duraient quatre et cinq jours, les perdaient par une efflorescence farineuse qui tombait quelques jours après en desquamations furfuracées; les sueurs seules, spontanées ou procurées par les infusions chaudes de fleurs de sureau, ont accéléré cette desquamation, et borné la durée des taches pourprées.

Les phénomènes relatifs à l'engorgement des parties internes de la gorge, et principalement l'inflammation des amygdales, étaient bientôt portés au plus haut degré d'intensité, et ceux

qui ont été attaqués dans le commencement de l'épidémie, ne purent profiter des secours qu'on porta aux habitants de Moiron. La gangrène de ces parties s'annonçait le troisième et quatrième jour par une puanteur intolérable; la langue qui avait été blanchâtre dans les premiers moments de l'invasion de la maladie, brunissait vers la base; le pouls, auparavant dur et vif, perdait ces deux caractères et devenait inégal et intermittent; des anxiétés un délire actif succédaient à l'assoupissement et au délire obscur primitifs; la mort qui suivait était toujours accompagnée de mouvements convulsifs qui rendaient affreux le spectacle de l'agonie des victimes de cette maladie. Un jeune homme de seize ans et une fille de vingt furent pris à cette époque d'une hémorragie considérable par le nez et la bouche, qui termina leur vie et leur souffrance. (*J. de méd.*)

Nous arrêtons ici nos extraits à propos des processus spécifiques, les matériaux que nous pourrions encore citer étant d'importance minime, ou faciles à trouver à cause de leur date récente, ou déjà analysés dans notre deuxième volume.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
I. MOYEN AGE OCCIDENTAL.	
I. PREARABISTES	5
MACER FLORIDUS.	5
Aloès.	5
Cepa.	6
Hyssopum.	7
Iris	8
Origanum.	9
Papaver.	10
Piper.	12
Plantago.	13
Porrum.	15
Pyrethrum.	16
Rosa.	17
Viola.	18
II. SALERNITAINS.	20
GARIONPONTUS.	20
De catarrho.	20
De uva.	21
De arteriacis.	21
De synanchia.	22
De secunda specie synanchiæ.	23
De tertia specie synanchiæ.	23
COPHRON.	26
De squinantia.	26
CONSTANTIN L'AFRICAIN	27
De angina.	27
Poema medicum de chirurgia	30
De cancro in naribus, labiis, gengivis et palato.	30
Flos medicinæ scholæ Salerni.	33
Agaricus.	33
Aloes.	33

	Pages
Canella.	33
Fœnugræcum.	33
Juniperum.	33
Nasturtium.	34
Pinea.	34
Piper.	34
Plantago.	34
Pyrethrum.	34
Rosa.	34
Sinapis.	35
Zinziber.	35
Influences astrales.	35
Etiologie.	35
Nosologie.	37
De vulnere gutturis vel œsophagi.	38
De squinantia.	38
De branco.	39
PLATEARIUS.	41
Alumen.	41
Ammoniacum.	41
De gummi arabico.	41
De moris.	42
De nitro.	42
Pyrethrum.	42
III. ARABISTES.	43
A. <i>Ecole de Montpellier</i>	43
GORDON (libium medicum).	43
De rheumate et corhyza.	43
De ægreditudinibus colli, pectoris et mamillarum. De squinantia seu angina.	45
De passionibus uvulæ.	50
VALESCUS (philonum).	55
De angina.	55
B. <i>Ecole italienne</i>	63
BRUNUS.	63
Squinantia.	63
De elongatione uvulæ et tumefactione.	64
De branchis sive amygdalis quæ in gutture nascun- tur, aliis passionibus gutturis.	65

	Pages
ROLANDO.	66
De apostematibus cujuscunque in gula et partibus ejus nascentibus.	66
De squinantia.	69
GUILLAUME DE SALICET.	72
De apostemate sanioso in collo et gula.	72
LANFRANC.	75
De apostematibus colli et gulæ.	75
ROGER.	79
De apostematibus gulæ et colli.	79
De squinantia, et ejus speciebus.	79
De branchis.	81
De uvula.	81
GUY DE CHAULIAC.	83
De squinantia.	83

II. TEMPS MODERNES.

I. PROCESSUS COMMUNS.	89
I. TRAITÉS DE MÉDECINE	89
FERNEL.	89
Linguae fauciumque morbi symptomata et causæ.	89
De julepo, apozemate et syrupo.	91
HOULLIER.	94
Angina.	94
PROSPER ALPINUS.	98
Morbi faucium.	98
De medicamentis ad gutturis phlegmonem, quam anginam vocant.	99
MASSARIA.	104
De angina.	104
MERCURIALI.	109
De angina.	109
MERCADO	114
De angina.	114
TRINCAVELLA	120
De inflammationibus ac ulceribus omnium partium oris et faucium	120

	Pages
De ratione curandi anginam et reliquas faucium et oris inflammationes.	126
De earundem partium ulceribus.	136
PARACELSE.	140
Squinantia	140
Squinantia	141
De Branco.	141
Squinantia Gallica	142
Prunella	143
SENNERT.	145
De carbunculo	145
De apthis et inflammatione tonsillarum apud pueros.	150
De tonsillarum inflammatione	151
De angina	154
An omnis angina sit ab inflammatione?	176
De angina notha	178
An laryngotomia utilis sit?	178
ETHMULLER.	180
De la déglutition blessée	180
Esquinancies	183
Inflammation des amygdales et autres parties avoi- sinantes.	188
Des abcès.	199
Aphtes	201
BOERHAAVE.	203
Angina.	203
Angina aquosa.	204
Angina scirrhusa.	205
Angina inflammatoria.	205
Angina suppuratoria.	208
Angina gangrænosâ.	208
Angina convulsiva.	208
SAUVAGE.	210
Esquinancie.	210
Esquinancie ordinaire.	210
Esquinancie épidémique	212
Esquinancie maligne	213
Esquinancie ulcérée	213
Esquinancie gangreneuse.	214
Esquinancie exanthématique	217

	Pages
Esquinancie trachéale.	218
Esquinancie du pharynx.	219
Esquinancie du Thymus	219
Esquinancie hépatique	219
Esquinancie par métastase	220
Esquinancie fausse.	220
Esquinancie causée par frictions mercurielles . . .	221
Esquinancie brûlante.	222
Esquinancie dysentérique.	222
CULLEN.	223
Cynanche.	223
VICQ-D'AZYR	226
De l'inflammation des amygdales	226
Du squirrhe ou de l'endurcissement des amygdales.	227
Angine ou esquinancie.	228
Angine œdémateuse ou fausse	231
Angine maligne.	232
Fièvre scarlatine angineuse.	240
Angine squirrheuse.	245
Angine sèche de Boerhaave.	246
Angine catarrhale.	247
PINEL.	248
Angine	248
II. TRAITÉS DE CHIRURGIE.	251
JEAN DE VIGO.	251
Des aposthèmes des mandibules	251
De l'aposthème du gosier nommé squinantia et de la cure d'icelle.	253
Ulcères de la bouche, des gencives, des amygdales et de la cure d'icelles.	255
De la chute de l'uvula.	255
AMBROISE PARÉ	258
De la squinancie	258
Des amygdales engrossies.	261
De la tumeur, et inflammation et relaxation de l'uvule	263
GUILLEMEAU	265
De la tumeur des amygdales.	265

	Pages
FABRICE DE HILDEN.	266
Ex ulcere circa fauces appetitus vitiosus, citra quem cibus deglutiri non poterat.	266
Modus eximendi ossicula, aliasque res gutturi in- fixas	266
Ex rebus extraneis gutturi infixis mors	269
FABRICE D'AQUAPENDENTE.	271
Des amygdales	271
Des tumeurs. Du polype comme il le faut tirer . . .	272
ESTIENNE GOURMELEN.	274
Du squirrhe.	274
BARBETTE.	275
De angina	275
DIMERBROECK.	277
MANGET.	280
Angina	280
De cura squinantiae	285
COURTIN.	286
De l'estiomène, gangrène, etc	286
DIONIS.	288
Des opérations des amygdales	288
GLANDORP	290
Polypi descriptio. }	290
De polypi speciebus, differentiis ac signis	290
Cura polypi.	291
VERDUC	293
De l'esquinancie	293
Absès en général.	299
MANNE	301
Observation de chirurgie au sujet d'un polype extra- ordinaire.	301
GARENGEOT.	305
Ouverture des absès amygdaliens, etc.	305
SHARP	307
Extirpation des amygdales.	307
HEISTER	308
Quomodo deprimi lingua debeat.	308

	Pages
Quomodo foramina ex naribus in palatum hiantia curari debeant	308
De uva sive uvula nimium producta.	309
De tonsillarum inflammatione	312
Quomodo aperiri tonsillæ exulceratæ debeant . . .	313
De tonsillis induratis	314
De tuberculis juxta fauces vel tonsillas provenien- tibus	316
DESAULT	317
Maladies de la bouche	317
III. OBSERVATIONES, CONSILIA, EPISTOLÆ, ETC . .	319
BENIVIENI.	319
Angina	319
Ex abscessu gulæ homo pene jugulatus.	319
BALLONIUS	321
De angina	321
AMATUS LUSITANUS	335
Curatio septuagesimatertia, in quo agitur de an- gina, etc	335
Angina periculosissima.	336
Curatio de angina occupante laryngem et œsopha- gum, etc	336
Angina stupenda	337
Ad tonsillarum et uvulæ, etc	337
Curatio quinquagesimaquinta in qua agitur de angina	337
De angina et nido hirundinis	338
CRATON.	340
In casu columellæ, seu uvulæ, pro quadam illus- tri persona	340
ARGULANUS.	341
Synanchia	341
VALERIOLA	344
Angina.	344
Observationis explanatio	346
MARCELLUS DONATUS	351
Verrucæ in gutture	351

	Pages
BERTINUS.	352
De morbis et symptomatibus oris et faucium . . .	352
Aphthæ	352
Gurgulio	352
Amygdalitis.	352
Paralysis linguæ	353
Angina	353
JOUBERT.	355
De angina	355
DODONÆUS.	356
De latente ac difficili angina.	356
LANGIUS	358
De calculo in tonsillis.	358
RHODION.	359
Deglutitio difficilis a caruncula uvulæ	359
Deglutitio difficilis a tumore squirrhoso.	359
Deglutitio abolita	359
A pyro cocto devorato mors	359
A pyro crudo improvide deglutito suffocatio. . . .	359
Inedia plurimorum dierum	360
RIEDLIN	361
Angina a tumore linguæ radicem occupante. . . .	361
Anginæ cura fortuita	362
Faucium inflammationem, etc.	363
CAMERARIUS	364
Angina gravissima	364
Paracelsi jactantia	364
SOLENER	365
De affectu oris et faucium sicco.	365
CAPPIVACIUS	366
De angina	366
ALEXANDER BENEDICTUS	368
Ad Paristhmia	368
De Notis anginæ	369
FORESTUS	371
De angina biliosa.	371
De paracynanche.	372
De tonsillis inflammatis et induratis.	373
Scholia.	375

	Pages
De utrisque glandulis, etc.	377
Scholia.	378
De ulceribus malignis tonsillarum.	379
Scholia.	379
De puella nubili sæpe inflammatione, etc.	381
Scholia.	382
De ingente gutturi apōstematē interno.	383
De synanche cum erysipelate faciei	384
De parasynanche	384
Scholia.	385
De angina admodum periculosa in pręgnantē.	386
Scholia	387
De angina periculosa per suppurationem finiente.	388
Scholia	388
Num in omni angina vena sit secanda.	391
Num jugularum sectio sit celebranda	392
ZAGUTUS LUSITANUS	395
De angina	395
Angina pręfocativa.	395
PLATTER.	397
Suffocationis a catarrho ad fauces periculum.	397
In transitu per gulam defectus.	397
Deglutionis impedimentum cum avulsa loquela.	399
Transglutiendi difficultas in alio.	399
Dentium dolor cum tumore aquoso in faucibus.	400
Faucium ulcus palatum exedens.	400
Ulcus exedens carnem in faucibus.	401
Angina cum tumore faucium extrinsecus apparente.	402
Angina cum tumore in faucibus.	404
Anginæ dolor ab ossiculo.	405
In gula dolor ob numisma inhærens.	405
Pleuritis cum angina lethalis.	406
TULPIUS.	407
Ulcera palati.	407
Prolapsus palati (paralysis).	407
Gula resoluta.	408
Angina interna.	409
RIVIÈRE.	411
Angina.	411
Tonsillarum inflammatio.	411

Angina.	411
FONSECA.	412
Angina citissime mortalis.	412
HARTMANN.	413
Cura anginæ.	413
Nota.	413
Angina notha.	414
Tonsillarum inflammatio.	414
Abcessus tonsillarum.	415
VAN DER WIEL.	416
Abcessus in faucibus, etc.	416
Pulvis e tubo ferreo in gulam explosus.	416
Annulus ingestus.	417
Frustum fistulæ (pipe) faucibus inhærens.	417
MARCHETTIS.	419
Obstructio utriusque naris polypo spurio.	419
Cancer exulceratus labri inferioris maxillæ, etc.	420
Tumor melliceris.	421
Tumor colli inflammatorius in puero.	422
HABICOT.	424
Preuves suffisantes par lesquelles le chirurgien doit faire la bronchotomie.	424
Moyens pour improuver la bronchotomie.	425
La réponse à tels moyens.	426
Les considérations pour faire la bronchotomie.	428
SCHENKIUS.	432
Columella inflammata.	432
Gurgulionis laxati historia curæ	432
Gurgulionis adeo laxati ut ad dentes usque ante- riores propenderet curatio	432
Columellam, si necessitas exigat, caute et pruden- ter esse excindendam, etc.	433
Uvula imprudenter resecta mortis causa.	433
Lapis in faucibus enatus.	434
Ex acri defluxione palati pars ad linguæ basim mollior exesa.	435
Palati lacuna Morbi Gallici vitio aut aliter deper- dita	436
Caruncula in palato.	436

	Pages
Cancer oris supernaturum, cancer albus dictus. . .	436
De squirrho ingenti, in ore nato : a multis pro . cancro habito.	437
Ab osse ethmoïdeo caro aliquando producta pon- deris librarum quinque.	439
Admiranda mulieris cujusdam excrescentia circa guttur nata, spiritum, cibum atque potum in- tercipiens, cujus portiones resectæ subinde re- natæ quæ non nisi cauterio cōhiberi.	440
Verrucæ in gutture	440
Stomatocatia.	441
Calculorum in tonsillis genitorum, pertinacem tus- sim excitantium historia et curatio	441
Phlebotomia	442
De tonsillarum affectibus	443
De muliere, cui in tonsillis spina piscium inhærebat, pene suffocationem inferens.	443
Abcessus tonsillarum, tumoribus utrinque sub auribus obortis, repurgatus.	443
De suffocatione.	443
Anginæ raræ species, ex primis vertebriis natæ . .	447
De latente ac difficili angina	448
In angina rubor et tumor cervicis et pectoris, si intro convertantur, mortis argumentum.	450
Angina lethalis	451
Angina octodecim, interdum duodecim, nonnun- quam etiam decem horis interficiens.	452
Ex angina strangulante et febre peracuta æger in quator horas obiit.	453
Historia cujusdam mulierculæ angina laborantis, quæ devoratis bolis aliquot cassiæ, etc.	453
Selecta aliquot tum de experimento, tum de histo- ria, ad anginam remedia.	454
Admirandum Galeni ad anginam experimentum . .	455
Anginæ cura per guttur lupi	455
Anginæ curatio mira et superstitiosa	455
Variæ ingeniosæ suppurati tumoris in angina ape- rienda rationes.	455
Angina suppuratio ruptorio medicamento promota, exemplum memorabile	457

	Pages
Anginæ tumor maturus in muliere, etc.	457
De angina gravi præfocativa, a qua conversa extrorsum tumor et suppuratio	458
Apertis post aures tumoribus, evacuato puro, soluta angina	459
Anginosi restituti inedia.	459
Laryngotomia.	459
HOFFMANN.	466
De angina	466
RICHARD MEAD.	472
De angina.	472
CAUBIUS	474
Des maladies gutturales	474
Des actions lésées des premières voies.	474
Des maladies des solides contenant.	475
II. ANATOMO-PATHOLOGISTES.	477
BONNET.	477
Deglutitio læsa ob columellæ et tonsillarum absen- tiam	477
Deglutitio læsa ab adipis copia gulæ et tracheæ ad- nata.	478
Deglutitio læsa ob epiglottidem indurata	478
Deglutitio læsa ob molem carneam circa exortum asperæ arteriæ innatam et œsophagum.	478
Deglutitio læsa a tuberculo fauces occupante	478
Deglutitio læsa ob pruni ossiculum subsistens in sinu quodam tonsillis insculpto, viam cibi potui- que arctans.	478
Angina latens a pulmonis abcessu purulento	479
Pulmonis substantiæ, etc.	482
Circa laryngem et fauces	482
Circa laryngem.	483
Angina pestifera in capite fomitem habens.	484
Extinctus vel præclusus spiritus.	489
Angina latens ab inflammatione pulmonum in gangrænam desinente. Tumor Thymi glandulæ phlegmone obsessæ.	490
Thymi glandula intumuerat atro sanguine referta.	491

	Pages
MORGAGNI.	492
Angine.	492
De la cécité, de l'aphonie, de l'angine	498
III. PROCESSUS SPÉCIFIQUES	501
I. AUTEURS AYANT ÉCRIT SUR LA DIPHTÉRIE.	501
JEAN WIERUS.	501
De angina publice grassante.	501
PALMARIUS.	504
De carbunculo pestilente.	504
PETRUS FORESTUS	505
De quibusdam sævis carbunculis in peste Del-	
phensi apparentibus.	505
VILLAREAL	506
An morbus suffocativus fuerit cognitus a medicis	
antiquis et neotericis ?	506
An sit contagiosus et pestilens morbus ?	508
De signis.	509
HERRERA	511
Causæ occultæ (astronomicæ), etc.	511
An hic suffocans morbus reputari possit inter eos,	
quorum dæmones sunt immissores ?	513
De signis pathognomicis, etc.	514
MERCADO.	517
De faucium et gutturis anginosis et lethalibus ul-	
ceribus.	517
PEREZ CASCALES	527
De natura morbi hispanicæ garotillo	527
HEREDIA	529
De anginae malignæ essentia.	529
De signis hujus morbi.	534
De parte affecta et de causis	536
De prognosticis hujus morbi	539
De signis et prognosticis anginae communis.	544
SGAMBATI.	547
Cerebrum non esse præcipue affectum	547
Non esse aphtas malignas	548
Non esse carbunculum	550
Non esse anginam proprie dictam	552

Probatur esse sacrum ignem, non modo malignum, sed pestilentem.	553
Quid de hujus morbi causis alii senserint.	555
Ex Hispania, non fluxisse huc seminaria contagionis.	556
Sacrum hunc ignem, non quod calidus humidus sit, sed quod calidus siccus, putrefacere	558
De signis prognosticis generatim	560
De signis gnosticis	561
De præservatione.	562
De auxiliis chirurgicis	564
CORTESIUS	567
Epistola ad Aguillonem.	567
SUMIÈRE	575
Observation sur une espèce de fièvre gangreneuse.	575
DUBOUEIX.	578
Angine membraneuse.	577
CHAMBON.	580
Autopsies de cas de croup	580
II. AUTEURS AYANT ÉCRIT SUR LA SCARLATINE .	581
INGRASSIAS	581
MORTON.	582
De febre scarlatina.	583
DUPUY DE LA PORCHERIE.	584
Abrégé historique sur le mal de gorge gangreneux.	585
HUXHAM.	586
Sur les maux de gorge gangreneux	586
BONTÉ	588
De la fièvre maligne épidémique	588
TISSOT	589
Maux de gorge.	584
READ	591
Histoire de l'épidémie pétéchiale.	591